

Pakuotės lapelis: informacija pacientui de pacientui

Metoprololsukcinatas Sandoz® retard 25, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 23,75 mg
Metoprololsukcinatas Sandoz® retard 50, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 47,5 mg
Metoprololio sukcinatas Sandoz® retard 100, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 95 mg
Metoprololio sukcinatas Sandoz® retard 200, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 190mg

metoprololio sukcinatas

Perskaitykite gerai visą pakuotės lapelį prieš u šį vaistą ketinate vartoti nes yra pateikta svarbi informacija apie jums. u.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt prireiks jo vėliau dar kartą reikia.
- Ar jūs dar klausimų? Tada susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.
- Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms , nes jis skirtas tik jums ir yra išrašytas. Tai gali būti kenksmingas yra kitiems ,net jei turi jie tuos pačius simptomus kaip jūs.
Atsiradus
- jums problemų vienas iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Ar jums atsiranda šalutinis poveikis kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekite su savo? Tada susisiekite su jūsų gydytojas vaistininkas.

Turinys šio šis pakuotės lapelis:

1. Kas yra Metoprololsuccinaat Sandoz retard ir kam yra šis vaistas naudojamas?
 2. Kada negalite šis vaistas ne naudoti ar turite būti papildomai atsargus su juo būti?
 3. Kaip naudojate jūs šį vaistą?
 4. Galimos šalutinės reakcijos
 5. Kaip laikote jūs šį vaistą?
 6. Turinys pakuotės ir kita informacija Kas yra
-
1. Metoprololsuccinaat Sandoz retard ir kam naudojamas šis vaistas naudojamas naudojamas?

Metoprololio sukcinatas Sandoz retard priklauso grupei vaistų kurie beta adrenoblokatoriais vadinami . Jieapsaugo širdį nuo per didelio aktyvumo . veikla.

Suaugusieji

Skirta gydymui nuo aukšto kraujospūdžio (hipertenzija),esant spaudžiančiam skausmingam pojūčiui krūtinėje (krūtinės angina) arba širdies ritmo sutrikimams , (krūtinės angina) širdies ritmo sutrikimai, po vieno miokardo infarkto siekiant kito naujo miokardo infarkto išvengti užkirsti kelią, esant vieno per greitam skydliaukės funkcionavimui skydliaukė hipertireozėhipertireozė) en ter prevencija nuo migrenos priepuolių.

Vaikai ir paaugliai nuo 6-18 metų:

Dėl gydymo nuo aukšto kraujospūdžio (hipertenzijahipertenzija).

2. Kada galite šį vaistą ne vartoti ar turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Kada galite šį vaistą ne vartoti?

- Jūs esate alergiškas vienai iš sudedamųjų medžiagų šiame vaistiniame preparate. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje šio dokumente 6 dokumente pakuotės lapelis.
- Jūs esate padidėjusio jautrumo kitų kraujospūdį mažinančių vaistų iš tos pačios rūšies kaip Metoprololsuccinaat Sandoz retard, būtent beta adrenoblokatoriai . Jūs.
- U turi sutrikimai širdies impulsų laidumas (2- ir 3 laipsnio AV-blokada).
- Jūs turite ūminį širdies nepakankamumą arba širdies nepakankamumas kuris nėra kontroliuojamas , su skysčiu skystis plaučiuose plaučiai (plaučių edema) arba sumažėjęs kraujospūdis (hipotenzija).Esant
- šokui sukeltam nepakankamo širdies siurbimo funkcijos. Jūs širdies.
- U kenčia nuo sunkios kraujotakos sutrikimų.
- Esant sunkiai sulėtėjusiai širdies ritmui (bradikardija).
- Jūs esate nuolat arba su pertraukomis gydomas su tam tikri vaistai kurie širdies siurbimo jėgą veikia paveikti būtentbeta agonistai).Jūs
- turite tam tikrą sutrikimą širdies ritme (Sick sinus sindromas (Sergančio sinuso sindromas) en u turite tam nėra širdies stimulatorius gavote.
- Jūs turite vieną širdies infarktą (miokardo infarktą) derinys su vienu lėtu širdies ritmu, vienas žemas kraujospūdis arba jūs esate dekompenсуotas.
- Jūs gaunate vaistą verapamilį injekcijos būdu injekcija į veną suleidžiamas ,nes todėl todėl de kraujospūdis gali sumažėti, širdies laidumo sutrikimai gali pasireikšti ir širdies nepakankamumas gali atsirasti.

Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo šis vaistas?

Susisieki te su jūsų gydytoju arba vaistininku prieš jūs šį vaistą vartojate. Visada informuokite gydytoją(us) kurie jus gydo žinoti kokius vaistus problemos arba ligos jūs dar daugiau po gydymu esate. Metoprololsuccinatas Sandoz retard turi atsargiai būti skiriamas ..

atsargūs su su Metoprololio succinatas Sandoz retard:

- kaip jūs norite nutraukti. Jūs galite būtent ne staiga nutraukti, nes tai lėtinis širdies nepakankamumas (sumažėjusi širdies siurbimo galia) gali pabloginti ir tas riziką ant širdies priepuolio (miokardoinfarktas) ir staigios mirties padidėjimą. Žr. dėl nutraukimo patarimo de rubrika 'Jei jūs nustojate vartoti vartojimą šio šio vaisto';
- jei jūs kitus vaistus vartojate širdies palaikymui širdies funkcijos vaisto. Yra gali būtent vienas blogėjimas širdies funkcijos atsirasti;
- jei jūs kenčiate nuo priepuoliais atsirandančio dusulio dėl spazmų raumenų ir ir patinimas iš gleivinės kvėpavimo takų dažnai lydimas kartu su kosuliu ir skrepliavimu skreplių (astma (bronchinė))bronchinis)) en als u tam gydomas yra su pvz. terbutaline. Kai de simptomai blogėja. Tai gali būti reikalinga de dozę pritaikyti te pritaikyti;
- jei jūs cukrinis diabetas (diabetas mellitus) turite. Metoprololis gali de simptomus nuo per žemą cukraus kiekį į jūsų kraujyje maskuoti. De tikimybė tam yra tačiau maža.;
- jei jūsų širdis nepakankama siurbimo galia turi ir jūs ne dėl gydomas esate. In jei atvejis galite Metoprololsuccinaat Sandoz retard ne naudoti;
- jei turite problemų su padidėjusiu sulėtėjusiu širdies ritmu (bradikardija). Vaistas). Tai gali būtent reikia būti de dozavimas prie te pritaikyti arba palapsniui te nutraukti;
- jei jūs kenčiate nuo šalčio pirštai pirštai enof pėdų (taip pat be vartojimo vaistų ,Raynaud sindromas) arba protarpinis šlubavimas Raynaud) arba protarpinis

šlubavimas). Metoprololio sukcinatas Sandoz retard gali Sandoz retard gali de simptomai pablogėja. Het is svarbu kad jūsų gydytojas tai žinotų;

- jei jums reikia operacijos reikia . Het issvarbu kad jūsų jūsų gydytojas žinokite kad jūs metoprolol vartojate;
- jei jūs tuo pačiu metu gydomas esate su digitalis (vaistas kuris širdies siurbimo jėgą stiprina). Taigali gali reikia yra de dozavimą pritaikyti ar arba iš palaipsniui nutraukti ;jei
- jūs turite rimtą sutriktą kepenų funkciją kepenų turite. De dozavimas turi prireikus būti sumažintas;
- esant ant navikas ant antinksčių širdies kuris gali būti susijęs su staigus stiprus kraujo spaudimo padidėjimas, stiprus galvos skausmas, prakaitavimas ir pagreitėjęs širdies plakimas (feochromocitoma).
- jei jaučiate nuo stipraus padidėjusio jautrumo tam tikriems tam tikras medžiagos. Šokas (stiprus sumažėjimas kraujospūdžio kraujospūdis, blyškumas, neramumas, silpnas greitas pulsas, drėgna oda, sumažėjęs sąmoningumas) dėl vienas staigus stiprus kraujagyslių išsiplėtimas dėl to dėl to (anafilaksinis šokas) gali būtent būti sunkesnis būti.

Pasitarkite su savo gydytoju jei vienas iš aukščiau minėtų įspėjimų dėl jums taikoma yra, ar kad praityje buvo yra buvo.

Nėra patirties su gydymu širdies nepakankamumo širdies nepakankamumas prie pacientų:

- vyresnių nei 80 metų;
- su tam tikru ir padidėjusiu širdies raumeniu;
- su tam tikra širdies vožtuvų liga;
- su vienas stipriai sumažėjusi kepenų- ir inkstų funkcija;
- kurie trumpiau nei 3 mėnesiai atgal vienas širdies priepuolis turėjo ;su
- vienas įgimtas įgimtas širdies yda.

Vartojate jūs kitus kitus vaistus?

Vartojate jūs be Metoprololsuccinaat Sandoz retard kitus kitus vaistus, turite jūs tai trumpai atgal padaryta arba eina jūs tai galbūt netrukus daryti? Pasakykite kad kad jūsų gydytojui arba vaistininkui. Tai taikoma taip pat už vaistus kuriuos jūs be recepto galite gauti.

Naudokite vaistų kortelę . Jūs užrašote ant jos kokius vaistus jūs vartojate ir j j kurie dozavimas.

Leiskite taip pat kitiems žinoti kurie vaistai jūs vartojate!

Metoprololsukcinatas Sandoz retard gali de poveikį nuo kai kurių vaistų paveikti ir atvirkščiai. Tai taikoma pvz. dėl:

- kalcio antagonistai, tokie kaip verapamilis ir diltiazemas. Šie vaistai gali būtent susitraukimą sukelti širdies (kontraktilumas širdies) ir de laidumas širdies (AV- laidumas) neigiamai paveikti (žr. taip pat de skyrių 'Kada galite šį vaistas ne naudoti');
- rifampicinas, vaistas nuo kai kurių infekcijų ,nes jis metoprololio kiekį kraujyje mažina ;vaistai
- vaistai prieš alergiją (antihistamininiai vaistai), nes jie metoprololio kiekį kraujyje padidina ;vaistai
- nuo (sunkios)depresijos depresija depresijadepresija) of vaistai nuo sunkios psichikos ligos (antipsichotikai), nes jie metoprololio kiekį kraujyje padidina ;tam tikra

- grupė skausmą malšinančių vaistų su su taip pat vienas priešūždegiminis ir karščiavimą mažinantis veikimas (COX-2 inhibitoriai), nes jie kiekį metoprololio kraujyje padidina;
- ganglijų blokatoriai (vaistai nuo nervų ligų), MAO-slopintuvai (vaistai nuo depresijos) ir kiti beta adrenoblokatoriai (taip pat akių lašai), nes papildoma kontrolė būtina ;
- klonidinas, nes tai derinyje su vienu beta adrenoblokatoriumi simptomus aukšto kraujospūdžio sustiprintu laipsniu gali sugrįžti ; vaistai nuo sugrįžti;
- vaistai prieš širdies ritmo sutrikimai (anti-aritminiai vaistai), tokie kaip amiodaronas ir chinidinas. Šie vaistai gali prailginti širdies laidumo laiką (AV-laidumas) ir turi turėti vienas neigiamas poveikis širdies susitraukimo jėgai; širdies;
- narkozės vaistai (žr. taip pat de skyrių 'Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo šis vaistas?');
- indometacinas (nustatytas skausmą malšinantis vaistas su taip pat vienas priešūždegiminis ir karščiavimą mažinantis veikimas), nes jis jis kraujospūdį mažinantis poveikis metoprololiui gali sumažinti;
- insulinas ir geriamieji vaistai nuo cukrinio diabeto, nes kraujyje cukraus kiekį mažinantis poveikis šių vaistų dėl beta adrenoblokatorių gali būti sustiprintas. In tas atvejis bus dozė dozavimas šių šis vaistai reikia būti pritaikytas;
- lidokainas, vaistas vaistas nuo širdies ritmo sutrikimų, nes metoprololis išskyrimą nuo lidokaino iš tai kūno gali sumažinti;
- digitalis, vaistas kuris tas širdies susitraukimo jėgą siurbimo galia padidina padidina, nes vienu metu vartojimas su šiuo vaistu gali sulėtinti širdies ritmą gali sukelti;

Į ką reikia atkreipti dėmesį su alkoholiu? Alkoholis padidina padidina de kiekis metoprololis jūsų kraujyje.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Ar esate nėščia, manote jūs nėščia esate , norite, norite nėščia tapti arba duoda jums žindote? Tada susisiekitė su jūsų gydytoju arba vaistininku prieš jūs šį vaistą vartojate.

Nėštumas:

Jūsų gydytojas gali Metoprololio sukcinatas Sandoz retard paskirti nėštumo metu de nėštumo jei de pranašumai vartojimo vartojimo jums u nusveria prieš de riziką už vaikui negyvagimis vaikas.

Jei jūs Metoprololsuccinaat Sandoz retard vartojote naudojote iki prie gimdymo gimdymas jūsų jūsų naujagimis vaikas galbūt pirmas pirmas dvi dienas po de gimimas papildomai turi būti kontroliuojamas.

Žindymas:

Metoprololsuccinaat Sandoz retard neturi būti naudojamas per turi būti žindymo laikotarpis kai žindymas vyksta duota, nebent tai vartojimas būtinas laikomas . Metoprololis yra išskiriamas per motinos pieną . Esant normalioms dozėms yra kiekis metoprololio motinos piene motinos pienas mažas. Jei jūsų gydytojas jums Metoprololsuccinaat Sandoz retard išrašo, tuomet bus jūsų vaikui papildomai bus tikrinama.

Vaisingumas:

Duomenys apie vaisingumą rodo ne ant ypatumai.

Vairavimo gebėjimai ir naudojimas naudojimas mašinų

Kiek žinoma žinoma yra nėra jokių neigiamų poveikių vairavimo gebėjimams vairavimo gebėjimams ir tai gebėjimas valdyti mašinas arba valdyti. Pasireiškus nuo šalutiniams poveikiams kaip nuovargis ar galvos svaigimas turite atsižvelgti tačiau į tai kad tas šis tas reakcijos greitį neigiamai gali paveikti.

Metoprololsukcinatas Sandoz retard turi gliukozės, sacharozės ir laktozės
Jei jūsų gydytojas jums pranešė kad jūs u tam tikrus cukrus ne toleruoja, susisiekitė su savo gydytoju prieš vartodami šį vaistą ..

3. vartojate jūs šį vaistą ?Vartokite

Naudojimas šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jums tai pasakė .. dėl teisingo vartojimo ? Tada susisiekitė sujūsų gydytoju arba menai vaistininkas.
De rekomenduojama dozė yra:

Padidėjęs kraujospūdis (hipertenzija):

Pradinė dozė: vieną kartą per dieną 1 tabletė Metoprololsuccinaat Sandoz retard 50. Jei reikia te padidinti iki 100-200 mg vieną kartą per dieną.

Kai jūs kenčiate nuo sumažėjusios kepenų funkcijos kepenų, gali gydytojas nuspręsti dozę sumažinti artritas sumažinti (pavyzdžiui iki 1 tabletės Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25).

Slegianti skausminga pojūtis ant krūtinės (krūtinės angina):

100-200 mg vieną kartą per dieną. Daugiausia 2 tabletės Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200 per diena.

Širdies ritmo sutrikimai:

100-200 mg vieną kartą per dieną. Jei reikia gali gydytojas nuspręsti šį dozavimą padidinti ..

greitas veikimas veikimas iš skyd liaukės (hipertireozė):

100-200 mg vieną kartą per dieną. Jei reikia gali gydytojas nuspręsti šį dozavimą padidinti ..

išvengti prevencija nuo migrenos priepuolių:

100-200 mg vieną kartą per dieną.

Širdies infarktas:

Po to, kai pirmiausia pradėjote vartoti su įprastomis metoprololio tabletėmis, palaikomoji dozė: vieną kartą per dieną 1 tabletė Metoprololsukcinatas Sandoz retard 200.

Jei jūs pastebite kad Metoprololsukcinatas Sandoz retard per stipriai arba priešingai per silpnai veikia, pasitarkite tada jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu neturi būti sulaužytos ar kramtomos , bet turibūti nurytos kaip visos arba pusės tabletės su vandeniu vartojamas nuryti.

Naudojimas vaikams ir paaugliams ::

kraujospūdis : Vaikamsnuo 6 metų ir vyresniems dozavimas yra dozė dozavimas priklauso nuo kūno svorio. Jūsų gydytojas apskaičiuos tinkamą dozę jūsų vaikui. Įprastinė pradinė dozė

yra 0,5 mg kilogramui kūno svorio vieną kartą per dieną vieną kartą kasdien, bet gali ne didesnė būti nei 50 mg. yra pasirinkta už esamą galimą tabletės stiprumą kuris artimiausias prie apskaičiuotos dozės yra .. Jūsų gydytojas gali dozę padidinti iki 2,0 mg kilogramui kūno svorio kūno svoris priklausomai nuo poveikio kraujospūdžiui .. virš 200 mg vieną kartą per dieną nėra iširtos iširta prie vaikų ir jaunimo.

Vartojimas iš Metoprololsuccinaat Sandoz retard nėra rekomenduojamas prie vaikų jaunesnių nei 6 metų ..

trukmė gydymas

Metoprololsuccinatas Sandoz retard bus dažniausiai ilgai naudojamas būti.

Ar jūs per daug šio šio vaisto naudojote?

Kada jūs per daug iš Metoprololsuccinaat Sandoz retard turi panaudojote, kreipkitės nedelsiant susisieki su savo gydytoją arba vaistininką. Simptomai gali būti: smarkiai sumažėjęs kraujospūdis (hipotenzija), sulėtėjęs širdies ritmas (bradikardija), sutrikimas širdies laidumo sistemoje (AV- blokada), širdies nepakankamumas (nepakankama širdies siurbimo galia) (dekompensacija cordis), šokas sukeltas dėl nepakankamo širdies siurbimo širdies, širdies sustojimas, dusulys dėl spazmo raumenų raumenų kvėpavimo takų kvėpavimo takų (bronchų spazmas), sąmonės sutrikimai (arba netgi koma), pykinimas, vėmimas ir mėlyna spalva lūpų lūpų, liežuvio, odos ir gleivinės dėl deguonies trūkumo dėl deguonies organizme kraujas (cianoze). Vienu metu vartojimas alkoholio, vaistų nuo aukšto kraujospūdžio, chinidinas (vaistas nuo širdies permušimų) arba barbitūratai (tam tikri vaistai nuo epilepsijos) sustiprina de simptomus.

Ar pamiršote pamiršote šį vaistą į išgerti ?Nevartokite

ne dvigubos dvigubas dozė om vieną pamiršote dozė in pasiimti pasivyti. Jei jūs pamiršote esate vieną dozę in vartoti ,galite jūs tai šis vis dėlto daryti, nebent tai beveik laikas yra prieš jūsų kitą dozę. Laikykitės tokiu atveju įprasto dozavimo grafiko dozavimo schema.

Jei jūs nutraukiate vartojimą šio vaisto Šis vaistas

Gydymas Metoprololsuccinaat Sandoz retard paprastai neturėtų staiga būti nutrauktas , nes nutrauktas, nes kadangi šis lėtinis širdies nepakankamumas (sumažėjusi širdies siurbimo galia širdies) gali pablogėti ir rizika širdies priepuolio padidėja širdies smūgis (miokardo infarktas) ir staigus mirtis gali padidinti. Gydytojas turės kaip taisyklė dozę palaiptai sumažinti per vieną laikotarpį ne mažiau kaip 2 savaites.

Ar jūs dar kiti klausimai apie vartojimą šio šio vaisto? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti. Ne visi gauna su tuo susidurti ..

šalutiniai poveikiai yra labai dažni ,dažni ,, kartais, retai arba labai retai pranešta:

Labai dažnai (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 vartotojų)Nervų sistema

Nervų sistema: nuovargis.

Dažnai (pasireiškia pas mažiau nei 1 iš 10 vartotojų) Širdis:

sulėtėjęs širdies ritmas (bradikardija), širdies plakimas Kraujagyslės

:: dėl per pavyzdžiui greitai atsistoti iš sėdimos padėties arba gulimos padėties kartais lydymas su galvos svaigimu galvos svaigimas ortostatinė hipotenzija), šaltos rankos rankos en kojos, širdies plakimas (palpitacijos)

Nervų sistema: galvos svaigimas, galvos skausmas Kvėpavimo sistema: dusulys fizinio krūvio metu Virškinimo traktas

Virškinimo traktas: pykinimas, pilvo skausmas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas

Kartais (pasitaiko mažiau nei 1 iš 100 vartotojų mažiau nei 1 iš 100 Širdis: paūmėjimas

simptomų širdies nepakankamumo (simptomai iš širdies nepakankamumas (nepakankamumas siurbimo jėga širdies), tam tikras sutrikimas laidumo širdies širdies, vedantis į ritmo sutrikimus (širdies blokada), skysčių kaupimasis (edema), skausmas krūtinėje širdies sritis; vienas 'šokas' sukeltas dėl nepakankamo širdies siurbimo širdies kardiogeninis šokas) pas pacientus su staigiu širdies priepuoliu (ūminis miokardo infarktas)

Nervų sistema: jautimas nuo dilgčiojimų, niežulys arba tirpimas be kad būtų priežastis (parestezija parestezija Raumenys

:: raumenų mėšlungis Virškinimo traktas: vėmimas Bendras: svorio padidėjimas

Psichika: (sunkus) prislėgtumas (depresija), sumažėjęs budrumas, mieguistumas arba nemiga, košmarai

Kvėpavimo sistema: Dusulys dėl spazmo raumenų raumenų kvėpavimo takų kvėpavimo takų (bronchų spazmas), taip pat pas pacientus kurie neturi užsikimšimų neturi iš kvėpavimo takų Oda: lakusis odos bėrimas, padidėjimas prakaito gamybos

Retai (pasitaiko mažiau nei 1 iš 1.000 vartotojų) Širdis: laidumo sutrikimai, laidumo sutrikimai, sutrikimai širdies ritme (aritmijos) Virškinimo traktas: sausa burna

Kepenys: kepenų funkcijos sutrikimai Psichika: nervingumas, nerimas

Lytiniai organai: impotencija, sumažėjęs noras seksui

Nosis: uždegimas nosies gleivinės būdingas per užsikimšusi nosis ,čiaudulys ir sekrecija (rinitas)

Akys:

sutrikimai regėjimo prie metu ,, sausos ir ar sudirgintos akys, uždegimas junginės (konjunktyvitas)

Oda

:: Labai

retai (pasitaikoma mažiau nei 1 iš 10 000 už prie mažiau nei 1 iš 10.000 naudotojai)

Oda: žūtis nuo audinio pas pacientus su sunkiais kraujotakos sutrikimais, padidėjęs jautrumas šviesai ,paūmėjimas paūmėjimas pasikartojančių pasikartojantis odos liga lydymas vykstantis su pleiskanojančiu, sausu odos bėrimu (psoriazė)

Virškinimo traktas: skonio sutrikimai

Kraujas: kraujo sutrikimas (trūkumas trombocitų trombocitų lydymas suporuota vykstantis su mėlynėmis ir kraujavimo polinkiu kraujavimo polinkis trombocitopenija trombocitopenija Kepenys:

kepenų uždegimas (hepatitas) lydymas vykstantis su gelta (geltonaspalva odos iš oda arba akys)

Sąnariai: sąnarių skausmas (artralgija)

Psichika: atminties praradimas, sumišimas, pojūčiai dalykų kurie nėra ne yra (haliucinacijos), atsiribojimas nuo savęs arba nuo savo jausmo (depersonalizacija)

Ausys: spengimas ausyse (tinitas) Lytiniai organai: potencijos sutrikimai

Pranešimas pranešti iš šalutinių poveikių

Ar jus vargina šalutiniai poveikiai, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame šiame pakuotės lapelyje nurodyti. U gali šalutinius poveikius taip pat pranešti per Nyderlandų Šalutinių poveikių Centras Lareb. Svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami šalutinius poveikius apie pranešti, padedate jūs mums gauti daugiau informacijos apie gauti apie saugumą šio šio vaisto.

Niekada savarankiškai dozės dozavimą mažinti ar gydymą (laikina) nutraukti! Žr. 'Jei jūs nustojate vartoti šį vaistą'. Kaiplaikote

5. Šį vaistą ? Laikyti žemiau 25°C

Laikyti nepasiekiamoje vietoje

ir ne matomoje laikyti nuo vaikų saugoti.

Po atidarymo buteliuko tabletės yra dar 6 mėnesiai galioja ..

šio vaisto jei negalioja daugiau po de galiojimo termino. Jį rasite ant pakuotės po „EXP“. Ten nurodytas mėnuo ir metai . Paskutinė diena paskutinis diena iš mėnesio yra galiojimo pabaigos data.

Neskalaukite vaistų ne per kriauklę ar tualetą ir išmeskite jų ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių nebe naudojate . Jeivaistus tinkamai išmesite teisingai būdu pašalinsite jie bus tinkamai teisingas būdas sunaikintas ir nepatenka į aplinką ..

6. pakuotės ir kita informacija Kokios medžiagos yra šiame produkte šis produktas vaistas?
- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra metoprololio sukcinatas metoprololio sukcinatas.
Sandoz retard 25: viena tabletė turi 23,75 mg metoprololio sukcinato metoprololio sukcinatas atitinkantis atitinkantis su 25 mg metoprolol tartratas.
Metoprolol sukcinatas Sandoz retard 50: viena tabletė turi 47,5 mg metoprolol sukcinato, atitinkantis su 50 mg metoprolol tartratas.
Metoprolol sukcinatas Sandoz retard 100: viena tabletė turi 95 mg metoprololio sukcinatas, atitinka su 100 mg metoprololio tartratas.
Metoprololio sukcinatas Sandoz retard 200: viena tabletė turi 190 mg metoprololio sukcinatas, atitinka su 200 mg metoprololio tartratas.
 - De kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra sacharozė, kukurūzų krakmolos , gliukozė (skysta), poliakrilatas , talkas (E553B), magnio stearatas (E470b), mikrokristalinė celiuliozė (E460), krospovidonas krospovidonaskoloidinis koloidinis silicio oksidas (E551), laktozė, hipromeliozė (E464), titano dioksidas (E171) ir makrogolis 4000.
 - Metoprololio sukcinatas Sandoz retard 100 turi taip pat geltonas geležies oksidas (E172).

Kaip atrodo Metoprololio sukcinatas Sandoz retard ? en kiek yra pakuotėje vienoje pakuotėje?
Metoprololsukcinatas Sandoz retard 25, 50 ir 200:
balta, pailga tabletė su lūžio linija abiejose pusėse . Tabletė sulūžio linija lūžis brūkšnys gali į dvi lygias dozes būti padalintas.

Metoprololsuccinaat Sandoz retard 100:
šviesiai geltonas, pailgas tabletė su lūžio linija abiejose pusėse ..
lūžio linija lūžis brūkšnys gali į dvi lygias dozes būti padalintas.

Tabletės yra supakuotos į polipropileno polipropilenasaliuminioarba PVC- aklaroaliuminiolizdinę pakuotę lizdinę pakuotę in vienas kartoninė dėžutė arba HDPE buteliukuose.

Metoprololsukcinatas Sandoz retard 25, 50, 100 ir 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 ir 90 tabletės su kontroliuojamu išsiskyrimu į lizdines plokšteles ir 30, 100, 250 ir 500 tabletės su reguliuojamu išsiskyrimu buteliukuose.

Ne visos nurodytos pakuotės yra rinkoje pateikiamos ..

turėtojas leidimo prekiauti rinkoje į prekyba atnešti ir gamintojas Leidimo turėtojas:
Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Nyderlandai

Gamintojai:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben Vokietija

Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
Nyderlandai

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovėnija

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovėnija

Šis vaistas yra įregistruotas registre po numeriu:
RVG 32376: Metoprololsukcinatas Sandoz retard 25, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 23,75 mg
RVG 32377: Metoprololsukcinatas Sandoz retard 50, tabletės su kontroliuojamu atpalaidavimu 47,5 mg
yra RVG 32378: Metoprololsukcinatas Sandoz retard 100, tabletės su reguliuojamas išsiskyrimas 95 mg
yra RVG 32380: Metoprololsukcinatas Sandoz retard 200, tabletės su reguliuojamas išsiskyrimas 190 mg

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas sausio mėn. 2025 sausis 2025

Transtoyou