

Pakningsvedlegg: informasjon for pasienten Metoprololsuccinat

Sandoz® retard 25, tabletter med regulert frigivelse 23,75 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 50, tabletter med regulert frigivelse 47,5 mg 47,5 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 100, tabletter med regulert frigivelse 95 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 200, tabletter med regulert frigivelse 190mg

metoprololsuccinat

Les nøye hele pakningsvedlegget før du dette medisin skal bruke fordi det står viktig informasjon i for deg.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje trenger du det senere igjen nødvendig.
- Har du mer spørsmål? Ta da kontakt med din lege eller apotek.
- Gi denne medisinen ikke til andre , fordi det er bare til du foreskrevet. Det kan være skadelig for andre ,selv om de har samme symptomer som deg. Får
- du bivirkninger du har plager med en av de bivirkninger som i avsnitt 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget står? Ta da kontakt med din lege apotekar.

Innhold av denne pakningsvedlegget:

1. Hva er Metoprololsuccinat Sandoz retard og hva brukes denne medisinen til?
 2. Når kan du dette medisin ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?
 3. Hvordan bruker du dette medisin?
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
 6. Innhold av emballasjen og annen informasjon
-
1. Hva er Metoprololsuccinat Sandoz retard og hva brukes dette legemidlet til?

Metoprololsuccinat Sandoz retard tilhører til gruppen medisiner som betablokkere kalles . Debeskytter hjertet mot en for stor aktivitet ..

Voksne

For behandling av en høy blodtrykk (hypertensjon), ved en trykkende smerte i brystet (angina pectoris) eller hjerterytmeforstyrrelser hjerterytmeforstyrrelser, etter en hjerteinfarkt for å en ny hjerteinfarkt å forebygge, ved en for rask funksjon av skjoldbruskkjertelen (hypertyreose) en til forebygging av migreaneanfall.

Barn og ungdom fra 6-18 år:

For behandling av høyt blodtrykk (hypertensjonhypertensjon).

2. Når kan du dette legemidlet ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?

Når kan du dette legemidlet ikke bruke?

- Du er allergisk for en av de stoffene i denne medisinen. Disse stoffene kan du finne i avsnitt 6 av dette pakningsvedlegg.

- Du er overfølsom for andre blodtrykksenkende medisiner av samme type som Metoprololsuccinat Sandoz retard, nemlig de beta-blokkere.
- Du har forstyrrelser i impulsledning i hjertet (2. og 3. grads AV-blokk).
- Du har akutt hjertesvikt eller hjertesvikt som ikke er under kontroll, med i lungene (lungeødem) eller en lav blodtrykk (hypotensjon).
- Ved en 'sjokk' forårsaket av utilstrekkelig pumpefunksjon av hjertet.
- Du lider av alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser.
- Ved en alvorlig forsinket hjerterytme (bradykardi).
- Du blir kontinuerlig eller med mellomrom behandlet med bestemte medisiner som påvirker pumpeevnen til hjertet påvirker (nemlig beta-agonister).
- Du har en bestemt forstyrrelse i hjerterytmen (Sick sinus syndrom)) du u har for dette ingen pacemaker fått.
- Du har et hjerteinfarkt (myokardinfarkt) i kombinasjon med en langsom hjerterytme, en lav blodtrykk eller du er dekompensert.
- Du får legemidlet verapamil ved injeksjon i en vene administrert, fordi derved de blodtrykk kan synke, hjerteledningsforstyrrelser kan oppstå og hjertesvikt kan oppstå.

Når må du være ekstra forsiktig med dette dette medisin?

Kontakt din lege eller apotek før du dette medisin bruker. La alltid legen(e) som behandler deg vite før hvilken hvilke problemer eller sykdommer du ennå mer under behandling er.

Metoprololsuccinat Sandoz retard må med forsiktighet bli administrert.

Vær ekstra forsiktig med Metoprololsuccinat Sandoz retard:

- hvis du vil stoppe. Du kan nemlig ikke plutselig stoppe, fordi dette kronisk hjertesvikt (reduisert pumpefunksjon av hjertet) kan forverre og det risikoen for en hjerteinfarkt (hjerteinfarkt) og plutselig død kan øke. Se for nedtrappingsråd de rubrikk 'Hvis du stopper med å bruke dette legemidlet';hvis
- du andre legemidler bruker for støtte av funksjonen av hjertet. Det er kan nemlig en forverring av hjertefunksjonen oppstå;
- hvis du lider av anfallsvis oppstå kortpustethet på grunn av krampe av musklene og hevelse av slimhinnen i luftveiene ofte ledsaget av med hoste og opp slim (astma (bronkial))bronkialBeklager, men det ser ikke ut til å være noen tekst å oversette. Hvis du har en tekst du vil ha oversatt, vennligst gi den til meg. en hvis du for dette behandles blir med f.eks. terbutalin. Når de symptomene forverres. Det kan være nødvendig å dosen justere til til passe;
- hvis du diabetes (diabetes mellitus) har. Metoprolol kan de symptomene av en for lav blodsukker i ditt blod maskere. De sjanse på dette er imidlertid liten.;
- hvis ditt hjerte utilstrekkelig pumpekraft har og du ikke blir behandlet for det. I det tilfellet
- kan du Metoprololsuccinat Sandoz retard ikke bruke;
- hvis du har problemer med en økende sakte hjerterytme (bradykardi). Det kan nemlig nødvendig være de doseringen å til passe eller gradvis å stoppe;
- hvis du har problemer med kalde fingre enof føtter (også uten bruk av medisiner, syndrom av Raynaud) eller vindusshoppersyke (claudicatio intermittens). Metoprololsuccinat Sandoz retard kan de symptomene forverres. Det er viktig at din lege dette vet;

- hvis du må opereres må bli. Det er viktig at din lege vet at du metoprolol bruker;
- hvis du samtidig behandles blir med digitalis (medisin som hjertets pumpeevne til hjertet fremmer). Det kan nødvendig er de dosering for å justere eller gradvis å stoppe;
- hvis du en alvorlig forverret funksjon av leveren har. De dosering må om nødvendig bli redusert;
- ved en svulst av binyremargen som kan følges av med plutselig sterk blodtrykksøkning, kraftig hodepine, svette og rask hjerterytme (feokromocytom).
- hvis du har plager med en alvorlig overfølsomhet for visse stoffer. Sjokket (sterk fall av blodtrykket, blekhet, uro, svak rask puls, klam hud, nedsatt bevissthet) ved en plutselig sterk vasodilatasjon ten følge dette (anafylaktisk sjokk) kan nemlig alvorligere være.

Rådfør din lege hvis én av ovennevnte advarsler for du av anvendelse er, eller at i fortiden har vært.

Det er ingen erfaring med behandling av hjertesvikt ved pasienter:

- eldre enn 80 år;
- med en begrensende og forstørret hjertemuskel;
- med en spesifikk hjerteklaffsykdom;
- med en sterkt redusert lever- og nyrefunksjon;
- som kortere enn 3 måneder siden en hjerteinfarkt har hatt;
- med en medfødt hjertefeil.

Bruker du andre medisiner ?Bruker

du i tillegg til Metoprololsuccinat Sandoz retard andre medisiner , hardu det du det kort siden gjort eller skal du dette kanskje snart gjøre? Fortell det det din lege eller apotek. Dette gjelder også for medisiner som du uten resept kan få.

Bruk et medisinkort. Du noterer her på hvilke medisiner du bruker og i hvilke dosering.

La også andre vite hvilke medisiner du bruker!

Metoprololsuccinat Sandoz retard kan effekten av noen medisiner medisiner påvirke og omvendt. Dette gjelder bl.a. for:

- kalsiumantagonister, som verapamil og diltiazem. Disse medisinene kan nemlig sammentrekningen av av hjertet (kontraktilitet av hjertet) og den ledning av hjertet (AV- ledning) negativt påvirke (se også den seksjon 'Når kan du dette medisin ikke bruke');
- rifampicin, en medisin mot noen infeksjoner, fordi det reduserer mengden metoprolol i blodet reduserer;
- medisiner mot allergi (antihistaminer), fordi de mengden metoprolol i blodet øker;
- medisiner mot (alvorlig) nedstemthet (depresjon) of medisiner mot alvorlig psykisk sykdom (antipsykotika), fordi de mengden metoprolol i blodet øker;
- visse gruppe smertestillende medisiner med også en betennelsesdempende og febernedsettende virkning (COX-2-hemmere), fordi de mengden metoprolol i blodet øker;
- ganglionblokkere (medisiner mot nervesykdommer), MAO-hemmere (medisiner mot depresjon) og andre betablokkere (også i øyedråper), fordi ekstra kontroll nødvendig er;

- klonidin, fordi det i kombinasjon med en betablokker de symptomene av høyt blodtrykk i forsterket grad kan få tilbake;
- medisiner mot hjerterytmeforstyrrelser (anti-arytmika), slik som amiodaron og kinidin. Disse medisinene kan forlenge ledningstiden i hjertet (AV-ledning) forlenge og har en negativ påvirkning på kontraksjonskraften til hjertet;
- narkosemedisiner (se også avsnittet 'Når må du være ekstra forsiktig med dette med dette medisin?');
- indometacin (bestemt smertestillende medisin med også en betennelsesdempende og febernedsettende virkning), fordi det det blodtrykksenkende effekt av metoprolol kan redusere;
- insulin og orale medisiner mot diabetes, fordi det blodsukkersenkende effekten av disse medisinene av betablokkere kan bli forsterket. I det tilfellet vil doseringen av disse medisinene måtte justeres ; lidokain,
- et legemiddel mot hjerterytmeforstyrrelser ved hjerterytmeforstyrrelser, fordi metoprolol utskillelsen av lidokain fra kroppen kan redusere ; digitalis,
- et legemiddel som øker pumpeevnen til hjertet øker øker, fordi samtidig bruk med dette legemidlet en forsinket hjerterytme kan forårsake;

Hva må du være oppmerksom på med alkohol?
Alkohol øker de mengde metoprolol i ditt blod.

Graviditet, amming og fruktbarhet

Er du gravid, tror du gravid å være, ønsker du gravid bli eller gir du amming? Ta kontakt med din lege eller apotek før du dette legemidlet bruker.

Graviditet:

Din lege kan Metoprololsuccinat Sandoz retard foreskrive under den graviditet hvis den fordelene av bruk for deg oppveier mot risikoene for fosteret det ufødt barn. Hvis du Metoprololsuccinat Sandoz retard har brukt til og med fødselen vil ditt nyfødte barn muligens de første to dager etter na de fødsel ekstra bli kontrollert.

Amming:

Metoprololsuccinat Sandoz retard bør ikke brukes å bli i perioden at amming blir gitt, med mindre det bruk nødvendig anses . Metoprolol blir utskilt via morsmelk . Ved normale doser er mengden metoprolol mengde morsmelk morsmelk liten. Hvis din lege foreskriver deg Metoprololsuccinat Sandoz retard foreskriver, da vil ditt barn bli ekstra blir overvåket.

Fertilitet:

Data om fertilitet tyder ikke på særegenheter.

Kjøreevne og den bruk av maskiner

For så vidt kjent er det ingen ugunstige effekter på kjøreevnen og det evnen til å bruke maskiner å betjene. Ved forekomst av bivirkninger som tretthet eller svimmelhet må du imidlertid ta hensyn til at dette det reaksjonsevne ugunstig kan påvirke.

Metoprololsuccinat Sandoz retard inneholder glukose, sukrose og laktose

Hvis din lege har har informert at du bestemte sukkerarter ikke tåler, ta kontakt med din lege før du dette legemidlet tar.

3. Hvordan bruker du dette legemidlet?

Bruk dette medisin alltid akkurat som din lege eller apotek deg det har fortalt. Er du i tvil om riktig bruk? Ta da kontakt med din lege eller lege av apotek.

De anbefalte dosering er:

Forhøyet blodtrykk (hypertensjon):

Startdosering: en gang daglig 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 50. Eventuelt til øke til 100-200 mg en gang daglig.

Når du lider av en nedsatt funksjon av leveren, kan legen beslutte doseringen dosen å redusere (for eksempel til 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 25).

Klemmt smertefull følelse på brystet (angina pectoris):

100-200 mg en gang daglig. Maksimalt 2 tabletter Metoprololsuccinat Sandoz retard 200 per dag.

Hjerterytmeforstyrrelser:

100-200 mg én gang daglig. Så nødvendig kan legen beslutte denne dosen å øke.

For rask virkning av skjoldbruskkjertelen (hypertyreose):

100-200 mg en gang daglig. Så nødvendig kan legen bestemme denne dosen å øke.

For forebygging av migreaneanfall:

100-200 mg en gang daglig.

Hjerteinfarkt:

Etter at du først har begynt med vanlige metoprolol tabletter, er vedlikeholdsdoseringen vedlikeholdsdose: én gang daglig 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 200.

Hvis du merker at Metoprololsuccinat Sandoz retard for sterk eller akkurat for lite virker, kontakt da din lege eller apotek.

Tablettene med regulert frigivelse må ikke bli knust eller tygget, men må tas som hele eller halve tabletter med vann bli inntatt.

Bruk hos barn og ungdom:

Høyt blodtrykk: Hos barn fra 6 år og eldre er doseringen dosering avhengig av kroppsvekt. Din lege beregner den riktige dosen for ditt barn.

Den vanlige startdosen er 0,5 mg per kilogram kroppsvekt en gang daglig, men kan ikke høyere være enn 50 mg. Det blir valgt for den tilgjengelige tablettstyrken som er nærmest til den beregnede dosen ligger. Din lege kan dosen dose økes til 2,0 mg per kilogram kroppsvekt, avhengig av effekten på blodtrykket. Doser over 200 mg en gang daglig er ikke undersøkt hos barn og ungdom.

Bruk av Metoprololsuccinat Sandoz retard anbefales ikke hos barn yngre enn 6 år ..

behandlingen behandling

Metoprololsuccinat Sandoz retard vil vanligvis langvarig brukt bli.

Har du for mye av dette legemidlet brukt?

Når du for mye av Metoprololsuccinat Sandoz retard har brukt, ta da umiddelbart kontakt med din lege eller apotek. Symptomer kan være: alvorlig senket blodtrykk (hypotensjon), forsinket hjerterytme (bradykardi), forstyrrelse i impulsledning av hjertet (AV- blokk), hjertesvikt (utilstrekkelig pumpefunksjon av hjertet) (dekompensasjon cordis), sjokk forårsaket av utilstrekkelig pumpefunksjon av hjertet, hjertestans, åndedrettsbesvær på grunn av krampe i musklene i luftveiene (bronkospasme), bevissthetsforstyrrelser (eller selv koma), kvalme, oppkast og blå misfarging av leppene, tunge, hud og slimhinner på grunn av en mangel på oksygen i blod (cyanose).

Samtidig bruk av alkohol, medisiner ved høyt blodtrykk, kinidin (medisin ved hjertebank) eller barbiturater (bestemte medisiner ved epilepsi) forverrer de symptomene.

Har du glemt denne medisinen i å ta?

Ta ikke dobbel dose om en glemt dose i å ta igjen. Hvis du glemt har en dose i å ta, kan du dette likevel gjøre, med mindre det nesten tid er for din neste dose. Følg i det tilfellet det vanlige doseringsskjemaet.

Hvis du stopper med bruken av dette legemidlet

Behandlingen med Metoprololsuccinat Sandoz retard bør generelt ikke avsluttes plutselig, fordi bli stanset, fordi dette kronisk hjertesvikt (reduert pumpeevne av hjertet) kan forverres og risikoen for en hjerteinfarkt (myokardinfarkthjerteinfarkt) plutselig plutselig død kan øke. Legen vil som regel dosen gradvis redusere over en periode på minst to ..

du du enda andre spørsmål om bruk av denne medisinen? Ta da kontakt med din lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle medisiner kan også denne medisin bivirkninger ha. Ikke alle får med det å gjøre.

De følgende bivirkninger er svært ofte, ofte, noen ganger, sjelden eller svært sjelden rapportert:

Svært ofte (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere) Nervesystemet
Nervesystemet: tretthet.

Ofte (forekommer hos mindre enn 1 av 10 brukere) Hjerte:

sakte hjerterytme (bradykardi), hjertebank Blodårer

:: på grunn av dør for eksempel raskt reise seg fra en sittende eller liggende stilling noen ganger ledsaget av svimmelhet svimmelhet ortostatiskhypotensjon), kalde hender hender en føtter, hjertebank (palpasjoner)

Nervesystem: svimmelhet, hodepine Respirasjonssystem: kortpustethet ved anstrengelse

Mage-tarmkanal: kvalme, magesmerter, diaré, forstoppelse

Noen ganger (forekommer hos mindre enn 1 av 100 brukere)Hjerte:
forverring av symptomer på hjertesvikt (utilstrekkelig pumpekraft av hjertet), visse forstyrrelse i ledning av hjertet, som fører til rytmeforstyrrelser (hjerteblokk), væskeansamling (ødem), smerte i hjerteområdet; en 'sjokk' forårsaket av utilstrekkelig pumpefunksjon av hjertet (kardiogent sjokk) hos pasienter med plutselig hjerteinfarkt (akutt hjerteinfarkt)
Nervesystemet: oppfatte av prikkinger, kløe eller prikking uten at det er grunn til det (parestesi)
Muskler: muskelkramper Mage-tarmkanalen: oppkast Generelt: vektøkning
Psyke: (alvorlig) nedstemthet (depresjon), nedsatt årvåkenhet, døsigheit eller søvnløshet, mareritt
Respirasjonssystemet: Tungpustethet på grunn av krampe av musklene i luftveiene (bronkospasme), også hos pasienter som ikke har blokkeringer ha av luftveiene Hud: flyktige hudutslett, økning av svetteproduksjon

Sjeldent (forekommer hos mindre enn 1 av 1.000 brukere) Hjerte:ledningsforstyrrelser ledningsforstyrrelser, forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier) Mage-tarmkanalen: tørr munn
Lever: leverfunksjonsforstyrrelser Psyke: nervøsitet, angst
Kjønnsorganer: impotens, redusert lyst på sex
Nese: betennelse av neselimhinnen kjennetegnet ved en tett nese, nysing og utflod (rhinitt)
Øyne: forstyrrelser ved synet ,, tørre ogeller irriterte øyne, betennelse i bindehinnen (konjunktivitt)
Hud: hårtap

Svært sjelden (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 mindre enn 1 av 10.000 brukere)
Hud: død av vev hos pasienter med alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser, overfølsomhet for lys, forverring av tilbakevendende hudsykdom ledsaget gående med skjellende, tørr hudutslett (psoriasis)
Mage-tarmkanal: smaksforstyrrelser
Blod: blodsykdom (mangel på blodplater) ledsaget gående med blå flekker og blødningstendens (trombocytopeni)
Lever: leverbetennelse (hepatitt) ledsaget gående med gulsott (gul misfarging av hud eller øyne)
Ledd: leddsmerter (artragi)
Psyke: hukommelsestap, forvirring, oppfatninger av ting som ikke er (hallusinasjoner), fremmedgjøring av seg selv eller av egen følelse (depersonalisering)
Ører: øresus (tinnitus) Kjønnsorganer: potensproblemer

Å rapportere av bivirkninger

Får du plager av bivirkninger, ta kontakt med din lege eller apotek. Dette gjelder også for bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget står. U kan bivirkninger også rapportere via Nederlandsk Bivirkninger Senter Lareb. Nettsted: www.lareb.nl. Ved å rapportere bivirkninger te melde, hjelper du oss med mer informasjon å få over sikkerheten til dette legemidlet.

Aldri selv doseringen redusere eller behandlingen behandling midlertidig)avbryte avbryteSe Se 'Hvis du stopper med å ta denne medisinen '.Hvordan

5. oppbevarer du denne medisinen ?Oppbevares

under 25°C Utenfor

syn og rekkevidde av barn holde.

Etter åpning av flasken er tablettene tablett for fortsatt 6 måneder holdbar.

Bruk denne medisinen ikke mer etter de siste holdbarhetsdato. Den finner du på emballasjen etter "EXP". Der står en måned og et år. Den siste dagen av den måned er den siste holdbarhetsdatoen.

Skyll medisiner ikke ned i vasken eller i toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med medisiner må gjøre som du ikke lenger bruker. Hvis du medisiner på den riktige måten kaster blir de på en riktig måte ødelagt og komme ikke i miljøet havne.

6. Innhold av emballasjen og andre informasjon Hvilke stoffer er det i dette medisin?
- De virkestoffet stoff i denne medisinen er metoprololsuccinat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 25: en tablett inneholder 23,75 mg metoprololsuccinat, tilsvarende med 25 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 50: en tablett inneholder 47,5 mg metoprololsuccinat, tilsvarende med 50 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 100: en tablett inneholder 95 mg metoprololsuksinat, tilsvarende med 100 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuksinat Sandoz retard 200: en tablett inneholder 190 mg metoprololsuksinat, tilsvarende med 200 mg metoprololtartrat.
 - De andre stoffer i denne medisinen er sukrose, maisstivelse, glukose (flytende), polyakrylat, talkum (E553B), magnesiumstearat (E470b), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krospovidon, kolloidal silisiumoksid (E551), laktose, hypromellose (E464), titandioksid (E171) og makrogol 4000.
 - Metoprololsuccinat Sandoz retard 100 inneholder også gul jernoksid (E172).

Hvordan ser Metoprololsuccinat Sandoz retard ut en hvor mye er det i en pakning?

Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, 50 og 200:

hvite, avlange tablett med delestrek på begge sider. Tabletten med delestrek kan i to like doser bli delt.

Metoprololsuccinat Sandoz retard 100:

lysegul, avlang tablett med delestrek på begge sider.

Tabletten med delestrek kan i to like doser bli delt.

Tablettene er pakket i polypropylen 2Faluminiumeller PVC- aclear2Faluminiumblisterpakning blisterpakning i en kartong eske eller i HDPE-flasker.

Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, 50, 100 og 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 og 90 tablett med regulert frigivelse i blisterpakninger og 30, 100, 250 og 500 tablett med regulert frigivelse i flasker.

Ikke alle nevnte pakningsstørrelser blir i handelen brakt.

Innehaver av tillatelsen for markedsføring handel bringe og produsent Innehaver av markedsføringstillatelse:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Nederland

Produsenter:

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben Tyskland

Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
Nederland

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovenia

Dette legemidlet er registrert under nummer nummer:

RVG 32376: Metoprololsuksinat Sandoz retard 25, tabletter med regulert frigivelse 23,75 mg RVG

32377: Metoprololsuksinat Sandoz retard 50, tabletter med regulert frigivelse 47,5 mg er RVG

32378: Metoprololsuksinat Sandoz retard 100, tabletter med regulert utløsning 95 mg er RVG

32380: Metoprololsuccinat Sandoz retard 200, tabletter med regulert utløsning 190 mg

Denne pakningsvedlegget er sist godkjent i januar 2025 januar 2025