

Ulotka: informacja dla pacjenta Metoprololsuccinate

Sandoz® retard 25, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 23,75 mg Metoprololsuccinate Sandoz® retard 50, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 47,5 mg 47,5 mg Metoprololsukcynian Sandoz® retard 100, tabletki z kontrolowanym uwalnianiem 95 mg Metoprololsukcynian Sandoz® retard 200, tabletki z kontrolowanym uwalnianiem 190mg

metoprololsukcynian

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę zanim u ten lek będzie używać ponieważ zawiera ważne informacje w dla ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może będziesz jej później ponownie potrzebne.
- Czy masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Nie podawaj tego leku nie innym osobom , ponieważ jest tylko dla ciebie do cię przepisany. To może szkodliwy być dla innych, nawet jeśli mają oni te same dolegliwości co ty.
- Czy masz objawy jeden z działań niepożądanych które w rubryce 4 są wymienione? Lub otrzymujesz Pan/Pani jeden działanie niepożądane które nie w tej ulotce jest wymienione? Skontaktuj się wtedy z swoim lekarz farmaceuta.

Zawartość tego tego ulotki:

1. Co to jest Metoprololsuccinaat Sandoz retard i do czego jest ten lek stosowany?
2. Kiedy nie wolno ten lek nie używać lub musisz być szczególnie ostrożny z być?
3. Jak używać tego leku ?Możliwe
4. działania niepożądane Jak
5. Jak przechowuje ty ten lek?
6. Zawartość opakowania opakowania i pozostałe informacje

1. Co to jest Metoprololsuccinaat Sandoz retard i do czego jest ten lek stosowany?

Metoprololsukcynian Sandoz retard należy do grupy leków które beta-blokery są nazywane. Chronią serce przed nadmierną aktywnością zbyt dużą aktywnością.

Dorośli

Dla leczenia z wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie), przy uczuciu ucisku i bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zaburzeń rytmu serca, po zawał serca aby nowy zawał serca zapobiec ,przy zbyt szybkim działaniu tarczycy (nadczynność tarczycy)nadczynność tarczycy) en ter zapobieganie z atakom migreny.

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat:

W leczeniu nadciśnienia z u wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie).

2. Kiedy nie wolno tego leku nie stosować lub należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu?

Kiedy nie wolno tego leku nie stosować?

- Jesteś uczulony na jeden z składników w tym leku. Te składniki możesz znaleźć w sekcji rubryce 6 tego dokumentu ulotka.
- Jesteś nadwrażliwy na inne leki obniżające ciśnienie krwi leki tego samego typu co Metoprololsuccinate Sandoz retard, czyli mianowicie beta-blokery beta-blokery.
- U masz zaburzenia w przewodzeniu impulsów serca (2. i blok AV 3. stopnia).Pan/Pani
- ma ostre niewydolność serca lub niewydolność serca która nie jest pod kontrolą , z płynem w płucach (obrzęk płuc) lub niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).W przypadku 'wstrząsu' spowodowanego przez niewystarczającą pracę pompy serca. Ty serca.
- U cierpi na ciężkie zaburzenia krążenia.
- Przy poważnym opóźnionym rytmem serca (bradykardia).Jesteś
- ciągle lub z przerwami leczony przerwy za pomocą z określone leki które siłę pompowania serca wpływają (mianowicie beta-agoniści).
- Pan/Pani ma pewne zaburzenie rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)) en u ma na to żadnego rozrusznik serca otrzymał.
- Pan ma zawał serca zawał serca zawał mięśnia sercowego) wpołączeniu z wolnym tempem bicia serca, jeden niskie ciśnienie krwi lub jesteś zdekompensowany.
- Ty otrzymujesz lek verapamil werapamil na iniekcji do żyły podawany ,ponieważ w ten sposób dlatego de ciśnienie krwi może spadać, zaburzenia przewodzenia serca mogą wystąpić i niewydolność serca może powstać.

Kiedy musisz być szczególnie ostrożny z tym lekiem lek?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim użyjesz tego leku .Zawsze informuj lekarza(i) którzy Cię leczą o jakie które problemy lub choroby jesteś jeszcze więcej pod leczeniem jesteś. Metoprololsuccinaat Sandoz retard musi z ostrożnością być podawany.

Bądź szczególnie ostrożny z Metoprololsuccynaat Sandoz retard:

- jeśli chcesz przestać. Nie możesz bowiem nie nagle przestać, ponieważ to przewlekła niewydolność serca (zmniejszona siła pompowania serca) może pogorszyć i to ryzyko na zawału serca (zawał) i nagła śmierć może zwiększyć. Zobacz poradę dotyczącą redukcji de rubryka 'Jeśli przestaniesz stosować użycie tego tego leku';
- jeśli używasz inne leki stosujesz dla wsparcia funkcjonowania pracy serca. może mianowicie jeden pogorszenie funkcji serca wystąpić;
- jeśli cierpisz na napadowo występującą duszność z powodu skurczu mięśni mięśni i oraz obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych często współistniejący z kaszlem i odkrztuszaniem śluzu (astma (oskrzelowa)) (oskrzelowe)) en jeśli u wcześniej leczony jesteś z np. terbutalina. Kiedy objawy się pogarszają. Może być konieczne jest dawkę dostosować do do stosować;
- jeśli masz cukrzycę (diabetes mellitus) masz. Metoprolol może objawy objawy niskiego niskiego poziomu poziomu cukru we twojej krwi maskować. De szansa na to jest jednak niewielka.;
- jeśli twoje serce niewystarczająca siła pompowania ma i nie jest nie na to leczony jesteś. W tym przypadku
- możesz Metoprololsuccinaat Sandoz retard nie używać;
- jeśli masz problem z z rosnącym spowolnionym tętnem (bradykardia). Lek). To może mianowicie potrzebny być de dawkowanie do się dostosować lub stopniowo się zatrzymać;

- jeśli masz problem z zimnymi palcami palce enof stóp (również bez użycia leków ,zespół Raynauda) lub chromanie przestankowe chromanie przestankowe claudicatiointermittens).Metoprololsuccinaat Sandoz retard może może de objawy pogarszają się. Het is ważne że twój lekarz to wie;
- jeśli musisz być operowany musisz . Het isważne że twój twój lekarz wie że używasz metoprolol stosujesz;
- jeśli ty jednocześnie leczony jesteś z digitalis (lek który siłę skurczu serca zwiększa). To może potrzebne są de dawkowanie do dostosowania lub stopniowego przerywania ; jeśli masz
- ciężkie pogorszenie funkcji wątroby pogorszony działanie wątroby ma. De dawkowanie musi w razie potrzeby zostać obniżona;
- przy guzie nadnercza rdzenia nadnerczy który może być związany z nagłym silnym wzrostem ciśnienia krwi, silne ból głowy, pocenie się i przyspieszone tętno (pheochromocytoma).
- jeśli masz problem z ciężką nadwrażliwością na określone dla określone substancje. Wstrząs (silne obniżenie ciśnienia krwi, błądź, niepokój, słaby szybki puls, wilgotna skóra, zmniejszona świadomość) przez jeden nagły silne rozszerzenie naczyń w wyniku tego (wstrząs anafilaktycznyanafilaktyczne może być poważniejszy . Skonsultuj się.

lekarzem jeśli jeden jeśli jeden z powyższych ostrzeżeń dla dla Pana/Pani zastosowanie jest, lub że w przeszłości było było.

Nie ma żadnego doświadczenia z leczeniem niewydolności serca przy pacjentach:

- starszych niż 80 lat;
- z ograniczoną i powiększoną mięśniem sercowym ;z
- określoną chorobą zastawek serca ; choroba zastawkowa serca;
- z jeden silnie zmniejszona wątroba- i funkcja nerek;
- którzy krócej niż 3 miesiące temu zawał serca mieli przebyli;
- z wrodzoną wadą wada serca.

Stosujesz u jeszcze inne leki?

Stosujesz u oprócz Metoprololsuccinaat Sandoz retard jeszcze inne leki, czy u to krótko temu zrobione lub zamierza Pan/Pani to może wkrótce zrobić? Poinformuj o tym że Twój lekarz lub farmaceuta. To dotyczy również dla leki które bez recepty można otrzymać.

Użyj karty leków . Na niej zapisujesz jakie leki stosujesz i w używany w w które dawkowanie.

Pozostaw również innym wiedzieć które leki używasz !Metoprololsuccinate

Sandoz retard może działanie niektórych leków z niektóre leków wpływać i odwrotnie. Dit dotyczy m.in. dla:

- antagonistów wapnia, takich jak werapamil i diltiazem. Te leki mogą mianowicie skurcz mięśni serca (kurczliwość serca) i przewodzenie przewodzenie serca (AV-przewodzenie) negatywnie wpływać (zobacz również sekcję ' Kiedynie wolno tego to lek nie
- używać');
- ryfampicyna, lek przeciw niektórym infekcjom ,ponieważ obniża ilość metoprololu we krwi ; leki;

- leki przeciw alergii (antyhistaminowe), ponieważ zwiększają ilość metoprololu we krwi ;leki
- przeciw (ciężkiej)depresji przygnębienie depresjadepresja) of leki przeciw ciężkiej chorobie psychicznej (leki przeciwpsychotyczne), ponieważ zwiększają ilość metoprololu we krwi zwiększają;
- pewna grupa leków przeciwbólowych leki z też jeden przeciwzapalne i przeciwgorączkowe działanie (inhibitory COX-2), ponieważ one ilość metoprololu we krwi zwiększają;
- blokery zwojowe (leki przeciw chorobom nerwowym), MAO-inhibitory (leki przeciw depresji) i inne beta-blokery (również w kroplach do oczu), ponieważ dodatkowa kontrola konieczna jest;
- klonidyna, ponieważ w kombinacji z jednym beta-blokerem objawy nadciśnienia mogą wzmocnić się w zwiększonym stopniu mogą powrócić ;leki
- przeciw przeciwko arytmie (przeciw-arytmiczne), takie jak amiodaron i chinidyna. Te leki mogą wydłużać czas przewodzenia serca (przewodzenie AV))wydłużać i mają mieć jeden negatywny wpływ na siłę skurczu serca;
- leki znieczulające (patrz również sekcja ' Kiedymusisz być szczególnie ostrożny ostrożnie tym z to lek?');
- indometacyna (określony przeciwbólowy lek z również jeden przeciwzapalny i przeciwgorączkowy działanie), ponieważ to to obniżające ciśnienie krwi działanie metoprololu może zmniejszać;
- insulina i doustne leki przeciw cukrzycy, ponieważ obniżający poziom cukru we krwi efekt tych leków przez beta-blokery może być może są wzmacnia. W tym przypadku należy dawkę dawkowanie tych tych leków trzeba zostać dostosowana;
- lidokaina, lek lek przy zaburzeniach rytmu serca, ponieważ metoprolol wydalanie z lidokainy z ciała może zmniejszyć ;digitalis,
- lek który zwiększa siłę skurczu serca zwiększa zwiększa, ponieważ jednoczesne stosowanie z tym lekiem może spowolnioną akcją serca powodować powodowaćNa co

należy zwrócić uwagę przy alkoholu? Alkohol zwiększa
Alkohol zwiększa de ilość metoprolol w twojej krwi.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Czy jesteś w ciąży, myślisz że jesteś w ciąży , chcesz byćw ciąży w ciąży zostać lub karmi Pan(i) piersią? Proszę skontaktować się z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim Pan(i) ten lek użyje.

Ciąża:

Pana(i) lekarz może Metoprololsuccinaat Sandoz retard przepisać podczas ciąży ciąży jeśli korzyści korzyści stosowania stosowania dla ciebie przewyższają nad ryzykiem ryzykiem dla dziecka nienarodzone dziecko. Jeśli Metoprololsuccinaat Sandoz retard stosowałeś do porodu może twoje noworodka dziecko może pierwsze dwa dni po porodzie mieć objawy odstawienia de narodziny extra zostaną sprawdzone.

Karmienie piersią:

Metoprololsuccinaat Sandoz retard nie powinien być używany w okresie kiedy karmienie piersią jest prowadzony jest dane, chyba że jest stosowanie konieczne uznane . Metoprololjest wydalany przez mleko matki . Przynormalnych dawkach ilość metoprololu w mleku matki metoprolol w

mleko matki mały. Jeśli twój lekarz ci Metoprololsuccinaat Sandoz retard przepisze, to będzie twoje dziecko dodatkowo będzie kontrolowane.

Płodność:

Dane dotyczące płodności wskazują nie na szczegóły.

Zdolność prowadzenia pojazdów i użycie maszyn

O ile wiadomo są nie żadne niekorzystne wpływy na zdolność prowadzenia pojazdów zdolność do prowadzenia pojazdów w to zdolność do obsługiwanie maszyn do obsługi. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych jak zmęczenie lub zawroty głowy należy wziąć jednak pod uwagę to że to to zdolność reakcji niekorzystnie może wpływać.

Metoprolol sukcylian Sandoz retard zawiera glukozę, sacharozę i laktozę

Jeżeli twój lekarz ci powiedział poinformował że ty określone cukry nie toleruje, skontaktuj się z swoim lekarzem zanim weźmiesz ten lek przyjmiesz.

3. Jak używasz tego leku ?Stosuj

Użycie ten lek zawsze dokładnie jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział .. w prawidłowe użycie ? Skontaktuj się ztwoim lekarzem lub sztuka farmaceuta.

De zalecana dawka jest:

Podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie):

Dawka początkowa: raz dziennie 1 tabletki Metoprololsuccinate Sandoz retard 50. Ewentualnie do zwiększyć do 100-200 mg raz dziennie.

Kiedy Pan cierpi na osłabioną funkcję wątroby, może lekarz zdecydować dawkę zmniejszyć dawkowanie dawkowanie obniżyć (na przykład do 1 tabletki Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25).

Uciskający bolesny uczucie na klatce piersiowej (dławica piersiowa):

100-200 mg raz dziennie. Maksymalnie 2 tabletki Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200 na dzień.

Zaburzenia rytmu serca:

100-200 mg raz dziennie. Tak w razie potrzeby może lekarz zdecydować tę dawkę zwiększyć ..

szybkie działanie działanie z tarczycy (nadczynność tarczycy):

100-200 mg raz dziennie. W razie potrzeby może lekarz zdecydować tę dawkę zwiększyć ..

zapobiegania zapobieganie z napadów migreny:

100-200 mg raz dziennie.

Zawał serca:

Po tym jak najpierw zostało rozpoczęte od zwykłych tabletek metoprololu , dawkapodtrzymująca dawka podtrzymująca: raz dziennie 1 tabletki Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200.

Jeśli zauważysz że Metoprololsuccinaat Sandoz retard zbyt silnie lub właśnie zbyt słabo działa, skonsultuj się wtedy twój lekarz lub farmaceuta.

Tabletki o kontrolowanym uwalnianiu nie mogą być rozdrabniane ani żuć, ale muszą być przyjmowane jako całe lub połówki tabletki z wodą być przyjmowane.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Wysokie ciśnienie krwi: U dzieci w wieku 6 lat i starszych dawka jest zależnie od masy ciała. Twój lekarz oblicza odpowiednią dawkę dla Twojego dziecka. Zwykle

początkowa dawka wynosi 0,5 mg na kilogram masy ciała raz dziennie, ale może nie wyższa być niż 50 mg. Jest wybierany dla dostępnej de mocy tabletki która jest najbliższa do de obliczonej dawki .. Twój lekarz może dawkę zwiększyć do 2,0 mg na kilogram masy ciała masa ciaław zależności od efektu na ciśnienie krwi .. powyżej 200 mg raz dziennie nie zostały zbadane zbadano przy dzieci i młodzież.

Stosowanie Metoprololsuccinate Sandoz retard nie jest zalecane u dzieci młodszych niż 6 lat .
Czas trwania.

Czas trwania leczenia

Metoprololsuccynian Sandoz retard będzie zwykle długotrwale stosowany być.

Czy Pan/Pani za dużo tego tego leku użył?

Kiedy Pan/Pani za wiele z Metoprololsuccinaat Sandoz retard ma używane, skontaktuj się natychmiast skontaktuj się z twoim lekarzem lub farmaceutą. Objawy mogą być: poważnie obniżone ciśnienie krwi (hipotensja), spowolniona akcja serca (bradykardia), zaburzenie w przewodzeniu serca (blok AV- blok), niewydolność serca (niewystarczająca siła pompowania serca) (dekompensacja cordis), wstrząs spowodowany przez niewystarczającą pracę pompową serca, zatrzymanie akcji serca, duszność przez skurcz mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), zaburzenia świadomości (lub (of nawet śpiączka), nudności, wymioty i niebieskie zabarwienie warg ust, języka, skóry i błon śluzowych z powodu niedoboru tlenu w organizmie w krew (sinica).

Jednoczesne stosowanie alkoholu, leków przy wysokim ciśnieniu krwi, chinidyna (lek na kołatanie serca) lub barbiturany (określone leki przy padaczce) pogarsza objawy objawy.

Czy zapomniałeś zapomniałeś tego leku w wziąć brać?

Nie bierz nie podwójnej dawka om jedną zapomnianą dawkę w nadrobić . Jeśli zapomniałeś wziąć jedną dawkę w wziąć , możesz ją to zrobić to jeszcze zrobić, chyba że to prawie czas jest na twoją następną dawkę. Postępuj w tym przypadku zgodnie z normalnym schematem dawkowania.

Jeśli przestaniesz stosować używanie tego leku medykamentu

Leczenie z Metoprololsuccinaat Sandoz retard nie powinno być ogólnie nie nagle przerwane ,ponieważ ponieważ to przewlekła niewydolność serca (zmniejszona siła pompowania serca) może pogorszyć się i ryzyko zawału serca zwiększa atak serca zawału serca)

nagła śmierć może zwiększać. Lekarz będzie zwykle reguła de dawkę stopniowo zmniejszać przez okres co najmniej 2 2 ..

masz u jeszcze inne pytania na temat stosowania tego leku? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy dostaje z tym do czynienia.

Następujące działania niepożądane są bardzo często ,często ,, czasami, rzadko lub bardzo rzadko zgłaszane:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 użytkowników)Układ nerwowy
Układ nerwowy: zmęczenie.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników)Serce:
spowolniona akcja serca (bradykardia),kołatanie serca Naczynia krwionośne
:: przez przez na przykład szybko wstać z pozycji siedzącej lub leżącej postawy czasami w towarzystwie z zawrotami głowy zawroty głowy niedociśnienie ortostatyczne), zimneręce zimno ręce en stopy, kołatanie serca (palpitacje)
Układ nerwowy: zawroty głowy, ból głowy Układ oddechowy: duszność przy wysiłku
Układ pokarmowy: nudności, ból brzucha, biegunka, zaparcie

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 użytkowników)Serce:
pogorszenie objawów niewydolności serca (niewydolność serca (niewystarczający siła pompowania serca), określone zaburzenie w przewodzeniu serca, prowadzące do arytmii (blok serca), zatrzymanie płynów (obrzęk), ból w okolicach serca; jeden 'wstrząs' spowodowany przez niewystarczającą pracę pompy serca (kardiogeny wstrząs) u pacjentów z nagłym zawałem serca (ostry zawał mięśnia sercowego)
Układ nerwowy: odczuwanie z mrowienia, swędzenie lub drętwienie bez żadnego powodu (parestezja)Mięśnie:
skurcze mięśni: skurcze mięśni Przewód pokarmowy: wymioty Ogólne: przyrost masy ciała
Psyche: (ciężka) przygnębienie (depresja), zmniejszona czujność, senność lub bezsenność, koszmary
Układ oddechowy: Dusznica przez skurcz mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), również u pacjentów którzy nie mają zablokowań z dróg oddechowych Skóra: lotny wysypka skórna, zwiększenie produkcji potu

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1.000 użytkowników) Serce:zaburzenia przewodzenia
zaburzenia przewodzenia, zaburzenia w rytmu serca (arytmie) Przewód pokarmowy: suchość w ustach

Wątroba: zaburzenia czynności wątroby Psychika: nerwowość, lęk

Narządy płciowe: impotencja, zmniejszone libido seks

Nos: zapalenie błony śluzowej nosa charakteryzujące się drzwiami zatkanym nosem ,kichaniem i wydzieliną (nieżyt nosa) Oczy:

zaburzenia widzenia, widzieć, suche i2F lub podrażnione oczy, zapalenie spojówki (zapalenie spojówek) Skóra
:: Bardzo

rzadko (występują mniej niż 1 na 10 000 przy mniej niż 1 na 10.000 użytkowników)
Skóra: martwica tkanki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia, nadwrażliwość na światło, pogorszenie nawracających pogorszenie z nawracającą chorobą skóry w połączeniu postępująco z łuszczący się, sucha wysypka (łuszczycyca)
Przewód pokarmowy: zaburzenia smaku
Krew: zaburzenie krwi (niedobór płytek krwi, płytki krwi w połączeniu z siniakami i skłonnością do krwawień, skłonność do krwawień, trombocytopenia, małopłytkowość)
Wątroba: zapalenie wątroby (hepatitis) współistniejące z żółtaczką (żółte zabarwienie skóry z skórą lub oczami)
Stawy: ból stawów (artralgia)
Psychika: utrata pamięci, dezorientacja, postrzeganie rzeczy które nie są (halucynacje), wyobcowanie od siebie lub od własnego uczucia (depersonalizacja)
Uszy: szumy uszne (tinnitus) Narządy płciowe: zaburzenia potencji

Zgłaszanie zgłosz z działania niepożądane

Czy masz problemy z działaniami niepożądanymi, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. To dotyczy również dla działań niepożądanych które nie są w tej ulotce zawarte. Umożesz działania niepożądane również zgłosić przez Niderlandzki Działania niepożądane. Działania niepożądane pomagasz nam uzyskać więcej informacji o nich. Więcej informacji herbata otrzymać o bezpieczeństwo tego leku.

Nigdy samodzielnie dawki dawkowanie zmniejszać lub leczenie (tymczasowo) przerywać!
Zobacz 'Jeśli przestaniesz przyjmować ten lek'. Jak przechowywać

5. ten lek? Przechowywać poniżej 25°C

Poza zasięgiem i

Poza wzrok w zasięgu od dzieci trzymać.

Po otwarciu butelki są tabletki jeszcze 66 ważne ..

tego leku nie więcej po de ostateczna data ważności. Die znajduje się na opakowaniu po „EXP”. Tam jest miesiąc i rok. De ostatni dzień ostatni dzień z tego miesiąca jest ostateczny termin ważności.

Nie spłukuj leków nie przez zlew ani toaletę i wyrzucaj ich nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami które masz i których już nie używasz. Jeśli leki są prawidłowo usuwane to są one w sposób właściwy sposób zniszczony i trafić nie do środowiska dostać się.

6. Zawartość opakowania i pozostałe informacje Jakie substancje są w tym leku?
- De czynna substancja w tym leku to metoprololsukcynian.

Metoprololsukcynian Sandoz retard 25: jedna tabletkę zawiera 23,75 mg metoprololsukcynianu, odpowiadający z 25 mg winian metoprololu.
bursztynian metoprololu Sandoz retard 50: jedna tabletkę zawiera 47,5 mg bursztynianu metoprololu, odpowiadający 50 mg winianu metoprololu.
bursztynian metoprololu Sandoz retard 100: jedna tabletkę zawiera 95 mg bursztynian metoprololu, odpowiadający 100 mg winianu metoprololu.
Bursztynian metoprololu Sandoz retard 200: jedna tabletkę zawiera 190 mg bursztynianu metoprololu, odpowiadający 200 mg winianu metoprololu.

- De inne substancje w tym leku są sacharoza, skrobia kukurydziana, glukoza (płynna), poliakrylan, talk (E553B), stearynian magnezu (E470b), mikrokrystaliczna celuloza (E460), krospowidon, koloidalny tlenek krzemu (E551), laktoza, hypromeloza (E464), dwutlenek tytanu (E171) i makrogol 4000.
- Metoprolol bursztynian Sandoz retard 100 zawiera również żółty tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda Metoprolol bursztynian Sandoz retard ? en ile jest w opakowaniu opakowaniu?

Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25, 50 i 200:

biała, podłużna tabletkę z linią podziału po obu stronach. Tabletkę z linią podziału może na dwie równe dawki być podzielony.

Metoprololsuccinate Sandoz retard 100:

jasnożółta, podłużna tabletkę z kreską po obu stronach.

Tabletkę z kreską może w dwie równe dawki być podzielony.

Tabletki są zapakowane w polipropylen polipropylenaluminiumlub PVC- acalaraluminiumblister opakowanie w jedno kartonowe pudełko lub w butelkach HDPE.

Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25, 50, 100 i 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 i 90 tabletek z kontrolowanym uwalnianiem w blisterach i 30, 100, 250 i 500 tabletki z kontrolowanym uwalnianiem w butelkach.

Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są w obrocie dostępne.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu handel przynosić i producent Posiadacz pozwolenia:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Holandia

Producenci:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben Niemcy

Sandoz B.V.

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

Holandia

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Lublana
Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Słowenia

Ten lek jest zarejestrowany w rejestrze pod numerem:
RVG 32376: Metoprololsukcynian Sandoz retard 25, tabletki z kontrolowanym uwalnianiem 23,75 mg
RVG 32377: Metoprololsukcynian Sandoz retard 50, tabletki z kontrolowanym uwalnianiem 47,5 mg
RVG 32378: Metoprololsukcynian Sandoz retard 100, tabletki z regulowane uwalnianie 95 mg
RVG 32380: Metoprololsuccinate Sandoz retard 200, tabletki z regulowanym uwalnianiem 190 mg

Ta ulotka została ostatnio zatwierdzona w styczniu 2025 styczeń 2025