

Prospect: informații pentru pacientul pacient

Metoprololsuccinat Sandoz® retard 25, comprimate cu eliberare controlată 23,75 mg
Metoprololsuccinat Sandoz® retard 50, comprimate cu eliberare controlată 47,5 mg Succinat de metoprolol Sandoz® retard 100, comprimate cu eliberare controlată 95 mg Succinat de metoprolol Sandoz® retard 200, comprimate cu eliberare controlată 190mg

succinat de metoprolol

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de dumneavoastră acest medicament veți utiliza deoarece există este informație importantă în pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Poate veți avea nevoie de el mai târziu din nou necesar.
- Aveți dumneavoastră încă întrebări? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Nu dați acest medicament nu mai departe altora , deoarece estedoar pentru dumneavoastră la dumneavoastră prescris. Este poate dăunător fi pentru alții, chiar dacă au ei aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți probleme cu un dintre efectele secundare care sunt în rubrica 4 sunt? Sau aveți o un efect secundar care nu în acest prospect este? Contactați dumneavoastră medic farmacist.

Conținut al acest prospect:

1. Ce este Metoprololsuccinat Sandoz retard și pentru ce se utilizează acest medicament ?Când
 2. nu aveți voie să poți acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu el?
 3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
 4. Posibile efecte secundare
 5. Cum păstrează dumneavoastră acest medicament?
 6. Conținutul ambalajului și alte informații Ce este
1. Metoprololsuccinat Sandoz retard și pentru ce se utilizează acest medicament utilizat?

Metoprololsuccinat Sandoz retard aparține de grupul medicamente care beta-blocante sunt numite. Ele protejează inima împotriva unei prea mari activități.

Adulți

Pentru tratamentul al unei tensiuni arteriale (hipertensiune), în cazul unei senzații dureroase în piept (angina pectorală) sau aritmii aritmii cardiace, după un infarct miocardic pentru a preveni un nou infarct miocardic ,în cazul unei funcționări prea rapide a glandei tiroide glandă tiroidă hipertiroidismhipertiroidism) en ter prevenirea a crizelor de migrenă.

Copii și adolescenți de 6-18 ani:

Pentru tratamentul unei tensiuni arteriale ridicate (hipertensiune).

2. Când aveți voie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?

Când aveți voie să acest medicament nu utilizați?

- Sunteți alergic la un dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6 din acest document prospect.
- Sunteți hipersensibil la alte medicamente antihipertensive de același tip ca Metoprololsuccinaat Sandoz retard, adică și anume beta-blocantele beta-blocante.
- o reacție tulburări în conducerea impulsurilor inimii (bloc AV de gradul 2 și 3).Dumneavoastră
- aveți insuficiență cardiacă acută sau insuficiență cardiacă care nu este sub control , cu lichid este, cu lichid în plămâni (edem pulmonar) sau o scădere a tensiunii arteriale (hipotensiune).
- În caz de 'șoc' cauzat de funcționare insuficientă a pompei inimii. Dumneavoastră
- U suferă de grave tulburări de circulație.
- În cazul unei grave încetiniri a ritmului cardiac (bradicardie).
- Sunteți tratat continu sau cu intermitențe tratat cu anumite medicamente care forța de pompare a inimii influențează (anume beta-agoniști).
- Aveți o tulburare anume în ritmul cardiac (Sindromul de sinus bolnav (Sindrom de sinus bolnav sindrom) en u aveți pentru aceasta niciun pacemaker primit.
- Dumneavoastră aveți un infarct miocardic (infarct miocardic) în combinație cu o bătăi lente ale inimii puls, un tensiune arterială sau sunteți decompensat.
- Vi se administrează medicamentul verapamil prin injecție în o venă administrat, deoarece astfel de tensiunea arterială poate scădea, tulburări de conducere cardiacă pot apărea și insuficiență cardiacă poate apărea.

Când trebuie să fiți extra precaut fiți cu acest medicament?

Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament .Informați întotdeauna medicul(ii) care vă tratează despre ce pentru care probleme sau boli dumneavoastră încă mai mult sub tratament sunteți. Metoprolol succinat Sandoz retard trebuie cu prudență să fie administrat.

Fiți extra prudent cu Metoprololsuccinaat Sandoz retard:

- dacă doriți să opriți. Dumneavoastră puteți de fapt nu brusc opri, deoarece acest lucru insuficiență cardiacă (scăderea forței de pompare a inimii) poate agrava și al riscul de un atac de cord (infarct miocardic) și moarte subită poate crește. Consultați pentru sfaturi de reducere de rubrică 'Dacă opriți utilizarea acestui medicament ' ; dacăutilizați
- alte medicamente pentru susținerea funcționării inimii. Există suport de la funcționare de inimă. Se poate de fapt o deteriorare a funcției cardiace apărea;
- dacă suferiți de atacuri apărute dificultăți de respirație din cauza spasm al mușchilor și în umflare a mucoasei a căilor respiratorii adesea însoțită de cu tuse și expectorația renunța de mucus (astm (bronșic)) en ca u pentru aceasta tratat este cu de ex. terbutalină. Când de simptomele se agravează. Poate fi necesar să de doza ajusta te adapta;
- dacă dumneavoastră diabet (diabet zaharat) aveți. Metoprololul poate să simptomele de un nivel scăzut de zahăr în sângele dumneavoastră masca. De șansa acestui lucru este totuși mică.;

- dacă inima dumneavoastră nu are suficientă forță de pompare are și nu sunteți nu pentru tratat fiți. În acel caz
- nu aveți voie să Metoprololsuccinaat Sandoz retard nu utilizați;
- dacă aveți probleme cu o creștere a ritmului cardiac (bradicardie). Medicamentul poate adică necesar fi de dozajul a se ajusta sau treptat a opri;
- dacă aveți probleme cu de degete reci enof picioare (de asemenea fără utilizarea de medicamente, sindromul Raynaud) sau claudicație (claudicație intermitentă). Metoprolol succinat Sandoz retard poate de simptomele se agravează. Het is important că dumneavoastră medicul acest lucru știe;
- dacă trebuie să fiți operat trebuie . Het is important că dumneavoastră dumneavoastră medic știți că luați metoprolol utilizați;
- dacă dumneavoastră simultan tratat sunteți cu digitalis (medicament care forța de pompare a inimii îmbunătățește). Poate poate necesar sunt de dozajul pentru a ajusta sau treptat a opri;
- dacă aveți o severă deteriorare a funcției hepatice aveți are. De dozajul trebuie dacă este necesar să fie redus;
- în un tumoră a medulosuprarenalei care poate să apară cu creșteri bruste ale tensiunii arteriale, severă durere de cap, transpirație și ritm cardiac accelerat (feocromocitom).dacă
- aveți probleme cu o hipersensibilitate severă la anumite pentru anumite substanțe. Șocul (puternică scădere a tensiunii arteriale, paloare, agitație, slab rapid puls, piele umedă ,conștiență redusă) prin) prin un bruscă dilatare vasculară din cauza acesteia (șoc anafilactic) poate fi mai grav.

Consultați medicul dumneavoastră dacă unul de de mai sus avertismente pentru dumneavoastră de aplicare este, sau că în trecut a fost a fost.

Nu există niciun experiență cu tratamentul insuficienței cardiace la pacienți:

- mai în vârstă de 80 ani;
- cu o limitare și mărire a mușchiului cardiac;
- cu o afecțiune a valvelor cardiace;
- cu un redus funcție hepatică și renală;
- care mai scurt de 3 luni în urmă un infarct miocardic au avut;
- cu un congenital afecțiune cardiacă.

Folosiți dumneavoastră alte medicamente ?Folosiți

dumneavoastră pe lângă Metoprololsuccinaat Sandoz retard alte medicamente , informațidumneavoastră despre asta acel scurt timp făcut sau veți dumneavoastră acest poate în curând faceți? Informați asta că medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru medicamente pe care le fără rețetă puteți obține.

Utilizați un card de medicamente. Vă notați pe acesta ce medicamente utilizați și în în care dozaj.

Lăsați de asemenea pe alții să știe ce medicamente utilizați !Metoprololsuccinat

Sandoz retard poate afecta eficacitatea unor medicamente anumite medicamente influența și viceversa. Acest lucru se aplică inclusiv pentru:

- antagoniști ai calciului, cum ar fi verapamil și diltiazem. Aceste medicamente pot de fapt al contractia inimii (contractilitate inimii) și conducerea conducerea inimii (AV-

- conducerea) negativ influența (vezi de asemenea rubrica ' Cândnu trebuie să acest acest medicament nu
- utilizați');
 - rifampicină, un medicament împotriva unor infecții, deoarece reduce cantitatea de metoprolol în sânge scade;
 - medicamente împotriva alergiei (antihistaminice), deoarece ele cantitatea de metoprolol în sânge cresc;
 - medicamente împotriva (severă) depresie (depresie) of medicamente împotriva bolii mintale (antipsihotice), deoarece ele cantitatea metoprolol în sânge cresc;
 - anumite grup analgezice medicamente cu de asemenea un antiinflamator și antipiretic acțiune (inhibitori COX-2), deoarece ei cresc cantitatea metoprolol în sânge crește;
 - blocante ganglionare (medicamente împotriva afecțiunilor nervoase), MAO-inhibitori (medicamente împotriva depresiei) și alte beta-blocante (inclusiv în picături oftalmice), deoarece este necesară monitorizare suplimentară ;
 - clonidină, pentru că în combinație cu un beta-blocant simptomele de hipertensiune arterială în mod accentuat poate face să repara ;medicamente
 - împotriva împotriva aritmii cardiace (anti-aritmice), cum ar fi amiodarona și chinidina. Aceste medicamente pot prelungi timpul de conducere al inimii (conducerea AV-)și au efecte au un negativă influență asupra forței de contracție a inimii;
 - medicamente anestezice (vezi de asemenea secțiunea ' Cândtrebuie să fiți precaut cu acest medicament acest medicament?');
 - indometacină (determinată analgezic medicament cu de asemenea un antiinflamator și antipiretic efect), deoarece reduce efectul antihipertensiv al metoprololului poate reduce;
 - insulină și medicamente orale împotriva diabetului, deoarece efectul de reducere a glicemiei al acestor medicamente de beta-blocante poate fi întărit. În acel caz va doza acestor medicamente trebuie medicamente să fie ajustată;
 - lidocaină, un medicament pentru aritmii cardiace, pentru că metoprololul eliminarea a lidocainei din corpul poate reduce ;digitalis,
 - un medicament care forța de pompă a inimii crește verhoogttt crește, pentru că simultan utilizare cu acest medicament un încetinit ritm cardiac poate cauza;

La ce trebuie să fiți atent cu alcoolul? Alcoolul crește crește de cantitate metoprolol în dumneavoastră sânge.

Sarcină, alăptare și fertilitate

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată , doriți să însărcinată a deveni sau oferiți dumneavoastră alăptare? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a acest medicament utilizați.

Sarcina:

Medicul dumneavoastră poate Metoprololsuccinat Sandoz retard prescrie în timpul sarcinii sarcinii dacă beneficiile beneficiile utilizării utilizării pentru dumneavoastră depășesc riscurile pentru riscurile pentru copilul nenăscut copil. Dacă dumneavoastră Metoprololsuccinaat Sandoz retard ați utilizat până la naștere va dumneavoastră nou-născut copil posibil în primele două zile după nu de naștere extra a fi controlat.

Alăptare:

Metoprololsuccinat Sandoz retard nu trebuie utilizat să fie în perioada în care alăptarea se face dat, cu excepția cazului în care utilizarea este considerată necesară. Metoprololul este excretat prin laptele matern. Ladoze normale cantitatea de metoprolol în laptele matern lapte matern mic. Dacă dumneavoastră medicul vă Metoprololsuccinat Sandoz retard prescrie, atunci va dumneavoastră copilul va fi suplimentar fi monitorizat.

Fertilitate:

Date despre fertilitate indică nu pe particularități.

Aptitudinea de a conduce vehicule și utilizarea mașinilor de mașini

În ceea ce se știe cunoscut nu sunt există niciun efecte adverse efecte asupra aptitudinii de a conduce vehicule și capacitatea de a folosi mașini a opera. În cazul apariției de efecte secundare precum oboseală sau amețeală trebuie să țineți totuși cont de faptul că acest al capacitatea de reacție nefavorabil poate afecta.

Metoprolol succinat Sandoz retard conține glucoză, sucroză și lactoză

Dacă dumneavoastră medicul v-a informat că dumneavoastră u anumite zaharuri nu tolerează, contactați dumneavoastră medicul înainte să acest medicament luați.

3. Cum utilizați acest medicament ?Utilizați

Utilizare acest medicament întotdeauna exact așa cum medicul dumneavoastră sau farmacistul v-a spus. Aveți îndoeli cu privire la. corectă ? Contactați corectă farmacistuldumneavoastră pentru informații suplimentare farmacist.

De recomandată doza este:

Tensiune arterială crescută sanguină (hipertensiune):

Doza inițială: o dată pe zi 1 comprimat Metoprolol succinat Sandoz retard 50. Eventual la crește la 100-200 mg o dată pe zi.

Când dumneavoastră suferiți de o funcție redusă a ficatului, poate medicul decide să doza să scadă (de exemplu până la 1 comprimat Metoprololsuccinat Sandoz retard 25).

Apăsător durere senzație pe piept (angina pectoris):

100-200 mg o dată pe zi. Maxim 2 comprimate Metoprololsuccinat Sandoz retard 200 pe zi.

Tulburări de ritm cardiac:

100-200 mg o dată pe zi. Așa dacă este necesar poate medicul decide această doză să crească.

O acțiune prea rapidă de tiroidă (hipertiroidism):

100-200 mg o dată pe zi. Dacă este necesar poate medicul decide această doză să crească.

Pentru prevenire de atacuri de migrenă:

100-200 mg o dată pe zi.

Infarct miocardic:

După ce ați mai întâi început cu comprimate obișnuite de metoprolol, estedoza de întreținere doză de întreținere: o dată pe zi 1 comprimat Metoprololsuccinat Sandoz retard 200.

Dacă observați că Metoprololsuccinat Sandoz retard prea puternic sau tocmai prea puțin funcționează, consultați atunci dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Comprimatele cu eliberare controlată nu trebuie să fie zdrobite sau mestecate, ci trebuie înghițite întregi sau pe jumătate ca comprimate comprimate cu apă a fi administrat.

Utilizare la copii și adolescenți:

Tensiune arterială: La copii de 6 ani și mai mari este dozajul în funcție de greutatea corporală. Medicul dumneavoastră calculează doza corectă pentru copilul dumneavoastră. Doza inițială uzuală

este de 0,5 mg pe kilogram greutate corporală o dată pe zi greutatea corporală o dată zilnic, dar poate nu mai mare fi decât 50 mg. Se alege pentru opțiunea de disponibilă concentrație a tabletei care este cea mai apropiată de doza calculată se află .. Dvs. medic poate doza crește până la 2,0 mg pe kilogram greutatea corporală greutatea corporală în funcție de efectul asupra tensiunii arteriale .. peste 200 mg o dată pe zi nu au fost studiat investigat la copii și tineri.

Utilizarea a Metoprololsuccinat Sandoz retard nu este recomandată la copii mai mici de 6 ani ..

tratamentului tratament

Succinat de metoprolol Sandoz retard va de obicei pe termen lung utilizat fi.

Ați dumneavoastră prea mult din acest medicament utilizat?

Când dumneavoastră prea multe de Metoprololsuccinat Sandoz retard are utilizat, contactați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul. Simptomele pot fi: scăderea severă a tensiunii arteriale (hipotensiune), încetinit ritm cardiac (bradicardie), tulburare în conducerea inimii (AV-bloc), insuficiență cardiacă (insuficientă forță de pompare a inimii) (decompensatio cordis), șoc cauzat de insuficientă funcționare de pompare a inimii, stop cardiac, dificultăți de respirație din cauza spasm al mușchilor căilor respiratorii (bronhospasm), tulburări de conștiență (sau chiar comă), greață, vărsături și albastră decolorare a buzelor, limbă, piele și mucoase din cauza unei deficiențe de oxigen în sânge (cianoză).

Utilizarea simultană a alcoolului, medicamente pentru tensiune arterială, chinidină (medicament pentru palpitații) sau barbiturice (anumite medicamente în epilepsie) agravează simptomele manifestările.

Ați uitat să luați acest medicament în a lua?

Nu luați niciun dublu doză om o uitat doză în a recupera. Dacă ați uitat să luați o doză în a lua, puteți să faceți acest lucru totuși a face, cu excepția cazului în care este aproape timpul este pentru doza următoare doză. Urmați în acel caz schema normală de dozare.

Dacă opriți utilizarea acestui medicament Acest medicament

Tratamentul cu Metoprololsuccinat Sandoz retard nu trebuie în general întrerupt brusc fără a fi consultat un medic acest cronic insuficiență cardiacă (scăderea capacității de pompare a inimii) poate agrava și riscul de un atac de cord (infarct miocardic infarct miocardic și moarte subită

moarte poate crește. Medicul va de obicei reduce doza treptat scădea pe o perioadă de cel puțin 2 săptămâni.

Aveți dumneavoastră încă alte întrebări despre utilizarea acestui acest medicament? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate și acest medicament efecte secundare au. Nu toată lumea primește cu asta de a face.

Următoarele efecte secundare sunt foarte des ,des ,, uneori, rar sau foarte rar raportat:

Foarte frecvent (apare la mai mult de 1 din 10 utilizatori)Sistem nervos
Sistem nervos: oboseală.

Adesea (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)Inimă:
ritm cardiac încetinit (bradicardie),palpitațiiVase de sânge palpitații
scăderea tensiunii arteriale: scăderea tensiunii arteriale ușă de exemplu rapid ridicare din o poziție sau culcată poziție uneori însoțită de amețală amețală hipotensiuneortostatică),mâini reci
mâini en picioare, palpitații (palpitații)
Sistem nervos: amețeli, dureri de cap Sistem respirator: scurtarea respirației la efort
Tract gastrointestinal: greață, dureri abdominale, diaree, constipație

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 utilizatori)Inimă:
agravare agravare simptomelor de insuficiență cardiacă ((insuficient forța de pompă a inimii),
anumite tulburare în conducerea inimii, care duce la aritmii (bloc cardiac), retenție de lichide
(edem), durere în regiunea inimii; un 'șoc' cauzat de funcționare insuficientă a pompei inimii (șoc
cardiogen) la pacienți cu infarct brusc (infarct miocardic acut infarct miocardic)
Sistem nervos: perceperea a furnicăturilor, mâncărimei sau amorțelilor fără ca să existe un motiv
pentru aceasta (parestezieparestezieMușchi
:: crampe musculare Tract gastrointestinal: vărsături General: creștere în greutate
Psihic: (severă) tristețe (depresie), vigilență redusă ,somnolență sau insomnie insomnie,
coșmaruri
Sistem respirator: Dificultăți de respirație din cauza spasm al mușchilor căilor aeriene
(bronhospasm), chiar la pacienți care nu au obstrucții ale căilor respiratorii Piele: erupție cutanată
erupție cutanatăcreștere a producției de transpirație Rareori

(aparla mai puțin de 1 din 1.000 utilizatori) Inima: tulburări de conducere, tulburări de conducere,
tulburări în ritmul cardiac (aritmii) Tractul gastrointestinal: gură uscată Ficat:
dîsfuncții hepatice Psihic: nervozitate , anxietateOrgane genitale
Organele genitale: , scăderea dorinței desex sex
Nas: inflamație a mucoasei nazale caracterizată de un nas înfundat ,strănut și secreție (rinită)
Ochi:
tulburări la vederea , vedere, uscate și/sau iritate ochi, inflamație a conjunctivei (conjunctivită)
Piele: căderea părului

Foarte rar (apare la mai puțin de 1 din 10.000 mai puțin de 1 din 10.000 utilizatori)

Piele: necroză a țesutului la pacienți cu tulburări severe de circulație hipersensibilitate fotosensibilitate lalumină agravare agravare recurentă afecțiune cutanată însoțit în curs cu descumare, uscat erupție cutanată (psoriazis)

Tract gastrointestinal: tulburări de gust

Sânge: anomalie sanguină (deficit de trombocite) însoțit însoțit cu vânătăi și tendință de sângerare tendință de sângerare trombocitopenie trombocitopenie Ficat:

inflamație hepatică (hepatită) însoțită de icter (îngălbenirea pielii și a de la piele sau ochi)

Articulații: dureri articulare (artralgie)

Psihic: pierdere de memorie, confuzie, percepții ale lucrurilor care nu sunt (halucinații), înstrăinare de sine sau de propriul sentiment (depersonalizare) Urechi:

țuit în urechi (tinitus) Organe genitale Organe genitale: Raportarea

efectelor adverse de efecte secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru efecte secundare care nu sunt în acest prospect menționate.

U puteți efecte secundare de asemenea raporta prin Olandez Centrul de Efecte Secundare

Lareb. Website: www.lareb.nl. Prin raportarea efectelor secundare te raporta, ajutați ne să obținem mai multe informații să a primi despre siguranța a acest medicament.

Niciodată să nu doza reduceți sau tratamentul tratament temporar) întrerupeți întrerupe Vezi Vezi 'Dacă opriți administrarea acestui medicament'. Cumpăstrați

5. acest medicament ? Păstrați la o temperatură sub 25°C

Departe de vederea și

În afara vedere în a nu se lăsa la de copii departe.

După deschiderea flaconului sunt comprimatele valabile încă 6 luni ..

acest medicament dacă nu este necesar mai după de data de expirare. Aceasta găsiți pe ambalaj după „EXP”. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a din lună este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele nu în chiuvetă sau în toaletă și nu le aruncați în coșul de gunoi . coș de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele care nu le mai folosiți . Dacă medicamentele sunt eliminate în modul corect ele vor fi într-un mod corectă mod distrus și ajung nu în mediu ajung.

6. Conținut al ambalajului și alte informații Ce substanțe sunt în acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este succinat de metoprolol succinat de metoprolol.

Sandoz retard 25: un comprimat conține 23,75 mg succinat de metoprolol succinat de metoprolol corespunzător corespunzător cu 25 mg tartrat de metoprolol.

succinat de metoprolol Sandoz retard 50: un comprimat conține 47,5 mg succinat de metoprolol, corespunzător cu 50 mg tartrat de metoprolol.

succinat de metoprolol Sandoz retard 100: un comprimat conține 95 mg succinat de metoprolol, corespunzător cu 100 mg tartrat de metoprolol.

Succinat de metoprolol Sandoz retard 200: un comprimat conține 190 mg succinat de metoprolol, corespunzător cu 200 mg tartrat de metoprolol.

- De alte substanțe în acest medicament sunt zaharoză, amidon de porumb, glucoză (lichidă), poliacrilat, talc (E553B), stearat de magneziu (E470b), celuloză microcristalină (E460), crospovidonă, coloidal dioxid de siliciu (E551), lactoză, hipromeloză (E464), dioxid de titan (E171) și macrogol 4000.
- Metoprolol succinat Sandoz retard 100 conține de asemenea oxid de fier galben (E172). Cum

arată Metoprolol succinat Sandoz retard Sandoz retard er ? en cât este în un ambalaj?

Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, 50 și 200:

alb, alungit comprimat cu linie de rupere pe ambele părți. Comprimatul cu linie de rupere poate în două egale doze fi împărțit.

Metoprololsuccinat Sandoz retard 100:

galben deschis, alungită tabletă cu linie de rupere pe ambele părți.

Tableta cu linie de rupere poate în două egale doze fi împărțit.

Comprimatele sunt ambalate în polipropilenă polipropilenăaluminisau PVC- aclairaluminiblister ambalaj în un cutie de carton sau în flacoane HDPE. Metoprololsuccinat

Sandoz retard 25, 50, 100 Sandoz retard 25, 50, 100 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 90 90 cu eliberare controlată în blistere și 30, 100, 250 și în 500 tablete cu eliberare controlată în flacoane.

Nu toate dimensiunile de ambalaj sunt pe piață disponibile.

Deținător al autorizației de punere pe comerț aduce și producător Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Olanda

Producători:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben Germania

Sandoz B.V.

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

Olanda

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57,

1526 Ljubljana

Slovenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovenia

Acest medicament este înregistrat sub numărul număr:

RVG 32376: Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, comprimate cu eliberare controlată 23,75 mg

RVG 32377: Metoprololsuccinat Sandoz retard 50, comprimate cu eliberare controlată 47,5 mg

este RVG 32378: Metoprololsuccinat Sandoz retard 100, comprimate cu reglementată eliberare

95 mg este RVG 32380: Metoprololsuccinat Sandoz retard 200, comprimate cu reglementată eliberare 190 mg

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în ianuarie 2025

Transtoyou