

Bipacksedel: information för patienten Metoprololsuccinat

Sandoz® retard 25, tabletter med kontrollerad frisättning 23,75 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 50, tabletter med kontrollerad frisättning 47,5 mg 47,5 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 100, tabletter med kontrollerad frisättning 95 mg Metoprololsuccinat Sandoz® retard 200, tabletter med kontrollerad frisättning 190mg

metoprololsuccinat

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel ska använda eftersom det finns viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Kanske behöver du den senare igen nödvändig.
- Har du ytterligare frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.
- Ge denna medicin inte vidare till andra, eftersom det är endast till du föreskriven. Det kan skadligt vara för andra, även om har de samma besvär som du.
- Får du besvär av en av biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel:

1. Vad är Metoprololsuccinat Sandoz retard och vad används denna medicin för?
 2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?
 3. Hur använder du detta läkemedel?
 4. Möjliga biverkningar
 5. Hur förvarar du detta läkemedel?
 6. Innehåll av förpackningen och övrig information Vad är
1. Metoprololsuccinat Sandoz retard och vad används detta läkemedel till används?

Metoprololsuccinat Sandoz retard tillhör till gruppen läkemedel som betablockerare kallas .De skyddar hjärtat mot en för stor aktivitet.

Vuxna

För behandling av en hög blodtryck (hypertoni), vid en tryckande smärtsam känsla i bröstet (angina pectoris) eller hjärtrytmrubbningar hjärtrytmrubbningar, efter en hjärtinfarkt för att en ny hjärtinfarkt förhindra ,vid en för snabb funktion av sköldkörteln sköldkörtel hypertyreos/hypertyreos) en ter förebyggande av migränanfall.

Barn och ungdomar i åldern 6-18 år:

För behandling av högt blodtryck (hypertoni/hypertoni).

2. När får du denna medicin inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

När får du denna medicin inte använda?

- Du är allergisk mot en av de ämnen i denna medicin. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6 i denna bipacksedel.

- Du är överkänslig för andra blodtryckssänkande läkemedel av samma typ som Metoprololsuccinat Sandoz retard, nämligen de betablockerare.
- Du har störningar i retledningen i hjärtat (2:a- och 3:e gradens AV-block).
- Du har akut hjärtsvikt eller hjärtsvikt som inte är kontrollerad, med vätska i lungorna (lungödem) eller en sänkt blodtryck (hypotension).
- Vid en 'chock' orsakad av otillräcklig pumpfunktion av hjärtat.
- Du lider av allvarliga cirkulationsstörningar.
- Vid en allvarligt fördröjd hjärtfrekvens (bradykardi).
- Du behandlas kontinuerligt eller med intervall behandlad med vissa läkemedel som påverkar pumpkraften hos hjärtat påverkar (nämligen beta-agonister).
- Du har en viss störning i hjartrytm (Sick sinus syndrom) en u har för detta ingen pacemaker fått.
- Du har en hjärtinfarkt (myokardinfarkt) i kombination med en långsam hjärtfrekvens, en låg blodtryck eller du är dekompenenserad.
- Du får läkemedlet verapamil genom injektion i en ven administrerat, eftersom det de blodtrycket kan sjunka, hjärtledningsstörningar kan uppstå och hjärtsvikt kan utvecklas.

När måste du vara extra försiktig med detta detta medicin?

Kontakta din läkare eller apotekare innan du denna medicin använder. Låt alltid läkaren(och) som behandlar dig veta innan vilken vilken problem eller sjukdomar du ännu mer under behandling är. Metoprololsuccinat Sandoz retard ska med försiktighet ges ..

försiktig med med Metoprololsuccinat Sandoz retard:

- om du vill sluta. Du kan nämligen inte plötsligt sluta, eftersom detta kronisk hjärtsvikt (minskad pumpkraft av hjärtat) kan förvärra och det risk för en hjärtattack (hjärtinfarkt) och plötslig död kan öka. Se för nedtrappningsråd de rubrik 'Om du slutar med att använda detta läkemedel';om
- du använder andra läkemedel för stöd av hjärtats funktion. Det kan nämligen en försämring av hjärtfunktionen uppträda;
- om du lider av anfallsvis uppträdande andnöd på grund av kramp av musklerna och svullnad av slemhinnan i luftvägarna ofta följt av hosta och upphostning av slem (astma (bronkial))bronkial)) en om du för detta behandlas blir med t.ex.. terbutalin. När de symtomen förvärras. Det kan vara nödvändigt att dosen justera till te passa;
- om du diabetes (diabetes mellitus) har. Metoprolol kan de symtom av en för låg blodsockernivå i ditt blod maskera. De risk för detta är dock liten.;
- om din hjärta otillräcklig pumpkraft har och du inte för behandlad blir. I det fallet får du Metoprololsuccinat Sandoz retard inte använda;
- om du har besvär av en ökande långsam hjärtfrekvens (bradykardi). Det kan nämligen nödvändig vara de dosering att justera eller gradvis sluta; omdu har
- problem med kalla fingrar kall fingrar enof fötter (även utan användning av läkemedel, Raynauds syndrom) eller fönstertittarsjuka fönstertittarsjuka claudicatiointermittens).Metoprololsuccinat Sandoz retard kan kan de symtomen förvärras. Det är viktigt att din läkare detta vet;
- om du måste opereras måste bli. Det är viktigt att din läkare vet att du metoprolol använder;

- om du samtidigt behandlas med digitalis (läkemedel som hjärtats pumpkraft ökar). Detkan kan nödvändig är de dosering att anpassa eller gradvis avsluta att stoppa;
- om du en allvarlig försämrad funktion av levern har. De dosering måste vid behov sänkas ;vid
- en tumör i binjuremärgen som kan förekomma med plötslig kraftig blodtrycksökning stark blodtrycksförhöjning, kraftig huvudvärk, svettning och snabb hjärtfrekvens (feokromocytom).
- om du har besvär av en allvarlig överkänslighet mot vissa ämnen. Chocken (stark minskning av blodtrycket, blekhet, oro, svag snabb puls, fuktig hud, nedsatt medvetande) på grund av en plötslig stark vasodilatation till följd härav (anafylaktisk chock) kan nämligen allvarligare vara.

Rådfråga din läkare om en av ovanstående varningar för dig av tillämpning är, eller att i det förflutna har varit.

Det finns ingen erfarenhet med behandlingen av hjärtsvikt vid patienter:

- äldre än 80 år;
- med en begränsande och förstörd hjärtmuskel;
- med en specifik hjärtklaffsjukdom;
- med en stark nedsatt lever- och njurfunktion;
- som kortare än 3 månader sedan en hjärtattack har haft;
- med en medfödd hjärtfel.

Använder du fortfarande andra läkemedel?

Använder du förutom Metoprololsuccinat Sandoz retard fortfarande andra läkemedel, har du det kort sedan gjort eller ska du detta kanske snart göra? Berätta det det din läkare eller apotekare. Detta gäller också för mediciner som du utan recept kan få.

Använd ett medicinkort. Du antecknar härpå vilka mediciner du använder och i vilka dosering.

Låt också andra veta vilka mediciner du använder!

Metoprololsuccinat Sandoz retard kan effekten av vissa mediciner läkemedel påverka och tvärtom. Detta gäller bl.a. för:

- kalciumantagonister, såsom verapamil och diltiazem. Dessa läkemedel kan nämligen det sammandragning av hjärtat (kontraktilitet av hjärtat) och den ledning av hjärtat (AV-ledning) negativt påverka (se även avsnittet ' Närfår du detta detta medicin inte använda');
- rifampicin, en medicin mot vissa infektioner, eftersom det minskar mängden metoprolol i blodet sänker;
- mediciner mot allergi (antihistaminer), eftersom de mängden metoprolol i blodet ökar;
- läkemedel mot (allvarlig) nedstämdhet (depression) av läkemedel mot allvarlig psykisk sjukdom (antipsykotika), eftersom de mängden metoprolol i blodet ökar;
- vissa grupp smärtstillande läkemedel med också en antiinflammatorisk och febernedsättande verkan (COX-2-hämmare), eftersom de mängden metoprolol i blodet ökar;
- ganglieblockerare (läkemedel mot nervsjukdomar), MAO-hämmare (läkemedel mot depression) och andra betablockerare (även i ögondroppar), eftersom extra kontroll nödvändig är;

- klonidin, eftersom det i kombination med en betablockerare de symtomen av högt blodtryck i förstärkt grad kan göra återkomma;
- läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (anti-arytmika), såsom amiodaron och kinidin. Dessa läkemedel kan förlänga ledningstiden i hjärtat (AV-ledning) förlänga och har en negativ påverkan på kontraktionskraften i hjärtat;
- narkosmediciner (se även avsnittet 'När bör du vara extra försiktig med detta med detta medicin?');
- indometacin (bestämd smärtstillande medicin med också en antiinflammatorisk och febernedsättande verkan), eftersom det den blodtryckssänkande effekt av metoprolol kan minska;
- insulin och orala läkemedel mot diabetes, eftersom det blodsockersänkande effekten av dessa läkemedel av betablockerare kan bli förstärkt. I det fallet ska doseringen av dessa läkemedel behöva justeras ; lidokain,
- ettläkemedel vid hjärtrytmrubbningar vid hjärtrytmrubbningar, eftersom metoprolol utsöndringen av lidokain från kroppen kan minska ;digitalis,
- ett läkemedel som ökar hjärtats pumpkraft av hjärtat ökar, eftersom samtidig användning med detta läkemedel kan orsaka en långsam hjärtfrekvens;

Vad bör du tänka på med alkohol?

Alkohol ökar de mängd metoprolol i ditt blod.

Graviditet, amning och fertilitet

Är du gravid, tror du gravid vara , vill du, vill du gravid bli eller ger du ammar? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du denna medicin använder.

Graviditet:

Din läkare kan Metoprololsuccinat Sandoz retard förskriva under graviditeten graviditet om fördelarna fördelarna med användning för dig väger tyngre än riskerna riskerna för barnet ofött barn. Om du Metoprololsuccinat Sandoz retard har använt till och med förlossningen kommer ditt nyfödda barn möjligen de första två dagarna efter na de födelse extra bli kontrollerad.

Amning:

Metoprololsuccinat Sandoz retard bör inte användas för att i perioden då amning sker givet, om inte det användning nödvändigt anses . Metoprololutsöndras via bröstmjölken . Vid normaladoser är mängden metoprolol i bröstmjölken metoprolol i de bröstmjolk liten. Om din läkare ordinerar dig Metoprololsuccinat Sandoz retard förskriver, då kommer ditt barn att extra bli kontrollerad.

Fertilitet:

Data om fertiliteten tyder inte på särskildheter.

Körförmåga och användning av maskiner

Såvitt bekant finns det inga negativa effekter på körförmågan och en förmågan att använda maskiner att hantera. Vid uppträdande av biverkningar som trötthet eller yrsel måste du dock ta hänsyn till att detta det reaktionsförmåga ogynnsamt kan påverka.

Metoprololsuccinat Sandoz retard innehåller glukos, sackaros och laktos

Om din läkare har har meddelat att du vissa sockerarter inte tål, kontakta då din läkare innan du denna medicin tar.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd detta läkemedel alltid exakt som din läkare eller apotekare du det har berättat. Tvekar du om rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

De rekommenderade doseringen är:

Förhöjt blodtryck (hypertoni):

Startdos: en gång dagligen 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 50. Eventuellt att öka till 100-200 mg en gång dagligen.

När du lider av en nedsatt funktion i levern, kan läkaren besluta att dosen sänka sänka (till exempel till 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 25).

Tryckande smärtsam känsla på bröstet (angina pectoris):

100-200 mg en gång dagligen. Maximalt 2 tabletter Metoprololsuccinat Sandoz retard 200 per dag.

Hjärtrytmrubbningar:

100-200 mg en gång dagligen. Så vid behov kan läkaren besluta denna dos att öka.

För snabb verkan av sköldkörteln (hypertyreos):

100-200 mg en gång dagligen. Vid behov kan läkaren besluta att denna dos öka ..

att förhindra förebyggande av migränanfall:

100-200 mg en gång dagligen.

Hjärtinfarkt:

Efter att du först har börjat med vanliga metoprolol tabletter, är underhållsdosen: en gång dagligen 1 tablett Metoprololsuccinat Sandoz retard 200.

Om du märker att Metoprololsuccinat Sandoz retard för stark eller just för lite fungerar, kontakta då din läkare eller apotekare.

De tabletter med kontrollerad frisättning får inte krossas eller tuggas, menska som hela eller halva tabletter tabletter med vatten tas in.

Användning hos barn och ungdomar:

Högt blodtryck: Hos barn från 6 år och äldre är doseringen dosering beroende av kroppsvikten. Din läkare beräknar den korrekta dosen för ditt barn.

Den vanliga startdosen är 0,5 mg per kilogram kroppsvikt en gång dagligen, men får inte högre vara än 50 mg. Det väljs för den tillgängliga tablettstyrkan som ligger närmast till den beräknade dosen. Din. Din läkare kan dosen öka till 2,0 mg per kilogram kroppsvikt kroppsviktberoende på effekten på blodtrycket .. över 200 mg en gång dagligen har inte undersökts undersökt vid barn och ungdomar.

Användning av Metoprololsuccinat Sandoz retard rekommenderas inte för barn yngre än 6 år ..

varaktighet behandling

Metoprololsuccinat Sandoz retard kommer vanligtvis långvarigt användas att.

Har du för mycket av denna medicin använt?

När du för många av Metoprololsuccinat Sandoz retard har använt, kontakta då omedelbart din läkare eller apotekare .. kan vara :: sänkt blodtryck blodtryck (hypotension), fördröjd hjärtfrekvens (bradykardi), störning i retledningssystemet i hjärtat (AV- block), hjärtsvikt (otillräcklig pumpkraft i hjärtat) (dekompensation cordis), chock orsakad av otillräcklig pumpfunktion av hjärtat, hjärtstillestånd, andnöd på grund av kramp i musklerna i luftvägarna (bronkospasm), medvetandestörningar (eller även koma), illamående, kräkningar och blå färgning av läpparna, tungan, huden och slemhinnor på grund av en brist på syre i blod (cyanos). Samtidig användning av alkohol, läkemedel vid högt blodtryck, kinidin (läkemedel vid hjärtklappning) eller barbiturater (vissa läkemedel vid epilepsi) förvärrar de symtomen.

Har du glömt denna medicin i att ta?

Ta inte dubbel dos om en glömd dos för att ta igen. Om du glömt att ta en dos , kanda göra det detta ändå göra, om inte det nästan tid är för din nästa dos. Följ i det fallet det vanliga doseringsschemat.

Om du slutar med användningen av denna medicin

Behandlingen med Metoprololsuccinat Sandoz retard bör i allmänhet inte plötsligt avbrytas , eftersom, eftersom detta kronisk hjärtsvikt (minskad pumpkraft av hjärtat) kan förvärras och risken för en hjärtattack (hjärtinfarkthjärtinfarktoch plötslig plötslig död kan öka. Läkaren kommer som regel att dosen gradvis minska över en period av minst 2 2 ..

du du ännu andra frågor om användning av denna medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Som varje medicin kan också denna medicin biverkningar ha. Inte alla får med att göra.

De följande biverkningar är mycket vanliga, vanliga, ibland, sällan eller mycket sällan rapporterad:

Mycket ofta (förekommer hos mer än 1 av 10 användare)Nervsystemet

Nervsystemet: trötthet.

Ofta (förekommer hos mindre än 1 av 10 användare)Hjärta:

långsam hjärtfrekvens (bradykardi),hjärtklappning Blodkär

:: på grund av genom till exempel snabbt stå upp ur en sittande eller liggande ställning ibland åtföljd av yrsel yrsel ortostatiskhypotension),kalla händer händer en fötter, hjärtklappning (palpitationer)

Nervsystemet: yrsel, huvudvärk Andningssystemet: andfåddhet vid ansträngning

Mag-tarmkanalen: illamående, buksmärtor, diarré, förstoppning

Ibland (förekommer hos mindre än 1 av 100 användare)Hjärta:

försämring av symtom av hjärtsvikt (otillräcklig pumpkraft av hjärtat), vissa störning i ledning av hjärtat, som leder till arytmier (hjärtblock), vätskeansamling (ödem), smärta i hjärtområde; en 'chock' orsakad av otillräcklig pumpfunktion av hjärtat (kardiogen chock) hos patienter med plötslig hjärtinfarkt (akut hjärtinfarkt)

Nervsystemet: uppfatta av kittlingar, klåda eller stickningar utan att det finns orsak till (parestesi)

Muskler: muskelkramper Mag-tarmkanalen: kräkningar Allmänt: viktökning

Psyke: (allvarlig) nedstämdhet (depression), minskad vakenhet, dåsig het eller sömnlöshet, mardrömmar

Andningssystemet: Andnöd på grund av kramp i musklerna i luftvägarna (bronkospasm), även hos patienter som inte har blockeringar av luftvägarna Hud: flyktiga hudutslag, ökning av svettproduktion

Sällan (förekommer hos mindre än 1 av 1.000 användare) Hjärta:ledningsstörningar ledningsstörningar, störningar i hjärtrytmen (arytmier) Mag-tarmkanalen: torr mun

Lever: leverfunktionsstörningar Psyke: nervositet, ångest

Könsorgan: impotens, minskad lust till sex

Näsa: inflammation av nässlemhinnan kännetecknas av en täppt näsa, nysningar och sekretion (rinit)

Ögon: störningar vid synen „ torra och eller irriterade ögon, inflammation av bindhinnan (konjunktivit)

Hud: håravfall

Mycket sällan (förekommer hos mindre än 1 av 10 000 mindre än 1 av 10.000 användare)

Hud: nekros av vävnad hos patienter med allvarliga cirkulationsstörningar, överkänslighet mot ljus, försämring av återkommande hudsjukdom förenad gående med fjällande, torr hudutslag (psoriasis)

Mag-tarmkanal: smakstörningar

Blod: blodsjukdom (brist på blodplättar) förenad gående med blå märken och blödningsbenägenhet (trombocytopeni)

Lever: leverinflammation (hepatit) åtföljd gående med gulsot (gul färgning av hud eller ögon)

Leder: ledvärk (artragi)

Psyke: minnesförlust, förvirring, uppfattningar av saker som inte är (hallucinationer), främlingskap av sig själv eller av den egna känslan (depersonalisering)

Öron: tinnitus (tinnitus) Könsorgan: potensstörningar

Att rapportera av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller också för biverkningar som inte i denna bipacksedel står. U kan biverkningar också rapportera via Nederländska Biverknings Centrum Lareb. Webbplats: www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, hjälper du oss att mer information att få om säkerheten av detta läkemedel.

Aldrig själv doseringen sänka eller behandlingen (tillfälligt)avbryta! Se! Se 'Om du slutar med att ta detta denna medicin'.

5. Hur förvarar du denna medicin?

Förvara under 25°C

Utanför synhåll och räckhåll av barn förvara.

Efter öppnande av flaskan är tablettorna tabletter fortfarande 6 månader hållbara.

Använd denna medicin inte mer efter den sista hållbarhetsdatum. Den finns du på förpackningen efter "EXP". Där står en månad och ett år. Den sista dagen av den månad är sista utgångsdatum.

Spola mediciner inte ner i handfatet eller toaletten och släng dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med mediciner som du inte längre använder. Om du avyttrar mediciner på rätt sätt blir de hanterade på ett rätt sätt förstörda och kommer inte i miljön hamna.

6. Innehåll av förpackningen och övrig information Vilka ämnen finns i detta medicin?
- De aktiva substansen i denna medicin är metoprololsuccinat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 25: en tablett innehåller 23,75 mg metoprololsuccinat, motsvarande med 25 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 50: en tablett innehåller 47,5 mg metoprololsuccinat, motsvarande med 50 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 100: en tablett innehåller 95 mg metoprololsuccinat, motsvarande med 100 mg metoprololtartrat.
Metoprololsuccinat Sandoz retard 200: en tablett innehåller 190 mg metoprololsuccinat, motsvarande med 200 mg metoprololtartrat.
 - De andra ämnen i denna medicin är sackaros, majsstärkelse, glukos (flytande), polyakrylat, talk (E553B), magnesiumstearat (E470b), mikrokristallin cellulosa (E460), krosprovidon, kolloidal siliciumoxid (E551), laktos, hypromellos (E464), titandioxid (E171) och makrogol 4000.
 - Metoprololsuccinat Sandoz retard 100 innehåller även gul järnoxid (E172).

Hur ser Metoprololsuccinat Sandoz retard ut ut en hur mycket finns det i en förpackning?

Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, 50 och 200:

vita, avlånga tablett med skåra på båda sidorna. Tabletten med skåra kan i två lika doser kan delas.

Metoprololsuccinat Sandoz retard 100:

ljusgul, avlånga tablett med skåra på båda sidorna.

Tabletten med skåra kan i två lika doser bli uppdelad.

Tabletterna är förpackade i polypropylen 2Faluminiumeller PVC-aclar2Faluminiumblisterförpackning blisterförpackning i en kartong ask eller i HDPE-flaskor.

Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, 50, 100 och 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 och 90 tabletter med kontrollerad frisättning i blisterförpackningar och 30, 100, 250 och 500 tabletter med reglerad frisättning i flaskor.

Inte alla nämnda förpackningsstorlekar säljs på marknaden ..

av tillståndet för försäljning på handel föra och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Nederländerna

Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben Tyskland

Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
Nederländerna

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovenien

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovenien

Detta läkemedel är registrerat under nummer nummer:

RVG 32376: Metoprololsuccinat Sandoz retard 25, tabletter med kontrollerad frisättning 23,75 mg
RVG 32377: Metoprololsuccinat Sandoz retard 50, tabletter med kontrollerad frisättning 47,5 mg
RVG 32378: Metoprololsuccinat Sandoz retard 100, tabletter med reglerad frisättning 95 mg
RVG 32380: Metoprololsuccinat Sandoz retard 200, tabletter med reglerad frisättning 190 mg

Denna bipacksedel är senast godkänd i januari 2025 januari 2025