

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Metoprololtartrato Accord 50 mg en 100 mg Comprimidos (Metoprololtartrato)

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento vaya a tomar porque hay estado importante información en para usted.

Guarde este prospecto. Quizás necesite usted más tarde de nuevo necesario.

Tiene usted más preguntas? Entonces contacte a su médico, o farmacéutico.

No dé este medicamento a otras personas , porque essolo para usted prescrito .

Puedeser perjudicial perjudicial son para otros, también aunque tengan ellos los mismos síntomas que usted.

¿Tiene usted mucho problema con uno de los efectos secundarios que en sección 4 aparecen? O tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto aparece?

Entonces póngase en contacto con su médico, farmacéutico.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Metoprololtartrato Accord y para qué se este medicamento tomar¿
2. Cuándo no debe este medicamento no tomar o debe u er extra con cuidado con ser?
3. ¿Cómo toma usted este medicamento ?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido de empaque y otra información

1. ¿Qué es Metoprololtartrato Accord y para qué se utiliza este medicamento?

Metoprolol es un bloqueador beta selectivo. Este significa que metoprolol tabletas el funcionamiento del corazón afectan y la presión arterial reducen.

Metoprololtartrato Accord Tabletas se prescriben a pacientes:

para la presión arterial reducir bajar;

con dolor en el pecho por falta de oxígeno del músculo cardíaco (angina de pecho);

con trastornos del ritmo cardíaco;

que un infarto de miocardio han sufrido; como protección contra un posible siguiente infarto de miocardio;

con palpitaciones;

con un demasiado fuerte funcionamiento de la glándula tiroides;

para prevención de ataques de migrañaataques.

2. Cuándo no debe este medicamento no tomar o debe tener especial con cuidado con ser?

Cuándo puede este medicamento no tomar?

usted es alérgico (hipersensible) es a metoprolol, a otros betabloqueantes of para unode el otras sustancias que en este medicamento están. Estas sustancias puede usted encontrar bajo sección 6.

si u trastornos de la conducción cardíaca o problemas del ritmo cardíaco tiene (bloqueo AV de 2° o 3° gradobloqueo o síndrome del nodo sinusal enfermo síndrome (a menos que un permanente marcapasos esté colocado)).

si usted insuficiencia cardíaca no tratada tienes, un tratamiento recibe para contracciones del corazón a permitir aumentar o en shock se encuentra como resultado de problemas cardíacos.

si usted sufre de grave bloqueadas vasos sanguíneos, incluyendo problemas con la circulación (causando sus dedos y dedos de los pies empiezan a hormiguesar, o pálido de azul volverse).

si usted un lento latido tiene (menos de 50 latidos2Fminuto).

si usted una baja presión arterial tienes.

si sufres de un aumento de acidez de su sangre (acidosis metabólica).

si usted sufre de grave asma de EPOC (crónica obstructiva pulmonar enfermedad).

si usted inhibidores de la monoaminoxidasa usa (IMAO). Vea también 'Uso con otros medicamentos'.

si usted insuficiencia cardíaca tiene, y su presión arterial repetidamente bajo los 100 mmHg está.

si usted otros antihipertensivos medicamentos usa, como verapamilo y diltiazem. Vea también 'Uso con otros medicamentos'.

si usted medicamentos contra arritmias (anti-arrítmicos) utilizado, como disopiramida. Vea también 'Uso con otros medicamentos'.

si usted sufre de feocromocitoma no tratado (alta presión arterial si resultado de un tumor de la médula suprarrenal).

Cuándo debe tener cuidado con este medicamento ?Consulte a su médico o artes de farmacéutico antes de usted este medicamento tome si usted:

asma tiene.

diabetes mellitus tiene (un bajo nivel de azúcar en sangre puede por este medicamento enmascarado ser).

sufre de feocromocitoma (alta presión arterial como resultado de un tumor de la médula suprarrenal).

un tratamiento recibe para alérgicas reacciones reducir reducirMetoprolol tabletas pueden la hipersensibilidad aumentar a las sustancias a las que alérgico a es, y de gravedad de las alérgicas reacciones aumentar.

un hiperactiva tiroides tiene (síntomas como aumento frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, ansiedad, aumentado apetito o pérdida de peso pueden por este medicamento enmascararse).psoriasis (

erupción cutánea grave) tieneo ha tenido tienes gehad.

si usted recibe anestesia administrada ;informe a su médico o dentista que utiliza tabletas de metoprolol tabletas de metoprolol sufre.

problemas con el problemas con la circulación sanguínea (en el dedos, dedos de los pies, brazos y piernas).

sufre de un trastorno de conducción cardíaca (bloqueo AV).insuficiencia cardíaca tiene en en combinación con un de siguientes factores:

- un ataque al corazón o un ataque de angina de pecho en los últimos 28 días.
- una disminución renal- de función hepática.

- más joven tiene menos de 40 años o mayor de 80 años.
- enfermedad de las válvulas cardíacas.
- miocardio hipertrofiado.
- una cirugía cardíaca en el pasado 4 meses.
- inestable insuficiencia cardíaca (NYHA IV).

Uso con otros medicamentos

Toma usted además de metoprolol tartrato Accord aún otros medicamentos en, de tiene usted que recientemente hecho o existe la posibilidad que usted en el futuro cercano otros medicamentos va a tomar ?? Diga eso entonces su médico o farmacéutico.

Use metoprolol tabletas no si ya un de los siguientes medicamentos usa:

Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO's) contra una depresión (estos pueden el efecto antihipertensivo potenciar).

otros antihipertensivos ,como verapamilo y diltiazem (diltiazem (estos pueden un lento latido del corazón o una mayor disminución de la presión arterial causar).

medicamentos contra arritmias cardíacas (anti-arrítmicos) como disopiramida (esto puede el riesgo de un irregular o lento latido del corazón aumentar y la función cardíaca disminuir).

floctafenina (puede las reacciones de corazón y vasos sanguíneos debido a baja presión arterial o shock reducir).

sultopride (aumentado riesgo de un ritmo cardíaco irregular).

Los siguientes medicamentos pueden el efecto sobre la reducción de la presión arterial aumentar:

cimetidina (contra úlceras gástricas).

hidralazina y clonidina (medicamentos antihipertensivos).terbinafina (contra infecciones por hongos).paroxetina

paroxetina, fluoxetina en sertralina (contra depresiones).

hidroxicloroquina (contra malaria).

clorpromazina, trifluopromazina, clorprotixeno (medicamentos contra psicosis).

amiodarona, quinidina y propafenona (contra un ritmo cardíaco irregular

). difenhidramina(un

antihistamínico).celecoxib (contradolor

). Los medicamentos a continuación pueden afectar la reducir:

indometacina (contra dolor).

rifampicina (un antibiótico).

Otros medicamentos que metoprolol pueden afectar o por metoprolol afectados pueden ser:

otros betabloqueantes, p. ej.. gotas para los ojos.

adrenalina (epinefrina), noradrenalina (norepinefrina) o otros simpaticomiméticos.

medicamentos para el tratamiento de diabetes; los síntomas de un bajo nivel de azúcar en sangre pueden ser enmascarados ..

..

glucósidos cardíacos glucósidos cardíacos.

de metoprolol de metoprolol tabletas con alimentos y bebida
El alcohol puede el efecto hipotensor de metoprolol tabletas potenciar.

Embarazo y lactancia

¿Está embarazada, piensa u embarazada a estar, desea embarazada quedar o da u lactancia?
Consulte con su médico o farmacéutico antes de u este medicamento usar.

Embarazo

Su médico puede Metoprololtartrato Accord prescribir durante el embarazo si los beneficios del uso para usted superan a de riesgos para el no nacido niño. Si usted Metoprololtartrato Accord ha usado hasta el parto tendrá su recién nacido niño posiblemente el de primero dos días después del nacimiento extra se controlan.

Lactancia

Metoprololtartrato Accord se excreta a través de la leche materna. En dosis normales esde cantidad metoprolol en la leche materna pequeña. Su hijo será adicionalmente será controlado.

Fertilidad

Los datos que existen indican no en particularidades.

Aptitud para conducir y el uso de máquinas

Metoprolol tabletas pueden fatiga y mareos causar. Asegúrese de que usted aquí ninguno molestia de tiene antes de usted vaya a conducir o usar máquinas vaya a utilizar, especialmente si usted ha cambiado a un otro medicamento o si usted alcohol ha usado.

3. Cómo toma usted este medicamento ?

Tome este medicamento siempre exactamente como su médico o artes de farmacéutico u eso ha dicho. ¿Duda usted sobre el correcto uso? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Los (enteros o partidos) comprimidos en uno vacío estómago tomar con uno medio vaso de agua. Elija un momento.

La dosis habitual es:

para hipertensión : 100 o 200 mg (1-2: 100 o 200 mg (1-2 tabletas), en preferencia una vez al día. Máximo 400 mg (4 tabletas de 100 mg) por día.

en dolor en el pecho (angina de pecho): según sea necesario de síntomas 100-200 mg (1-2 comprimidos de 100 mg) por día en dosis divididas. Máximo 400 mg (4 comprimidos de 100 mg) por día.

en trastornos del ritmo cardíaco: 100-200 mg dividido sobre el día (p. ej. dos veces al día 1 tableta de 50 mg). Así si es necesario puede su médico la dosificación aún más aumentar.

como protección contra un siguiente infarto de miocardio: dos veces 1 tableta de 100 mg.

en palpitaciones: 100 mg por día preferiblemente una vez al día. Si es necesario puede su médico de dosificación continuar aumentar hasta 200 mg (2 tabletas de 100 mg) por día.

en un demasiado fuerte efecto de la tiroides: 150-200 mg dividido en 3-4 dosis por día (3-4 veces al día 1 tableta de 50 mg). Si es necesario puede su médico dosis aún más aumentar.

para prevenir de ataques de migraña-ataques: 100-200 mg dividido en 1-2 dosis por día (1-2 veces al día 1 tableta de 100 mg).

El uso de este medicamento será generalmente prolongado . Nuncacambiar la dosis por sí mismo repentino dejar el uso.

En función renal reducida función renal: no es necesario . En.

: informe a su: decir su médico si usted un enfermedad hepática tiene. Posiblemente debe la dosificación ajustada ser.

Ancianos: ajuste de dosis no es necesario.

Niños: la experiencia de este medicamento en niños es limitada.

El comprimido puede dividirse en dosis iguales .

Tiene usted te mucho de este medicamento ingerido?

Si por accidente más que la dosis prescrita ha ingerido, póngase en contacto con el servicio de urgencias más cercano o luz inmediatamente su médico o farmacéutico en.

Síntomas de una sobredosis son baja presión arterial (fatiga y mareos), pulso lento, irregular ritmo cardíaco, paro cardíaco, dificultad para respirar, profunda inconsciencia, náuseas, vómitos y ponerse azul de la piel.

¿Está usted olvidar este medicamento en tomar ?Si usted su tableta(s) olvidó en tomar y usted se da cuenta dentro de 4 dentro 4 hora después, entonces debe usted la olvidada tableta(s) tan pronto como sea posible tomar y después la siguiente tableta(s) tomar según su 'habitual' esquema.

Si más de 4 horas han pasado desde que usted su tableta(s) debía tomar , entoncesomita esa dosis simplemente y espere en espera hasta el momento en el que usted según su 'habitual' esquema la siguiente tableta(s) debería tomar ..

ninguna dosis doble para para uno olvidar dosis en recuperar ..

deja de tomar este medicamento Si usted de repente deja de tomar entonces detener con el ingerir entonces puede su condición de repente empeorar; puede haber arritmias o una presión arterial elevada . Laprobabilidad de un ataque al corazón o de repente repentino fallecimiento se aumenta.

El interrumpir del tratamiento con metoprolol debe por lo tanto como regla gradualmente realizarse y siempre en consulta con su médico. Durante al menos 2 semanas se la dosis gradualmente reducida a la mitad. La dosis más baja debe al menos 4 días tomado a ser antes de el tratamiento completamente a detener.

Cuando usted durante la reducción síntomas obtiene, debe u su médico consejo a consultar.

4. Posibles efectos secundarios

Como cada medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener, aunque recibe no todos con eso que hacer.

Deje el tratamiento y llame inmediatamente al su médico si usted síntomas de un alérgica reacción experimenta, como erupción cutánea con picazón , enrojecimiento de la cara , hinchazón de la cara , los labios, la lengua o la garganta, o problemas con problemas con respirar o tragar. Esto es un muy grave, pero raro efecto secundario. Puede ser que usted necesite urgente ayuda médica necesaria tienes de admitido debe ser en el hospital.

Informe a su médico si usted experimenta uno de los siguientes efectos secundarios o si como er en usted un efecto secundario ocurre que no en este prospecto está mencionado:

Muy frecuente (en más de 1 de cada 10 pacientes):	se somnoliento sentir al estar de pie como resultado de una baja presión arterial, fatiga.
Frecuente (en menos de 1 de cada 10, pero en más de 1 de cada 100 pacientes):	pulso lento, problemas con el mantenimiento del equilibrio (muy raramente con desmayos), frío manos y pies, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, estreñimiento (constipación), dolor abdominal, dificultad para respirar en actividad física.
A veces (en menos de 1 de cada 100, pero en más de 1 de cada 1000 pacientes):	empeoramiento temporal de los síntomas de insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción cardíaca, retención de líquidos, dolor en el pecho, sensación de hormigueo ,calambres musculares calambres muscularesvómitos ,aumento de peso aumento de pesodepresión depresión, disminución concentración, insomnio, somnolencia, pesadillas, dificultad para respirar, erupción cutánea, aumento sudoración.
Raramente (en menos de 1 en 1000, pero en más de 1 en 10.000 pacientes):	empeoramiento de diabetes, nerviosismo, ansiedad, trastornos de la visión, secos o irritados ojos, conjuntivitis, impotencia, síndrome de Peyronie (curvatura del pene durante una erección), latido irregular, boca seca, rinorrea, pérdida de cabello, cambios en las pruebas de función hepática.

Muy raramente (en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): cambios en las células sanguíneas, olvido, confusión, alucinaciones, cambios de humor, tinnitus, problemas de audición, alteraciones del gusto, inflamación del hígado (hepatitis), sensibilidad a la luz, aparición o exacerbación de la psoriasis, debilidad muscular, dolor articular, tejido necrótico en pacientes con trastornos graves en la circulación sanguínea.

El informe de efectos secundarios

Tiene molestias de efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no están en este prospecto. Usted puede efectos secundarios también directamente informar a través del Holandés Centro de Efectos Secundarios Centro Lareb (www.lareb.nl). Al informar de efectos secundarios, puede ayudarnos a obtener más información sobre obtener sobre la seguridad de este medicamento.

Tiene usted mucho problema con un de los efectos secundarios? O tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto indica? Póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

5. Cómo almacena usted este medicamento

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

No almacenar por encima de 25°C.

Conserve sus comprimidos en el empaque original.

Use este medicamento no más después de de última fecha de caducidad. Esa es para encontrar en la caja después de EXP. Allí aparece un mes y un año. El último día de esa mes es la fecha de caducidad última.

No tire medicamentos no por el fregadero o el inodoro y deseche los no en la basura. Consulte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que ya no no más usa. Se eliminan de manera una responsable manera destruidos y no entran en el medio ambiente justificado.

6. Contenido de la empaque y otra información


¿Qué sustancias contiene en este medicamento ?La sustancia activa en sustancia en este medicamento es metoprololtartrato 50 mg y 100 mg.

Los otros componentes en este medicamento son celulosa microcristalina (E460), gelatina (E441), almidón glicolato de sodio, coloidal hidratado dióxido de silicio (E551), ácido esteárico (vegetal) (E477).

Cómo se ven tartrato de metoprolol Accord comprimidos y qué contiene un empaque 50 mg comprimidos – blancos blanco a blanco pálido, redonda, biconvexa tableta con la inscripción



en un lado y una ranura en el otro lado 100 mg

tabletas – blanca a hasta blanco pálido, redonda, biconvexa tableta con la inscripción  en el un lado y una ranura de rotura en el otro lado

Metoprolol tartrato Accord Tabletas están empaquetadas en blísteres. El cajetín contiene 30, 60 o 90 comprimidos. No todos los tamaños de envase mencionados se comercializan . Titular.

autorización de comercialización para en el comercialización introducir Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

Fabricante

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomska 50,95-200 Pabianice, Polonia

Registrado bajo ::

Metoprololtartrato Accord 50 mg Tabletas, RVG 57170.

Metoprololtartrato Accord 100 mg Tabletas, RVG 57171.

Este prospecto es por la última aprobado en noviembre 2021.