

## PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

### Metoprolooltartraat Accord 50 mg ja 100 mg Tabletid (Metoprolooltartraat)

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit hakkate kasutama sest seal seisund oluline teave sisse teie jaoks .

Säilitage see infoleht. Võib-olla vajate seda hiljem jälle ..

teil on veel küsimusi küsimused? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit mitte edasi teistele , sest see onainult teile määratud . Seevõib olla kahjulik kahjulik on jaoks teised, ka juba on nad samasugused kaebused kui teil.

Kas teil palju häirib üks nendest kõrvaltoimetest mis on rubriik 4 seisab? Või saate te kõrvaltoime mis ei ole selles selles infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma arstiga, apteekriga.

Sisu kohta see pakendi infoleht

1. Mis on Metoprolooltartraat Accord ja milleks kasutatakse seda ravimit ?Millal
2. ei tohi te seda ravimit mitte võtta või peate peab olge eriti ettevaatlik kaasa olema?
3. Kuidas võtate te seda ravimit sisse?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Sisu pakendi pakend ja muu teave

1. Mis on Metoprolooltartraat Accord ja milleks seda ravimit kasutatakse ?Metoprolool on

selektiivne beetablokaator . See beetablokaatorSee tähendab et metoprolool tabletid südame tööd mõjutavad ja vererõhku alandavad ..

Accord Tabletid määratakse välja patsientidele : patsiendid:

et vererõhku alandada ;koos

valuga rinnus hapnikupuuduse tõttu (stenokardia ); koos rütmihäiretega ; stenokardia);

koos häired alates südamerütm;

mis üks südameinfarkt on läbielanud; kui kaitse vastu üks võimalik järgmine südameinfarkt;

koos südamepekslemine;

koos üks liiga tugev toime kilpnäärme talitus;

migreenide ennetamiseks migreeni korralhoogude.

2. Millal ei tohi te seda ravimit võtta või peate olema eriti ettevaatlik ettevaatlik kaasa olema?

Millal tohib te seda ravimit mitte võtta?

te olete allergiline (ülitundlik) olete metoprolooli suhtes, teiste vastu ainete

beetablokaatorid või jaoks ühe teise aine mis on selles ravimis sisaldub. Need ained

leiate te all punktis jaotises 6.

kui u südame juhtivushäired või südame rütmihäired on (2. või 3. astme AV-blokaad või 'sick sinus' sündroom (välja arvatud kui püsiv südamestimulaator on paigaldatud)).  
kui teil on ravimata südamepuudulikkus on, üks ravi saab et kokkutõmbed südame et lasta suurendada või šokis on kui tagajärg südameprobleemidest südameprobleemid.  
te te kannatab all raske ummistunud veresooneid, sealhulgas probleemid vereringega vereringe mis põhjustab teie sõrmed ja varbad hakkavad kihelama, võikahvatu kahvatu of sinine muutuma).

kui te üks aeglane südamerütm on (vähem kui 50 löökiminutis).

kui te madal vererõhk vererõhk on.

kui kannatate kõrge ühe suurenenud happesuse teie veres (metaboolneatsidoos).kui

te kannatate raske kõrge happesuse astma või KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus).

kui te monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid kasutate (MAOI-d). Vaata ka 'Kasutamine koos muude ravimitega'.

kui te südamepuudulikkus on, ja teie vererõhk korduvalt alla 100 mmHg langeb.

kui te teisi vererõhku alandavaid ravimeid kasutate, nagu verapamiil ja diltiaseem. Vaata ka 'Kasutamine koos muude ravimitega'.

kui te ravimeid südame rütmihäirete vastu (anti-arütmikumid) kasutatakse, nagu disopüramiid. Vaata ka 'Kasutamine koos muude ravimitega'.

kui te kannatate all ravimata feokromotsütoomi (kõrge vererõhk kui tagajärg alates ühe kasvaja neerupealise säsi).

Millal peate olema eriti ettevaatlik olema selle ravimiga? Võtke ühendust oma arstiga või arstide apteeker enne te seda ravimit võtate kui te:

astma on.

diabeet mellitus on (madal veresuhkru tase võib selle põhjustada seda ravim maskeeritud saama).

kannatab all feokromotsütoom (kõrge vererõhk tulemusena tagajärjel alates üks kasvaja neerupealise säsi).

üks ravi saab et allergilised reaktsioonid vähendada vähendama Metoprolol tabletid võivad suurendada ülitundlikkust tekitada ainete suhtes mille te olete allergiline olete, ja de tõsidus van de allergilised reaktsioonid suurendama.

üks üliaktiivne kilpnääre on (sümptomid nagu kiirenenud südame löögisagedus, higistamine, värisemine, ärevus, suurenenud isu või kaalukaotus võivad selle ravimi poolt varjatud ollapsoriaas (

raskenahalööve nahalööve on või on olnud läbinud.

kui te üks tuimestus saate manustatakse; rääkige oma arstile või hambaarstile et umetoprololi tablette kasutate.

kannatate all probleemide korral vereringe (sisse sõrmed, varbad, käed ja jalad).

kannatab all südame juhtivushäire (AV- blokk).südamepuudulikkus

on on sisse kombinatsioon koos ühe järgmistest teguritest ::

- või stenokardiahoog viimase 28 päeva jooksul . 28 langus.
- ühe vähenenud neerufunktsioon- of maksafunktsioon.
- noorem olete alla 40 aasta või vanem kui 80 aasta.
- haigus südame klapid.
- suurenenud südamelihhas.

- südameoperatsioon südameoperatsioon in de möödunud 4 kuud.
- ebastabiilne südamepuudulikkus (NYHA IV).

Kasutamine koos muude ravimitega

Kas te lisaks metoprololitartraadile Accord veel muud ravimid sisse, või on te et lühike hiljuti teinud või eksisteerib see võimalus et te lähitulevikus lähedal tulevikus teised ravimid hakkate tarvitama? Rääkige et siis teie arstile või apteekrile.

Kasutage metoprolooli tablette mitte kui te juba üht järgmistest ravimitest kasutate ::

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d) vastu üks depressioon (need võivad vererõhku alandavat toimet tugevdada ).muud

vererõhku alandavad ained ,nagu verapamiil ja diltiaseem ( diltiaseemneed võivad aeglane südamerütm või tugevam vererõhu langus põhjustada ).ravimid südame rütmihäirete vastu (anti-arütmikumid) nagu disopüramiid (see võib de võimalus op ühe ebaregulaarse või aeglase südamerütmi suurendada ja de südamefunktsiooni vähendada).

floctafenine (võib de reaktsioone süda ja veresooned tõttu madal vererõhk või šokk vähendada).

sultopriid (suurenenud risk ebaregulaarne südamerütm ). Allpoolravimid

ravimid ravimid võivad mõju vererõhu langetamisele tugevdada:

tsimetidiin (maohaavandite vastu).

hüdralasiin ja klonidiin (vererõhku langetavad ravimid).

terbinafiin (seeninfektsioonide vastu).

paroksetiin, fluoksetiin ja sertraliin (vastu depressioonid).

hüdroksüklorokviin (vastu malaaria).

kloorpromasiin, trifluopromasiin, kloorprotikeen (ravimid vastu psühhoosid).

amiodaroon, kinidiin ja propafenoon (vastu ebaregulaarne südamerütm ).difenhüdramiin

difenhüdramiin antihistamiin).tselekoksiib ( vastu

valu). Alljärgnevadravimid

võivad mõjutada vererõhu alandamist mõju kohta vererõhu alandamine vähendada:

indometatsiin (vastu valu).

rifampitsiin (üks antibiootikum).

Teised ravimid , mis võivad metoprolooli mõjutada või metoprolooli poolt mõjutatud olla saama saama:

teised beetablokaatorid, nt. silmadropsid.

adrenaliin (epinefriin), noradrenaliin (norepinefriin) või teised sümpatomimeetikumid.

ravimid jaoks de ravi alates diabeet; sümptomid alates madal veresuhkru tase võivad varjatud olla ..

..

südameglükosiidid südameglükosiidid.

metoprolooliga metoproloolist tabletid koos toiduga ja joogiga

Alkohol võib vererõhku alandavat toimet metoprolooli tabletid tugevdada.

## Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate u rase olla olete, soovite rase jääda või toidate te rinnaga? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui seda ravimit kasutate.

## Rasedus

Teie arst võib Metoprolol tartraat Accord välja kirjutada raseduse ajal kui kasu kasutamisest teile kaalub üles riskid teie jaoks üles vastu de riskid jaoks het sündimata laps. Kui te Metoprolol tartraat Accord olete kasutanud kuni sünnituseni de sünnitus võib teie vastsündinud laps võimalik de esimene kaks päeva pärast sünni sünnitust lisaks kontrollitakse kontrollitud.

## Rinnaga toitmine

Metoprolol tartraat Accord eritub eritub läbi rinnapiima. Tavaliste tavaliste annuste isde kogus metoprolol piimas rinnapiim väike. Teie laps saab lisaks olema kontrollitud.

## Viljakus

Andmed mis on olemas näitavad mitte ei peal eripärad.

## Sõiduvõimekus ja see kasutamine masinate

Metoprolol tabletid võivad väsimust ja peapööritust põhjustada. Veenduge selles et te siin pole vaevusi on enne te lähete autot juhtima või masinaid kasutama ,eriti kui te üle läinud olete teisele ravimile või mõnele muule kui te alkoholi on kasutanud.

## 3. Kuidas võtate te seda ravimit sisse?

Võtke seda ravimit alati sisse täpselt nagu teie arst või apteeker u et on öelnud. Kahtlete te õige kasutamine? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteeker.

Terve (või poolitatud) tabletid peal üks tühi kõht võtta koos üks pool klaas veega. Valige kindel aeg.

Tavaline annus on: kõrge

vererõhk : 100 või 200 mg (1-2 tablettipäevas tabletid), juures eelistatavalt üks kord päevas. Maksimaalselt 400 mg (4 tabletti 100 mg) päevas päev.

valu rindkeres (stenokardia): vastavalt rind (stenokardia): alates vastavalt vajadusele de kaebused 100-200 mg (1-2 tabletid 100 mg) päevas päev jaotatud annustena .

Maksimaalselt 400 mg (4 tabletid 100 mg) päevas päev.

juures häired südamerütmi : 100-200 mg: 100-200 mg jagatud üle päeva (nt. kaks korda päevas 1 tablett 50 mg). Kui vajalik võib teie arst annust veel suuremaks tõsta.

kui kaitse vastu üks järgmine südameatakk: kaks korda päevas 1 tablett 100 mg.

juures südamepekslemine: 100 mg päevas päev soovitatavalt üks kord päevas .. võib teie teie arst de annus edasi suurendama kuni 200 mg (2 tabletti 100 mg) päevas päev.

juures üks liiga tugev toime kilpnäärme : 150-200 mg jagatud 3-4 annuse vahel päevas päev päev (3-4 korda päevas 1 tablett 50 mg). Kui vajalik võib teie arst annust veelgi suurendada ..

ennetamiseks : 100-200 mg jagatud 1-2 annuse vahelpäevas jagatud üle 1-2 annuse kohta per päev (1-2 korda päevas 1 tablett 100 mg).

Selle kasutamine selle ravimi ravim on enamasti pikaajaline olema. Mitte kunagi ise annust muuta või koos äkilise lõpetama kasutamise kasutamine.

Neerufunktsiooni vähenemine neerufunktsioon: annuse kohandamine on pole vajalik.

Maksafunktsiooni vähenemine maksafunktsioon: rääkige oma arst kui te üks maksahaigus on. Võimalik peab annustamine kohandatud olema.

Eakad: annuse kohandamine ei ole vajalik ..

Lapsed: de kogemus van selle ravimi juures lastel on piiratud.

Tabletti saab jagada osadeks in võrdseteks annusteks.

Kas teil te veel van dit ravim võtnud?

Kui te olete kogemata kogemata rohkem kui ettenähtud annus võtnud , võtke ühendust lähimaesmaabi osakonnaga või abiosakonnaosakond koos kerge koheselt teie arst või apteeker sisse.

Sümptomid üle üleannustamine on madal vererõhk ( väsimusja pearinglus ), aeglane pulss, pulss, ebaregulaarne südamerütm, südame seiskumine, hingeldus, sügav teadvusetus, iiveldus, oksendamine ja siniseks muutumine naha ..

Kas te olete unustada seda ravimit sisse võtta ? Kui te oma tabletti(de) unustanud olete sisse võtta ja te avastate selle 4 tunni jooksul 4 tund taga, siis peate te unustama tableti(d) nii kiiresti kui võimalik võtma ja seejärel järgmise tableti(d) võtma vastavalt teie ' tavaline ' ajakava. ' skeem.

Kui kauem kui 4 tundi tagasi on sellest kui oma tabletti oleks pidanud võtma , siisjätate selle annuse lihtsalt vahele ja ootate oota kuni aeg millal te vastavalt teie ' tavaline ' skeem järgmine järgmine tablett(id) peaks võtma ..

mitte kahekordne annus et kuni üks unustatud annus sisse võtta järele.

Kui te lõpetate selle võtmise selle ravimi ravimi

Kui te äkki lõpetate selle võtmise siis võib teie seisund äkki halveneda; võib tekkida südamerütmihäired või kõrgenenud vererõhk tekkida . Tõenäosus südameataki või äkilise südameataki või äkilise surm on suurenenud.

See lõpetamine ravi metoprolooliga peab seetõttu reeglina aeglaselt toimuma ja alati kooskõlastatult ja alati kooskõlastatult arstiga koos teie arstiga. Kogu vähemalt 2 2 vähendatakse annust järk-järgult poole võrra . Madalaim annuspeab vähemalt 4 nädalat olema säilitatud 4 päeva võetud et saada enne ravi ravi täielikult lõpetada lõpetada.

Kui te jooksul vähendamise vähendamine kaebusi saate, peate u teie arst nõu pidama ..

#### 4. kõrvaltoimed Nagu

iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada , kuigi, juba saab mitte kõik sellega tegema ..

ravi ja võtke kohe ühendust oma arstiga kui teil ilmnevad sümptomid millestki ühest allergiline reaktsioon kogete, nagu sügelev nahalööve, punane muutumine näo nägu, turse näo ,huuled , keel või kurk, võiprobleemid probleemid koos hingamine või neelamine. See on üks väga tõsine, kuid haruldane kõrvaltoime. See võib olla et teil kiiresti meditsiinilist abi vaja on või hospitaliseeritud peab olema haiglasse haigla.

Rääkige sellest oma arstile kui te üks järgmistest allpool kõrvaltoimetest kogete või kui er juures teil üks kõrvaltoime tekib mis ei selles selles infolehes on mainitud:

Väga sageli (juures rohkem kui 1 10-st patsiendid):

ennast lõtv tundma juures seismine kui tulemusena madal vererõhk , väsimus .Sageli ( juures.

Sageli juures vähem kui 1 10-st, kuid juures rohkem kui 1 100-st patsiendist):

aeglane südametegevus, probleemid tasakaalu säilitamisega alates ( vägaharva koos minestamisega ),külmad külm käed ja jalad, südamepekslemine, pearinglus, peavalu, iiveldus, kõhulahtisus, kõhukinnisus (kõhukinnisus), kõhuvalu, hingeldus juures füüsiline pingutus.

Mõnikord (juures vähem kui 1-1 100-st, kuid juures rohkem kui 1-1 1000-st patsiendil):

ajutine halvenemine sümptomite ilmumine südamepuudulikkuse korral, südame juhtivushäired, vedelikupeetus alates vedelik, valu rinnal ,surin tunne ,lihaste krambid lihaste krambidoksendamine ,kaalutõus kaalutõusdepressioon depressioon, vähenenud kontsentratsioon, unetus, unisus, õudusunenäod, hingeldus, nahalööve, suurenenud higistamine.

Harva (juures vähem kui 1 1000-st, kuid juures rohkem kui 1 10 000-st patsientidel):

süvenemine diabeet suhkruhaigusnärvilisus , ärevus,nägemishäired nägemishäiredkuivad või ärritunud silmad ,konjunktiviit sidekesta põletik, impotentsus, sündroom van Peyronie (peenise kõverdumine erektsiooni ajal juures ühe erektsiooni), ebaregulaarne südamerütm, kuiv suu, nohu, juuste väljalangemine, muutused maksa funktsiooni testides.

Väga harva (vähem kui 1 10 000-st patsiendist ):muutused

vererakkudes , unustamine, unustamine, segadus, hallutsinatsioonid, meeleolumuutused, kõrvahelin, kuulmisprobleemid, maitse muutused, maksapõletik (hepatiit), tundlikkus valguse suhtes ,tekke või kohta ägenemine psoriaasi, lihasnõrkus, liigesvalu, surev kude juures patsientidel koos raske häired vereringes vereringe.

teatamine kõrvaltoimetest alates kõrvaltoimetest

Kas teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles pakendi infoleheskirjas võib kõrvaltoimed ka otse teatada kaudu Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Teatades kõrvaltoimetest te teatada, võite teid aidata rohkem teavet teave te saama üle ohutus selle selle ravimi.

Kas teil palju probleeme ühe kõrvaltoimetest ? Võikas teil ühe kõrvaltoime mis see mitte sisse see infoleht on? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga.

#### 5. Kuidas säilitate te seda ravimit

Hoida nähtavuse ja kättesaamatus kohas lapsed hoidke.

Mitte säilitada üle 25°C.

Hoidke oma tabletid originaal pakendis ..

seda ravimit pärast mitte enam kui de viimane kõlblikkusaeg. See on leida karbil EXP. Seal on kuu ja aasta . Viimane päev sellest on karbilmärgitud EXP. Kuu ja aasta kuu on aegumiskuupäev kõlblikkusaeg.

Loputage ravimeid mitte kraanikausist või WC-st alla ja visake neid mitte prügikasti .. oma teie apteeker mida te ravimitega peate tegema mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse siis vastutustundlikul viisil ja ei sattu keskkonda ei keskkonnas õigustatud.

#### 6. Sisu pakendi pakend ja muu teave

Millised ained sisaldavad selles ravimis ?Toimeaine  
toimeaine aine selles sisse see ravim on metoprolol tartraat 50 mg ja 100 mg.

Teised ained selles ravimis on mikrokristalne tselluloos (E460), želatiin (E441), naatriumtärklisglükolaat tselluloos (E460), želatiin (E441), kolloidnehüdreeritud kolloidaalne hüdreeritud ränioksiid (E551), steariinhape (taimne) (E477).

Kuidas näevad Metoprolol tartraat Accord Tabletid välja ja mis on pakendis 50 mg

tabletid – valged valge kuni vaalvalged, ümmargune, bikoonekave tablett koos peaetrükiga ühel poolel küljel ja ühe murdjoonega teisel küljel 100 mg

tabletid – valged kuni kuni vaalvalge, ümmargune, bikoonekave tablett, millel on pealiskiri ühel küljel ja murdjoon teisel küljel Metoprolol tartraat Accord Tabletid

on pakitud sisse on pakendatud sisse blisterpakendid. See karp sisaldab 30, 60 või 90 tabletti. Mitte kõik nimetatud pakendisuurused on turul saadaval ..



omav isiku luba jaoks turule viimine Accord Healthcare B.V.,  
Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Tootja

Accord

Healthcare Polska Sp.z o.o. , ul.Lutomierska 50,95-200 Pabianice , PoolaRegistrisse

kantud numbri all ::

Metoprololartaaadi Accord 50 mg Tabletid, RVG 57170.

Metoprololartaaadi Accord 100 mg Tabletid, RVG 57171.

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud novembris 2021. sisse november 2021.

Transtoyou