

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Metoprololitartraatti Accord 50 mg ja 100 mg Tabletit (Metoprololitartraatti)

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä aiot ottaa sillä sisältää tärkeää tietoa sisään sinulle. u.

Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä tarvitset sitä myöhemmin uudelleen .. sinulla vielä kysymyksiä kysymykset? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin. Älä anna tätä lääkettä muille , koska se on vain sinulle määrätty . Se voi olla haitallista. voi haitallinen ovat varten muut, myös vaikka heillä on he samat oireet kuin sinulla. Jos sinulla on paljon haittaa yksi näistä sivuvaikutuksista jotka kohta 4 on? Tai saatteko te sivuvaikutuksen joka ei tässä tässä pakkausselosteessa ole? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin, apteekkariin.

Sisältö alkaen tämä pakkausseloste

1. Mikä on Metoprololitartraatti Accord ja mihin tätä lääkettä käytetään ?Milloin
2. et saa tätä lääkettä ottaa tai täytyy ottaa huomioon ole erityisen varovainen kanssa olla?
3. Kuinka otatte tämän lääkkeen sisään? Mahdolliset
4. sivuvaikutukset Kuinka
5. säilytätte tämän lääkkeen ? Sisältö?
6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot

1. Mitä on Metoprololitartraatti Accord ja mihin käytetään tätä lääkettä ?Metoprololi on

eräs selektiivinen beetasalpaaja . Tämä. Tämä tarkoittaa että metoprololi tabletit vaikuttavat sydämen toimintaan vaikuttavat ja alentavat verenpainetta alentavat.

Metoprololitartraatti Accord Tabletit määrätään potilaille joille potilaille:

vähentää verenpainetta alentaa vähentää;
kanssa kipu rinnassa rinnassa johtuen hapettomuudesta sydänlihaksen sydänlihas (angina pectoris);
kanssa häiriöt sydämen sydämen rytmi;
joka yksi sydäninfarkti ovat kokeneet; jos suojaus vastaan yksi mahdollinen seuraava sydäninfarkti;
sydämentykytyksillä sydämentykytyssydämentykytyksillä
; yksi liian voimakas vaikutus kilpirauhasen toiminta;
migreeni ehkäisyyn kohtauksiavastaan.

2. Milloin et saa tätä lääkettä ottaa tai sinun täytyy olla erityisen varovainen kanssa olla?

Milloin et saa tätä lääkettä ottaa ?olet

allerginen (yliherkkä) oletmetoprololille, muut metoprololille, muut muut beetasalpaajat tai varten yksi muiden aineiden jotka ovat tässä lääkkeessä olevat. Nämä aineet voit löytää kohdasta alla kohta 6.

jos u sydänjohtumishäiriöt tai sydämen rytmihäiriöt on (2. tai 3. asteen AV-katkos tai 'sick sinus' oireyhtymä (ellei pysyvä sydämentahdistin on asennettu)).jos u hoitamaton sydämen vajaatoiminta sydämen vajaatoiminta on, yksi hoito saa sydämen supistukset sydäimestä lisätä antaa kasvattaa tai shokissa on seurauksena seuraus sydänongelmista sydänongelmat.

sinä u kärsii jostakin vakava tukkeutuneet verisuonet, mukaan lukien ongelmat verenkierron kanssa (mikä aiheuttaa sormiesi ja varpaidesi kihelmöintiä , tai kalpea, tai kalpea of sininen tulla).

jos te yksi hidas syke on (alle 50 lyöntiäminuutissa).

jos te yksi matala verenpaine on.

jos kärsit jostakin yhdestä kohonneesta happamuudesta alkaen sinun veresi (metabolinen asidoosi).

jos sinä kärsit vakavasta vakava astma tai COPD (krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus sairaus).

jos käytät monoamiinioksidaasin estäjiä (MAOI:t). Katso myös ' Käyttömuiden lääkkeiden kanssa '.

jos te sydämen vajaatoiminta on, ja teidän verenpaine toistuvasti alle 100 mmHg laskee.

jos te muita verenpainelääkkeitä käytätte ,, kuten verapamiili ja diltiatseemi. Katso myös 'Käyttö muiden lääkkeiden kanssa'.

jos käytät lääkkeitä sydämen rytmihäiriöihin (anti-arytmia) käytetty, kuten disopyramidi. Katso myös 'Käyttö muiden lääkkeiden kanssa'.

jos sinä kärsit hoitamattomasta feokromosytoomasta feokromosytooma korkeakorkea verenpaine jos seuraus alkaen yksi kasvain lisämunuaisydin).

Milloin täytyy olla erityisen varovainen olemaan tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekki ennen te tätä lääkettä otat jos sinä:

astma on.

diabetes mellitus on (yksi matala verensokeri voi johtua tästä lääke naamioitu tulla).

kärsii jostakin feokromosytooma (korkea verenpaine seurauksena kasvain lisämunuaisytimen kasvain kasvain kasvain).

hoito saada saada vähentää allergisia reaktioita vähentää vähentää. Metoprolol tabletit voivat herkkyyttä yliherkkyyttä lisätä kohdalla aineille aineet joille olette allerginen kohdalla olette, ja de vakavuus van de allergiset reaktiot lisääntyä.

yli- aktiivinen kilpirauhanen on (oireet kuten kohonnut syke, hikoilu, vapina, ahdistus, lisääntynyt ruokahalu tai painonlasku voidaan tämän tämän lääkkeen peittää).psoriasis (vakavaihottuma ihottumaon tai on ollut gehad.

jos te saa puudutuksen annettuna ;kerro lääkärillesi tai hammaslääkärillesi että käytät umetoprololitabletteja ..

ongelmista päällä kanssa kanssa verenkierto (sormissa sormet, varpaat, käsivarret ja jalat).

kärsii jostakin sydämen johtumishäiriö (AV- katkos).sydämen vajaatoiminta on on sisään yhdistelmä kanssa yksi seuraavista tekijöistä ::

- tai angina pectoris -kohtaus viimeisten 28 päivän aikana angina pectoris rintakipua heikentynyt 28 toiminta.
- yksi heikentynyt munuainen- of maksatoiminta.
- nuorempi olet alle 40 vuotta tai vanhempi kuin 80 vuotta.

- sairaus sydämen läppien.
- suurentunut sydänlihás.
- sydänleikkaus sydänleikkaus in de viimeisten 4 kuukauden.
- epävákáa sydämen vajaatoiminta (NYHA IV).

Käyttö muiden lääkkeiden kanssa

Otako sinä lisäksi metoprololitartraattia Accord vielä muita lääkkeitä sisään, tai on te että lyhyt sitten tehnyt tai on olemassa se mahdollisuus että te lähitulevaisuudessa muita lääkkeitä aikoo ottaa ?? Kerro että sitten lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Älä käytä metoprololi tabletteja jos käytät jo yhtä seuraavista lääkkeistä alla oleva Monoamiinioksidaasin estäjät käytetty:

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAOI:t) vastaan yksi masennus (nämä voivat se verenpainetta alentava vaikutus vahvistaa).

muut verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten verapamiili ja diltiatseemi (nämä voivat yksi hidas syke tai yksi voimakkaampi verenpaineen lasku aiheuttaa).

lääkkeet vastaan rytmihäiriöt (anti-arytmiat) kuten disopyramidi (tämä voi de mahdollisuus op yksi epäsäännöllinen tai hidas sydämenlyönti lisätä ja de sydämen toiminta heikentää).

floctafenine (voi de reaktiot sydän ja verisuonet johtuen alhaisesta verenpaineesta tai shokki vähentää).

sultopride (lisääntynyt riski epäsäännölliseen sydämen rytmiin).Seuraavat

lääkkeet lääkkeet voivat vaikutus verenpaineen alentamiseen vahvistaa:

simetidiini (vastaan mahahaavat).

hydralatsiini ja klonidiini (verenpainetta alentavat lääkkeet).

terbinafiini (vastaan sieni-infektiot).

paroksetiini, fluoksetiini en sertraliini (vastaan masennusta).

hydroksiklorokiini (vastaan malariaa).

klooripromatsiini, trifluoripromatsiini, klooriprotikseeni (lääkkeet vastaan psykooseja).

amiodaroni, kinidiini ja propafenoni (vastaan epäsäännöllinen sydämen rytmi).

difenhydramiini (antihistamiini).

celecoxibi (kipua vastaan).

Seuraavat lääkkeet voivat vaikuttaa verenpaineen alentamiseen vähentää:

indometasiini (vastaan kipu).

rifampisiini (antibiootti).Muut

lääkkeet jotka voivat vaikuttaa metoprololiin tai joita metoprololi voi vaikuttaa tai joita metoprololi voi vaikuttaa tulla:

muut beetasalpaajat, esim. silmätipat.

adrenaliini (epinefriini), noradrenaliini (norepinefriini) tai muut sympatomimeetit.

lääkkeet varten de hoito alkaen diabetes; oireet alkaen matala verensokeri voidaan peittää . Lidokaiini.

Lidokaiini.

reserpiini, alfa-metyylidopa, guanfasiini, Käyttö.

metoprololin metoprololista tabletit kanssa ruoka ja juoma
Alkoholi voi sen verenpainetta alentava vaikutus metoprololilla tabletit vahvistaa.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, ajattelet u raskaana olla olemassa, haluatko raskaaksi tulla tai imetätkö u imetät? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin u tätä lääkettä käytät.

Raskaus

Teidän lääkäri voi Metoprololitartraatti Accord määrätä raskauden aikana raskauden jos hyödyt käytöstä sinulle ylittävät riskit sinulle ylittävät riskit de riskit sikiölle het syntymättömälle lapselle. Jos käytät Metoprololitartraattia Accord olet käyttänyt asti synnytykseen de synnytys voi sinun vastasyntynyt lapsi mahdollisesti de ensimmäinen kaksi päivää jälkeen syntymän syntymä ylimääräistä tarkistetaan tarkastetaan.

Imetys

Metoprololitartraatti Accord erittyy eritty rintamaidon kautta. Normaalisti normaaleilla annoksilla isde määrä metoprolol maidossa rintamaito pieni. Sinun lapsi tulee ylimääräisesti olla tarkistettu.

Hedelmällisyys

Tiedot jotka ovat osoittavat ei ei op erityispiirteet.

Ajokyky ja se käyttö koneiden

Metoprolol tabletit voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta aiheuttaa. Varmista että sinä tässä tässä ei haittaa on ennen te menette ajamaan tai koneita menette käyttämään, erityisesti jos te olette siirtyneet toiseen lääke tai toinen lääke jos olette alkoholia on käyttänyt.

3. Kuinka ottaa te tätä lääkettä ?

Ota tätä lääkettä aina tarkalleen kuten teidän lääkäri tai lääkäri apteekki u että on kertonut. Epäiletkö u oikea käyttö? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekki.

Koko (tai puolitetut) tabletit klo yksi tyhjä vatsa ottaa kanssa yksi puoli lasi vettä. Valitse yksi kiinteä ajankohta.

Tavallinen annostus on: kohonneessa

verenpaineessa : 100 tai 200 mg (1-2 verenpaine: 100 tai 200 mg (1-2 tabletit), mieluiten mieluiten kerran päivässä. Enintään 400 mg (4 tablettia 100 mg) per päivä.

kipu rinta (angina pectoris): al rinta (angina pectoris): al tarpeen mukaan de oireet 100-200 mg (1-2 tablettia 100 mg) per päivä jaettuna annoksiin . Enintään 400 mg (4 tablettia 100 mg) per päivä.

rytmihäiriöissä häiriöt sydämen rytmi: 100-200 mg jaettu päivän aikana päivä (esim. kaksi kertaa päivässä 1 tabletti 50 mg). Tarvittaessa voi lääkäri sinun annosta vielä lisätä . jos.

kuten suojaus vastaan yksi seuraava sydäninfarkti: kaksi kertaa päivässä 1 tabletti 100 mg.

sydämentykytys : 100 mg per päivä mieluiten kerran päivässä . Tarvittaessa sinun voi sinä lääkäri annostus jatkaa lisätä enintään 200 mg (2 tablettia 100 mg) per päivä.

jos liian voimakas vaikutus kilpirauhasen : 150-200 mg jaettuna 3-4 annokseen per päivä yli 3-4 annosta per päivä (3-4 kertaa päivässä 1 tabletti 50 mg). Jos tarpeen voi teidän lääkäri annostusta vielä lisätä ..

ehkäisyyn : 100-200 mg jaettuna 1-2 annokseen per päivä jaettu yli 1-2 annosta per päivä (1-2 kertaa päivässä 1 tabletti 100 mg).

Käyttö käyttö tästä tästä lääkkeestä on yleensä pitkäaikaista olla. Älä koskaan itse annostusta muuttaa tai äkillinen lopettaa käytön käyttö.

Jos heikentynyt munuaistoiminta: annoksen säätäminen ei tarpeen ..

heikentynyt maksatoiminta maksatoiminta: sinun sinun lääkäri jos te yksi maksasairaus on. Mahdollisesti täytyy annostusta muuttaa olla.

lääkät: annoksenmuutos ei tarvitaan ei.

Lapset: de kokemus van tämä lääke lasten on rajoitettu ..

voidaan jakaa in tasaisiin annoksiin. Onko teillä

kysymyksiä ? liian paljon tästä lääkkeestä ottanut ? Jos olet vahingossa ottanut enemmän kuin määrätty annos , ota yhteyttä lähimpään ensiapuosastoon tai lähin ensimmäinen päivystysosasto tai valo välittömästi teidän lääkäri tai apteekkari sisään. Oireet yliannostuksesta yksi yliannos ovat matala verenpaine (väsymys ja huimaus), hidas pulssi, epäsäännöllinen sydämen rytmi, sydänpysähdys, hengenahdistus, syvä tajuttomuus, pahoinvointi, oksentelu ja siniseksi muuttuminen ihon ..

Oletko unohtaa tämä lääke sisään ottaa ? Jos

sinun tabletti(a) unohtanut olet ottaa ja ottaa tulet siitä tietoiseksi siellä 4 4 tunti jälkeen, sitten täytyy sinun unohtaa tabletti(t) niin nopeasti kuin mahdollista ottaa ja sen jälkeen seuraava tabletti(t) ottaa mukaan sinun ' tavallinen ' aikataulu. ' kaavio.

Jos yli 4 tuntia sitten on kun otit sinun tabletit piti ottaa, niin jätä se annos yksinkertaisesti väliin ja odota kunnes ajankohta jolloin te mukaan teidän 'tavallinen' aikataulun mukaan seuraavan seuraava tabletti(a) pitäisi ottaa ..

ota kaksinkertaista annosta korvataksesi klo yksi unohtaa annos sisään ottaa kiinni.

Jos lopetat lopettaa lääkkeen ottamisen tästä lääkkeestä Jos

yhtäkkiä lopetat lääkkeen ottamisen niin sitten voi sinun tila yhtäkkiä huonontua; voi esiintyä rytmihäiriöitä tai kohonnut verenpaine ilmetä . Riskisydänkohtaukseen tai äkilliseen sydänkohtaukseen tai äkilliseen kuolemaan kuolema tulee suurentaa.

Se lopettaminen hoidon metoprololilla kanssa tulisi siksi yleensä tapahtua vähitellen ja aina yhteistyössä ja aina konsultaatiossa kanssa sinun lääkärisi. Kahden viikon ajan 2 viikkoa annosta

vähennetään annostus vähitellen puoleen. Alin annos annostus tulee vähintään neljä 4 päivää otettu olla tulee ennen de hoito kokonaan lopettaa ..

te aikana vähentämisen oireita saatte , tuleelopettaa aineosaa u teidän lääkäri neuvo ottaa yhteyttä.

4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke sivuvaikutuksia olla, vaikka saa ei kaikki siihen tehdä ..

hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi jos sinulla oireita sinä yksi alkaen yksi allerginen reaktio koet, kuten kutiseva ihottuma, punainen tuleminen kasvojen alueella, turvotus kasvojen , huulten, kielen tai kurkun, tai ongelmia kanssa ongelmat kanssa hengittää tai niellä. Tämä on erittäin vakava , muttarharvinainen haittavaikutus . Sevoi olla että tarvitsette kiireellistä lääketieteellistä apua tarpeen on onko of sairaalahoitoon täytyy olla sairaalaan sairaala.

Kerro sen sinun lääkäriille jos sinä yksi of seuraavista sivuvaikutuksista koet tai jos er jos teillä esiintyy haittavaikutus joka ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu : Hyvin:

(yli 1kymmenestä tapauksesta ja 1:stä 10:stä potilaat):	itse velto tuntea kun seisoo seisoa kuten seurauksena alhaisen yksi matala verenpaine, väsymys.
Usein (kun alle 1 kymmenestä, mutta kanssa enemmän kuin 1 100:sta potilasta):	hidas syke, ongelmia tasapainon säilyttämisessä alkaen (hyvinharvoin pyörtyminen), kylmät), kylmä kädet ja jalat, sydämentykytys, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, ummetus (ummetus), vatsakipu, hengenahdistus yhteydessä fyysiseen rasitukseen.
Joskus (alle 1:stä 100:sta, mutta yli 1:stä 1000:sta potilaasta):	tilapäinen pahaneminen oireiden sydämen vajatoiminnan oireet, sydänjohtumishäiriöt, nesteen pidättyminen neste, kipu rinnassa ,kihelmöivä tunne ,lihas krampit, oksentelu, painonnousu, masennus, vähentynyt keskittymiskyky, unettomuus, uneliaisuus, painajaiset, hengenahdistus, ihottuma, lisääntynyt hikoilu.
Harvoin (kanssa alle alle 1000:sta, mutta kohdalla enemmän kuin 1:llä 10 000:sta potilasta):	pahaneminen diabeteksen sokeritauti, hermostuneisuus, ahdistus, näköhäiriöt, kuivat tai ärtyneet silmät, sidekalvontulehdus, impotenssi, oireyhtymä van Peyronie (peniksen käyryys erektion aikana yksi erektio), epäsäännöllinen sydämenlyönti, kuiva suu, vuotava nenä, hiustenlähtö, muutokset maksan toimintakokeissa.
Hyvin harvoin (alle 1:10 000 potilaasta):	muutokset verisoluissa verisolutunohtelu unohtelevaisuus, sekavuus, hallusinaatiot, mielialanvaihtelut, tinnitus, kuulohäiriöt,

makumuutokset, maksatulehdus (hepatiitti), herkkyys valolle , esiintymintai syntyy of paheneminen psoriaasin, lihasheikkous, nivelkipu, kuoleva kudosis potilailla joilla on vakavia häiriöitä verenkiertoon . Sen.

haittavaikutuksista ilmoittaa alkaen sivuvaikutukset

Saatteko haittavaikutuksia , ottakaa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin . Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu . Te seistä . U voit sivuvaikutukset myös suoraan ilmoittaa kautta Alankomaiden Sivuvaikutukset Keskus Lareb (www.lareb.nl). Ilmoittamalla sivuvaikutuksista auttaa , voit te meitä auttamaan lisää tietoa saada tee hankkia yli turvallisuus tästä tämä lääke.

Saatteko te paljon haittaa yksi näistä sivuvaikutuksista? Tai saatteko te yksi sivuvaikutus joka ei sisään tämä pakkausseloste lukee? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkiin.

5. Kuinka säilytät sinä tätä lääkettä

Poissa näkyvistä ja ulottuvilta alkaen lapset säilyttää.

Ei säilytä yli 25°C.

Säilytä sinun tabletit alkuperäisessä pakkauksessa ..

tätä lääkettä enää kuin jälkeen ei de viimeinen viimeinen käyttöpäivä. Se on löydettävissä löytää laatikosta laatikko jälkeen EXP. Siellä lukee yksi kuukausi ja yksi vuosi. Viimeinen päivä päivä siitä kuukausi on viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin tai WC:hen tai WC:hen ja heitä ne ei roskakoriin roskakoriin. Kysy sinun apteekki mitä sinun tulee tehdä lääkkeillä täytyy tehdä joita et enää käytä . Nehävitetään sitten vastuullisella tavalla ja eivät päädy ympäristöön eivätkä tule ympäristöön oikein.

6. Sisältö pakkauksen ja muut tiedot Mitkä

aineet sisältyvät tähän lääkkeeseen ? Vaikuttavaaine

tässä aktiivinen aine sisään tämä lääke on metoprololitartraatti 50 mg ja 100 mg.

Muut aineet tässä lääkkeessä ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), gelatiini (E441), natriumtärkkelysglykolaatti selluloosa (E460), gelatiini (E441), kolloidinenvedetön kolloidinen hydratoitu piidioksidi (E551), steariinihappo (kasviperäinen) (E477).

Miten näyttää Metoprololitartraatti Accord Tabletit näyttävät ja mitä sisältää pakkaus 50 mg tabletit – valkoinen valkoinen asti vaaleanvalkoinen, pyöreä, kaksikupera tabletti, jossa on

merkintä  toisella puolella ja murtoviiva toisella puolella 100 mg tabletit –

valkoinen asti – valkoinen asti vaaleanvalkoinen, pyöreä, bikonveksi tabletti, jossa on merkintä



toisella puolella reuna ja murtoviiva toisella puolella muu reuna

Metoprololitartraatti Accord Tabletit ovat pakattu sisään läpipainopakkaukset. Se laatikko sisältää 30, 60 tai 90 tablettia. Ei kaikki mainitut pakkauskoot ole markkinoilla saatavilla ..

haltija myyntiluvan saaja varten markkinoille tuoda Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Valmistaja

Accord

Healthcare Polska Sp.z o.o. , ul.Lutomierska 50,95-200 Pabianice , PuolaRekisteriin

merkitty numerolla ::

Metoprololitartraatti Accord 50 mg Tabletit, RVG 57170.

Metoprololitartraatti Accord 100 mg Tabletit, RVG 57171.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty marraskuussa 2021. sisään marraskuu 2021.