

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Metoprololio tartratas Accord 50 mg ir 100 mg Tabletės (Metoprololio tartratas)

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš jums šį vaistą pradėdami vartoti nes yra yra svarbi informacija in jums. u.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt jums jo vėliau vėl prireiks.

Jei turite dar klausimų? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms, nes jis yra skirtas . Jis gali būti kenksmingas žalingas yra dėl kitiems, taip pat nors turi jie tuos pačius simptomus kaip jūs.

Ar jūs daug kenčiate nuo vieno iš šalutinių poveikių kurie yra skyrius 4 nurodyta? Ar gaunate jūš šalutinį poveikį kuris nėra šiame šiam pakuotės lapelyje nurodytas? Susisiekite su savo gydytoju, vaistininku.

Turinys iš ši pakuotės lapelis

1. Kas yra Metoprololtartratas Accord ir kam šis vaistas vartojamas ?Kada
2. jūs negalite šio vaisto nevertoti arba turite vartoti privalote u papildomai atsargiai su būti?
3. Kaip vartojate jūs šį vaistą ?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikote jūs šį vaistą?
6. Turinys iš pakuotės ir kita informacija

1. Kas yra Metoprololtartratas Accord ir kam šis vaistas vartojamas ?Metoprololis yra

selektyvus beta adrenoblokatorius . Šis beta adrenoblokatorius. Šis reiškia kad metoprololis tabletės de širdies veiklą veikia ir de kraujospūdį mažina.

Metoprololio tartratas Accord Tabletės skiriamos pacientams kuriems reikia:

sumažinti kraujospūdį te mažinti;

su skausmu krūtinėje dėl deguonies trūkumo širdies raumenyje (krūtinės angina);
susutrikimais

širdies ritmo ; širdies ritmas;

kurie vieną miokardo infarktą patyrė praeityje; kaip apsauga nuo galimo kito miokardo infarkto miokardo infarktassu

širdies plakimu širdies plakimassu

vienu per te stiprus veikimas skydliaukės liaukos;

migrenos priepuolių prevencijai..

2. negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs atsargiai su būti?

Kada galite šio vaisto ne vartoti?

jūs esate alergiškas (padidėjęs jautrumas) esate metoprololiui, kitoms kitų vaistų beta adrenoblokatoriai arba prieš viena iš kitų medžiagų esančių šiame vaistiniame preparate yra. Šias medžiagas galite rasti skyriuje rubrikoje 6. 6.

kaip u širdies laidumo sutrikimai arba širdies ritmo problemos turite (2-o ar 3-io laipsnio AV-blokada arba 'sick sinus' sindromas (nebent yra nuolatinis širdies stimulatorius implantuotas)).

jei jūs neapdorotas širdies nepakankamumas turite, vieną gydymą gaunate siekiant susitraukimus širdies padidinti leisti padidėti arba šoko būsenos esate kaip pasekmė dėl širdies problemų.

jei jūs kenčia nuo sunkios užsikimšusios kraujagyslės, įskaitant problemas su kraujotaka (dėl kurių jūsų pirštai ir kojų pirštai pradeda tirpti, arba blyškūs iš mėlyna tampa).

jei jūs vieną lėtą širdies ritmą turite (mažiau nei 50 dūžių/minutę).

jei jūs žemą kraujospūdį kraujospūdis turite.

jei kenčiate nuo padidėjusio rūgštingumo kiekio jūsų kraujo (metabolinė acidozė), jei

jūs kenčiate nuo sunkios sunkus astma arba LOPL (lėtinė obstrukcinė plaučių liga).

jei jūs monoaminooksidazės inhibitorius vartojate (MAOI). Žr. taip pat 'Vartojimas su kitais vaistais'.

jei jūs širdies nepakankamumas turite, ir jūsų kraujospūdis pakartotinai žemiau 100 mmHg nukrenta.

jei jūs kitus kraujospūdį mažinančius vaistus vartojate, kaip verapamilis ir diltiazemas. Žr. taip pat 'Vartojimas su kitais vaistais'.

jei jūs vaistus nuo širdies ritmo sutrikimų (anti-aritminiai) naudojamas, kaip disopiramidas. Žr. taip pat 'Naudojimas su kitais vaistais'.

jei jūs sergate neapdorotu feochromocitoma feochromocitoma aukštas aukštas kraujospūdis kaip pasekmė iš naviko antinksčių širdies).

Kada turite būti papildomai atsargūs esate su šiuo vaistu?

Susisieki su savo gydytoju ar vaistininkas prieš jūs šį vaistą vartojate jei jūs:

astma turite.

cukrinis diabetas turite (žemas kraujo cukraus gali dėl šio vaistas užmaskuotas būti).

kenčia nuo feochromocitoma (aukštas kraujospūdis dėl naviko ant antinksčių širdies). gydymas

gauti gydymą gauna om alergines reakcijas sumažinti sumažinti Metoprolol tabletės gali padidinti jautrumą padidinti medžiagoms kurioms jūs esate alergiškas esate alergiškas, ir de sunkumas van de alerginės reakcijos padidinti.

jei peraktyvi skydliaukė turite (simptomai tokie kaip padidėjęs širdies ritmas, prakaitavimas, drebulys, nerimas, padidėjęs apetitas arba svorio netekimas gali būti šiuo vaistu užmaskuotas). psoriazė (

sunkus odos bėrimas odos bėrimas turite arba turėjote turi gehad.

kaip jūs vieną anestezija gaunate suleista; pasakykite jūsų gydytojui arba odontologui kad umetoprololio tabletes vartojate.

kenčiate nuo problemų su kraujotaka (pirštuose pirštai, pirštai, rankos ir kojos).

kenčia nuo širdies laidumo sutrikimo (AV- blokas). širdies nepakankamumas turite turi in kombinacija su vienu iš žemiau išvardytų veiksmų:

- širdies priepuolis arba krūtinės angina per pastarąsias 28 28 ..
- inkstų funkcija inkstas- of kepenų funkcija.

- jaunesnis esate jaunesnis nei 40 metų arba vyresnis nei 80 metų.
- širdies vožtuvų liga širdies vožtuvai.
- širdies raumuo ..
- operacija širdies operacija per praėjusiais 4 mėnesius.
- nestabilus širdies nepakankamumas (NYHA IV).

Vartojimas su kitais vaistais

Ar jūs be metoprololio tartrato Accord dar kitus vaistus j, iš turi jūs kad trumpai neseniai padarė ar egzistuoja galimybė kad jūs artimoje ateityje kitus vaistus pradėsite vartoti ? vartoti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojui arba vaistininkui.

Vartokite metoprololio tablečių ne jei jūs jau vieną iš žemiau išvardytų vaistų:

Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI's) prieš vieną depresiją (šios gali sumažinti kraujospūdį mažinantį poveikį sustiprinti).

kitos kraujospūdį mažinančios priemonės, tokios kaip verapamilis ir diltiazemas (šis gali vienas lėtas širdies ritmas arba vienas stipresnis kraujospūdžio sumažėjimas sukelti).

vaistai nuo širdies ritmo sutrikimų (anti-aritminiai) tokie kaip disopiramidas (šis gali de tikimybė ant nereguliarus arba lėtas širdies ritmas padidinti ir širdies funkcija sumažinti). floctafeninas(

gali (reakcijas de padidinti širdies ir kraujagyslių dėl žemo kraujospūdžio arba šoko sumažinti).

sultopride (padidėjusi rizika nereguliarus širdies ritmo).Toliau

išvardyti vaistai gali poveikį kraujospūdžio mažinimui sustiprinti:

cimetidinas (nuo skrandžio opų).

hidralazinas ir klonidinas (kraujospūdį mažinantys vaistai).

terbinafinas (nuo grybelinių infekcijų).

paroksetinas, fluoksetinas en sertralinas (prieš depresijas).

hidroksichlorokvinas (prieš maliariją).

chlorpromazinas, trifluopromazinas, chlorprotiksenas (vaistai prieš psichozes).

amjodaronas, chinidinas en propafenonas (nuo nereguliarus širdies ritmo).

difenhidraminas (antihistamininis vaistas).

celekoksibas (nuo skausmo).

Toliau išvardyti vaistai gali turėti įtakos kraujospūdžio mažinimui sumažinti:

indometacinas (nuo skausmo).

rifampicinas (antibiotikas).Kiti

vaistai kurie metoprololį gali paveikti arba metoprololis paveikti gali gali tampa:

kiti beta adrenoblokatoriai, pvz. akių lašai.

adrenalinas (epinefrinas), noradrenalinas (norepinefrinas) arba kiti simpatomimetikai.

vaistai nuo de gydymas nuo cukrinio diabeto; simptomai reiškiniai dėl žemo gliukozės kiekio kraujyje gali būti užmaskuoti ..

..

širdies glikozidai širdies glikozidai.

metoprololio metoprololio tabletės su maistu ir gėrimu

Alkoholis gali sustiprinti kraujospūdį mažinantį metoprololio poveikį tabletės sustiprinti.

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, galvojate u nėščia būti esate, norite nėščia tapti ar žindote u krūtimi?
Susisiekiite su savo gydytoju ar vaistininku prieš u šį vaistą vartojate.

Nėštumas

Jūsų gydytojas gali Metoprololtartraat Accord išrašyti nėštumo metu de nėštumo jei de pranašumai vartojimo jums viršija u galimą riziką prieš de rizikos dėl het ne gimusio vaiko. Jei vartojote Metoprololtartraat Accord turite naudojote iki pat de gimdymo gali jūsų naujagimis vaikas galbūt de pirmas du dienos po gimimo papildomai tikrinami būti kontroliuojami.

Žindymas

Metoprololio tartratas Accord išsiskiria per motinos pieną . Esant normalioms dozėms dozės išde kiekis metoprololis piene motinos pienas mažas. Jūsų vaikas bus papildomai bus tikrinamas.

Vaisingumas

Duomenys duomenys kurie yra rodo ne op ypatumai.

Vairavimo gebėjimai ir tą naudojimas mašinų

Metoprololis tabletės gali sukelti nuovargį ir galvos svaigimą . Užtikrinkite kad prieš jūs čia čia nėra diskomfortas turite prieš jūs važiuojate automobiliu ar naudojate įrenginius pradėdate naudoti, ypač jei jūs perėjote prie kito vaisto ar iš jei jūs alkoholį turite vartojote.

3. Kaip vartoti jūs šį vaistą ?

Vartokite šį vaistą visada taip tiksliai kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas u kad turi pasakė. Abejokite dėl teisingo vartojimo? Tada susisiekiite su savo gydytoju arba vaistininku.

Visos (arba perpjautos) tabletės ant vieną tuščią skrandį vartoti su vienu puse stiklinės vandens. Pasirinkite pastovų laiką.

Įprasta dozė yra: esant

padidėjusiam kraujospūdžiui : 100 arba 200 mg (1-2: 100 arba 200 mg (1-2 tabletės),
prie pageidautina vieną kartą per dieną. Maksimaliai 400 mg (4 tabletės po 100 mg) per dieną.

dėl skausmo krūtinėje (krūtinės angina): kaip priklauso nuo aplinkybių de skundai 100-200 mg (1-2 tabletės po 100 mg) per dieną į padalintas dozes. Maksimaliai 400 mg (4 tabletės po 100 mg) per dieną.

esant sutrikimams širdies ritmo: 100-200 mg padalintas per dieną (pvz. du kartus per dieną 1 tabletė po 50 mg). Jei reikia gali jūsų gydytojas dozę dar toliau padidinti.

kaip apsauga prieš vieną kitą miokardo infarktą: du kartus per dieną 1 tabletė po 100 mg.

esant širdies plakimui: 100 mg per dieną geriausia vieną kartą per dieną .. gali jūsų jūsų menai de dozavimas toliau padidinti iki 200 mg (2 tabletės po 100 mg) per dieną.

prie vienas per stiprus poveikis skydliaukės : 150-200 mg padalinta į 3-4 dozes per dieną diena (3-4 kartus per dieną 1 tabletė po 50 mg). Taip reikia gali jūsų gydytojas dozę dar padidinti ..

prevencijai : 100-200 mg padalintą 1-2 dozes per dieną . per 1-2 dozes per diena (1-2 kartus per dieną 1 tabletė po 100 mg).

Vartojimas šio vaisto dažniausiai bus ilgalaikis . Niekada patys nekeiskite dozės arba dozavimas pakeisti iš staiga nutraukti vartojimą naudojimas.

Esant sumažėjusiai inkstų funkcijai: dozės koregavimas nėra reikalingas ..

sumažėjusiai kepenų funkcijai kepenų funkcija: savo jūsų gydytojas jei jūs turite kepenų liga .. reikia dozė pakeisti . Senyvo amžiaus žmonės.

dozės koregavimas: reikalingas . ne reikalingas.

Vaikai: patirtis su šiuo vaistu vaikams yra ribota ..

galima padalyti į lygias dozes. Ar turite

klausimų ? per daug šio vaisto pavartojote ? Jei netyčia daugiau nei nurodyta dozė pavartojote , susisieki su artimiausia pirmosios pagalbos skyriumi arba pagalbos skyrius iš šviesa nedelsiant jūsų gydytojas arba vaistininkas į.

Simptomai per viena perdozavimas yra žemas kraujospūdis (nuovargis ir galvos svaigimas), lėtas pulsas, nereguliarus širdies ritmas, širdies sustojimas, dusulys, gilus sąmonės netekimas, pykinimas, vėmimas ir mėlyna tapti odos ..

Ar jūs pamiršote šį vaistą į vartoti ? Jei jūs savo tabletę(-es) pamiršote pamiršti vartoti ir jūs pastebėjote tai per 4 viduje 4 valanda po to, turite jūs pamiršote tabletę(-es) kuo greičiau galima išgerti ir po to kitą sekantį tabletę(-es) išgerti pagal jūsų 'įprastą' grafiką.

Jeilgiau nei 4 valandos praėjo nuo kai jūs savo tabletę(-es) turėjote vartoti , tad praleiskite tą dozę tiesiog ir laukti iki kito iki laiko kada jūs pagal jūsų 'įprastą' grafiką kitą tabletę(s) turėtumėte vartoti ..

dvigubos dozės kad dozė apie vieną pamirštą dozę į kompensuoti ..

nutraukiate vartojimą šio vaisto Jei jūs staiga nutraukiate vartojimą tada sustabdyti su vartoti tada gali jūsų būklė staiga pablogėti; gali atsirasti širdies ritmo sutrikimai arba padidėjęs kraujospūdis atsirasti . Rizika širdies priepuolio arba staiga padidėja širdies priepuolis arba staiga mirtis yra padidėjęs.

Tai nutraukti gydymą metoprololiu reikia todėl kaip taisyklė palaipsniui turėtų vykti ir visada su gydytoju pasitarus su jūsų gydytoju. Per bent mažiausiai 2 savaites bus dozė dozė palaipsniui perpus sumažinta. Mažiausia mažiausia dozė turi bent mažiausiai 4 dienas vartojamas būti turi prieš de gydymą visiškai nutraukti ..

Jūs per per mažinimą simptomus patiriate, turite ingredientas u jūsų gydytojas konsultuotis su kreiptis.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti, nors gauna ne visi su tuo turėti reikalų.

Nustokite gydymą ir kreipkitės nedelsiant susisieki su savo gydytoją jei jūs simptomus nuo ligos alerginė reakcija patiria, tokių kaip niežtintis odos bėrimas, raudonas tapti veido veidas, patinimas veido, lūpų, liežuviu ar gerklės, arba problemų liežuvis arba gerklė, arba problemos su kvėpuoti arba nuryti. Tai yra labai rimtas, betretas šalutinis poveikis. Taigali būti kad jums skubiai reikia medicininės pagalbos reikalingas turite iš hospitalizuotas turi būti į ligoninę.

Pasakykite tai savo gydytojui jei jūs patiriate vieną iš žemiau išvardytų šalutinių poveikių arba er prie jums viena šalutinis poveikis pasireiškia kuris nėra šiame šiame pakuotės lapelyje yra nurodytas:

Labai dažnai
(prie daugiau nei 1 iš 10
pacientai):

jaučiasi silpni jausti prie stovėjimo stovėti kaip dėl žemo vienas žemo kraujospūdžio, nuovargis.

Dažnai (prie mažiau nei 1
iš 10, bet prie daugiau nei
1 iš 100 pacientų):

lėtas širdies ritmas, problemų su pusiausvyros išlaikymu (labai retai su nualpimu), šaltos šaltis rankos ir kojos, širdies plakimas, galvos svaigimas, galvos skausmas, pykinimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas (konstipacija), pilvo skausmas, dusulys prie fizinio krūvio.

Kartais (prie mažiau nei 1
iš 100, bet prie daugiau
nei 1 iš 1000 pacientų):

laikinas paūmėjimas simptomų širdies nepakankamumo, širdies nepakankamumas, širdies laidumo sutrikimai, skysčių susilaikymas nuo skysčių, skausmas krūtinėje, dilgčiojimo pojūtis, raumenų spazmai raumenų mėšlungis svėrimas, svorio padidėjimas svorio padidėjimas depresija depresija, sumažėjusi koncentracija, nemiga, mieguistumas, košmarai, dusulys, odos bėrimas, padidėjęs prakaitavimas.

Retai (prie mažiau nei 1 iš
1000, bet pas daugiau nei
1 iš 10.000 pacientų):

cukrinio diabeto pablogėjimas cukrinis diabetas nervingumas, nerimas, regėjimo sutrikimai regėjimo sutrikimai sausos arba sudirgintos akys, konjunktyvitas junginės uždegimas, impotencija, sindromas nuo Peyronie (varpos išlinkimas varpos esant erekcijai), nereguliarus širdies ritmas, sausa burna, sloga sloga, plaukų slinkimas,

retai (mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų mažiau nei 1 iš 10.000 pokyčiai kraujo ląstelėse

pokyčiai kepenų funkcijos tyrimuose kepenų funkcijos tyrimai.

pokyčiai užmaršumas kraujo ląstelės, užmaršumas, sumišimas, haliucinacijos, nuotaikos svyravimai, spengimas ausyse, klausos sutrikimai, skonio pokyčiai, kepenų uždegimas (hepatitas), jautrumas šviesai , atsiradimas arba atsiradimas iš paūmėjimas psoriazės, raumenų silpnumas, sąnarių skausmas, mirštantis audinys pas pacientus su sunkiais sutrikimais kraujotakoje kraujotaka.

apie šalutinius poveikius nuo šalutinis poveikis

Ar Jūs jaučiate šalutinį poveikį, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir galimiems šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame lapelyje paminėti . Jūs. U gali šalutinis poveikis taip pat tiesiogiai pranešti per Nyderlandų Šalutinio poveikio Centras Lareb (www.lareb.nl). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite pranešti, gali jūs mums padėti daugiau informacijos pranešti gauti apie saugumą šio šio vaisto.

Ar jūs daug kenčiate nuo vienos iš šalutinių poveikių? Arba ar jūs vieną šalutinį poveikį kuris ne į šiame pakuotės lapelyje nurodyta? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vietoje vaikai laikyti.

Ne laikyti virš 25°C.

Laikykite savo tabletes originalioje pakuotėje ..

šio vaisto po ne daugiau kaip de galutinė galiojimo data. Ji yra rasti ant dėžutės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai . Paskutinė diena tolaikotarpio yra nurodyta etiketėje mėnuo yra galiojimo data.

Neskalaukite vaistų ne per kriauklę ar tualetą ir išmeskite jų ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininkas ką daryti su vaistais turite daryti kurių nebe naudojate .Jie yra tada atsakingai sunaikinami būdu sunaikinami ir nepatenka į aplinką aplinkoje pagrįstas.


6. Turinys iš pakuotės ir kita informacija


Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame in šis vaistas yra metoprololio tartratas 50 mg ir 100 mg.

Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra mikrokristalinė celiuliozė (E460), želatina (E441), natrio krakmolo glikolatas natrio krakmolo glikolatas koloidinis hidratuotas hidratuotas silicio dioksidas (E551), stearino rūgštis (augalinis) (E477).

Kaip atrodo Metoprololio tartratas Accord Tabletės ir kas yra pakuotėje 50 mg tabletės

– baltos – baltas iki blyškiai baltos, apvalios, dvipusės išgaubtos tabletės su įspaudu  vienoje pusėje ir lūžio linija kitoje pusėje 100 mg tabletės

– baltos iki baltas iki blyškiai baltos, apvalios, dvipusės tabletės su įspaudu  vienoje pusėje kraštas ir lūžio linija kitoje pusėje kraštas

Metoprololio tartratas Accord Tabletės yra supakuotos į lizdines plokštelės. Ket dėžutė turi 30, 60 arba 90 tablečių. Ne visos paminėtos pakuotės dydžiai yra prekyboje pateikiami ..

turėtojas leidimo vaistui gauti į prekybą pateikti
Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

Gamintojas

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomińska 50,95-200 Pabianice, Lenkija

Įregistruota po ::

Metoprololio tartratas Accord 50 mg Tabletės, RVG 57170.

Metoprololio tartratas Accord 100 mg Tabletės, RVG 57171.

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas lapkričio mėn. 2021 m. lapkritis 2021.