

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Tartarato de Metoprolol Accord 50 mg e 100 mg Comprimidos (Tartarato de Metoprolol)

Leia cuidadosamente todo o folheto informativo antes de tomar este medicamento começar a tomar porque estado importante informação em para você.

Guarde este folheto. Talvez precise dele mais tarde novamente ..

você mais perguntas perguntas? Entre em contato com seu médico, ou farmacêutico.

Não dê este medicamento a outras pessoas , pois é apenas para você prescrito . Pode ser prejudicial pode prejudicial são para outros, mesmo que tenham eles os mesmos sintomas que você.

Se você muito incomodado com um dos efeitos colaterais que em rubrica 4 está? Ou tem você um efeito colateral que não neste este folheto informativo está? Entre em contato com seu médico, farmacêutico.

Conteúdo de este folheto informativo

1. O que é Metoprolol tartarato Accord e para que é este medicamento tomado?
2. Quando não deve este medicamento não tomar ou deve u er extra cautela com ser?
3. Como toma você este medicamento ?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como guarda você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Metoprolol tartarato Accord e para que é este medicamento usado?

Metoprolol é um bloqueador beta seletivo. Este significa que metoprolol comprimidos o funcionamento do coração afetam e a pressão arterial reduzem.

Metoprolol tartarato Accord Comprimidos são prescritos a pacientes:

para pressão arterial reduzir ;com
dor no peito por falta de oxigênio do músculo cardíaco (angina pectoris);com
distúrbios do ritmo cardíaco ;;
que um infarto do miocárdio tiveram sofrido; como proteção contra um possível
próximo infarto do miocárdio;
com palpitações;
com um muito forte ação da glândula tireoide;
para prevenção de ataques de enxaqueca-crises.

2. Quando não pode este medicamento não tomar ou deve ter cuidado cuidado com ser?

Quando você pode este medicamento não tomar?

você é alérgico (hipersensível) é a metoprolol, a outros betabloqueadores de para um dos as outras substâncias que estão em este medicamento contidas. Estas substâncias pode encontrar sob a seção 6.

se u distúrbios de condução cardíaca ou problemas de ritmo cardíaco tem (bloqueio AV de 2º ou 3º grau bloqueio ou síndrome do nó sinusal doente síndrome (a menos que um permanente marcapasso tenha sido implantado)).

se você insuficiência cardíaca não tratada tem, um tratamento recebe para contrações do coração para aumentar aumentar ou em choque está como resultado de problemas cardíacos.

se você sofre de grave bloqueio vasos sanguíneos, incluindo problemas com a circulação sanguínea (fazendo com que seus dedos e dedos dos pés fiquem formigando, ou pálido de azul ficar).

se você um batimento lento tem (menos de 50 batidas por minuto).

se você uma pressão baixa tem.

se sofre de um aumentado nível de acidez do seu sangue (acidose metabólica).

se você sofre de grave asma de DPOC (crônica obstrutiva pulmonar doença).

se você inibidores da monoamina oxidase usa (IMAO). Veja também 'Uso com outros medicamentos'.

se você insuficiência cardíaca tem, e sua pressão arterial repetidamente abaixo de 100 mmHg fica.

se você outros anti-hipertensivos medicamentos usa, como verapamil e diltiazem. Veja também 'Uso com outros medicamentos'.

se você medicamentos para arritmias cardíacas (anti-arrítmicos) usado, como disopiramida. Veja também 'Uso com outros medicamentos'.

se você sofre de feocromocitoma não tratado (alta pressão arterial como resultado de um tumor da medula adrenal).

Quando deve ter extra cuidado estar com este medicamento?

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes você este medicamento tomar se você:

asma tem.

diabetes mellitus tem (um baixo nível de açúcar no sangue pode por este medicamento mascarado ser).

sofre de feocromocitoma (alta pressão arterial como resultado de um tumor da medula adrenal).

um tratamento recebe para alérgicas reações reduzir . Metoprolol comprimidos podem a hipersensibilidade aumentar para as substâncias às quais você alérgico a é, e em de gravidade da alérgicas reações aumentar.

uma hiperativa tireoide tem (sintomas como aumento frequência cardíaca, sudorese, tremores, ansiedade, aumentado apetite ou perda de peso podem por este medicamento ser mascarados). psoríase (

erupção cutânea grave) tem ou teve no passado tem gehad.

se você receber anestesia administrada ; informe seu médico ou dentista que umetoprolol comprimidos usa ..

de problemas com o com o circulação sanguínea (nos dedos, dedos dos pés, braços e pernas).

sofre de um distúrbio de condução cardíaca (bloqueio AV). insuficiência cardíaca tem em em combinação com um de abaixo fatores:

- um ataque cardíaco ou um ataque de angina pectoris nos últimos 28 dias.

- uma função renal reduzida rim- of função hepática.
- mais jovem tem menos de 40 anos ou mais velho que 80 anos.
- doença das válvulas cardíacas.
- miocárdio aumentado.
- uma cirurgia cardíaca no passados 4 meses.
- instável insuficiência cardíaca (NYHA IV).

Uso com outros medicamentos

Toma você além de metoprolol tartarato Accord ainda outros medicamentos em, de tem você que curto atrás feito ou existe a possibilidade que você no próximo futuro outros medicamentos vai tomar? Diga isso então seu médico ou farmacêutico.

Use metoprolol comprimidos não se você já um dos seguintes medicamentos usa:

Inibidores da monoamina oxidase (IMAO's) contra uma depressão (estes podem o efeito anti-hipertensivo potencializar).

outros anti-hipertensivos ,como verapamil e diltiazem (diltiazemestes podem um lento batimento cardíaco ou uma maior queda de pressão arterial causar).

medicamentos contra arritmias cardíacas (anti-arrítmicos) como disopiramida (isto pode o risco de um irregular ou lenta frequência cardíaca aumentar e a função cardíaca reduzir).

floctafenina (pode as reações do coração e vasos sanguíneos devido a baixa pressão arterial ou choque reduzir).

sultopride (aumentado risco de um ritmo cardíaco irregular).

Os seguintes medicamentos podem o efeito sobre a redução da pressão arterial potencializar:

cimetidina (contra úlceras gástricas).

hidralazina e clonidina (antihipertensivos).terbinafina (

contrainfecções fúngicas).paroxetina

paroxetina, fluoxetina en sertralina (contra depressões).

hidroxicloroquina (contra malária).

clorpromazina, trifluopromazina, clorprotixeno (medicamentos contra psicoses).

amiodarona, quinidina e propafenona (contra um irregular ritmo cardíaco).

difenidramina (um anti-histamínico).

celecoxib (contra dor).

Os seguintes medicamentos podem afetar a redução da pressão arterial reduzir:

indometacina (contra dor).

rifampicina (um antibiótico).

Outros medicamentos que metoprolol podem afetar ou por metoprolol afetados podem ser:

outros betabloqueadores, ex. colírios.

adrenalina (epinefrina), noradrenalina (norepinefrina) ou outros simpaticomiméticos.

medicamentos para o tratamento de diabetes; os sintomas de uma baixa glicemia podem ser mascarados ..

..

glicosídeos cardíacos glicosídeos cardíacos.

de metoprolol de metoprolol comprimidos com alimento e bebida
Álcool pode o efeito hipotensor de metoprolol comprimidos potencializar.

Gravidez e amamentação

Está grávida, acha u grávida estar estar, deseja grávida ficar ou dá u amamentação? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de u este medicamento usar.

Gravidez

Seu médico pode Metoprololtartrato Accord prescrever durante a gravidez se os benefícios do uso para você superarem os de riscos para o nascituro criança. Se você Metoprololtartrato Accord tem usado até ao o parto irá seu recém-nascido criança possivelmente o primeiro dois dias após o nascimento extra serão controlados.

Amamentação

Metoprololtartrato Accord é excretado através do leite materno. Em doses normais isde quantidade metoprolol no leite materno pequena. Seu filho será extra será monitorado.

Fertilidade

Os dados que existem indicam não não em particularidades.

Habilidade para dirigir e o uso de máquinas

Metoprolol comprimidos podem fadiga e tontura causar. Certifique-se de que você aqui nenhum incômodo de tem antes de você vai dirigir ou operar máquinas vai usar, especialmente se você foi transferido para um outro medicamento ou se você álcool tem usado.

3. Como tome você este medicamento ?

Tome este medicamento sempre exatamente como seu médico ou artes de farmacêutico u que tem informado. Dúvidas sobre o uso correto ? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico ..

divididos cortada ao meiocomprimidos em em um estômago vazio tomar com um meio copo de água. Escolha um horário fixo.

A dosagem usual é:

para hipertensão : 100 ou 200 mg (1-2: 100 ou 200 mg (1-2 comprimidos), em preferência uma vez por dia. Máximo 400 mg (4 comprimidos de 100 mg) por dia.
em dor no peito (angina pectoris): conforme necessário dependendo de sintomas 100-200 mg (1-2 comprimidos de 100 mg) por dia em doses divididas. Máximo 400 mg (4 comprimidos de 100 mg) por dia.
para distúrbios do ritmo cardíaco: 100-200 mg dividido ao longo do dia (por ex. duas vezes ao dia 1 comprimido de 50 mg). Se necessário pode o seu médico a dosagem ainda mais aumentar.
como proteção contra um próximo infarto do miocárdio: duas vezes por dia 1 comprimido de 100 mg.

em palpitações: 100 mg por dia de preferência uma vez por dia. Se necessário pode o seu artes de dosagem continuar aumentar até 200 mg (2 comprimidos de 100 mg) por dia.

em um efeito muito forte da glândula tireoide: 150-200 mg dividido em 3-4 doses por dia (3-4 vezes por dia 1 comprimido de 50 mg). Se necessário pode o seu médico a dosagem ainda mais aumentar.

para prevenção de ataques de enxaqueca-crisis: 100-200 mg divididos em 1-2 doses por dia (1-2 vezes por dia 1 comprimido de 100 mg).

O uso de este medicamento será geralmente prolongado .Nunca mude a dosagem ou de repentino parar com o uso.

Em função renal reduzida função renal: ajuste de dose não necessário ..

função hepática reduzida reduzida informe: diga seu médico se você um doença hepática tem. Possivelmente deve a dosagem ajustada ser.

Idosos: ajuste de dose é não necessário.

Crianças: a experiência de este medicamento em crianças é limitada.

O comprimido pode ser dividido em doses iguais. Tem

você você te muito de este medicamento ingerido?

Se você por acidente mais do que a dose prescrita tomou , entre em contato com o pronto-socorro mais próximo primeiro primeiro ou de leve imediatamente seu médico ou farmacêutico em.

Sintomas de uma overdose são baixa pressão arterial (fadiga e tontura), pulso lento, irregular ritmo cardíaco, parada cardíaca, falta de ar, profunda inconsciência, náusea, vômito e ficar azul da pele.

Você está esquecer este medicamento em tomar ?Se você seu comprimido(s) esquecer estiver em tomar e você perceber isso dentro de 4 4 hora atrás, então deve você o esquecido comprimido(s) assim rápido possível tomar e depois o próximo comprimido(s) tomar conforme seu 'habitual' esquema.

Se mais de 4 horas atrás foi que você seu comprimido(s) deveria tomar , então pule essa dose simplesmente e espere e aguarde até o horário em que você de acordo com seu 'habitual' esquema de próximo comprimido(s) deveria tomar ..

nenhuma dose dupla para para um esquecer dose em compensar ..

parar de tomar este medicamento Se você de repente parar de tomar então ingerir então pode sua condição de repente piorar; pode haver arritmias cardíacas ou uma pressão arterial elevada surgir. A probabilidade de um ataque cardíaco ou de repente falecimento é aumentado.

A interrupção do tratamento com metoprolol deve portanto como regra ser gradual e acontecer sempre em consulta com seu médico. Durante pelo menos 2 semanas a dosagem gradualmente reduzida. A menor dosagem deve pelo menos 4 dias tomado para ser antes de tratamento completamente parar ..

Se você durante a redução dos sintomas receber, deve seguir o seu médico conselho a consultar.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter, embora recebe não todos com isso a ver.

Pare com o tratamento e entre imediatamente em contato com seu médico se você sintomas de uma alérgica reação experimentar, como coceira erupção cutânea, vermelho ficar do rosto, inchaço do rosto, os lábios, a língua ou a garganta, ou problemas com respirar ou engolir. Isto é um muito grave, mas raro efeito colateral. Pode ser que você precise urgente ajuda médica necessária tem de admitido deve ser no hospital.

Informe o seu médico se você um dos seguintes efeitos colaterais experimentar ou se em você uma reação adversa ocorrer que não neste este folheto informativo está mencionado:

Muito frequente (em mais de 1 em 10 pacientes):	se mole sentir ao ficar em pé como resultado de uma baixa pressão arterial, fadiga.
Frequentemente (em menos de 1 em 10, mas em mais de 1 em 100 pacientes):	batimento cardíaco, problemas com o armazenamento do equilíbrio (muito raramente com desmaios), frio mãos e pés, palpitações, tontura, dor de cabeça, náusea, diarreia, prisão de ventre (constipação), dor abdominal, falta de ar em atividade física.
Às vezes (em menos de 1 em 100, mas em mais de 1 em 1000 pacientes):	agravamento temporário dos sintomas de insuficiência cardíaca, distúrbios de condução cardíaca, retenção de líquidos, dor no peito, sensação de formigamento, câibras musculares, vômito, ganho de peso, depressão, diminuição concentração, insônia, sonolência, pesadelos, falta de ar, erupção cutânea, aumento suor.
Raramente (em menos de 1 em 1000, mas em mais de 1 em 10.000 pacientes):	agravamento de diabetes, nervosismo, ansiedade, distúrbios visuais, olhos secos ou irritados, conjuntivite conjuntivite, impotência, síndrome de Peyronie (curvatura do pênis durante uma ereção), batimento cardíaco irregular, boca seca, coriza, nariz escorrendo, queda de cabelo, alterações na função hepática.
Muito raramente (em	alterações nas células sanguíneas, esquecimento,

menos de 1 em 10.000
pacientes):

confusão, alucinações, alterações de humor,
zumbido, problemas auditivos, alterações do paladar,
inflamação do fígado (hepatite), sensibilidade à luz,
aparecimento ou agravamento da psoríase, fraqueza
muscular, dor nas articulações, tecido necrosado em
pacientes com distúrbios graves na circulação
sanguínea.

A notificação de efeitos colaterais

Tem efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isso também se aplica a possíveis efeitos colaterais que não estão neste folheto. Você pode efeitos colaterais também diretamente relatar via o Holandês Centro de Efeitos Colaterais Lareb (www.lareb.nl). Ao relatar efeitos colaterais você relatar, pode nos ajudar mais informação a chá obter sobre a segurança do este medicamento.

Tem você muito incomodado com um dos efeitos colaterais? Ou tem você um efeito colateral que não em este folheto está? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

5. Como conserva você este medicamento

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Não armazenar acima 25°C.

Guarde os seus comprimidos na embalagem original.

Não utilize este medicamento não mais após de última data de validade. Essa é para encontrar na caixa após EXP. Lá está um mês e um ano. O último dia desse mês é a data de validade.

Descarte medicamentos não pelo esgoto ou no vaso sanitário e jogue os não no lixo. Pergunte ao seu farmacêutico o que você deve fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usa. Eles são então de uma forma responsável destruídos e não entram no meio ambiente corretamente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações


Quais substâncias estão no este medicamento?

A substância ativa no em este medicamento é metoprolol tartarato 50 mg e 100 mg.


Os outros componentes neste medicamento são celulose microcristalina (E460), gelatina (E441), glicolato de amido de sódio glicolato de amido de sódio coloidal hidratado hidratado dióxido de silício (E551), ácido esteárico (vegetal) (E477).

Como parecem tartarato de metoprolol Accord Comprimidos e o que contém uma embalagem 50 mg

comprimidos – brancos branco até branco pálido, redondo, biconvexo comprimido com a

inscrição  de um lado um lado e uma ranhura do outro lado 100 mg

comprimidos – branco até até branco pálido, redondo, biconvexo comprimido com a inscrição

 no um lado e uma ranhura no outro lado

Metoprolol tartarato Accord Comprimidos estão embalados em blisters. O caixa contém 30, 60 ou 90 comprimidos. Nem todos os tamanhos de embalagem mencionados são comercializados . Titular.

autorização de comercialização para no comércio colocar
Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

Fabricante

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polônia

No registro inscrito sob:

Metoprolol tartarato Accord 50 mg Comprimidos, RVG 57170.

Metoprolol tartarato Accord 100 mg Comprimidos, RVG 57171.

Este folheto é pela última vez aprovado em novembro 2021.