

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Tartrat de metoprolol Accord 50 mg și 100 mg Comprimate  
(Tartrat de metoprolol)

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament să luați deoarece stare important informație în pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.

Aveți dumneavoastră încă întrebări? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu dați acest medicament altor persoane , deoarece este prescris numai pentru dumneavoastră . Poate fi dăunător dăunător sunt pentru alții, chiar și au ei aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți dumneavoastră multe probleme cu un dintre efectele secundare care sunt menționate în rubrică 4 sunt? Sau aveți dumneavoastră o reacție adversă care nu în acest prospect este menționată? Contactați medicul dumneavoastră, farmacistul.

Conținutul din acest prospect

1. Ce este Metoprololtartrat Accord și pentru ce se acest medicament administrat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu luați sau trebuie u er extra precaut cu fiți?
3. Cum luați dumneavoastră acest medicament ?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținut din ambalaj și alte informații

1. Ce este Metoprololtartrat Accord și pentru ce se utilizează acest medicament?

Metoprololul este un beta-blocant selectiv. Acest înseamnă că metoprolol comprimate afectează funcția inimii influențează și tensiunea arterială scad ..

Accord Comprimate sunt prescrise pentru pacienți ::

pentru a tensiunea arterială a reduce;

cu durere în piept din cauza lipsei de oxigen lipsă de oxigen mușchiului cardiac (angina pectorală );cu

tulburări ale ritmului cardiac ;;

care un infarct miocardic au suferit; ca protecție împotriva unui posibil următor infarct miocardic;

cu palpitații;

cu un prea puternic funcționare a glandei tiroide;

pentru prevenirea atacurilor de migrenă-atacuri.

2. Când nu trebuie să acest medicament nu luați sau trebuie să fiți atent atenție cu fiți?

Când nu trebuie să acest medicament nu luați?

sunteți alergic (hipersensibil) la metoprolol, la alte altă beta-blocante sau pentru una dintre substanțele active care sunt în acest medicament .. substanțe le puteți găsi la rubrica 6. dacă 6.

ca u tulburări de conducere cardiacă sau probleme de ritm cardiac aveți (bloc AV de gradul 2 sau 3 bloc sau sindromul sinusului bolnav sindrom (cu excepția cazului în care un permanent stimulator cardiac este plasat)).

dacă dumneavoastră netratată insuficiență cardiacă aveți, un tratament primiți pentru a contractiile inimii să crească crească sau în șoc sunteți ca rezultat al problemelor cardiace.

dacă dumneavoastră suferă de sever blocate vase de sânge, inclusiv probleme cu circulația sângelui (ceea ce face ca degetele dumneavoastră și degetele de la picioare să furnice, sau palid de albastru devin).

dacă dumneavoastră un lent ritm cardiac aveți (mai puțin de 50 bătăi/minut).

dacă dumneavoastră o tensiune arterială scăzută aveți.

dacă suferiți de un crescut nivel de aciditate al sângelui ( acidozămetabolică ).dacă

suferiți de o formă severă gravă astmă sau BPOC (cronică obstructivă pulmonară boală).

dacă utilizați inhibitori de monoaminoxidază utilizați (IMAO). Vezi de asemenea 'Utilizare cu alte medicamente'.

dacă dumneavoastră insuficiență cardiacă aveți, și tensiunea dumneavoastră arterială repetat sub 100 mmHg ajunge.

dacă dumneavoastră alte antihipertensive medicamente utilizați, ca verapamil și diltiazem. Vezi de asemenea 'Utilizare cu alte medicamente'.

dacă luați medicamente împotriva aritmiilor (anti-aritmice) utilizat, precum disopiramidă. Vezi de asemenea 'Utilizare cu alte medicamente'.

dacă dumneavoastră suferiți de feocromocitom netratat (tensiune tensiune arterială ca urmare a un tumoră a medulosuprarenalei).

Când trebuie să fiți extra precaut fiți cu acest medicament?

Contactați dumneavoastră medicul sau farmacist înainte să acest medicament luați dacă aveți:

astm aveți.

diabet zaharat aveți (un nivel scăzut de zahăr în sânge poate din cauza acest medicament mascat a fi).

suferă de feocromocitom (tensiune arterială ridicată ca rezultat al unei tumori a medularei suprarenale ).un

tratament primește primește pentru alergice reacții a reduce. Metoprolol comprimate pot sensibilitatea crește la substanțele la care sunteți alergic la sunteți, și în de greutatea a alergice reacții crește.

o hiperactiv glandă tiroidă aveți (simptome cum ar fi ritm cardiac

crescut ,transpirație ,tremurături tremur, anxietate, crescut apetit sau pierdere în greutate pot de acest medicament mascat fi)psoriazis (

erupție cutanată severă) aveți sau ați avut ai gehad.

dacă dumneavoastră un anestezie primiți administrat; spuneți medicului sau dentistului că comprimate de metoprolol utilizați.

suferiți de probleme cu circulația sângelui (în degete, degetele de la picioare, brațe și picioare).

suferă de o tulburare de conducere cardiacă (bloc AV).insuficiență cardiacă

aveți în în combinație cu un de următorii factori:

- un infarct sau un atac de angină pectorală în ultimele 28 zile.
- o funcție renală redusă rinichi- of funcția hepatică.
- mai tânăr aveți sub 40 ani sau mai în vârstă de 80 ani.
- boală a valvelor cardiace.
- mușchi cardiac mărit ..
- operație pe cord operație pe cord în trecut 4 luni.
- insuficiență cardiacă instabilă (NYHA IV). Utilizare

cu alte medicamente Luați

dumneavoastră pe lângă metoprolol tartrat Accord încă alte medicamente medicamente în, de are dumneavoastră că scurt recent făcut sau există posibilitatea că dumneavoastră în viitorul apropiat alte medicamente veți lua ?? Spuneți că atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu utilizați metoprolol comprimate dacă deja utilizați unul dintre următoarele medicamente ::

Inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) împotriva unei depresii (acestea pot efectul de scădere a tensiunii arteriale efect amplifica).

alte medicamente de scădere a tensiunii arteriale ,cum ar fi verapamil și diltiazem ( diltiazem (acestea pot un lent ritm cardiac sau un mai puternic scădere a tensiunii arteriale cauza).

medicamente împotriva aritmiilor (anti-aritmice) precum disopiramide (acest poate de șansa de un neregulat sau lent ritm cardiac crește și de funcția cardiacă reduce).

floctafenină (poate de reacțiile de inimă și vase de sânge din cauza tensiunii arteriale scăzute sau șoc reduce).

sultoprid (risc crescut de un ritm cardiac neregulat ).Următoarele

medicamente medicamente pot efectul asupra scăderii tensiunii arteriale amplifica:

cimetidină (împotriva ulcerelor gastrice).

hidralazină și clonidină (antihipertensive medicamente).

terbinafină (împotriva infecțiilor fungice).

paroxetină, fluoxetină en sertralină (împotriva depresiilor).

hidroxiclorochină (împotriva malariei).

clorpromazină, trifluopromazină, clorprotixen (medicamente împotriva psihozelor).

amiodaronă, chinidină și propafenon (împotriva unui ritm cardiac neregulat).

difenhidramină (un antihistaminic).

celecoxib (împotriva durerii).

Următoarele medicamente pot afecta efectul de scădere a tensiunii arteriale reduce:

indometacină (împotriva durerii).

rifampicină (un antibiotic).

Alte medicamente care pot afecta metoprololul sau care pot fi afectate de metoprolol devin:

alte beta-blocante, de ex.. picături oftalmice.

epinefrină), noradrenalină (norepinefrină) sau alte simpatomimetice simpatomimetice.

pentru pentru de tratament de diabet; simptomele manifestările de un scăzut nivel de zahăr din sânge pot fi mascate ..

..  
glicozide cardiace glicozide cardiace.

de metoprolol de metoprolol comprimate cu alimente și băutură  
Alcoolul poate efectul de scădere a tensiunii arteriale al metoprololului comprimate amplifica.

#### Sarcina și alăptarea

Sunteți însărcinată, credeți u însărcinată să fiți, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați dați dumneavoastră alăptare? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utilizați acest medicament utilizați.

#### Sarcină

Dumneavoastră medicul poate Metoprololtartrat Accord prescrie în timpul sarcinii dacă beneficiile utilizării pentru dumneavoastră depășesc riscurile pentru dumneavoastră . de riscurile pentru het nenăscut copil. Dacă ați Metoprololtartrat Accord utilizat până la naștere de naștere va dumneavoastră nou-născut copil posibil de primul două zile după naștere naștere suplimentar sunt controlate.

#### Alăptare

Metoprolol tartrat Accord este excretat prin laptele matern. În cazul dozelor normale este cantitate metoprolol în laptele matern mic. Copilul dumneavoastră va fi va suplimentar fi monitorizat.

#### Fertilitate

Datele disponibile indică există nu nu pe particularități.

#### Aptitudinea de a conduce vehicule și utilizarea mașinilor de mașini

Metoprolol comprimate pot provoca oboseală și amețeli . Asigurați-văcă pentru aceasta dumneavoastră u aici nu disconfort de aveți înainte de dumneavoastră mergeți să conduceți sau să folosiți utilaje mergeți să utilizați, mai ales dacă dumneavoastră ați trecut la un alt medicament sau dacă ați consumat alcool aveți utilizat.

### 3. Cum luați dumneavoastră acest medicament ?

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum vă medicul sau farmacistul farmacist u că a spus .. cu privire la corecta utilizare ? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul . Comprimatele (întregi sau.

Întregul sau tableta comprimate pe un stomac gol luați cu un jumătate pahar de apă. Alegeți un moment.

Doza uzuală este: pentru

hipertensiune : 100 sau 200 mg (1-2 tensiune arterială: 100 sau 200 mg (1-2 comprimate), de preferință o dată pe zi .. 400 mg (4 comprimate de 100 mg) pe zi ..

durere în piept (angină pectorală): în funcție de caz către gelangă de simptome 100-200 mg (1-2 comprimate de 100 mg) pe zi în doze divizate. Maxim 400 mg (4 comprimate de 100 mg) pe zi.

pentru tulburări ale ritmului cardiac: 100-200 mg distribuit pe parcursul zilei (de ex.. de două ori pe zi 1 comprimat de 50 mg). Dacă este necesar poate medicul dumneavoastră să doza încă mai mult crească.

ca protecție împotriva un următor infarct miocardic: de două ori pe zi 1 comprimat de 100 mg.

pentru palpitații: 100 mg pe zi de preferință o dată pe zi .. poate dumneavoastră medic de dozare mai departe crește până la 200 mg (2 comprimate de 100 mg) pe zi.

în un prea puternic efect al glandei tiroide: 150-200 mg împărțit în 3-4 doze pe zi (3-4 ori pe zi 1 comprimat de 50 mg). Dacă este necesar poate dumneavoastră medicul doza încă mai mult crește.

pentru prevenirea migrenelor-crizelor: 100-200 mg împărțit în 1-2 doze pe zi (1-2 ori pe zi 1 comprimat de 100 mg).

Utilizarea acestui medicament va fi de obicei de lungă durată . Niciodată să nu modificați doza sau fără consultarea medicului brusc opri utilizarea utilizare.

În caz de funcție renală redusă funcția renală: nu este necesară . În caz de.

: spuneți medicului: despre aceasta medic dacă dumneavoastră o boală de ficat aveți. Este posibil să fie necesar dozajul ajustat să fie.

Vârstnici: ajustarea dozei nu este necesară ..

Copii: de experiența a acestui medicament la copii este limitată.

Comprimatul poate fi divizat în doze egale .

Aveți dumneavoastră prea mult de acest medicament luat?

Dacă ați accident mai decât doza prescrisă doză ați luat, contactați cel mai apropiat primul ajutor sau ușor imediat dumneavoastră medic sau farmacist în.

Simptome de o supradoză sunt tensiune arterială scăzută ( obosealăși amețea ), puls lent lentă puls neregulat ritm cardiac, stop cardiac, dificultăți de respirație, profundă inconștientă, greață, vărsături și albastru devine al pielii.

Sunteți uitat acest medicament în a lua?

Dacă ați dumneavoastră comprimat(e) uitat să luați și ați realizat acest lucru în 4 4 oră în urmă, atunci trebuie să luați uitat comprimat(e) cât de repede posibil luați și apoi următorul comprimat(e) luați conform planului dumneavoastră 'obișnuit'.

Dacă mai mult de 4 ore în urmă este de când ați luat comprimatul(e) trebuiat să luați, atunci săriți acea doză pur și simplu peste și așteptați până la momentul în care dumneavoastră conform programului 'obișnuit' să luați următoarea tabletă(e) ar trebui să luați.

Nu luați niciodată dublă doză pentru un uitat doză în a recupera.

Dacă opriți administrarea medicamentului luarea acestui medicament

Dacă brusc opriți administrarea luarea atunci poate dumneavoastră starea brusc se agrava; pot apărea aritmii cardiace sau o creștere a tensiunii arteriale apărea. Riscul de un infarct sau de moarte subită crește deces este mărit.

Întreruperea tratamentului cu metoprolol trebuie prin urmare ca regulă să fie treptată și întotdeauna în consultare cu medicul dumneavoastră . Pe parcursul a cel puțin două 2 doza este redusă treptat la jumătate . Ceamai mică doză trebuie să fie cel puțin 4 zile luat a fi înainte de de tratament complet a opri.

Când dumneavoastră în timpul reducerii simptome aveți ,trebuie ingredient u dumneavoastră medic consultați a consulta.

#### 4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea, deși primește nu toată lumea cu asta a face ..

tratamentul și contactați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți simptome de un o un alergic reacție experimentează, cum ar fi erupție cutanată pruriginoasă , roșeața deveni a feței ,umflarea a feței , abuzelor buze probleme cu cu respirație sau înghițire. Acesta este un foarte grav, dar rar efect secundar. Poate fi că aveți urgent nevoie de asistență medicală necesar ai de internat trebuie să fie în spital.

Spuneți al medicului dumneavoastră dacă aveți una dintre următoarele efecte secundare simțiți sau dacă er la dumneavoastră o reacție adversă apare care nu în acest prospect este menționat:

Foarte frecvent (la mai mult de 1 din 10 pacienți):	se slăbit simt la statul în picioare ca urmare a unei tensiuni arterialescăzute oboseală.
.Frecvent ( mai puțin de 1 din 10, dar la mai de 1 din 100 pacienți):	puls lent, probleme cu menținerea echilibrului ( foarterar cu leșin ),rece rece mâini și picioare, palpitații, amețală, dureri de cap, greață, diaree, constipație (constipație), dureri abdominale, scurtare a respirației la efort fizic.
Uneori (la mai puțin de 1 din 100, dar la mai mult de 1 din 1000 pacienți):	agravare temporară a simptomelor insuficienței cardiace, tulburări de conducere cardiacă, retenție de lichide, durere în piept, senzație de furnicături ,crampe musculare crampe muscularevărsături ,creștere în greutate creștere în greutatedepresie depresie, scăderea concentrației, insomnie, somnolență, coșmaruri, dispnee, erupție

Rareori (la mai puțin de 1 din 1000, dar la mai mult de 1 din 10.000 pacienți):	cutanată, transpirație excesivă. agravare a diabetului, nervozitate, anxietate, tulburări de vedere, uscăciune sau iritare a ochilor, conjunctivită, impotență, sindrom de Peyronie (curbura penisului în cazul unei erecții), ritm cardiac neregulat, gură uscată, rinoree, nas înfundat, căderea părului, modificări în testele funcției hepatice.
Foarte rar (la mai puțin de 1 din 10.000 pacienți):	modificări în celulele sanguine, uitare, confuzie, halucinații, schimbări de dispoziție, țiuire în urechi, probleme de auz, modificări ale gustului, inflamație a ficatului (hepatită), sensibilitate la lumină, apariția sau agravare a psoriazisului, slăbiciune musculară, dureri articulare, țesut necrozat la pacienți cu tulburări severe în circulația sângelui circulație sanguină.

reacțiilor adverse ale efectelor secundare efecte secundare  
Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru posibile efecte secundare care nu sunt în acest prospect menționate. Dumneavoastră puteți efecte secundare de asemenea direct raporta prin Olanda Efecte Secundare Centrul Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Raportând efecte secundare să raportați, puteți să ne ajutați mai multe informații să obține despre siguranța a acest medicament.

Aveți dumneavoastră mult disconfort de la un dintre efectele secundare? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect scrie? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

## 5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament

A nu se lăsa la vedere și la îndemâna copiilor copii păstrați.

Nu păstrați peste 25°C.

Păstrați medicamentele tabletele în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare de ultimă data de expirare. Aceasta este de găsit pe cutie după EXP. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a acelei de la lună este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau în toaletă și nu le aruncați în coșul de gunoi. Întrebați pe. dumneavoastră. farmacist ce să faceți cu medicamente trebuie să faceți pe care nu le mai utilizați. Elesunt apoi într-un mod responsabil distruse și nu ajung în mediu înconjurător în mediu justificat.


## 6. Conținutul al ambalajului și alte informații


Ce substanțe sunt în acest medicament?

Substanța activă din în acest medicament este tartrat de metoprolol 50 mg și 100 mg.

Cele alte substanțe din acest medicament sunt celuloză microcristalină (E460), gelatină (E441), glicolat de amidon de sodiu glicolat de amidon de sodiu coloidal hidratat hidratat dioxid de siliciu (E551), acid stearic (vegetal) (E477).

Cum arată tartrat de metoprolol Accord Comprimatele și ce conține un ambalaj 50 mg

comprimate – alb alb până la alb-gălbui, rotund, biconvex comprimat cu inscripție  pe o parte și o linie de rupere pe cealaltă parte

100 mg comprimate – alb până la alb-cenușiu, rotundă, biconvexă tabletă cu inscripția pe  o parte și o linie de rupere pe cealaltă parte Metoprolol tartrat

Accord Comprimate sunt ambalate în în blistere. Het cutie conține 30, 60 sau 90 comprimate. Nu toate menționate dimensiuni de ambalaj sunt pe piață aduse.

Deținător al autorizației de în comercializare a aduce  
Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

Producător

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomińska 50,95-200 Pabianice, Polonia

În registru înregistrat sub:

Tartrat de metoprolol Accord 50 mg Comprimate, RVG 57170.

Tartrat de metoprolol Accord 100 mg Comprimate, RVG 57171.

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în noiembrie 2021.