

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja

Metronidasool Aurobindo 250 mg, kaetud tabletid
Metronidasool Aurobindo 500 mg, kaetud tabletid
metronidasool

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne te seda ravimit hakkate kasutama, sest seal on oluline teave sees teile jaoks.

Hoidke seda infolehte. Võib-olla vajate seda hiljem uuesti vajalik.

Kas teil veel küsimusi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Ärge seda ravimit andke edasi teistele, sest see on ainult teile kuni te määratud. See võib kahjulik olla teistele, ka kui on neil samad kaebused nagu teil. Kas teil tekivad teil on probleeme üks kohta kõrvaltoimetest mis on jaotises 4 loetletud? Või saate te üks kõrvaltoime mis ei ole selles infolehes loetletud? Võtke siis ühendust oma arst apteeker.

Sisu selle selle infoleht

1. Mis on Metronidasool Aurobindo ja milleks kasutatakse seda ravimit? Millal
2. ei tohi te seda see ravim mitte kasutama või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?
3. Kuidas kasutate te seda ravimit?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate u see ravim?
6. Sisu pakendi ja muud teave 1.

1. Metronidasool Aurobindo ja milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse kasutab?

Metronidasool Aurobindo kuulub rühma ravimite hulka, mis hävitavad baktereid ja üherakulisi organisme (algloomad) tõrjub.

Metronidasool Aurobindo kasutatakse juures täiskasvanutel ja lastel kasutatakse juures de ravi alates:

infektsioonid alates kusiti või limaskest vagina, nn „valgevoolus“ juures naistel (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).

soolestik- ja maksainfektsioonid põhjustatud poolt ühe kindla üherakulise organismi, amööb (amööbiaas).

sooleinfektsioonid põhjustatud poolt üks määratud üherakuline loomake, giardia (giardiaas).

tõsised infektsioonid mis on põhjustatud mikro- organismidepoolt mis on tundlikud selle ravimi vastu ..

üks teatud vorm of raske igemepõletik (Plaut-Vincenti stenokardia).

Ja et teatud infektsioone ära hoida mis võivad tekkida juures ja pärast operatsiooni ..

2. Millal tohib teil seda ravimit mitte kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Millal tohib teil seda ravimit mitte kasutada?

Ütle see kohe oma arstile ja lõpeta võtmine metronidasool kui metronidasool Sa:

U millegi vastu üks nendest alates ained sisse selles ravimis. Need ained saate te leida sisse jaotisest 6 sellest infoleht ..

Teie juures ebatavaline vereanalüüs vereanalüüs on kindlaks tehtud. See hinnatakse teie arsti poolt. Teil on vaevused

seoses haigusega teie ajus , seljaajus või närvides aju, see seljaaju või de närvid (neuroloogiline haigus)

Teil on tekib alates kõhuvalu, isu puudus isu (anoreksia), iiveldus, oksendamine, palavik, halb enesetunne, väsimus, kollatõbi, tume uriin, kitt (hele hall)- või mastiksivärvi väljaheide või sügelus.

Millal peate te lisaks ettevaatlik olema koos selle ravimiga?

Kui esineb ennast ravi ajal krampid või muud närvihäired närvahaigused nt.. kohta alates käed ja/või jalad) esineda, peab teie ravi koheselt olema muudetud ..

pikaajaline kasutamine kasutamine metronidasool metronidasool de vereloome võimalik võib kahjustada (vt punkti 4, "Võimalikud kõrvaltoimed"), võib teie vereanalüüs ravi ajal kontrollitakse olla jälgitud.

Kui te alkoholi sisaldavat jooki kasutate. Te ei tohi mitte alkoholi sisaldavaid jooke tarvitada ajal ja kuni 48 tundi pärast ravi Metronidazoliga koos Metronidazoliga Aurobindo.

Kui te seda ravimit kauem kui 10 päeva kasutate. Võivad tekkida muutused teie pärilikus materjalis (DNA) esineda ..

Kui teie maks ei hästi tööta. Toimeaine toimeaine aine, metronidasool, võib koguneda siis koguneda kehas teie kehas (vt „Kui teie maks ei tööta hästi” jaos rubriik 3).

Kui te allergiline olete teiste sarnaste, sarnaste ravimite (ketokonasool, mikonasool, sulkonasool). U võib siis ka allergiline olla metronidasool Aurobindo. Minge

oma arsti juurde kui te pärast seda de ravi "valge voolus" veel kaebusi on. See võib olla et teil on kaebusi seoses teise infektsiooniga (gonorröagonorröa).

Juhtumid van raske maksatoksilisus2Fäge maksapuudulikkus, sealhulgas juhtumid koos surmaga lõppenud patsientidel Cockayne'i sündroomiga patsientidel Cockayne'i sündroomiga, on teatatud koos ravimid mis metronidasool sisaldavad.

Kui teil on tegemist Cockayne'i sündroomiga Cockayne'i sündroom peab teie arst ka sageli teie maksafunktsioon kontrollida niikaua kui teid metronidasool ravitakse ja ka pärast ..

väga raske nahareaktsioonid on teatatud , teatatud, nagu Stevens-Johnsoni sündroom (SJS) koos kõrge palavikuga, villid nahal ,liigesvalud ja võisilmapõletik , võiraske ,äkiline allergiline allergiline reaktsioon, koos nagu sümptomid palavik ja villid nahal nahk ja naha koorumine nahal nahk (TEN (toksiline epidermaalne nekrolüüs)), või äkiline puhang vahel kümneid kuni sadu 1 kuni 2 mm suured villid täidetud mädaga (AGEP (äge üldistunud eksanteemne pustuloos)). Kui sümptomid või märgid SJS, TEN või AGEP tuleb u koheselt lõpetama ravi kohe raviga.

Kui teil tekib vertiigo (pearinglus tunne) kogete kasutamise ajal metronidasool . Kui teil on üks vereanalüüs peab läbima, rääkige siis arstile või öele kes analüüsi teostab et te metronidasooli kasutate. Metronidasool võib mõjutada omama peal tulemused kohta mõned vereanalüüsid.

Võtke ühendust arstiga kui üks kohta ülaltoodud hoiatused kehtib teie kohta rakendatav on või et minevikus minevikus on olnud.

Kasutatud te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Metronidazol Aurobindo veel teisi ravimeid, on te seda lühike hiljuti tehtud või läheb te see võib-olla varsti teha? Rääkige sellest siis oma arstile või apteekrile.

Võtke ühendust oma arst kui te ravimeid kasutate mis üks häire südamerütmis võivad põhjustada põhjustama nnQT- pikenemine mis nähtav on elektrokardiogrammil on üks EKG), nagu teatud antiarütmikumid (ravimid südame rütmihäirete), teatud antibiootikumid ja ravimid mis peamiselt kasutatakse psühhoosi raviks raviks psühhoos te ravida (sealhulgas luulud, hallutsinatsioonid, paranoia või korrapäratud mõtted).

Samaaegne kasutamine järgmiste ravimitega ei ole soovitatav : Disulfiraam,:

Disulfiraam, üks ravim vastu alkoholisõltuvus. Te võite kannatada saada alates psühhootiliste reaktsioonide. Psühhoos on tõsine vaimuhaigus kus kontroll kaob de kontroll oma käitumine ja tegutsemine häiritud on.

Fenobarbitaal, kasutatakse epilepsia korral. Fenobarbitaal võib vähendada efektiivsust ravimil Metronidazol Aurobindo vähendada.

Fenütoiin, üks ravim südamehaiguste või epilepsia .. võib vähendada Metronidasool Aurobindo toimet Metronidasool Tsimetidiin, vähendada.

Tsimetidiin, üks ravim vastu kõhuvaevused. De kõrvaltoimed van Metronidazol Aurobindo võivad sageda.

Teatud ravimid vastu verehüübimist (antikoagulandid van het kumariin tüüp, nagu atsenokumarool). Metronidasool Aurobindo võib de toimet alates nende ravimite tugevdada.

Ravimid mis sisaldavad liitiumi sisaldavad. Metronidasool Aurobindo võib see tase liitiumi sisaldus veres tõsta, mille tõttu neerud neerud mürgitatud võivad saada.

Tsüklosporiin, üks ravim mis kasutatakse kasutatakse pärast elundisiirdamisi ja teatud nahahaiguste korral. Metronidasool Aurobindo võib suurendada selle aine taset veres sisse veres tõsta.

Ravimid koos koos koostisosa 5-fluorouratsiil (ravi vastu vähk). Metronidasool Aurobindo võib see tase 5-fluorouratsiili veres suurendada, mille tõttu 5-fluorouratsiil lisaks kahjulik võib olla.

Busulfaan, mida kasutatakse vähi raviks . On suurem tõenäosus et teil tekivad tõsised kõrvaltoimed saate alates kõrvaltoimed tõsised busulfaaniga.

Millele peate te tähelepanu pöörama söömise, joomise ja alkoholiga?

Te ei tohi ravi ajal ja pärast ravi kuni 48 tundi pärast ravi de pöörata tähelepanu Metronidasool Aurobindo ei alkoholi sisaldavaid jooke kasutada. See võib põhjustada teatud psüühilisi häireid , mison mainitud jaotises 4 „Võimalikud kõrvaltoimed kõrvaltoimed“.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate te olevat rase , soovite rase olla või toidate te rinnaga imetate imetamine?

Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui te seda ravimit kasutate.

Rasedus

Kui teie arst peab seda vajalikuks , võite te Metronidasooli Metronidasool Aurobindo kasutada raseduse ajal de rasedus.

Imetamine

Metronidasool Aurobindo satub rinnapiima moedermelk . Te võite Metronidasool Aurobindo ühekordselt kasutada kui te te imetamine annab. Kui te kauem aega Metronidasool Aurobindo peate kasutama ,peate te kõigepealt oma arstiga konsulteerima kas te peate või teie peab lõpetama rinnaga andmine alates toitmine.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine masinatest

Metronidasool võib kõrvaltoimeid põhjustada nagu ajutine hägune või kahelinägemine, peapööritus, pearinglus tunne (vertiigo), segasus, hallutsinatsioonid (asju näha või kuulda mida ei ole , ei ole, krambid (krambid).

Kui see juhtub, ei tohi te mitte sõidukit juhtida, masinaid kasutada ega tööriistu kasutada.

Metronidasool Aurobindo tabletid sisaldavad laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud et te teatud suhkruid ei talu , võtke ühendust omaarstiga enne kui seda ravimit võtate . võtab.

Metronidasool Aurobindo sisaldab naatrium

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab et see on põhimõtteliselt " naatriumivaba" .3. Kuidas

kasutada te te see ravim?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud. Kas kahtlete te õige õige kasutamine? Võtke ühendust teie arstiga või apteekriga.

Annus on iga patsiendi jaoks erinev ja määratakse teie arsti poolt kindlaks kindlaks tehtud. Kui teie arst midagi muud määrab on tavaline annus:

Giardiaasi korral

10 aastat ja vanemad: 3x 400 mg päevas päev jooksul 5 päeva, of
2x 500 mg per päev kestel 7-10 päeva, of
2000 mg üks kord per päev kestel 3 päeva.

Lapsed nooremad kui 10 aastat: 1-3 aastat: 500 mg üks kord päevas päevas kestel 3 päeva
3-7 aastat: 600 kuni 800 mg üks kord päevas päevas jooksul 3 päeva
7-10 aastat: 1000 mg üks kord päevas päevas jooksul 3 päeva

Alternatiiv, väljendatud mg/kg kehakaalu: 15-40 mg/kg kehakaalu iga päev 23 annust.

Amebiaasi korral

10 aastat ja vanemad: 400 kuni 800 mg 3 korda iga päev 5-10 päeva päevad

Lapsed nooremad kui 10 aastat: 1-3 aastat: 100 kuni 200 mg 3 korda päevas päevas 5-10 päeva päeva
3-7 aastat: 100 kuni 200 mg 4 korda päevas päeva jooksul 5-10 päeva

7-10 aastat: 200 kuni 400 mg 3 korda päevas jooksul 5-10 päeva Alternatiiv

võib võib de annus väljendatud olema per kehakaalu
35-50 mg/kg kehakaalu per päev 3 korda 5-10 päeva ;maksimaalselt 2400 mg per päev ..

Juures raske infektsioonid

Täiskasvanud ja lapsed vanemad kui 12 aastat:

3 x 750 mg päevas päev või

3-4 x 500 mg päevas päev kestel 7 päeva või kauem, vajadusel vajalik

Lapsed vanemad kui 8 nädalat kuni 12 aastat: Tavaline annus on 20-30 mg/kg kehakaalu kohta päevas ,antud antud kui üks üksik annus või kui 7,5 mg/kg kehakaalu kohta iga 8 tund. Annust annus võib olla suurendatud kuni 40 mg/kg kehakaalu kohta, päevas päevas sõltuvalt infektsiooni tõsidusest infektsiooni nakkuse. Ravi kestus ravi ravi on tavaliselt 7 päeva.

Imikud nooremad kui 8 nädalat vanad: Ravi tavaline annus on 15 mg/kg kehakaalu päevas päev, antud kui üks ainus annus või kui 7,5 mg/kg kehakaalu iga 12 tundi.

Kell vastsündinutel kes on sündinud kell rasedusajaga alla 40 nädalat võib metronidasool esimese elunädala jooksul koguneda . Seetõttu. Seetõttu peab pärast mõne päeva ravi de kogus metronidasool veres kontrollitakse . kontrollitud.

ennetamiseks ennetamine mis pärast infektsioonid pärast ühte operatsioon saama esinevad: (sooleoperatsioon (kolonkirurgia)):

Enamasti antakse metronidasool 24 tundi enne operatsiooni manustada kuni minimaalselt kuni vähemalt 4 tundi pärast haava sulgemist , või kauem, sõltuvalt riskist nakkuse suhtes .

Täiskasvanud ja.

vanemad ja lapsed vanem kui 12 aastat: 1000 mg Metronidasool Aurobindo kui ühekordne annus, järgneb 500 mg, 3 korda päevas kestel 24 tundi kuni enne operatsiooni operatsioon mitte enam tohib süüa süüa.

Lapsed nooremad kui 12 aastat: 20-30 mg/kg kehakaalu, antud kui üks ainus annus, 1-2 tund enne operatsiooni protseduur.

Vastsündinud sündinud juures rasedus kestus lühem kui 40 nädalat:

10 mg/kg kehakaalu, antud kui üks mõned annus, enne protseduuri ..

Nii

patsient kui ka partner peab saama ravitud . Täiskasvanud.

lapsed ja lapsed van 10 aastat ja vanemad:

3 x 200 mg päevas päeva jooksul 7 päeva, või

2 x 400 mg päevas päeva jooksul 5-7 päeva või
2000 mg ühekordse annusena annus.

Lapsed nooremad kui 10 aastat: 15-30 mg/kg kehakaalu kohta päevas 2-3 korras jooksul jooksul
7 päeva, või 40 mg/kg kehakaalu kui mõned annus.
Maksimaalselt 2000 mg annuse kohta annus.

Kell infektsioonid Gardnerella vaginalis'ega
Nii te kui teie naissoost partner peab olema ravitud.

Täiskasvanud: 1000 mg päevas ,2 annust, kestel 7 päeva
Noorukid kuni 18 aastat vanad: 2x 400 mg päevas , kestel 5-7 päeva, või 2000 mg kui mõned
annus.

Täiskasvanud

Günekoloogilised protseduurid:

1000 mg Metronidasool Aurobindo kui ühekordne manustamine, järgneb 500 mg 3 korda päevas
kuni enne de operatsioon mitte enam ei tohi süüa . Pärastoperatsiooni nii vajadusel veel 24 24 3 x
500 mg. Lapsed

Enne

Enne operatsiooni de operatsiooni manustatakse Metronidasool Aurobindo koos koos
kombinatsioonis teise teise teise ravimiga mis baktereid hävitab (neomütsiin).

Metronidasool Aurobindo tabletid või suspensioon (3 korda päevas jooksul 2 päeva)	Neomütsiin tabletid (4 korda päevas jooksul 3 päeva)
5 - 12 aastat: 100 mg	500 mg
1 - 5 aasta: 5 mg/kg kehakaalu	250 mg
Noorem kui 1 aasta: 5 mg/kg kehakaalu	125 mg

Pärast operatsiooni jätkatakse ravi edasi ,, enamasti koos ühe teise manustamisvormiga.

Helicobacter pylori puhang lastel ::

kombinatsioonravi koos ühe kombinatsiooniga , 20 mg/kg päevas ravikoos ühe koos üks
maksimaalselt 500 mg 2 annust jooksul 7-14 päeva.

Annustamine juures Plaut-Vincenti stenokardia:

Annustamine nagu juures raske infektsioonid.

Teie arst ütleb teile rääkida kui kaua te Metronidasool Aurobindo peate kasutama.

Kui teie maks ei tööta hästi

Kui teie maks ei tööta hästi siis teie arst de annus vähendama.

Kui te märgate et see ravim liiga tugev või just liiga vähe toimib, konsulteerige siis oma arst.

Kas te liiga palju sellest ravimist võtnud? Kui te liiga palju Metronidazol Aurobindo olete kasutanud, võtke siiskohe ühendust võtke ühendust teie arst või apteeker.

Kasutamine liiga palju metronidasooli võib põhjustada muu hulgas iiveldust, oksendamist, jakoordineerimisprobleeme, ja koordinatsiooniprobleemid, nagu joobnud kõnnak. Pärast kasutamist alates liiga palju metronidasooli, ravitakse eriti sümptomeid. Spetsiifilist vastumürkiei ole üleannustamise korral. Jaoks üleannustamine.

Kas te unustasite seda ravimit sisse võtta? Kui te ühe korra ühe annuse Metronidazol Aurobindo unustate, saate te te see ikkagi võtma, välja arvatud kui see peaaegu aeg on järgmise annuse jaoks annus. Järgi siis lihtsalt vana vana skeem.

Kas teil veel muid küsimusi selle kasutamise kohta selle ravimi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid omada. Mitte kõigil ei esinenud sellega kokku.

Harva (esinevad ette juures vähem kui 1 inimesel 1000-st kasutajatel):

Tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia).

Väga harva (esinevad juures vähem kui 1 inimesel 10 000-st): Väga

tõsine verehäire raske verehäire poolt üks puudus valgete vereliblede puudumine koos äkiline kõrge palavik, tugev kurguvalu ja haavandid suus (agranulotsütoos).

Üks verehäire põhjustatud ühest puudusest valgete vereliblede puudusest, mille tõttu olete tundlikum infektsioonide suhtes (neutropeenia). Puudus

valgete vereliblede trombotsüüdid, mille tõttu te tundlikum oled verevalumite suhtes.

Verehäire mis avaldub ennast kui suurenenud tundlikkus suurenenud infektsioonide suhtes infektsioonid (mööduv leukopeenia). See hälv kaob jälle kui te lõpetate Metronidazoli kasutamist. Aurobindo. Aju

haigus haigus alates aju koos näiteks segasus ja krambid

(entsefalopaatia), seisund aju koos näiteks koordinatsiooniprobleemid näiteks kõnehäired, raskused koos raskused koos kõndimine, krambid silmamuna ja värisemine

(väikeajusündroom). Need kõrvaltoimed võivad taanduda pärast ravi lõpetamist vaktsineeritud alates ravi.

Üks raske põletik jämesoole paksu soole koos nagu sümptomid palavik ja raske, püsiv või verine kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit).

Suurenenud kogus maksaensüüme veres veri. Kahjustus maksas, mis kaasneb võib kaasa tuua koos kollatõbi (kollane värvimuutus nahal nahk või silmad).

Häired sisse kontroll üle tegutsemise ja käitumine (psühhoatilised häired).

Pole teada (võib olemasolevate andmete alusel mitte saama määratud):

Peavalu, unisus, peapööritus, koordinatsioonihäired.

Teatud vorm alates meningiit, mis enamasti on põhjustatud poolt üks viirus (aseptiline meningiit).

Närvihaigus (neuropaatia) või krampid mis sarnanevad epilepsiaga .. nägemises , nagu, nagu kahelinägemine, lühinägelikkus, hägune nägemine, mitte hästi teravalt näha võimalik näha või muutused nägemises värvide nägemisel.

Haigus of põletik van de nägemisnärv.

Kahjustus of kaotus van het kuulmine, kõrvalkohin.

Seedetrakti kaebused nagu valu in de ülakõht, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Põletik suu limaskestal, kaetud keel, keele värvimuutus keele pealt (võimalik kui tulemus alates candida- infektsiooninfektsioon).

Maitsetundlikkuse häired, nagu üks ebameeldiv metallimaitse.

Põletik kõhunäärme koos nagu sümptomid tugev valu ülakõhus kiirgav üles kiirgav kuni selg ja iiveldus ja oksendamine.

Isu puudumine (anoreksia). Tume värvumine

teie uriinil. Lihavalu, liigesvalu

. Äkiline.

kehas vedelikupeetus sisse nahk ja limaskestad alates näiteks kurgu või keele, hingamisraskused või sügelus ja nahalööve, sageli kui allergiline reaktsioon (angioneurootiline ödeem).

Lenduv nahalööve mõne nakkushaiguse korral, sügelus, punetus, nahalööve koos tugeva sügelusega ja moodustumine alates muhkudest (nõgestõbi).

Terav piiritletud piirkond naha peal punetusega ja mõnikord villidega , mistekib ülitundlikkuse tõttu ravimi vastu ülitundlikkus ravimi suhtes ravim (fikseeritud ravimlööve).

Tõsine, äkiline allergiline reaktsioon koos kõrge palavikuga, villid nahal ja naha koorumine alates (toksilineepidermaalne nekrolüüs).

Tõsine allergiline reaktsioon kõrge palavikuga ,villid nahal , liigesvaluja või silmapõletik(Stevens-Johnsoni- sündroom).Tõsine).

Tõsine nahalööve koos äkiline puhang alates kümnete kuni sadade 1 kuni 2 mm suurused villid täidetud mädaga (äge üldistunud eksanteemne pustuloos).

Maksapuudulikkus, kusjuures maksasiirdamine vajalik oli. See on teatatud juures patsientidel kes ravitud olid koos metronidasool koos teise antibiootikumiga antibiootikum.

Äge maksapuudulikkus juures patsientidel koos sündroomiga Cockayne (vt punkt 2 "Millal peate olema eriti ettevaatlik koos selle ravimiga ?").Täheldused

kohta alates asjad mis on pole olemas (hallutsinatsioonid), segasus, masendunud meeleolu. Palavik.

Peapööritus (vertiigo). Südamerütmihäired

Südame rütmihäired nnQT- QT-pikendamine mis võib olla nähtav EKG-l), eriti kui metronidasool kasutati koos muude ravimitega mis südamerütmi võivad häirida südamerütm saama häirima.

De sagedus, iseloom ja tõsidus van kõrvaltoimed on lastel sama kui täiskasvanutel . Het.

van teatama alates kõrvaltoimed

Kas teil esineb kõrvaltoimeid, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga. See kehtib ka selliste kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles infolehes loetletud. Te võib kõrvaltoimed ka teatada kaudu

Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb, www.lareb.nl. Teatades kõrvaltoimetest te teatama, aitate te meid et rohkem teave saada saamiseks selle ohutuse kohta selle ravimi.

5. Kuidas säilitate te seda ravimit?

Hoida nähtavuse ja kättesaamatus alates lapsed hoidma.

On pole eriline säilitustemperatuur vajalik. Hoida algses pakendis ..

seda ravimit mitte enam rohkem pärast de aegumiskuupäev kõlblikkusaeg. See leiate te sildilt etikett, karbil karp või pudelil pudel. Seal on kuu kuu ja ja aasta. See viimane päev sellest kuust on aegumiskuupäev aegumiskuupäev.

ravimeid visake kraanikausist alla või tualetist alla ja visake neid mitte prügikasti prügikast. Küsi oma apteekriilt mida teha ravimitega tuleb teha mida te enam ei kasuta. Kui te ravimid õigel viisil kõrvaldada „ hävitatakse need õigel viisil ja ei sattu need keskkonda . 6. Pakendi.

6. muu teave pakend ja muud teave

Millised ained sisaldavad selles ravimis ?Toimeaine

selles ravimis on metronidasool . Üks tablett sisaldab. Üks tablett sisaldab 250 või 500 mg metronidasool.

De muud ained selles ravimis on kroskarmelloosnaatrium
kroskarmelloosnaatriumlaktoosmonohüdraat

laktoosmonohüdraatpovidoon ,magneesiumstearaat magneesiumstearaatmaisitärklis
maisitärklismikrokristalne mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos,
titaandioksiid (E171) ja makrogool 400.

Kuidas näeb Metronidasool Aurobindo välja ja mis on pakendis ?Metronidasool

Aurobindo 250 mg on on valged, ümarad kaetud tabletid koos poolitusjoonega murdjoon.

Aurobindo 500 mg on valged ,ümarad kaetud tabletid koos poolitusjoonega . murdjoon tähtedega "CLJ". murdjoon on mitte mõeldud tableti poolitamiseks jagada kahte võrdsesse annusesse.

Pakendid

PVC/Al blisterpakend: 20 või 30 tükki..

tabletipudelid koos koos üks HDPE/LDPE või HDPE kork: 100 tükki.

See on võimalik et mitte kõik nimetatud pakendisuurused turule ei toodud ole.

Luba omanik müügiluba jaoks turule toomine ja tootja Registreerija
Aurobindo Pharma B.V.,
Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn Tootja

Generis
Farmacêutica FarmatseutilineRegistrisse

kantud Metronidasool
Aurobindo 250 mg, kaetud tabletid RVG 07074. RVG 07074.
Metronidasool Aurobindo 500 mg, kaetud tabletid RVG 08652.

See infoleht on viimati heaks kiidetud novembris 2024 Metronidasool Aurobindo 250 ja