

Notice: information pour l' utilisateur

Metronidazole Aurobindo 250 mg, comprimés pelliculés comprimés
Metronidazole Aurobindo 500 mg, comprimés pelliculés comprimés
métronidazole

Lisez attentivement toute la notice avant de vous ce médicament allez utiliser, car il contient des informations importantes informations dans pour vous.

Conservez cette notice. Peut-être aurez vous besoin de nouveau nécessaire.

Avez -vous encore des questions? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes , car il est uniquement pour vous à vous prescrit. Il peut être nocif pour les autres, même si ils ont les mêmes symptômes que vous.

Avez-vous des effets secondaires un de effets secondaires qui dans rubrique 4 sont? Ou avez vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice est mentionné? Contactez alors votre arts de pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Metronidazole Aurobindo et pourquoi ce médicament est-il utilisé?
2. Quand ne devez-vous pas ce médicament ne pas utiliser ou devez vous en prudent avec être?
3. Comment utilisez vous ce médicament?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez u ce médicament?
6. Contenu de l' emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Metronidazole Aurobindo et pourquoi ce médicament est utilisé?

Metronidazol Aurobindo appartient au groupe de médicaments qui bactéries et protozoaires (protozoaires)combat ..

Aurobindo Aurobindo est chez adultes et enfants utilisé pour le traitement de :
infections de l' urètre ou de la muqueuse du vagin, la dite «leucorrhée »” chez les femmes (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).
intestin- et infections hépatiques causées par un certain protozoaire ,amibe (amibiase).
infections intestinales
causées par par un certain unicellulaire animal, giardia (giardiase).
graves infections qui sont causées par des micro-organismes qui sont sensibles à ce médicament ..
un certaines forme de grave gingivite (angine de Plaut-Vincent).
Et pour certaines infections prévenir qui peuvent survenir lors et après une opération ..

2. Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser ou devez vous faire attention avec être?

Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser?

Dites le immédiatement à votre médecin et arrêtez de prendre du métronidazole si:

Vous êtes allergique à un des de la substances dans ce médicament. Ces substances pouvez vous trouver dans rubrique 6 de cette notice.

Si vous avez un profil sanguin anormal est déterminé. Cela est évalué par votre médecin. Vous souffrez de une affection du cerveau , de la moelle épinière ou des nerfs ou le nerfs (neurologique affection)

Vous souffrez éprouvez de douleurs abdominales, manque d' appétit (anorexie), nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, jaunisse, urine foncée , selles (claires grises)- ou selles couleur mastic ou démangeaisons ..

devez -vous consulter prudent être avec ce médicament?

Si se pendant le traitement convulsions ou d'autres affections neurologiques (ex. de la de la bras et/ou jambes) se produire, doit votre traitement immédiatement être être ajusté. Étant donné que utilisation prolongée de de métronidazole de hématopoïèse possible peut nuire (voir rubrique 4, "Effets indésirables"), peut votre numération sanguine pendant le traitement être contrôlé.

Quand vous alcoolisées boisson utilisez. Vous ne devez pas alcoolisées boissons utiliser pendant et jusqu'à 48 heures après le traitement avec Metronidazole Aurobindo.

Quand vous ce médicament plus de 10 jours utilisez. Il peut y avoir des changements dans votre matériel génétique (ADN) se produire.

Si votre foie ne bien fonctionne. Le principe actif substance, métronidazole, peut s' alors accumuler dans votre corps (voir « Si votre foie ne fonctionne pascorrectement » dans la rubrique 3).

Si vous êtes allergique à d'autres médicaments, similaires médicaments (kétoconazole, miconazole, sulconazole). U pouvez alors aussi être allergique à Metronidazole Aurobindo. Consultez

votre médecin si vous après le début du traitement de la "blanche perte" encore symptômes avez. Il peut être que vous souffriez de une autre infection (gonorrhéegonorrhée).

Cas de grave hépatotoxicité2Faiquë insuffisance hépatique, y compris cas avec une issue fatale chez patients atteints du syndrome de Cockayne, sont signalé avec médicaments qui métronidazole contiennent.

Si chez vous question est du syndrome de Cockayne, doit votre médecin également fréquemment votre fonction hépatique contrôler tant que vous avec métronidazole êtes traité et aussi après.

Des cas de très graves réactions cutanées ont été signalés, comme le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) avec fièvre élevée , cloquessur la peau , douleurs articulaireset douleurs articulaires ouconjunctivite , ougrave ,soudaine allergique allergique réaction, avec comme symptômes fièvre et cloques sur la peau et desquamation de la peau (TEN (nécrolyse épidermique toxique)), ou éruption soudaine de dizaines à centaines 1 à 2 mm grands vésicules remplies de pus (AGEP (pustulose généralisée exanthématique aiguë)). En cas de symptômes ou signes de SJS, TEN ou AGEP doit u immédiatement à arrêter le traitement.

Si vous ressentez des vertiges (sensation de tête qui tourne)ressentez pendant l' utilisation de métronidazole métronidazole.

un un analyse de sang doit subir, dites alors au médecin ou infirmier qui effectue l'examen réalise que vous utilisez du métronidazole .. peut avoir une influence influence avoir sur le résultats de certains analyses de sang.

Contactez le médecin si un des ci-dessus avertissements s'applique à vous applicable est ou que dans le passé est été.

Utilisé vous encore d'autres médicaments?

Utilisé vous en plus de Metronidazole Aurobindo encore d'autres médicaments, avez vous que court il y a peu fait ou allez vous cela peut-être bientôt faire? Informez cela alors votre médecin ou pharmacien.

Contactez votre médecin si vous médicaments utilisez qui un trouble du rythme cardiaque peuvent provoquer (un appelé allongement de l'intervalle QT qui visible est sur est sur un ECG), comme certains antiarythmiques (médicaments pour les arythmies cardiaques), certains antibiotiques et médicaments qui sont principalement utilisés pour traiter la psychose à traiter (y compris délires, hallucinations, paranoïa ou pensées désordonnées).

L'utilisation concomitante avec les médicaments suivants est déconseillée:

Disulfiram, un médicament contre l'alcoolisme. Vous pouvez avoir des réactions psychotiques . Une psychose est une maladie mentale grave où le contrôle sur son propre comportement et agir perturbé est.

Phénobarbital, utilisé pour l'épilepsie. Phénobarbital peut l'efficacité de Métronidazole Aurobindo réduire.

Phénytoïne, un médicament pour les troubles cardiaques ou l'épilepsie. La phénytoïne peut réduire l'efficacité du Métronidazole Aurobindo diminuer.

Cimétidine, un médicament contre les maux d'estomac. Le effets secondaires de Metronidazole Aurobindo peuvent augmenter.

Certains médicaments contre la coagulation sanguine (anticoagulants de la coumarine type, comme acenocoumarol). Métronidazole Aurobindo peut la efficacité de ces médicaments augmenter.

Médicaments contenant du lithium contiennent. Métronidazole Aurobindo peut le taux de lithium dans le sang augmenter, ce qui les reins empoisonnés peuvent être.

Ciclosporine, un médicament qui est utilisé après transplantations d'organes et dans certaines maladies de la peau. Métronidazole Aurobindo peut le taux de cette substance dans le sang augmenter.

Médicaments avec comme composant 5-fluorouracile (traitement contre le cancer).

Métronidazole Aurobindo peut le taux de 5-fluorouracile dans le sang augmenter, ce qui entraîne un excès de 5-fluorouracile nocif peut être.

Busulfan, qui est utilisé dans le cancer. Il y a une plus grande probabilité que vous souffriez d'effets secondaires graves effets secondaires par busulfan.

Sur quoi devez vous faire attention avec la nourriture, boissons et alcool?

Vous pouvez pendant le traitement et jusqu'à 48 heures après le traitement avec Metronidazole Aurobindo aucun alcoolisées boissons utiliser. Cela peut conduire à certains troubles psychiques, qui sont mentionnés dans la rubrique 4 "Effets effets secondaires".

Grossesse et allaitement

Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, voulez-vous devenir enceinte ou allaitez-vous un enfant vous allaitez? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament ..

Si votre médecin le juge nécessaire nécessaire vous pouvez prendre ce médicament Metronidazole Aurobindo utiliser pendant le grossesse.

Allaitement

Metronidazole Aurobindo passe dans le lait maternel atteint. Vous pouvez Metronidazole Aurobindo une seule fois utiliser si vous allaitement donne. Si vous pour longue durée Metronidazole Aurobindo devez utiliser, devez vous d'abord avec votre médecin consulter si vous devez arrêter de donner de l'allaitement.

Aptitude à conduire et l'utilisation de machines

Le métronidazole peut provoquer des effets secondaires tels que une vision floue ou double, étourdissements, vertiges sensation (vertige), confusion, hallucinations (voir des choses ou entendre qui ne sont pas là, crises (convulsions).

Si cela se produit, vous ne devez pas conduire de véhicule, utiliser des machines ou des outils Métronidazole.

comprimés contiennent du lactose contenir lactose

Si votre médecin vous a informé que vous ne tolérez certains sucres, contactez alors votre médecin avant de prendre ce médicament ..

Metronidazole Aurobindo contient sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, ceci veut dire que il est en essence «sans sodium».

3. Comment utilisez-vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué .. des doutes sur le bon usage utilisation? Prenez alors contact avec votre médecin ou pharmacien.

La posologie est par patient différente et sera par votre médecin déterminée établi. À moins que votre médecin quelque chose d'autre prescrit est la posologie habituelle:

En cas de giardiase

10 ans et plus: 3x 400 mg par jour pendant 5 jours, de
2x 500 mg par jour pendant 7-10 jours, ou
2000 mg une fois par jour pendant 3 jours.

Enfants de moins de 10 ans: 1-3 ans: 500 mg une fois par jour pendant 3 jours
3-7 ans: 600 à 800 mg une fois par jour pendant 3 jours
7-10 ans: 1000 mg une fois par jour pendant 3 jours

Alternative, exprimé en mg par kg poids corporel: 15-40 mg/kg poids corporel par jour en 23 doses.

En cas d'amibiase

10 ans et plus: 400 à 800 mg 3 fois par jour pendant 5-10 jours

Enfants plus jeunes de 10 ans: 1-3 ans: 100 à 200 mg 3 fois par jour pendant 5-10 jours
3-7 ans: 100 à 200 mg 4 fois par jour pendant 5-10 jours
7-10 ans: 200 à 400 mg 3 fois par jour pendant 5-10 jours

Alternative peut de dose exprimée être par poids corporel

35-50 mg/kg poids corporel par jour en 3 prises pendant 5-10 jours; maximum 2400 mg par jour.

Chez graves infections

Adultes et enfants de plus de 12 ans:

3 x 750 mg par jour ou

3-4 x 500 mg par jour pendant 7 jours ou plus longtemps, si nécessaire

Enfants de plus de 8 semaines à 12 ans: La dose habituelle est de 20-30 mg/kg de poids corporel par jour, administrée si un seule dose ou si 7,5 mg/kg poids corporel toutes les 8 heures. La dose peut être augmentée jusqu'à 40 mg/kg poids corporel, par jour dépendant de la gravité de l' infection. La durée du traitement est habituellement 7 jours.

Bébés âgés de moins de 8 semaines : Le usuelle dose est 15 mg/kg poids corporel par jour, administrée comme une seule dose ou comme 7,5 mg/kg poids corporel toutes les 12 heures.

Chez les nouveau-nés qui sont nés à une durée de grossesse inférieure à 40 semaines le métronidazole pendant la première semaine de vie s'accumuler. C'est pourquoi doit après quelques jours traitement le quantité métronidazole dans le sang être contrôlée.

Pour prévention des infections qui après une opération pouvoir survenir: (chirurgie intestinale (chirurgie du côlon)):

Généralement sera métronidazole 24 heures avant l' opération être administré jusqu'à au moins 4 heures après la fermeture de la plaie, ou plus longtemps, selon le risque de contamination.

Adultes et enfants plus âgés plus de 12 ans: 1000 mg Métronidazole Aurobindo comme dose unique , suivi de 500 mg, 3 fois par jour pendant 24 heures jusqu'à avant l' opération ne plus doit être mangé.

Enfants de moins de 12 ans: 20-30 mg/kg poids corporel, administré en une seule dose, 1-2 heure avant l' intervention.

Nouveaux-nés nés à une durée de grossesse inférieure à 40 semaines:

10 mg/kg de poids corporel, administré en une seule quelques dose, pour l' intervention.

En cas de trichomonase

Tant le patient que le partenaire doit être traité.

Adultes et enfants de 10 ans et plus:

3 x 200 mg par jour pendant 7 jours, ou
2 x 400 mg par jour pendant 5-7 jours ou
2000 mg en dose unique dose.

Enfants plus jeunes de 10 ans: 15-30 mg/kg poids corporel par jour en 2-3 prises pendant pendant 7 jours, ou 40 mg/kg poids corporel si quelques dose. Maximum 2000 mg par dose.

En cas d' infections à Gardnerella vaginalis

Vous et votre ainsi que votre partenaire féminine devez être traités.

Adultes: 1000 mg par jour, en 2 prises, pendant 7 jours

Adolescents jusqu'à 18 ans : 2x 400 mg par jour pendant 5-7 jours, ou 2000 mg comme quelques dose.

Adultes

Interventions gynécologiques:

1000 mg Metronidazole Aurobindo comme dose unique , suivi de 500 mg 3 fois par jour jusqu'à avant de opération pas plus peut être mangé. Après l' opération si nécessaire encore 24 heures 3 x 500 mg.

Enfants

Avant de l' opération est Metronidazole Aurobindo administré dans combinaison avec un autre médicament qui combat les bactéries (néomycine).

Metronidazole Aurobindo comprimés ou Néoamycine comprimés (4 fois suspension par jour pendant 3 jours)

(3 fois par jour pendant 2 jours)

5 - 12 ans: 100 mg 500 mg

1 - 5 an: 5 mg/kg poids corporel 250 mg

Moins de 1 an: 125 mg

5 mg/kg poids corporel

Après l' opération le traitement est poursuivi ,, généralement avec une autre forme d'administration.

Épidémie de Helicobacter pylori chez les enfants:

Dans le cadre d' un traitement combiné , 20 mg/kg parjour avec une un maximum de 500 mg en 2 doses pendant 7-14 jours.

Dosage pour l'angine de Plaut-Vincent :

Dosage comme pour infections graves.

Votre médecin vous dira informer combien de temps vous Metronidazol Aurobindo devez utiliser.

Si votre foie ne fonctionne pas

Si votre foie ne fonctionne pas sera votre arts de dose réduire.

Si vous remarquez que ce médicament trop fort ou au contraire trop peu efficace, consultez alors votre arts.

Avez -vous trop de ce médicament pris ? Si vous

trop de Metronidazole Aurobindo avez utilisé , contactez immédiatement votre médecin votre médecin ou pharmacien.

Utilisation de trop de métronidazole peut entraîner entre autres choses nausées, vomissements et problèmes de coordination, comme démarche ébrieuse. Après utilisation de trop de métronidazole, sont surtout les symptômes traités. Il n'y a pas d'antidote spécifique pour surdosage.

Avez-vous oublié ce médicament à prendre ? Si vous

oubliez une fois une dose Metronidazole Aurobindo oubliez, pouvez vous cette quand même prendre, sauf lorsque le presque temps est pour la prochaine dose. Suivez alors simplement l'ancienne schéma.

Avez -vous d'autres questions sur l' utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien ..

4. indésirables Comme

Comme chaque médicament peut aussi ce médicament effets secondaires avoir. Pas tout le monde reçoit avec cela à faire.

Rarement (se produisent pour chez moins de 1 sur 1000 utilisateurs):

Réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie).

Très rarement (se produisent chez moins de 1 sur 10 000):

Une très grave anomalie sanguine par un déficit en globules blancs avec fièvre élevée soudaine, maux de gorge intenses et ulcérations dans la bouche agranulocytose agranulocytose

Un trouble sanguin dû à un déficit en globules blancs corpuscules sanguins ce qui vous rend plus sensible aux infections (neutropénie).

Déficit en plaquettes, ce qui vous rend plus sensible à des ecchymoses.

Une anomalie sanguine qui se manifeste par une sensibilité accrue aux infections infections (transitoire leucopénie). Cette anomalie disparaît à nouveau lorsque vous arrêtez avec l' utilisation de Metronidazole Aurobindo.

Une affection du cerveau avec par exemple confusion et convulsions (encéphalopathie), une affection du cerveau avec par exemple problèmes de coordination, troubles de la parole, difficultés avec marcher, convulsions de la globe oculaire et trembler (syndrome cérébelleux). Ces effets secondaires peuvent se rétablir après l'arrêt du traitement.

Un grave inflammation du côlon avec comme symptômes fièvre et grave, persistante ou sanglante diarrhée (pseudomembraneuse pseudomembraneuse colite).

Augmentation quantité enzymes hépatiques dans le sang. Lésion du foie, qui peut être accompagnée de jaunisse (jaunissement de la peau ou de yeux).

Troubles dans le contrôle sur l'action et comportement (troubles psychotiques). Non

connu (peut avec les données disponibles données non être déterminé):

Maux de tête, somnolence, vertiges, troubles de la coordination.

Une forme spécifique de méningite, qui est généralement causée par un virus (aseptique méningite).

Affection nerveuse (neuropathie) ou crises qui ressemblent à épilepsie.

Troubles de la vision, tels que diplopie, myopie, vision floue, ne pas pouvoir voir net ou changements dans la perception des couleurs.

Affection de inflammation du nerf optique.

Lésion ou perte de l'audition, acouphènes.

Troubles gastro-intestinaux comme douleur dans le haut de l'abdomen, nausées, vomissements et diarrhée.

Inflammation de la muqueuse buccale, langue chargée, décoloration de la langue (possiblement due à une infection à candida).

Dysgueusie, comme un goût métallique désagréable goût métallique.

du pancréas avec comme symptômes douleur intense dans le haut de l'abdomen irradiant vers vers le dos en nausées en vomissements.

Manque d'appétit (anorexie).

Assombrissement de votre urine.

Douleurs musculaires, douleurs articulaires.

Soudain accumulation de liquide dans le peau et muqueuses de par exemple la gorge ou la langue, difficultés respiratoires ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme réaction allergique (œdème angioneurotique).

Volatile éruption cutanée chez certaines maladies infectieuses, démangeaisons, rougeur, éruption cutanée avec fortes démangeaisons et formation de bosses (urticaire).

Aigu délimité zone de la peau avec rougeur et parfois avec ampoules, qui apparaît en raison de hypersensibilité à le médicament (éruption fixe).

Grave, soudaine allergique réaction avec forte fièvre, cloques sur la peau et desquamation de la peau (nécrolyse épidermique toxique).

Grave allergique réaction avec forte fièvre, cloques sur la peau, douleurs articulaires et/ou inflammation oculaire (syndrome de Stevens-Johnson). Grave

Grave éruption cutanée avec soudaine éruption de dizaines à centaines 1 à 2 mm grands vésicules remplies de pus (pustulose généralisée exanthématique aiguë).

Insuffisance hépatique, où transplantation hépatique nécessaire était. Ceci est signalé chez patients qui traités étaient avec métronidazole ensemble avec un autre antibiotique.

Aigu insuffisance hépatique chez les patients atteints du syndrome de Cockayne (voir rubrique 2 "Quand devez-vous faire preuve de prudence avec ce médicament ?"). Observations

de de choses qui ne sont pas là (hallucinations), confusion, humeur dépressive .
Fièvre.

Sensation de vertige (vertige). Troubles du rythme cardiaque

Arythmies cardiaques dits QT- QT-prolongation qui peut être observée sur un ECG), surtout lorsque métronidazole était utilisé avec d'autres médicaments qui rythme cardiaque peuvent perturber.

De fréquence, nature et gravité des effets indésirables sont chez les enfants les mêmes que chez les adultes.

Le signalement des effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires effets secondaires, contactez alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également pour effets secondaires qui ne figurent pas dans cette notice. Vous pouvez effets secondaires également signaler via le Néerlandais Centre des Effets Secondaires Lareb, www.lareb.nl www.lareb.nl. signalant les effets secondaires à signaler, aidez vous nous à mieux information à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conservez -vous ce médicament?

Hors de la vue et portée de enfants garder.

Il n'y a pas de température de conservation nécessaire. Conserver dans l' emballage d'origine.

N'utilisez pas ce médicament après après la date de péremption. Vous trouvez cela sur l' étiquette, la boîte ou la bouteille. Il indique un mois et une année. La dernier jour de ce mois est la date limite de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les jetez pas dans la poubelle poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Si vous les médicaments de la bonne manière éliminez, être elles un correcte manière détruites et entrer elles pas dans l'environnement se retrouvent.

6. Contenu de l' emballage et autres informations

Quelles substances contiennent dans ce médicament?

La substance active dans ce médicament est métronidazole métronidazole. comprimé contient 250 ou 500 mg 250 de 500 mg métronidazole.

Le autres substances dans ce médicament sont croscarmellose sodique, lactose monohydraté, povidone, stéarate de magnésium, amidon de maïs, cellulose microcristalline cellulose, hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane (E171) et macrogol 400.

Comment apparaît Métronidazole Aurobindo ? et que contient un emballage?

Métronidazole Aurobindo 250 mg sont blanches, arrondies enrobées comprimés avec une barre de cassure.

Métronidazole Aurobindo 500 mg sont blanches, arrondies enrobées comprimés avec une barre de cassure avec les lettres « CLJ ». Le barre de fraction est pas destinée à diviser le comprimé en deux parties égales .

Emballages

PVC/Al blister: 20 ou 30 pièces.

Flacons en HDPE avec un HDPE/LDPE ou bouchon HDPE : 100 pièces.

Il est possible que pas tous les emballages mentionnés soient commercialisés . Titulaire de l'.

de mise sur le marché . dans le commercialisation mettre et fabricant
Titulaire de l'enregistrement
Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabricant

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portugal

Inscrit au registre inscrit

Métronidazole Aurobindo 250 mg, comprimés pelliculés comprimés RVG 07074.

Metronidazole Aurobindo 500 mg, pelliculés comprimés RVG 08652.

Cette notice est pour la dernière approuvée en novembre 2024

Transtoyou