

Pakuotės lapelis: informacija skirta de vartotojui

Metronidazol Aurobindo 250 mg, plėvele dengtos tabletės
Metronidazol Aurobindo 500 mg, plėvele dengtos tabletės
metronidazolas

Perskaitykite atydžiai visą pakuotės lapelį prieš jū šį vaistą ketinate vartoti, nes yra pateikta svarbi informacija apie jums .

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt prireiks jo vėliau vėl reikia.

Ar turite jūs dar klausimų? Tada susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms , nes jis skirtas tik jums . Tai gali būti kenksmingas būti kitiems ,net jei turi jie tuos pačius simptomus kaip jūs. Atsiranda jums šalutinis poveikis jaučiate diskomfortą vienas iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Arba jums pasireiškia vienas šalutinis poveikis kuris nėra šiame šiame pakuotės lapelyje nurodytas? Susisiekite su savo menas vaistininkas.

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Metronidazol Aurobindo ir kam yra šis vaistas naudojamas?
2. Kada galite šį vaistas ne naudoti arba turite būti papildomai atsargūs su juo būti?
3. Kaip naudojate jūs šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti u šis vaistas?
6. Turinys pakuotės ir kita informacija 1.

1. Metronidazol Aurobindo ir kam naudojamas šis vaistas naudojamas naudojamas?

Metronidazol Aurobindo priklauso grupei vaistų kurie naikina bakterijas ir vienaląsčius organizmus (protozojus)kovoja ..

Aurobindo Aurobindo yra suaugusiems ir vaikams naudojamas gydant šias ligas: infekcijas šlaplės ar makšties gleivinės, vadinamąją baltąją išskyra arba leukorėją,, „" prie moterų (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).

žarnynas- ir kepenų infekcijos sukeltos dėl tam tikro nustatyto vienaląsčio organizmo, ameba (amebiazė).

žarnyno infekcijos sukeltos dėl vienas tam tikras vienaląstis gyvūnėlis, giardia (giardiazė). sunkios infekcijos kurias sukelia mikro- organizmaikurie jautrūs yra šiam vaistui . vienas. vienas tam tikra forma iš sunkios dantenų uždegimo (Plaut-Vincent angina).

Ir tam, kad tam tikras infekcijas užkirsti kelią kurios gali atsirasti prieš ir po operacijos ..

2. Kada galite šį vaistą ne vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Kada galite šį vaistą ne vartoti?

Pasakykite tai nedelsiant savo gydytojui ir nutraukite vartojimą metronidazolo jei esate alergiškas: kažkam alergiškas iš už šio iš medžiagos j šis vaistas. Šias medžiagas galite u rasti in skyriuje 6 šio pakuotės lapelio.

Jei jums yra pakitęs kraujo vaizdas yra nustatyta. Tai yra įvertinama jūsų gydytojo. Jūs turite problemų su liga smegenų, nugaros smegenų ar nervų, stuburo ar nervų (neurologinis sutrikimas)

Jūs kenčiate nuo pilvo skausmo, apetito stoka (anoreksija), pykinimas, vėmimas, karščiavimas, negalavimas, nuovargis, gelta, tamsūs šlapimas, glaistas (šviesus pilkas) – arba mastikos spalvos išmatos arba niežulys.

Kada reikia jums papildomai atsargiai būti su šiuo vaistu?

Jei atsiranda gydymo metu traukuliai ar kiti nervų sutrikimai nervų sutrikimai pvz.. tirpimas kojos rankos ir ar kojos) pasireiškia, reikia jūsų gydymas nedelsiant turi būti pakeistas.

Kadangi ilgalaikis vartojimas metronidazolo de kraujodara galimai gali pakenkti (žr. skyrių 4, "Galimos nepageidaujamos reakcijos"), gali jūsų kraujo vaizdas gydymo metu de gydymas būti kontroliuojamas.

Kai jūs alkoholinius gėrimus vartojate. Jūs neturite vartoti alkoholinių gėrimų vartoti per ir iki 48 valandų po gydymo procedūros su Metronidazoliu Aurobindo.

Kai jūs šį vaistą ilgiau nei 10 dienų vartojate. Gali atsirasti pokyčių jūsų genetiniame medžiagoje (DNR) pasireikšti ..

Jei jūsų kepenys ne gerai veikia. Veiklioji medžiaga, metronidazolas gali kauptis tada jūsų kūne (žr. kūnas (žiūrėk „Jeigu jūsų kepenys ne gerai veikia“ skyriuje 3).

Jeigu jūs alergiškas esate kitoms panašioms, panašioms vaistams (ketokonazolas, mikonazolas, sulkonazolas). U gali ir taip pat alergiškas būti metronidazolui Aurobindo.

Eikite

pas savo gydytoją jei jūs po to de gydymas dėl „baltosios išskyros“ dar skundų turite. Tai gali būti kad jūs kenčiate turite dėl kitos infekcijos (gonorėja/gonorėja).

Atvejais iš sunkios kepenų toksiškumo/ūminio kepenų nepakankamumo, įskaitant atvejus su mirtina baigtimi pas pacientus su Cockayne sindromu, sindromas iš Cockayne, yra pranešta su vaistais kurie metronidazolą turi.

Jeigu jums yra atvejis dėl Cockayne sindromo, turite jūsų gydytojas taip pat dažnai tikrinti jūsų kepenų funkcija tikrinti kol jūs su metronidazolu esate gydomas ir taip pat po to.

Atvejais labai sunkių odos reakcijų buvo pranešta „kaip Stevens-Johnson sindromas (SJS) su aukšta karščiavimu, pūslelės ant odos, sąnarių skausmai ir/ arba akių uždegimas, arba sunkus, staigus alerginis reakcija, su kaip simptomai karščiavimas ir pūslelės ant odos ir odos lupimasis (TEN (toksinė epiderminė nekrolizė)), arba staigus išsiveržimas protrūkis nuo dešimties iki šimtai 1 iki 2 mm didelės pūslelės užpildytos pūliais (AGEP (ūminė generalizuota egzanteminė pustuliozė)). Jei simptomai ar požymiai SJS, TEN ar AGEP reikia u nedelsiant nutraukti gydymą su gydymu.

Jeigu jaučiate vertigo (svaigulį jausmą) patiriate vartojant tas metronidazolą. Jei.

Jeigu jūs vieną kraujo tyrimą turi atlikti, pasakykite tada gydytojui arba slaugytojui kuris tyrimą atlieka kad jūs metronidazolą vartojate. Metronidazolas gali paveikti turėti ant rezultatai iš kai kurie kraujo tyrimai.

Kreipkitės į gydytoją jei vienas iš aukščiau įspėjimai jums taikoma yra arba tai praeityje buvo yra buvęs.

Naudojate jūs dar kitus vaistus?

Naudojate jūs be Metronidazol Aurobindo dar kitus vaistus, turite jūs tai trumpai atgal padaryta arba einate jūs tai galbūt netrukus daryti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojui arba vaistininkui.

Susisieki su jūsų gydytojas jei jūs vaistus vartojate kurie gali sutrikimą širdies ritme sukelti sukelti vadinamą QT- pailgėjimą kurismatomas yra EKG yra į vienas EKG), kaip tam tikri antiaritmikai (vaistai nuo širdies ritmo sutrikimų), tam tikri antibiotikai ir vaistai kurie ypač naudojami gydyti psichozę psichozė te gydyti (tarp jų kliesdėsiai, haliucinacijos, paranoja arba netvarkingos mintys).

Vienalaikis vartojimas su šiomis vaistais nerekomenduojamas ::

Disulfiramas, vienas vaistas nuo alkoholizmo. Jūs galite patirti sunkumą dėl psichotinių reakcijų. Psichozė yra sunki psichikos liga kai prarandama kontrolė valdoma apie savo elgesį ir veiksmus sutrikęs yra.

Fenobarbitalis, naudojamas prie epilepsijos. Fenobarbitalis gali sumažinti veiksmingumą Metronidazolo Aurobindo sumažinti sumažinti.

Fenytoinas, vaistas nuo širdies sutrikimų arba epilepsijos .. gali sumažinti Metronidazolo Aurobindo veiksmingumą Metronidazolis Cimetidinas, sumažinti.

Cimetidinas, vienas vaistas nuo skrandžio problemų. De šalutinis poveikis van Metronidazol Aurobindo gali padidėti.

Tam tikri vaistai nuo kraujo krešėjimo (antikoagulantai van het kumarinų type, kaip acenokumarolis). Metronidazolas Aurobindo gali de poveikį nuo šiuos vaistus sustiprinti. Vaistai kuriuose yra ličio turi. Metronidazolas Aurobindo gali padidinti koncentraciją ličio kiekį kraujyje padidinti, dėl ko inkstai gali apsinuodyti gali būti.

Ciklosporinas, vaistas vaistas kuris yra naudojamas po organų transplantacijų ir esant tam tikroms odos ligoms. Metronidazol Aurobindo gali padidinti kiekį šios medžiagos kraujyje į kraujas padidinti.

Vaistai su kaip sudėtinė dalis 5-fluorouracilas (gydymas nuo vėžio). Metronidazolas Aurobindo gali padidinti lygis 5-fluorouracilo kraujyje kraujyje padidinti, dėl ko 5-fluorouracilas papildomai kenksmingas gali būti.

Busulfanas, kuris naudojamas gydant vėžį . Yradidesnė tikimybė kad jūs patirsite rimtų šalutinių poveikių dėl sunkių šalutinių poveikių dėl busulfano.

Į ką turite jūs atkreipti dėmesį su maistu, gėrimais ir alkoholiu?

Jums leidžiama gydymo metu ir gydymo ir iki 48 valandų po gydymo su su Metronidazol Aurobindo nėra alkoholinių gėrimų vartoti. Tai gali sukelti į tam tikrus psichikos sutrikimus, kurie yra nurodyti skyriuje skyrius 4 "Galimi šalutinis poveikis".

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote jūs nėščia būti , noritenėščia tapti arba žindote jūs kūdikį žindymas? Tada susisieki su savo gydytoju arba vaistininku prieš vartodami šį vaistą ..

Je

jūsų gydytojas mano, kad tai būtina būtinas galite vartoti Metronidazolą u Metronidazolas Aurobindo naudoti nėštumo metu nėštumo.

Žindymas

Metronidazol Aurobindo patenka į motinos pieną . Jūs galite Metronidazol Aurobindo vieną kartą naudoti jei jūs jums žindymas duoda. Jei Jūs ilgą laiką Metronidazol Aurobindo turite

naudoti, turite pirmiausia su savo gydytoju pasitarti ar Jūs turite ar jūs turi nutraukti maitinti duoti nuo krūtimi.

Vairavimas ir mašinų naudojimas iš mašinų

Metronidazol gali sukelti šalutinius poveikius tokių kaip laikinas neryškus ar dvejobas matymas, galvos svaigimas, svaigulys jausmas (vertigo), sumišimas, haliucinacijos (dalykus matyti arba girdėti kurių nėra, priepuoliai (traukuliai).

Jei tai įvyksta, negalite vairuoti transporto priemonės, valdytimechanizmų ar įrankių naudoti ..

Aurobindo tabletės turi laktozės laktozė

Jei jūsų gydytojas jums pasakė kad jūs negalite toleruoti tam tikrų cukrų, susisieki su savogydytoju prieš vartodami šį vaistą. vaistas vartoja.

Metronidazol Aurobindo sudėtyje yra natrio

Šis vaistas sudėtyje yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje tabletėje, tai reiškia kad jis iš esmės „be natrio“ yra.3. Kaip

vartoti jūs jums šis vaistas?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas jums tai pasakė .. ar dėl teisingo teisinga naudojimas? Tada susisieki su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Dozavimas yra kiekvienam pacientui skirtingas ir bus nustatytas jūsų gydytojo nustatytas. Jei ne. Nebent jūsų gydytojas kažką kitaip paskiria yra įprasta dozė:

Sergant giardiaze

10 metų ir vyresniems:

3x 400 mg per dieną 5-5 dienos, of
2x 500 mg per dieną per 7-10 dienų, arba
2000 mg vieną kartą per dieną per 3 dienas.

Vaikai jaunesni nei 10 metų:

1-3 metai: 500 mg vieną kartą per dieną trukmę 3 dienas
3-7 metai: 600 iki 800 mg vieną kartą per dieną per 3 dienas
7-10 metų: 1000 mg vieną kartą per dieną per 3 dienas

Alternatyva, išreikšta mg/kg kūno svorio: 15-40 mg/kg kūno svorio per dieną 2-3 dozėmis.

Esant amebiazei

10 metų ir vyresniems::

400-800 mg 3 kartus per dieną 5-10 dienų 5-10 dienos

Vaikai jaunesni nei 10 metų:

1-3 metai: 100 iki 200 mg 3 kartus per dieną per 5-10 dienų
3-7 metai: 100 iki 200 mg 4 kartus per dieną per 5-10 dienų
7-10 metų: 200 iki 400 mg 3 kartus per dieną per 5-10 dienų

Alternatyva gali de dozė išreikšta būti per kūno svoris

35-50 mg/kg kūno svoris per diena į 3 dozės už 5-10 dienos; maksimaliai 2400 mg per diena.

Esant sunkios infekcijos

Suaugusieji ir vaikai vyresni nei 12 metų:

3 x 750 mg per dieną arba

3-4 x 500 mg per dieną 7 7 arba iš ilgiau, jei reikia

Vaikai vyresni nei 8 savaičių iki 12 metų:

Įprasta dozė yra 20-30 mg/kg kūno svorio per dieną, skiriama duotas kaip viena keletas dozė arba kaip 7,5 mg/kg kūno svorio kas 8 valandas. Dozė dozė gali būti padidinta iki 40 mg/kg kūno svorio, per dieną priklausomai nuo sunkumo infekcijos infekcijos. trukmė gydymo gydymo yra paprastai 7 dienos.

Kūdikiai jaunesni nei 8 savaitės amžiaus:

Gydymas įprasta dozė yra 15 mg/kg kūno svorio per dieną, suteikiama kaip viena vienkartinė dozė arba kaip 7,5 mg/kg kūno svorio kas 12 valandų.

Prie naujagimių kurie yra gimę prie nėštumo trukmės trumpesnės nei 40 savaičių gali metronidazolas per pirmąją gyvenimo savaitę kauptis. Todėl turi po kelias dienas gydymo de kiekis metronidazolo kraujyje kraujyje turi būti patikrintas.

Siekiant užkirsti kelią infekcijoms infekcijoms kurios po vieno operacija gali pasireikšti: (žarnyno operacija (kolonų chirurgija)):

Dažniausiai bus metronidazolas 24 valandos prieš de operaciją bus skiriamas iki mažiausiai 4 valandos po uždarymo žaizdos, arba ilgiau, priklausomai nuo rizikos užsikrėtimo. Suaugusieji ir.

vyresni ir vaikai vyresni ir 12 metų:

1000 mg Metronidazol Aurobindo kaip vienkartinė dozė, po kurios 500 mg, 3 kartus per dieną per 24 valandas iki prieš operaciją operacija ne daugiau gali būti valgoma.

Vaikai jaunesni nei 12 metų:

20-30 mg/kg kūno svorio, suvartota kaip viena vienintelė dozė, 1-2 valanda prieš operaciją procedūra.

Naujagimiai gimę su nėštumo trukme mažiau nei 40 savaičių:

10 mg/kg kūno svorio, suleista kaip viena keletas dozė, prieš procedūrą ..

Tiek

pacientas tiek partneris turi būti gydomi. Suaugusieji.

vaikai ir vaikai nuo 10 metų ir vyresniems:

3 x 200 mg per dieną 7 7, arba 2 x 400 mg per dieną 5-7 dienas 5-7 2000 mg kaip vienkartinė dozė keletas dozė.

Vaikai jaunesni nei 10 metų:

15-30 mg/kg kūno svorio per dieną 2-3 kartus per per 7 dienas, arba 40 mg/kg kūno svorio kaip keletas dozė. Maksimaliai 2000 mg per dozė.

Esant infekcijoms su Gardnerella vaginalis

Tiek jūs tiek jūsų moteriškoji partnerė turi būti gydoma.

Suaugusieji: 1000 mg per dieną, 2 dozėmis, per 7 dienas
Jaunuoliai iki 18 metų amžiaus: 2x 400 mg per dieną per 5-7 dienas, arba 2000 mg kaip keletą dozę.

Suaugusieji

Ginekologinės procedūros:

1000 mg Metronidazol Aurobindo kaip vienkartinė dozė, po kurios 500 mg 3 kartus per dieną iki prieš de operacija ne daugiau gali būti valgoma. Po operacijos taip reikia dar 24 valandas 3 x 500 mg.

Vaikai

Prieš prie operaciją operacija yra Metronidazol Aurobindo skiriamas į derinys su kitu kitu vaistu kuris bakterijas kovoja (neomicinas).

Metronidazol Aurobindo tabletės arba suspensija (3 kartus per dieną per 2 dienas)	Neomicinas tabletės (4 kartus per dieną per 3 dienas)
5 - 12 metai: 100 mg	500 mg
1 - 5 metai: 5 mg/kg kūno svorio	250 mg
Jaunesni nei 1 metai: 5 mg/kg kūno svorio	125 mg

Po operacijos yra tęsiamas gydymas toliau, dažniausiai su viena kita vartojimo forma.

Helicobacter pylori protrūkis vaikams vaikai:

Kaip dalis iš vieno kombinuoto gydymo, 20 mg/kg per dieną su viena maksimaliai 500 mg per 2 dozės per 7-14 dienų.

Dozavimas esant Plaut-Vincent anginai:

Dozavimas kaip esant sunkios infekcijos.

Jūsų gydytojas pasakys jums pasakyti kaip ilgai jūs Metronidazol Aurobindo turite naudoti.

Jei jūsų kepenys ne gerai veikia

Jei jūsų kepenys ne gerai veikia bus jūsų menai dozė sumažinti.

Jei pastebite kad šis vaistas per stiprus arba būtent per silpnas veikia, pasitarkite tada su gydytojas.

Ar jūs per daug šio vaisto pavartojote ?Jeį jūs

per daug Metronidazol Aurobindo pavartojote , nedelsdami kreipkitės į nedelsiant susisiekiute su jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Vartojimas per daug metronidazolo gali sukelti tarp kitų pykinimą, vėmimą ir koordinacijos problemas, koordinacijos sutrikimai, kaip girtumo eiseną. Po vartojimo iš per daug metronidazolo, yra ypač simptomai gydomi. Nėra specifinio priešnuodžio nuo perdozavimo perdozavimas.

Ar jūs pamiršote šį vaistą ir išgerti? Jei jūs kartą pamiršote dozę Metronidazol Aurobindo pamiršote, galite jūs gali u šią vis tiek vartoti, išskyrus kai tai beveik laikas yra kitai dozei artėja dozė. Sekite tada tiesiog tą seną schema.

Ar jūs dar kitų klausimų apie vartojimą šio vaisto? Susisiekiite su savo gydytoju arba vaistininku ..

4. nepageidaujamos reakcijos Kaip

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti. Ne visi gauna su tuo susidurti ..

(pasitaiko dažnai prie mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų):
Sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos (anafilaksija).

Labai retai (pasitaiko prie mažiau nei 1 iš 10 000): Labai sunkus kraujo sutrikimas sunkus kraujo sutrikimas dėl trūkumo baltųjų kraujo kūnelių su staigia aukšta karščiavimu, stipriu gerklės skausmu ir opelėmis burnoje (agranulocitozė).). Vienas kraujotakos sutrikimas dėl vieno trūkumo baltųjų kraujo kūnelių, dėl kurio jūs jautresni esate infekcijoms (neutropenija). Trūkumas baltųjų prie trombocitai, dėl ko jūs jautresni esate kraujosruvoms kraujavimams. Kraujo sutrikimas kuris pasireiškia kaip padidėjęs jautrumas infekcijoms infekcijoms jautrumas infekcijoms (praeinantis leukopenija). Šis nukrypimas išnyksta vėl kai jūs nutraukiate vartojimą Metronidazol Aurobindo. Ligos sutrikimas smegenų liga iš smegenų su pavyzdžiui sumišimas ir traukuliai (encefalopatija), liga smegenų su pavyzdžiui koordinacijos sutrikimai pavyzdžiui kalbos sutrikimai, sunkumais sunkumais su vaikščioti, traukuliai akies obuolio ir drebulys (smegenėlių sindromas). Šalutiniai poveikiai gali atsistatyti po nutraukimo gydymo procedūros gydymas. Vienas sunkus uždegimas storosios žarnos su kaip simptomai karščiavimas ir sunkus, nuolatinis arba kruvinas viduriavimas (pseudomembraninis pseudomembraninis kolitas). Padidėjęs kiekis kepenų fermentų kraujyje kraujas. Pažeidimas kepenų, kuris gali būti susijęs su gelta (geltona spalva odos oda arba akys). sutrikimai in de kontrolė over het veiksmus ir elgesys (psichoziniai sutrikimai).

Nežinoma žinoma (gali su turimais duomenimis duomenys ne būti nustatyta):
Galvos skausmas, mieguistumas, galvos svaigimas, koordinacijos sutrikimai.
Tam tikra nustatyta forma meningito, kuria dažniausiai yra sukelta sukelta per vienas virusas (aseptinis meningitas).
Nervų sutrikimas (neuropatija) arba priepuoliai kurie primena epilepsiją ..
regėjime, tokie kaip, kaip dvejinimasis akyse, trumparegystė, neryškus matymas, ne gerai aštriai matyti arba pokyčiai regėjime spalvų matyme spalvų ..

Liga of uždegimas van de regos nervo.

Pažeidimas of praradimas van het klausos, spengimas ausyse.

Virškinimo trakto sutrikimai tokie kaip skausmas in de viršutinėje pilvo dalyje, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas.

Uždegimas burnos gleivinės, apnašos ant liežuvio, spalvos pasikeitimas liežuvio (galimas kaip pasekmė nuo kandidozės kandida-infekcija).

Skonio sutrikimai, kaip nemalonus metalo skonis metalo skonis.

su simptomais stiprus skausmas viršutinėje pilvo dalyje plintantis į skausmas į viršutinę pilvo dalis spinduliuojantis į nugarą en pykinimas en vėmimas.

Apetito stoka (anoreksija). Tamsus

šlapimo spalvos pakitimas. Raumenų skausmas, sąnarių.

Staigus skysčių kaupimasis oda ir gleivinės van pavyzdžiui gerklės ar liežuvio, kvėpavimo sunkumai arba niežulys ir odos bėrimas, dažnai kaip alerginė reakcija (angioneurotinis edema).

Laikinas odos bėrimas kai kai kurios infekcinės ligos, niežulys, paraudimas, odos bėrimas su stiprus niežulys ir susidarymas iš gumbeliai (dilgėlinė).

Aštrus apibrėžtas sritis odos su paraudimu ir kartais su pūslelėmis ,kuri atsiranda dėl padidėjusio jautrumo vaistui už tai vaistas (fiksuota vaistų reakcija).

Sunkus, staigus alerginis reakcija su aukšta karščiavimu, pūslelės ant odos ir odos lupimasis (toksinėepiderminė nekrolizė nekrolizė).

Sunkus alerginė reakcija su aukšta karščiavimu, pūslelės ant odos, sąnarių skausmas ir/ akių uždegimas (Stevens-Johnson-sindromas).

Sunkus odos bėrimas su staigus išsiveržimas iš dešimčių iki šimtų 1 iki 2 mm didelės pūslelės užpildytos su pūliais (ūminė generalizuota egzantematinė pustuliozė).

Kepenų nepakankamumas, kai kepenų transplantacija būtina buvo. Tai yra pranešta pas pacientus kurie gydyti buvo su metronidazolu kartu su kitu antibiotiku antibiotikas.

Ūmus kepenų nepakankamumas pas pacientus su sindromu Cockayne (žr. skyrių 2 „Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo vaistu ?“).Stebėjimai

apie nuo dalykai kurie yra nėra yra (haliucinacijos), sumišimas, depresinė nuotaika.

Karščiavimas.

Galvos svaigimas (vertigo). Širdies ritmo sutrikimai

Širdies ritmo sutrikimai vadinamasisQT- QT-pratęsimas kuri gali būti matoma ant EKG), ypač kai metronidazolas buvo naudojamas su kitais vaistais kurie širdies ritmą gali sutrikdyti sutrikdyti.

De dažnis, pobūdis ir sunkumas van nepageidaujamos reakcijos yra pas vaikus tas pats kaip pas suaugusiuosius.

Het pranešimas van šalutinis poveikis

Jei jus vargina šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir šalutiniam poveikiui kuris nėra šiame lapelyje paminėtas . Jūs. U gali šalutinius poveikius taip pat pranešti per Nyderlandų Šalutinių poveikių Centras Lareb, www.lareb.nl. Pranešdami šalutinius poveikius apie pranešti, padedate jūs mums suprasti daugiau informacija gauti apie šio saugumą vaisto šio vaisto.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir vietoje iš vaikų laikyti.

Yra nėra specialios laikymo temperatūros būtina. Laikyti originalioje pakuotėje ..

šio vaisto nebe daugiau daugiau po de galiojimo data. Tą rasite ant etiketės, dėžutės arba butelio . Ten nurodytasmėnuo ir metai . De vienas metai. De paskutinis diena iš to mėnesio yra galiojimo data.

Neskalaukite vaistų ne per kriauklę ar per tualetą ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžė. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių nebe naudojate . Jeivaistus tinkamai šalinate , būdas išskiria, sunaikinami jie tinkamu būdu ir nepatenka į aplinką . 6. Turinys pakuotės ir.

6. Turinys iš pakuotė ir kiti informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate ?Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra metronidazolas . Vienoje tabletėje. 250 arba 500 mg tabletė sudėtyje yra 250 arba 500 mg metronidazolas. Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra kroskarmeliozės natrio druska natrio kroskarmeliozėlaktozės monohidratas laktozės monohidrataspovidonas ,magnio stearatas magnio stearataskukurūzų krakmolos kukurūzų krakmolasmikrokristalinė mikrokristalinė celiuliozė, hidroksipropilmetilceliuliozė, titano dioksidas (E171) ir makrogolis 400.

Kaip atrodo Metronidazol Aurobindo išvaizda ir kas yra pakuotėje ?Metronidazol Aurobindo 250 mg yra yra baltos, apvalios dengtos tabletės su lūžio linija.

Metronidazol Aurobindo 500 mg yra baltos, apvalios dengtos tabletės su lūžio linija su raidėmis „CLJ“. lūžio linija yra ne skirta tabletei padalinti į dvi lygias dozes. Pakuotės

PVC/Al

juostelės pakuotė : 20 arba 30vienetų ..

tablečių buteliukai su su vienas HDPE/LDPE arba HDPE dangtelis: 100 vienetų.

Tai yra galima kad ne visi paminėti pakuočių dydžiai į rinką yra pateikiami.

Leidimo turėtojas leidimo gauti į prekybą išleisti ir gamintojas
Registracijos turėtojas
Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Gamintojas
Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portugalija

Registruotas įrašytas
Metronidazol Aurobindo 250 mg, plėvele dengtos tabletės RVG 07074.
Metronidazol Aurobindo 500 mg, plėvele dengtos tabletės RVG 08652.

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas lapkričio 2024 Metronidazol Aurobindo 250 ir

Transtoyou