

Bipacksedel: information för användaren Metronidazol

Aurobindo 250 mg, filmdragerade tabletter Metronidazol

Aurobindo 500 mg, filmdragerade tabletter metronidazol

Läs

noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel ska använda, eftersom det finns viktig information i för dig.

Spara denna bipacksedel. Kanske behöver du den senare igen nödvändig.

Har du fortfarande frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Ge denna medicin inte vidare till andra, eftersom det är endast till du föreskriven. Det kan skadligt vara för andra, även om har de samma besvär som du.

Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Metronidazol Aurobindo och vad används denna medicin för?
2. När får du denna medicin inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?
3. Hur använder du denna medicin?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar u detta läkemedel?
6. Innehåll av förpackningen och övrig information

1. Vad är Metronidazol Aurobindo och vad används detta läkemedel för?

Metronidazol Aurobindo tillhör gruppen av läkemedel som bakterier och encelliga djur (protozoer) bekämpar ..

Aurobindo Aurobindo används hos vuxna och barn används vid de behandling av:

infektioner i urinröret eller i slemhinnan i slidan, den så kallade "vita flytningen" vid kvinnor (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).

tarm- och leverinfektioner orsakade av en viss encellig organism, amöba (amöbiasis).

tarminfektioner orsakade av en bestämd encellig djur, giardia (giardiasis).

allvarliga infektioner som orsakas av mikro- organismersom känsliga är för denna medicin .. en vissa form av allvarlig tandköttsinflammation (angina av Plaut-Vincent).

Och för att vissa infektioner förhindra som kan uppstå vid och efter en operation ..

2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

När får du detta läkemedel inte använda?

Säg det omedelbart till din läkare och sluta ta metronidazol om metronidazol Du:

mot någon av de en av ämnen i detta läkemedel. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6 i denna bipacksedel.

Om du har en avvikande blodbild är fastställt. Detta bedöms av din läkare. Du besväras

av en sjukdom i dina hjärna , ryggmärgen eller nerverna , ryggmärgen eller nerverna (neurologisk sjukdom)

Du besväras av från buksmärtor, brist på aptit (anorexi), illamående, kräkningar, feber, illamående, trötthet, gulsot, mörk urin, kittfärgad (ljus grå)- eller mastixfärgad avföring eller klåda.

När måste du extra försiktig vara med detta läkemedel?

Om det uppstår under behandlingen kramper eller andra nervsjukdomar (nervsjukdomar t.ex... domningar av armen enof benen) uppträder, bör din behandling omedelbart att justeras ..

Långvarig användning av metronidazol metronidazol de blodbildning möjligt kan skada (se avsnitt 4, "Möjliga biverkningar"), kan ditt blodvärde under de behandling kontrolleras kontrolleras.

När du alkoholhaltiga drycker använder. Du får inte alkoholhaltiga drycker använda under och upp till 48 timmar efter behandlingen med Metronidazol Metronidazol Aurobindo.

När du detta läkemedel längre än 10 dagar använder. Det kan förändringar i ditt ärftligt material (DNA) uppstå.

Om din lever inte bra fungerar. Den aktiva substansen, metronidazol, kan sig då ansamlas i din kropp (se "Om din lever inte fungerar bra" i avsnitt 3).

Om du allergisk är mot andra, liknande läkemedel (ketokonazol, mikonazol, sulkonazol). U kan då också allergisk vara mot Metronidazol Aurobindo.

Gå till din läkare om du efter den behandling av "vit flytning" fortfarande besvär har. Det kan vara att du har besvär har av en annan infektion (gonorrhé).

Fall av allvarlig levertoxicitet/akut leversvikt, inklusive fall med en dödlig utgång hos patienter med Cockaynes syndrom, från Cockayne, är rapporterats med läkemedel som metronidazol innehåller.

Om hos dig finns det syndromet Cockayne, måste din läkare också ofta din leverfunktion kontrollera så länge du med metronidazol blir behandlad och även därefter.

Fall av mycket allvarliga hudreaktioner har rapporterats, såsom Stevens-Johnsons syndrom (SJS) med hög feber, blåsor på huden, ledvärk och/eller ögoninflammation, eller allvarliga, plötsliga allergiska reaktion, med som symtom feber och blåsor på huden och fjällning av huden (TEN (toxisk epidermal nekrolys)), eller plötslig utbrott av tiotals till hundratals 1 till 2 mm stora blåsor fyllda med pus (AGEP (akut generaliserad exanthematös pustulos)). Vid symtom eller tecken på SJS, TEN eller AGEP bör u omedelbart att sluta med behandlingen behandling.

Om du upplever vertigo (yrsel känsla) upplever under användning av metronidazol metronidazol.

en en blodprov måste genomgå, berätta då för läkaren eller sjuksköterskan som undersökningen utför att du metronidazol använder. Metronidazol kan påverka ha på resultaten av vissa blodprover.

Kontakta läkare om en av de ovanstående varningar gäller dig eller att i det förflutna är varit.

Använt du fortfarande andra läkemedel?

Använder du förutom Metronidazol Aurobindo fortfarande andra läkemedel, har du det kort sedan gjort eller ska du detta kanske snart göra? Berätta det då din läkare eller apotekare.

Kontakta din läkare om du läkemedel använder som en störning i hjärtrytmen kan orsaka (en så kallad QT-förlängning som synlig är på en EKG), såsom vissa antiarytmika (läkemedel för hjärtrytmrubbningar), vissa antibiotika och läkemedel som särskilt används för att psykos att behandla (inklusive vanföreställningar, hallucinationer, paranoia eller oordnade tankar).

Samtidig användning med följande läkemedel rekommenderas inte: Disulfiram,:

Disulfiram, en medicin mot alkoholberoende. U kan drabbas av från psykotiska reaktioner. En psykos är en allvarlig psykisk sjukdom där kontrollen kontroll om det egna beteende och agerande störd är.

Fenobarbital, används vid epilepsi. Fenobarbital kan effekten av Metronidazol Aurobindo minska minska.

Fenytoin, en medicin för hjärtproblem eller epilepsi. Fenytoin kan minska effekten av Metronidazol Aurobindo minska.

Cimetidin, en medicin mot magsmärtor. De biverkningar av Metronidazol Aurobindo kan öka.

Vissa läkemedel mot blodkoagulation (antikoagulantia av kumarin typ, såsom acenokumarol). Metronidazol Aurobindo kan effekten av dessa läkemedel förstärka .. som innehåller litium innehåller .. Aurobindo Aurobindo kan det halten av litium i blodet öka, vilket njurarna kan förgiftas . Ciklosporin.

ettläkemedel som används det blir används efter organtransplantationer och vid vissa hudsjukdomar. Metronidazol Aurobindo kan det halten av denna substans i blodet öka.

Läkemedel med som ingrediens 5-fluorouracil (behandling mot cancer). Metronidazol Aurobindo kan nivån av 5-fluorouracil i blodet öka, vilket gör att 5-fluorouracil extra skadlig kan vara.

Busulfan, som används vid cancer . Det finnsen större risk att du får problem med allvarliga biverkningar biverkningar genom busulfan.

Vad måste du tänka på med mat, dryck och alkohol?

Du får under behandlingen och upp till 48 timmar efter behandlingen med behandling med Metronidazol Aurobindo ingen alkoholhaltiga drycker använda. Detta kan leda till vissa psykiska störningar, som anges i avsnitt 4 " Möjliga Möjliga biverkningar".

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du gravid att vara , vill dugravid bli eller ger du amning amning? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du denna medicin använder.

Graviditet

Om din läkare anser det nödvändigt ,kan du Metronidazol Metronidazol Aurobindo använda under de graviditet.

Amning

Metronidazol Aurobindo kommer i bröstmjölkin. Du får Metronidazol Aurobindo en gång använda om du amning ger. Om du för längre tid Metronidazol Aurobindo måste använda, måste du först med din läkare rådgöra om du måste sluta med att ge av amning.

Körförmåga och användning av maskiner Metronidazol

kan biverkningar orsaka såsom tillfälligt suddig eller dubbelseende dubbelseende, yrsel, svindel känsla (vertigo), förvirring, hallucinationer (saker se eller höra som inte finns ,anfall (kramper). Om detta händer, får du inte något fordon köra, maskiner använda eller verktyg använda.

Metronidazol Aurobindo tabletter innehåller laktos

Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter , kontakta då din läkare innan du tar denna medicin ..

Metronidazol Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det betyder att det i princip är " natriumfritt".3. Hur

använder du du detta läkemedel?

Använd detta läkemedel alltid exakt som din läkare eller apotekare du det har berättat. Tvivlar du på rätta användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Dosen är per patient olika och kommer att din läkare fastställas fastställd. Om inte din läkare något annat föreskriver är den vanliga dosen:

Vid giardiasis

10 år och äldre: 3x 400 mg per dag under 5 dagar, av
2x 500 mg per dag under 7-10 dagar, eller
2000 mg en gång per dag under 3 dagar.

Barn yngre än 10 år: 1-3 år: 500 mg en gång per dag under 3 dagar
3-7 år: 600 till 800 mg en gång per dag under 3 dagar
7-10 år: 1000 mg en gång per dag under 3 dagar

Alternativ, uttryckt i mg per kg kroppsvikt: 15-40 mg/kg kroppsvikt per dag i 23 doser.

Vid amöbiasis

10 år och äldre:: 400 800 mg 3 gånger per dag under 5-10 dagar dagar

Barn yngre än 10 år: 1-3 år: 100 till 200 mg 3 gånger per dag under 5-10 dagar
3-7 år: 100 till 200 mg 4 gånger per dag under 5-10 dagar
7-10 år: 200 till 400 mg 3 gånger per dag under 5-10 dagar

Alternativt kan de dos uttryckt bli per kroppsvikt
35-50 mg/kg kroppsvikt per dag i 3 doser för 5-10 dagar; maximalt 2400 mg per dag.

Vid allvarliga infektioner

Vuxna och barn över 12 år:

3 x 750 mg per dag eller
3-4 x 500 mg per dag under 7 dagar eller längre, vid behov nödvändigt

Barn äldre än 8 veckor till 12 år: Den vanliga dosen är 20-30 mg/kg

kroppsvikt per dag, givet som en enkel dos eller som 7,5 mg/kg kroppsvikt varje 8 timme. Dosen kan bli ökad till 40 mg/kg kroppsvikt, per dag beroende av allvaret av infektionen. varaktighet av behandlingen är vanligtvis 7 dagar.

Spädbarn yngre än 8 veckor gamla: Den vanlig dos är 15 mg/kg kroppsvikt per dag, givet som en enda dos eller som 7,5 mg/kg kroppsvikt varje 12 timmar.

Vid nyfödda som är födda vid en graviditetslängd kortare än 40 veckor kan metronidazol under den första levnadsveckan ansamlas. Därför måste efter några dagar behandling de mängden metronidazol i blodet kontrolleras kontrollerad.

att förebygga av infektioner som efter en operation kunna uppträda: (tarmoperation (kolonkirurgi)):

Vanligtvis kommer metronidazol 24 timmar före operationen administreras till minst till minst 4 timmar efter stängning av såret , ellerlängre ,beroende på risken för infektion ..

och barn äldre äldre dan 12 år: 1000 mg Metronidazol Aurobindo som engångsdos följt av 500 mg, 3 gånger dagligen under 24 24 till före operationen de operation inte mer får ätas ätas.

Barn yngre än 12 år: 20-30 mg/kg kroppsvikt, ges som en enda dos, 1-2 timme före de ingreppet.

Nyfödda födda vid en graviditetslängd kortare än 40 veckor: 10 mg/kg kroppsvikt, givet som en några dos, före ingreppet ..

Både patienten och partnern måste behandlas . Vuxna och.

Vuxna och barn av 10 år och äldre: 3 x 200 mg per dag under 7 dagar, eller 2 x 400 mg per dag under 5-7 dagar eller 2000 mg som enkel dos.

Barn yngre än 10 år: 15-30 mg/kg kroppsvikt per dag i 2-3 doser under under 7 dagar, eller 40 mg/kg kroppsvikt som några dos. Maximalt 2000 mg per dos.

Vid infektioner med Gardnerella vaginalis Både du och din kvinnliga partner måste bli behandlad.

Vuxna: 1000 mg per dag, i 2 doser, under 7 dagar
Ungdomar upp till 18 år gamla: 2x 400 mg per dag under 5-7 dagar, eller 2000 mg som enkel dos.

Vuxna

Gynekologiska ingrepp:

1000 mg Metronidazol Aurobindo som engångs dos, följt av 500 mg 3 gånger dagligen till före de operationen inte mer får ätas . Efteroperationen så nödvändigt ännu 24 24 3 x 500 mg. Barn

Innan

till de operationen operation blir Metronidazol Aurobindo administreras i kombination med en annan medicin som bakterier bekämpar (neomycin).

Metronidazol Aurobindo tabletter eller suspension (3 gånger dagligen under 2 dagar)	Neomycin tabletter (4 gånger dagligen under 3 dagar)
5 - 12 år: 100 mg	500 mg
1 - 5 år: 5 mg/kg kroppsvikt	250 mg
Yngre än 1 år: 5 mg/kg kroppsvikt	125 mg

Efter operationen fortsätts behandlingen fortsatt ,, vanligtvis med en annan administreringsform.

Utbrott av Helicobacter pylori hos barn:

Som del av en kombinationsbehandling , 20 mg/kg perdag med en en maximum av 500 mg i 2 doser under 7-14 dagar.

Dosering vid angina av Plaut-Vincent:

Dosering som vid allvarliga infektioner.

Din läkare kommer att berätta hur länge du Metronidazol Aurobindo måste använda.

Om din lever inte bra fungerar

Om din lever inte bra fungerar kommer din läkare dos sänka.

Om du märker att denna medicin för stark eller just för lite fungerar, kontakta då din läkare.

Har du för mycket av denna medicin tagit?

Om du för mycket Metronidazol Aurobindo har använt, kontakta då omedelbart läkare din läkare eller apotekare.

Användning av för mycket metronidazol kan leda till bland annat illamående, kräkningar och koordineringsproblem, såsom berusad gång. Efter användning av för mycket metronidazol, behandlas framförallt symtomen behandlas . Det finns inget specifikt motgift för överdosering överdosering.

Har du glömt detta läkemedel i att ta?

Om du en gång en dos Metronidazol Aurobindo glömmes, kan du denna ändå ta, förutom när det nästan dags är för nästa dos .. då bara det gamla gamla schema.

Har du andra frågor om användningen av denna medicin ? Kontakta då din läkare eller apotekare ..

4. biverkningar Som

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha. Inte alla får det att göra.

Sällan (förekommer för vid mindre än 1 av 1000 användare):

Allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi).

Mycket sällan (förekommer hos mindre än 1 av 10 000): mindre än 1 av 10.000):

mycket allvarlig blodsjukdom genom en brist på vita blodkroppar med plötslig hög feber, svår halsont och sår i munnen (agranulocytos).

En blodsjukdom på grund av en brist på vita blodkroppar, vilket gör dig mer känslig för infektioner (neutropeni).Brist

på till blodplättar, vilket gör du känsligare är för blåmärken.

En blodsjukdom som visar sig i en ökad känslighet för infektioner (övergående leukopeni).

Denna avvikelse försvinner igen när du slutar med användningen av Metronidazol Aurobindo.

En sjukdom i hjärnan med till exempel förvirring och kramper (encefalopati), en sjukdom i hjärnan med till exempel koordineringsproblem, talsvårigheter, svårigheter med gå, kramper av ögonloben och skakningar (cerebellärt syndrom). Dessa biverkningar kan återhämta sig efter att avbryta av behandlingen.

En allvarlig inflammation av tjock tarm med som symtom feber och allvarlig, ihållande eller blodig diarré (pseudomembranös kolit).

Förhöjd mängd leverenzym i blodet. Skada på levern, som kan förekomma med gulsot (gulfärgning av huden eller av ögon).

Störningar i kontroll över handlingar och beteende (psykotiska störningar).

Inte känd (kan med de tillgängliga uppgifterna inte bli bestämd):

Huvudvärk, sömnhet, yrsel, koordineringsstörningar.

En bestämd form av hjärnhinneinflammation, som vanligtvis blir orsakad genom en virus (aseptisk meningit).

Nervsjukdom (neuropati) eller anfall som liknar epilepsi ..

i synen , såsom, som dubbelseende, närsynthet, suddig syn, inte bra skarp kunna se eller förändringar i synen av färger.

Sjukdom av inflammation av synnerven.

Skada eller förlust av hörseln, tinnitus.

Mag-tarmbesvär såsom smärta i övre buken, illamående, kräkningar och diarré.

Inflammation av munslemhinnan, belagd tunga, missfärgning av tungan (möjligt som följd av en candida-infektion).

Smakstörningar, såsom en obehaglig metallsmak.

Inflammation av bukspottkörteln med som symtom svår smärta i övre buken strålade mot ryggen och illamående och kräkningar.

Brist på aptit (anorexi).

Mörkfärgning av din urin.

Muskelvärk, ledvärk.

Plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor av till exempel halsen eller tungan, andningssvårigheter eller klåda och hudutslag, ofta som allergisk reaktion (angioneurotiskt ödem).

Flyktig hudutslag vid vissa infektionssjukdomar, klåda, rodnad, hudutslag med intensiv klåda och bildning av knölar (nässelutslag).

Skarp avgränsad område av huden med rodnad och ibland med blåsor ,som uppstår genom överkänslighet mot läkemedlet det läkemedel (fixed-drug eruption).

Allvarlig, plötslig allergisk reaktion med hög feber, blåsor på huden och fjällning av huden (toxisk epidermal nekrolys).

Allvarlig allergisk reaktion med hög feber, blåsor på huden, ledvärk och6goninflammation (Stevens-Johnson- syndrom).Allvarlig

Allvarlig hudutslag med plötslig utbrott av tiotals till hundratals 1 till 2 mm stora blåsor fyllda med pus (akut generaliserad exantematös pustulos).

Leversvikt, varvid levertransplantation nödvändig var. Detta har rapporterats hos patienter som behandlades med med metronidazol tillsammans med ett annat antibiotikum.

Akut leversvikt hos patienter med syndromet Cockayne (se avsnitt 2 "När bör du vara försiktig med detta läkemedel ?").Observationer

av från saker som inte inte finns (hallucinationer), förvirring, nedstämd sinnesstämning. Feber.

Yrsel (vertigo). Hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar så kalladeQT- QT-förlängning som kan bli observerad på ett EKG), särskilt när metronidazol användes med andra läkemedel som hjärtrytmen kan störas störa.

De frekvens, karaktär och allvarlighetsgrad av biverkningar är hos barn detsamma som hos vuxna.

Det rapportering av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller även för biverkningar som inte i denna bipacksedel står. Du kan biverkningar också rapportera via Nederländska Biverknings Centrum Lareb, www.lareb.nl. Genom biverkningar rapportera ,hjälp ni oss att mer mer information att få om säkerheten av denna medicin.

5. Hur förvarar du denna medicin?

Utanför synhåll och räckhåll av barn hålla.

Det finns ingen speciell förvaringstemperatur nödvändig. Förvara i den ursprungliga förpackningen.

Använd denna medicin inte mer efter den sista hållbarhetsdatum. Den finns du på etiketten, lådan eller flaskan . Där ståren månad och ett år . Den. De sista dag av den månad är sista hållbarhetsdatum.

Spola mediciner inte ner i handfatet eller toaletten och släng dem inte i soptunna. Fråga din apotekare vad du ska göra med mediciner ska göra som du inte längre använder. Om du mediciner på rätt sätt bortskaffar ,, förstöras de på ett korrekt sätt förstörda och kommer de inte i miljön hamnar.

6. Innehåll av förpackningen och övrig information

Vilka ämnen finns det i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är metronidazol. En tablett innehåller 250 eller 500 mg metronidazol.

De andra ämnen i denna medicin är kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylmetylcellulosa, titandioxid (E171) och makrogol 400.

Hur ser Metronidazol Aurobindo ut och vad finns i en förpackning?

Metronidazol Aurobindo 250 mg är vita, avrundade överdragna tablett med en skåra.

Metronidazol Aurobindo 500 mg är vita, avrundade överdragna tablett med en skåra med bokstäverna "CLJ". Den brytningslinje är inte avsedd att dela tablett i två lika doser.

Förpackningar

PVC/Al

blisterförpackning : 20 eller 30stycken ..

tablettflaskor med med en HDPE/LDPE eller HDPE-kork: 100 stycken.

Det är möjligt att inte alla nämnda förpackningsstorlekar i handeln sätts ut.

Innehavare av tillståndet för i handel sätta och tillverkare
Registreringsinnehavare
Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Tillverkare
Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portugal

Registrerad inskriven
Metronidazol Aurobindo 250 mg, filmdragerade tabletter RVG 07074.
Metronidazol Aurobindo 500 mg, filmdragerade tabletter RVG 08652.

Denna bipacksedel är senast den sist godkänd i november 2024

Transtoyou