

## KASUTUSJUHEND: TEAVE PATSIENDILE

### Metronidazol-ratiopharm® 400 mg Tabletid

#### Metronidasool

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi, enne kui alustate selle ravimi võtmist alustate, sest sest nad sisaldab olulist teavet.

- Hoidke seda pakendi infolehte alles. Võib-olla soovite te seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui te lisaküsimusi küsimusi on, pöörduge te oma arsti või apteekri poole. See ravim
- on teile isiklikult välja kirjutatud välja kirjutatud. andke seda kolmandatele isikutele Kolmas edasi. See võib teistele inimestele kahjustada, isegi kui need samad kaebused on nagu teil. Kui te
- kõrvaltoimeid täheldate, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, misei ole selles pakendi infolehes loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles pakendi infolehes seisab

1. Mis on Metronidazol-ratiopharm® ja milleks kasutatakse seda rakendatakse?
2. Mida peaksite Te enne võtmist teadma kohta Metronidazol-ratiopharm® tähele panna?
3. Kuidas on Metronidazol-ratiopharm® kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas on Metronidazol-ratiopharm® säilitada?
6. Sisu der pakend ja täiendav teave

1. Mis on Metronidazol-ratiopharm® ja milleks kasutatakse seda rakendatakse?

Metronidazol-ratiopharm® on üks Ravim vastu Parasiidid (Tõprad): vastu Algloomad (Protozoad) ja ilma Hapnikuta elavad (anaeroobsed) Bakterid.

Metronidazol-ratiopharm® kasutatakse juures

- Trichomoniasis juures
- bakteriaalne vaginosis ( AminkolpiitAminkolpiitmittespetsiifiline kolpiit )juures
- amebiasis juures
- lambiasis (Giardiaas) juures
- infektsioonid Infektsioonid (Ülekanded, Nakkused) koos osalemine bakterite, misilma hapnikuta elavad võivad ( anaeroobid);eriti infektsioonid, mis on põhjustatud, mis on põhjustatud naissoost suguelundid, alates seedetrakt samuti kõrva-nina-kurgu ja hamba-suu-lõualuu piirkond pärinevad.
- juures infektsioonid koos Helicobacter pylori ülemises seedetraktis piirkonnasennetatavaks
- kasutamiseks eesmärgil Ravi kuni kaitse ees infektsioonide juures operatiivsete sekkumiste naiste suguelundite piirkonnas ja maos jasoolestikus

Selgitused:

Trichomoniasis on üks Haigus, mida põhjustab üks viburloom, Trichomonas vaginalis, põhjustatud on. See esineb peamiselt kuni põletikud naise vagiina ja mehe kusiti. Levik toimub peaaegu kiire ainult läbi seksuaalvahekord. Tuvastamine haiguse haigus tehakse üks sekreedi tampoon valmistatud.

Bakteriaalse vaginiidi puhul on bakteriaalne bakteriaalne koostis, mis loomulikult sees naissoost tupes esineb, muutub. See esineb kuni ühe põletikuni koos ühe kalasarnase lõhnaga. Aminkolpiit ja mittespetsiifiline Kolpiit on teised nimetused bakteriaalse vaginosisi jaoks..

( amööbne düsenteeria)on haigus , mida põhjustab üksjuurjalgne ürgelukas , Entamoeba histolytica, Algloom, Entamoeba histolytica, põhjustab on. See tekib enamasti kuni kõhuvalud ja raske kõhulahtisus läbi ühe infektsioon kõhus seedetraktis. Lisaks sellele võib see kuni Nakatumine teiste organite esineb, kusjuures haigus ravimata sageli surmav on . Amööbse düsenteeriatuvastamiseks uuritakse väljaheiteid . saab tool uuritud.

Lambliasis (Giardiaas) on haigus , mida põhjustab üks piitsloom, Giardia lamblia, põhjustatud . Läbiinfektsiooni seedetraktis tekib peamiselt vesine kõhulahtisus see peamiselt kuni vesilahus Kõhulahtisus. Giardia lamblia tuvastatakse väljaheites Väljaheide kindlaks.

2. Mida peaksite Teie enne der Metronidazol-ratiopharm® võtmistarvestama ?Metronidazol-ratiopharm

Metronidazol-ratiopharm<sup>ei tohi</sup> tohib mitte võetud olema

- kui Te allergiline vastu Metronidasool, muud 5-nitroimidasoolid (rühm, kuhu kuulub ka Metronidasool )või üks koostisosadest, mis on sisse Jaotis 6. nimetatud muud koostisosad selle ravimi on. Erand on ,kui on eluohtlik infektsioon olemas ja teised ravimid Ravim toimeta on.

Hoiatused ja Ettevaatusabinõud

Palun rääkige oma arstiga või apteekriga enne kui võtate Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>ravimit</sup> ..

ettevaatus Ettevaatust juures der manustamine alates Metronidazol-ratiopharm® on vajalik, kui teil on verehäired ja vereloome ning haigus aju, seljaaju ja närvid kannatama. Jaga seda oma arstiga koos.

Trichomoniasis korral on sageli seksuaalpartner samuti Trichomonase kandja, isegi kui siiani pole haiguslikud muutused täheldatud olema peksid. Selleks, et vastastikune nakkus vältida ,on vajalik , etseksuaalpartner samuti uuritud saaks olema . saab ja vajaduse korral koos ravitud saab. Peale seksuaalvahekord tuleks ajal ravi ravi loobuda tuleb.

Juhtumid koos raske hepatotoksilisus/ägeda maksapuudulikkus sealhulgas juhud koos surmaga lõppenud on täheldatud patsientidel koos Cockayne'i sündroomigaravimite puhul mis sisaldavadmetronidasooli Metronidasool Kui teil on Cockayne'iKui teil on Cockayne'i sündroom,Sündroom kannatama, peaks Teie arst ajal ravi ravi koos Metronidasool ja järgneb pärast ravi ka ravi samuti Teie maksafunktsioon sageli jälgima.

Teavitage Teie arsti koheselt ja lõpetage Metronidazoli kasutamine , kui teil tekivad järgmised sümptomid kui teil on kõhuvalu Sümptomid arendama:

- Kõhuvalu, Anoreksia, iiveldus, oksendamine, palavik, halb enesetunne, väsimus, kollatõbi, tume uriin, helekollane või valge väljaheide või sügelus.

Patsiendid koos piiratud maksafunktsiooniga

Kui teil on raske maksakahjustus kannatate ,rääkige palun enne võtmist ravimi Metronidazol-ratiopharm® koos<sup>oma</sup> arstiga Teie Arst.

Manustamine koos Metronidazol-ratiopharm® koos teiste ravimitega Ravimid

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate teisi ravimeid kasutatekasutama hiljuti teised ravimid võtnud kasutanud on või kavatsevad teised ravimid võttakasutada.

Millised teised ravimid mõjutada die toimet alates Metronidazol-ratiopharm® ?

Barbituraadid, fenütoiin

Toime vähenemine Toimivuse vähenemine Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>esineb</sup> astub kui juures manustatakse barbituraate (ravimid koos Toimeained nagu Hexobarbitaal või Fenobarbitaal, mis vastu unetuse ja krambihoogude samuti narkoosi jaoks kasutatakse ) jajuures manustamisel ravimid koos Fenütoiin ( FenütoiinToimeaine vastu krambihoogude).

Tsimetidiin

Ravim koos tsimetidiiniga (toimeaine vastu mao limaskesta põletik [gastrit] samuti vastu mao- ja soolehaavandid) võivad väga harva eritumist Metronidasool mõjutada ja seega toimet / kõrvaltoimeidMetronidazol-ratiopharmKõrvaltoimed tugevdada Metronidazol-ratiopharm<sup>Disulfiraam</sup> Samaaegne.

alkoholivastase

ravimi samaaegne koos Alkoholi võõrutusravim Disulfiraam võib põhjustada segasusseisundeid ja teatud vaimseid häireid (psühhoose) põhjustada.

Silymariin/Silibiniin

Samaaegsel manustamisel Silymariin/Silibiniin (ravim maksa Ravi alates maksahaiguste ja seedehäirete) on toime Toime Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>vähenevad</sup> ..

Diosmiin

(ravim (Ravim raviks Ravi alates venoosne jalahaigused ja hemorroidid) võib die metronidasoolikontsentratsioon veres Veri suurendada ja seega toimet2Fkõrvaltoimeid alates Metronidazol-ratiopharm® tugevdada.

Millised teised ravimid mõjutavad nende toimet Metronidazol-ratiopharm® poolt?

Verehüübimisvastasedvahendid

Patsiendid , kes

onteatud ravimitega ravitud Ravimid ravitud saavad, mis mis vere hüübimist pidurdavad (antikoagulandid kumariini-tüüpi Kumariini tüüp nagu nt fenprokumoon , varfariin),peavad vajadusel uuesti kohandatud saama ,, sest läbi Metronidazol-ratiopharm® see vere hüübimist takistav toime nende ravimite tugevneb on.

Busulfaan

Toksilisus Busulfaani (kemoterapeutikum)võibolla märkimisväärselt oluliselt tugevdatud saama.

Tsüklosporiin

Kaasneva manustamise korral tsüklosporiiniga (üks ravim, mis immuunvastust pärsib või nõrgestab) ja Metronidazol-ratiopharm® võib vere tase tsüklosporiin suurenenud olla. Laske seetõttu oma tsüklosporiini ja kreatiniini sisaldust veres sageli kontrollida.

5-fluorouratsiil

Toksilisus 5-fluorouratsiili 5-Fluorouratsiil)üks keemiaravim kasutatakse raviks kasvajate puhul tõuseb ennast, kuna koos samaaegse manustamisega Metronidazolratiopharm® die eritumine 5-Fluorouratsiili vähenenud on.

#### Liitium

Ravimite manustamisel ravimid koos liitiumiga (ravim teatud vormide ravi eest eufooriline või masendunud meeleolu [maniakaal-depressiivsed seisundid]) on ettevaatus vajalik, sest pärast seda tõus des liitiumi veres Veri täheldatud oli (oht liitiumimürgitusele värinaga ja krampidega ). Laskeseetõttu oma liitiumi veretaset kreatiniini Kreatiniin ja Elektrolüüdid kontrollima.

#### Takroliimus

Ravimi samaaegne manustamine koos Metronidazol-ratiopharm® viib kuni tõusuni veres takroliimuse tasemes (vahend veretaseme takroliimuse (ravim mõjutamiseks immuunsüsteemi Immunsystems). Laske seetõttu oma Takroliimuse-veretase ja neerufunktsioon sageli kontrollida.

#### Amiodaroon

Samaaegne kasutamine koos Metronidasooliga ja Amiodarooniga (vahend südame jaoks Ravi alates südamerütmihäired) võib viia ühe mõjutamiseni der südamefunktsioon viima. Seetõttu peaks die südamefunktsioon regulaarselt EKG-s EKG jälgima olema. Pöörduge arsti poole, niipea kui te märke südamerütmihäirest Südame rütmihäire nagu peapööritus Peapööritustuntav südame löögisageduse muutus või lühiajaline minestus täheldate . märkama.

#### Mykofenolaatmofetiil

Kaasneva samaaegse manustamise koos antibiootikumidega võib die kättesaadavus alates mykofenolaatmofetiil (ravim mis pärsib immuunsüsteemi toimet Immuunsüsteem alla surutud) kehas Keha vähenenud olla. Seetõttu on soovitatav samaaegne sage jälgimine läbi laborikontrollide soovitatav.

Manustamine alates Metronidazol-ratiopharm® koos alkoholiga Alkohol

Der tarbimine von alkoholi on ravi ajal metronidasooliga ja vähemalt 48 tundi 48 seda vältida , kuna muiduvõivad tekkida talumatusnähud esinevad võivad, nagu nt nahapunetus pea piirkonnas ja kael ning kaela samuti iiveldus, oksendamine, peavalu ja pearinglus.

Rasedus, Imetamine ja Reproduktiivvõime

Kui te rase olete või imetate, või kui te kahtlustate, rase olevat või kavatsete kavatsema, rase saama ,küsige enne selle ravimi võtmist oma arstilt või apteekrilt nõu. Rasedus Kui te

olete

rase , on, saab Teid Teie arst ainult siis koos Metronidazol-ratiopharm® ravidada, kui ta peab seda absoluutselt vajalikuks peab.

Imetamine

Metronidazol läheb sisse rinnapiim üle. Seetõttu peaksite Te ajal ühe ravi koos Metronidazol-ratiopharm® ja veel vähemalt 2–3 päeva pärast imetamise rinnaga toitmise katkestama.

## Reproduktiivsus

Loomkatsed näitavad ainult võimalikku negatiivset mõju Mõju Metronidasool Metronidasool meessuguelunditele , kuikõrged annused manustati Annused anti saadi, mis kaugel üle maksimaalse soovitatava annuse inimesele on.

## Autojuhtimine ja Võime masinate käsitlemiseks Masinate

eriti ravi alguses võib Metronidazol-ratiopharm® Teie reaktsioonivõime halvendada. Te võite siis peal ootamatutele ja äkilistele sündmustele mitte enam kiiresti ja täpselt piisavalt reageerida, nii et nt. Võime osalemiseks aktiivselt osaleda olen liikluses või masinate käsitlemiseks masinatest või see töötamine ilma kindla toeta väheneb . See kehtib. See kehtib tugevdatud mõõtmel sisse koostoime koos alkoholiga.

Metronidazol-ratiopharm® sisaldab laktoosi.

Palun võtke Teie Metronidazol-ratiopharm® alles pärast konsulteerimist koos Teie arst üks, kui teile teada on, et te kannatate teatud talumatuse vastu teatud suhkru all.

### 3. Kuidas on Metronidazol-ratiopharm® võtma?

Võtke seda ravimit alati täpselt vastavalt kokkuleppele oma arstiga sisse .. oma arstilt kui oma arstilt või apteeker järgi, kui Te ei kindel olete ..

#### Annustamine

sõltub haiguse tõsidusest ja tüübist järgi ja raskusastmest haiguse Haigus.

Järgmised andmed on keskmised väärtused ja kehtivad ainult ,kui Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>ei ole</sup> teie arsti poolt teisiti määratud ei ole ..

Die igapäevane annus võib ½ kuni maksimaalselt 5 tabletti Metronidazol-ratiopharm® (vastavalt 200-2.000 mg metronidasool) olla. Tavaliselt võetakse die Tabletid 2- kuni 3 korda päevas võtta.

Tüsistusteta Infektsioonid (Nakkused, mis ravi enamasti kiiresti ja ilma tagajärgedeta paranevad )Juures

Kell ühe madala päevase annuse 1½ tabletti (vastavalt 600 mg metronidasooli) või vähem on mitmepäevane ravi (5-7 päeva) vajalik nõutav.

Kell suurem annus võtmine 2½-5 tabletti (vastavalt 1.000-2.000 mg Metronidasool) päevas võib lühike ravikuur (13 päeva) piisav olla. Bakteriaalne

vaginoos Vaginoos ja trihhomonoos juures täiskasvanutel ravi läbi ühekordse annusena 5 tabletti (vastavalt 2.000 mg metronidasool) võimalik.

#### Alternatiivina juures

- bakteriaalne vaginiit  
2½ Tabletid (vastavalt 1.000 mg Metronidasool) päevas (jagatuna 2-3 üksikannuseks) kokku 7 päeva. Trihhomonoos (
- eritipüsivates juhtudel kangekaeliste 2-2½-(4)tabletti

2-2½-(4) Tabletid (vastavalt 800-1.000-[1.600] mg Metronidasool) päevas (jagatud 2-3 üksikannuseks) kokku 7 päeva. Et

vastastikust nakatumist juures ühe trihhomonoosi vältida kuni vältida, on see vajalik, et seksuaalpartner samuti uuritakse ja vajadusel ravitakse metronidasooli sisaldava preparaadiga ravitakse ( ravitakse ravitakse (vt 2. „Hoiatused ja Ettevaatusabinõud“).

Keerulised Infektsioonid (Nakkused, mis ka hoolika ravi korral tihti raskesti paranevad) kuidas

- põletik emaka limaskest (endometriit)
- põletik munajuhade või munasarjade (adnexiit) põletikud
- hammaste, suu ja lõualuu piirkonnas põletikud Vald kond kõhukelmepõletik
- Põletikud ma Vald kond kõri, nina ja kõrvad
- Kõhukelmepõletik (Peritoniit) ja
- Mädapaiseid (Abstsessid) kõhuõõnes Igapäevane

annus alguses 4-5 tabletti ( vastavalt 1.600-2.000 mg Metronidasool ) jajärgnevatel päevadel järgnevatel päevadel päeva 2½ tabletti (vastavalt 1.000 mg Metronidasool) 5-7 päeva. Ainult erandjuhtudel tuleks annust suurendada 3½ tabletti (vastavalt 1.400 mg Metronidasool) päevas suurendada võib.

Im Raames ühe kombinatsioonravi jaoks likvideerimine Helicobacter pylori on enne ravi algust ametlikud terapeutilised soovitusel järgida . Ennetav.

Die ennetav Ravi peaks peal üks ühekordne annus 1½ kuni maksimaalselt 5 tabletti (vastavalt 600-2.000 mg metronidasool) piirduma jääma.

Kasutamine lastel ja noorukitel Infektsioonid

Infektsioonid, mida läbi anaeroobsed bakterid põhjustatud on

Lapsed üle 8 nädala kuni 12 aastat: 20 mg kuni 30 mg/kg kehakaalu kohta üks kord päevas ühekordse annusena või jagatud 7,5 mg/kg iga 8 tunni järel Tundi.

Sõltuvalt raskusastmest võib annust suurendada 40 mg/kg päevas kuni 40 mg/kg päevas suurendada. Ravi kestus on tavaliselt 7 päeva. Lapsed alla 7 päeva. Lapsed nädala 8 jaoks see Vanuserühm on üks ravim koos madalama tugevusega vajalik.

Bakteriaalne vaginosis

Noorukid: kaks korda päevas 1 tablett (vastavalt kaks korda päevas 400 mg Metronidasool) üle 5 kuni 7 päeva või 5 Tabletid (vastavalt 2.000 mg Metronidasool) ühekordne annus ..

Profülaktika Lapsed

Lapsed alla 12 aasta: ühekordselt 20 mg kuni 30 mg/kg kehakaalu kohta üks kuni kaks tundi enne protseduuri ..

alla 40. rasedusnädala : Selle vanuserühma jaoks Vanuserühm on üks ravim koos väiksema tugevusega vajalik

Urogenitaalne trihhomonoos

Noorukid: 5 tabletti (vastavalt 2.000 mg metronidasool) kui ühekordne annus või kolm korda päevas ½ tablett (vastavalt kolm korda päevas 200 mg Metronidasool) üle 7 päeva või kaks korda päevas 1 tablett (vastavalt kaks korda päevas 400 mg Metronidasool) üle 5 kuni 7 päeva.

Lapsed alla 10 aasta: 40 mg/kg kehakaalu kohta ühekordse annusena (maks. 2.000 mg Metronidasool Metronidasoolvõi 7 päeva jooksul 15 mg kuni 30 mg/kg kehakaalu kohta päevas, jagatuna jagatud peal kaks kuni kolm annust päevas. See ei tohi 2.000 mg iga annuse mitte ületada ..

#### (Giardiaas) Lapsed

üle 10 aasta: 5 Tabletti Tabletid (vastavalt 2.000 mg Metronidasool) kord päevas üle 3 päeva või 1 Tablett (vastavalt 400 mg Metronidasool) kolm korda päevas üle 5 päeva.

Lapsed vanuses 7 kuni 10 aastat: 2½ Tabletti (vastavalt 1.000 mg Metronidasool) üks kord päevas üle 3 päeva.

Lapsed vanuses 3 kuni 7 aastat: 1½-2 Tabletti (vastavalt 600 mg kuni 800 mg Metronidasool) üks kord päevas üle 3 päeva. Lapsed vanuses 1 kuni 3 aastat: sellele vanuserühmale on ravim vajalik madalama tugevusega ravim vajalik.

Alternatiivselt väljendatud: Lapsed saavad 15 mg kuni 40 mg/kg kehakaalu kohta päevas, jagatud peal kahe kuni kolme annuse päevas.

#### Amebiaas

Lapsed üle 10 aasta: 1-2 tabletti (vastavalt 400 mg kuni 800 mg metronidasool) kolm korda päevas üle 5 kuni 10 päeva.

Lapsed vanuses 7 kuni 10 aastat: ½-1 tablett (vastavalt 200 mg kuni 400 mg metronidasool) kolm korda päevas üle 5 kuni 10 päeva.

Lapsed vanuses 3 kuni 7 aastat: ½ tablett (vastavalt 200 mg metronidasool) neli korda päevas üle 5 kuni 10 päeva.

Lapsed vanuses 1 kuni 3 aastat: ½ tablett (vastavalt 200 mg metronidasool) kolm korda päevas üle 5 kuni 10 päeva.

Alternatiivina väljendatud: Lapsed saavad 35-50 mg/kg Kehakaal päevas, jagatud kolme annuse päevas ,üle 5 kuni 10 päeva. Ei tohi ületada 2 400 mg päevas ületatud Kombinatsioonravi.

likvideerimiseks . Im Helicobacter pylori'lt

Ma olen raames ühe kombinatsioonravi antakse 20 mg/kg kehakaalu päevas, jagatud kaheks annuseks päevas (maks. kaks korda 500 mg/päev), üle 7 kuni 14 päeva kasutatakse . Enneravi algust Ravi algus on ametlikud terapeutilised soovitusel järgida ..

alla 6 aasta ei ole tabletid , midanärimata võtta tuleb , ei olesobivad ..

#### Tüüp Kasutamine

Võtke tablett tabletid tervelt koos piisava vedelikuga (nt 1 klaas vett) söögi ajal söömist või vahetult pärast sisse. Tablett tablett võib sisse sama Dosed jagatud saavad.

#### Kasutamise kestus Kasutamine

Üle kasutamise kestuse otsustab teie arst. Hoiatus

#### Hoiatus:

Metronidazol-ratiopharm® koos Metronidazol-ratiopharm® või teise nitroimidazooli sisaldava ravimi ei tohi reeglina 10 päeva ületada reeglina mitte 10 päeva See. tohib ainult üksikjuhtudel eriti rangete näidustuste korral (s.t. rangem Näidustuse määramine (s.t. pärast hoolikat kaalumist läbi Teie arst juures olemasolu tõsiste põhjuste) ületatud saada. Ravi ravi peaks

võimalikult harva korratud saada. Die Piirang der ravi kestus on vajalik, sest võib kahjustus inimese sugurakkudele ( võimalikkahjustus geneetilisele materjalile ) ei saa välistada) mitte välistama jätab ja sest sisse katsejadad koos loomadega üks suurenemine kohta teatud kasvavad (kasvavad) nähti oli.

Kui teil on üks suurem kogus Metronidazol-ratiopharm® võtnud olete, kui te pidite

Kui te ühekordse annuse Metronidazol-ratiopharm® kogemata<sup>kahekordselt</sup> võtate , on sellel tagajärjed. ei mõju edasisele kasutamisele võtmisele, s.t. te võtate Metronidazol-ratiopharm® pärast nii nagu, nagu annustamisjuhendis Annustamisjuhend.

võtmine oluliselt oluliselt liiga kõrge ravimikogused võib see põhjustada iiveldust, oksendamist, suurenenud reflekse, ataksiat (häire korrapärasel liikumises ),kiirenenud kiirendatud Südamelöök, Hingeldus ja Desorientatsioon (Aja ja koha tundmatus) esinevad ..

Vastumürk ei ole teada . Pärast meditsiinilist ravi sümptomite leevendamiseks der Kaebused on koos ühe täieliku tervenemise pärast mõne päeva arvestada ..

manustamise Manustamine Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>unustasite</sup> võtnud Ärge

võtke mitte Ärge võtke kahekordne Kogus üks, kui te eelneva võtmise unustanud olete. Kui te oma eksimuse veel samal päeval märkasite ,, võtke te liiga vähe võetud ravimikogus veel samal päeval hiljem sisse ..

te oma eksimust alles järgmisel päeval, siis Tere, nii võib see vajalik olla, et ravi ühe päeva võrra pikendada .. oma sellisel juhul palun oma arstiga . Kui te

unustate Manustamine alates Metronidazol-ratiopharm® katkestada

Kui te ravi enneaegselt lõpetate või seda ajutiselt katkestate, seate ohtu ravitulemuse!

Ebameeldivate korral Kõrvaltoimed on Teie arst koos Teiega arutama, millised vastumeetmed on selleks olemas ja kas muud ravimid on Teile sobivad võivad.

Kui Te täiendavad küsimused seoses manustamisega selle ravimi on, pöörduge Teie poole oma arsti või apteekri poole.

#### 4. Millised kõrvaltoimed on võimalik?

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim kõrvaltoimeid omada, mis kuid ei igapäev esine peavad ..

kõrvaltoimed võivad olla tõsised olema. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil ilmneb üks järgmistest kõrvaltoimetest : Aeg-ajalt Kõrvaltoimed võib:

esineda (kuni kuni kuni 1 100-st ravitud puudutavad)

- allergiline reaktsioon, sageli kaasneb koos vererõhu langus, pearinglus, iiveldus ja võib-olla. hingamisraskused (anafülaktiline reaktsioon)

- limaskestast turse im piirkonnas hingamisteede teede koos hingamisraskusega (angioneurotiline ödeem)
  - häired koostöös liikumiste liigutuste ( ataksia),närvihäired Närvihäired (perifeersed neuropaatiad) ja krambihood
- Kui teil on tuimus Tuimussurin või kihelus kätes ja jalgades tunnete ,peate kohe oma arstiga ühendust võtma Arst teavitama, ka kui need nähtused teil ainult kergel kujul esinevad !Väga

harva ( võibkuni 1 10 000-st ravitavast Ravitud mõjutama)

- tugev vähenenud arv teatud valgete vereliblede (agranulotsütoos), vereliistakute (trombotsütopeenia) või. kõigi vereliblede Vererakk (Pantsütopeenia). Haigustunnused on Nõrkus, suurenenud Vastuvõtlikkus infektsioonidele ja suurenenud verevalumid . Tulebnendel juhtudel kiiresti teha vereanalüüs läbi viia läbi viidud saavad.
- rasked juhud ühest allergilisest reaktsioonist (anafülaktiline šokk). Kui see juhtub koos vereringe rikkega teadvusehäiretega Teadvusehäiredkülmavärinad Külm higi samuti kahvatu ja külmad käed ja jalad tuleb kohe arst kutsuda appi . Kuni temasaabumiseni on mille Saabumine on ülakeha patsient tasane haige lamama ja tema jalad kõrgele asetada .Vältimaks jahtumist on patsient kaetud tekiga haige koos ühe tekiga soojas kuni hoidma. Arst alustab tavalisi vastavaid hädaabimeetmeid rakendama ..
- põletikulised haigused aju ( entsefalopaatia näitekssegadus näiteks segadus segadus, palavik, peavalu, hallutsinatsioonid, halvatus, valgustundlikkus, häired nägemis- ja liikumisvõime, kaelajäikus), haigused väikeaju koos nt. nt. Kõne-, Liikumis- ja Käimishäired, Värisemine, Silmatõmbus (Nüstagn). Need Ilmingud võivad taanduda pärast ravi lõppu taanduma.
- of der Kõhunääre (Pankreatiit), mis viib tugevate valudeni ülakõhus , iivelduseni jaoksendamiseni põhjustab Esinemine
- raske püsiva kõhulahtisuse ajal või pärast sisse esimese nädala pärast ravi ravi (pseudomembranoosne enterokoliit). See läbi ühe antibiootikumravi põhjustatud soolehaigus võib eluohtlik olla ja nõuab ühe kohene ja asjakohane meditsiiniline ravi. Ravimid, mis soole liikumist (peristaltika) pidurdavad, ei tohi võtta võetud Pole

teada ( (Sagedus peal Alus der saadaval Andmed mitte hinnatav)

- mitte bakteriaalne põhjustatud Meningiit (aseptiline Meningiit)
- Haigus/Põletik der Nägemisnärv
- Juures Patsientidel, kes samaaegselt koos muude antibiootikumidega raviti ,ilmnesid juhud maksapuudulikkusest , milles maksasiirdamine oli vajalik nendes üks maksasiirdamine vajalik oli.
- äge põletikuline haigus naha või limaskestast (Erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, fikseeritud ravimlööve); osaliselt koos Häire üldseisundis , palavik javalulik villide teke Äge
- maksapuudulikkus patsientidel Cockayne'i sündroomiga ( vt2. „Mida peaksitetegema enne kui Teie enne der Manustamine alates Metronidazol-ratiopharm® jälgida?“, „Hoiatused ja Ettevaatusabinõud“)

Muud kõrvaltoimed

Rääkige palun oma arstiga umbes üle die edasi ravi, kui järgmised kõrvaltoimed ilmnevad:

Sagedased (võivad kuni 1-st 10-st ravitavast mõjutada)

maitsehäired (nt. metalliline maitse), kibe röhitsemine, keelekatud, põletikud suus (glossiit, stomatiit), kõhuvalu , iiveldus, oksendamine ,isutus Isutuskõhulahtisus tumenemine  
Tumenemine des Uriin (tingitud läbi ühe ainevahetusprodukti, ilma haigusväärtuseta)

Aeg-ajalt (võib kuni 1 kuni 100 ravitavast puudutada )Infektsioonid

- Infektsioonid koos ühe nahaseen (nt Candida albicans) suguelundite piirkonnas
- Vähenemine alates valgete vereliblede (leukopeenia ja granulotsütopeenias). Pikaajalise kasutamise korral on seetõttu regulaarsed Vereanalüüside kontrollid läbi viia.
- põletikuline punetus, allergiline nohu ja allergiline silma sidekesta põletik , nõgestõbi, ravimipalavik
- peavalu, pearinglus
- unisus, unetus, Meeltepettus (Hallutsinatsioon), Segasusseisundid, Ärrituvus, kurb Meeleolu langus (Depressioon)
- enamasti mööduvad Nägemishäired nagu Kahelinägemine ja Lühinägelikkus
- Häired maksa funktsioon, tõus erinevate maksaensüümide väärtuste
- nahareaktsioonid (nt nahalööve koos villide- ja nõgestõve [urtikaarne eksanteem], pustuloosne lööve, sügelus, hoogudena nahapunetus koos kuumatundega [Flush])
- valulik urineerimine (düsuuria), põiepõletik (tsüstiit) ja tahtmatu uriinieritus ( uriinipidamatusUriinipidamatusnõrkustunne
- Nõrkustunne

Väga harva (võib kuni 1 10 000-st ravitavast puudutada)

- Kollatõbi, maksapõletik koos ummistusega sapivoolu Lihavalu
- Lihavaluliigesvalu Liigesvalu

Ei teada (Sagedus põhineb andmetel ei ole saadaval andmed hinnatav hinnatavKuulmislangu

- Kuulmislangukuulmiskaotus,kõrvahelin või - -tinnitus (Tinnitus)

Lapsed ja Noorukid

Esinemissagedus, tüüp ja Raskusaste kõrvaltoimete on lastel ja täiskasvanutel sama Täiskasvanutele Kõrvaltoimete.

Kui teil esineb kõrvaltoimeid Kõrvaltoimete

Kui teil kõrvaltoimeid tähele panema, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mis ei oleselles pakendi infolehes märgitud . Tevõite saada Kõrvaltoimed ka otse selle Föderaalne Instituut ravimite ja meditsiiniseadmete, osakond Farmakovigileerimine, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, veebisait: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) teatada. Teavitades te kõrvaltoimetest ,saate te Teie selleni aitama, et rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta kättesaadavaks tehtud saaks ..

5. tuleb Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharmsäilitada säilitada?

Hoida seda ravimit lastele kättesaamatus kohas.

Te ei tohi seda ravimit pärast pakendil oleva karbi ja blisterpakendite kuupäeva „Kõlblik kuni“ „Kasuta. kuni“ märgitud aegumiskuupäeva mitte enam kasutada. Aegumiskuupäev viitab sellele kuu viimasele päevale märgitud kuus.

Mitte üle 30 °C hoida.

## 6. Sisu pakendi ja täiendav teave Mis

Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>sisaldab</sup> Toimeaine

- on metronidasool . Iga.  
sisaldab . sisaldab 400 mg Metronidasool.
- Die muud koostisosad on:  
Laktoos-monohüdraat, Mikrokristalne tselluloos, Maisitärklis, Povidoon K30, Kros-povidoon, Makrogool 6000, Kõrgdispergeeritud Ränidioksiid, Magneesiumstearaat (Ph.Eur.) [taimne], Tselluloosipulber

Kuidas Metronidazol-ratiopharm<sup>®</sup> välja näeb ja Pakendi sisu Pakend

Valkjad, piklikud Tablett koos murdumisjoonega mõlemal poolel. Leheküljed.

Metronidazol-ratiopharm<sup>®</sup> on saadaval pakendites koos 14 ja 20 tabletti saadaval.

Farmatseutiline ettevõtja

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

Tootja

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Str. 3  
89143 Blaubeuren

See pakendi infoleht on viimati üle vaadatud novembris 2022.