

VARTOJIMO INSTRUKCIJA: INFORMACIJA PACIENTAMS

Metronidazol-ratiopharm® 400 mg Tabletės

Metronidazolas

Perskaitykite visą pakuotės lapelį atydžiai prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes pradėti, nes ji turi svarbią informaciją.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt norėsite jį vėliau dar kartą perskaityti ..
- turite daugiau klausimų turite, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Šis vaistas buvo
- jums asmeniškai išrašytas. Neduokite kitiems asmenims an Trečioji toliau. Tai gali kitiems žmonėms pakenkti, net jei jie turi tuos pačius simptomus kaip jūs. Jei pastebite
- šalutinį poveikį Šalutinis poveikis kreipkitės. kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir šalutiniams poveikiams, kurie nėra nurodyti šiame pakuotės lapelyje paminėti Pakuotės lapelis Žr. skyrių. Žr. Skyrius 4.

Kas yra šiame pakuotės lapelyje rašoma

1. Kas yra Metronidazol-ratiopharm® ir kam jis yra naudojamas?
2. Ką turėtumėte Jūs prieš vartojimą žinoti nuo Metronidazol-ratiopharm® atkreipti dėmesį?
3. Kaip yra Metronidazol-ratiopharm® vartoti?
4. Kokios šalutinės reakcijos gali būti galimos?
5. Kaip yra Metronidazol-ratiopharm® laikyti?
6. Turinys pakuotės ir kita informacija 1. Kas

yra Metronidazol-ratiopharm® ir kam jis naudojamas? Metronidazol-ratiopharm® yra® yra vienas vaistas nuo parazitų (parazitas): nuo pirmuonių (protozoa) ir be deguonies gyvenančios (anaerobinės) bakterijos.

Metronidazol-ratiopharm® yra naudojamas

- esant trichomonozei
- esant bakterinei vaginozei (aminokolpitui, nespecifiniam kolpitui)
- esant amobiazei
- esant lambliazei (giardiazei)
- esant infekcijoms (Perdavimai, Užkrėtimai) su Dalyvavimas iš Bakterijos, kurios be Deguonis gali gyventi (Anaerobai); ypač Infekcijos, kurias sukelia moterų lyties organų, nuo virškinamojo trakto taip pat ausų-nosies-gerklės ir dantų-burnos-žandikaulio sritis prasideda.
- esant infekcijoms su Helicobacter pylori viršutiniame virškinamojo trakto srityje profilaktikai
- prevencijai prevencijai Gydytas nuo apsaugos nuo infekcijų atliekant chirurgines procedūras moterų lytinių organų ir virškinimo trakto Paaiškinimai

Paaiškinimai:

yra infekcija viena Liga, kurią sukelia vienaląstis žiuželinė, Trichomonas vaginalis, sukelia yra. Ji pasireiškia daugiausia kaip uždegimai moterų makšties ir vyrų šlaplės. Plitimas vyksta beveik greitai išskirtinai per lytinius santykius. Norint nustatyti ligą atliekamas sekreto tepinėlis Sekreto tepinėlis Esant.

vaginozei yra bakterinė sudėtis, kuri bakterinė sudėtis, kuri natūraliai į moterišką makštį atsiranda, pasikeičia. Ji atsiranda iki uždegimo su žuvingu kvapu žuvies tipo Aminokolpitas. nespecifinis ir nespecifinis Kolpitas yra kiti pavadinimai už bakterinę vaginozę.

Amöbiazė (amöbinė dizenterija) yra liga, kurią sukeliavienaląstis šakniakojis protistas, Entamoeba histolytica, Entamoeba histolytica, sukelia yra. Tai atsiranda dažniausiai į pilvo skausmus ir sunkų viduriavimą dėl infekcijos virškinimo trakte. Be to gali tai sukelti tai į Užkrėtimas kitų organų pasitaiko, kai liga neapdorota dažnai mirtina praeina. Amöbinėsdizenterijos nustatymui tiriamos išmatos atliekamas išmatų tyrimas.

Lambliasis (Giardiasis) yra liga, kurią sukelia, kurią prasideda. Per infekcijavirškinimo trakte atsiranda daugiausia vandeningų viduriavimų ateina tai pagrindiniai į vandeningas Viduriavimai. Giardia lamblia aptinkama išmatose Išmatos nustatoma.

2. Ką turėtumėte Jūs prieš vartojimą Metronidazol-ratiopharm® atkreipti dėmesį? Metronidazol-ratiopharm®

negalima® gali ne vartojamas būti

- jei Jūs alergiškas prieš Metronidazolą, kitus 5-Nitroimidazolius (grupė, kuriai taip pat Metronidazolas priklauso) arba vieną iš į Skyrius 6. minėtų kitų sudedamųjų dalių šio vaistinio preparato yra. Išimtis yra, jei yra gyvybei pavojinga infekcija esama ir kiti vaistai Vaistai neveiksmingas yra.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prašome pasikalbėti su savo gydytoju arba vaistininku, prieš vartodami Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm Ypatingas.

Ypatingos Atsargiai vartojant der Metronidazol-ratiopharm® reikia, jei sergatekraujo gamybos sutrikimais bei smegenų, nugaros smegenų ir nervų ligomis Nugaros smegenys ir Nervai kentėti. Pasidalinkite tai savo gydytojui su.

Esant trichomonozei yra dažnai lytinio partnerio taip pat nešiotojas trichomonų, net jei iki šiol nėra patologinių pokyčių pastebėta būti turėtų. Kad abipusė infekcija išvengti, yra būtina, kad seksualinis partneris taip pat turi būti ištirtas ištirta yra ir prirėikus su gydomas yra. Dėl lytinio akto reikėtų gydymo metu der gydymo atsisakyti reikia.

Atvejai su sunkia hepatotoksiškumu/ūminiu kepenų nepakankamumu įskaitant atvejai su mirtina baigtimi buvo pas pacientus su Cockayne sindromuvaistai stebėti, kurie metronidazolį turi. Jei sergate Cockayne -sindromusindromas kentėti, turėtų Jūsų gydytojas gydymo metu der gydymo su Metronidazoliu ir po Prijungimas gydymo taip pat Jūsų taip pat kepenų funkciją Kepenų funkcija dažnai stebėti.

Informuokite savo gydytoją nedelsiant ir nutraukite vartojimą Metronidazolo, jei Jums pasireiškia šie simptomai: pilvo skausmas vystyti:

- Pilvo skausmas, Anoreksija, pykinimas, vėmimas, karščiavimas, negalavimas, nuovargis, gelta, tamsus šlapimas, šviesiai pilkas arba baltas išmatos arba niežulys.

Pacientai su sutrinka kepenų funkcija

Jei Jūs nuo sunkios kepenų pažeidimo kenčiate, pasitarkite prašome prieš vartojimą vaisto Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{su} savo gydytoju Gydytojas.

Vartojimas iš Metronidazol-ratiopharm[®] kartu su kitais vaistais

Informuokite savo gydytoją arba vaistininką, jei vartojate kitus vaistus vartojate vartotitaikyti neseniai kiti vaistai vartojote taikėte turite arba ketinate kiti vaistai vartotitaikyti.

Kokie kiti vaistai paveikti mirtis poveikį nuo Metronidazol-ratiopharm[®] ?

Barbitūratai, fenitoinas

Poveikio sumažėjimas Veiksmingumo sumažėjimas Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{pasireiškia} įvyksta vartojant prie barbitūratų (vaistai su su Veikliosios medžiagos kaip Hexobarbital arba Fenobarbitalis, kurie nuo miego sutrikimų ir traukuliai taip pat anestezijai naudojami būna) ir kai skiriant vaistus su Fenitoinas (Fenitoinas (Veiklioji medžiaga nuo traukuliai).

Cimetidinas

Vaistai su Cimetidinas (Veiklioji medžiaga nuo skrandžio gleivinės uždegimas [Gastritas] taip pat nuo skrandžio ir žarnyno opos) gali labai retai mirtis išskyrimą nuo Metronidazol paveikti ir taip poveikį/šalutinį poveikį nuo Metronidazol-ratiopharm[®] sustiprinti.

Disulfiramas

Kartu skiriamas vaistas alkoholio vartojimo nutraukimui Disulfiramas gali sukelti sumišimo būsenas ir tam tikrus psichikos sutrikimus (psichoze) sukelti.

SilibininasKartu

vartojant Silymariną/ Silibininą(vaistas nuo į Gydymas nuo kepenų ligų ir virškinimo sutrikimų) yra poveikis nuo Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{sumažintas} ..

Diosminas

(vaistas nuo gydymo nuo veninis kojų ligos ir hemorojus) gali padidinti metronidazolo koncentraciją kraujyje Kraujas padidinti ir taip sustiprinti poveikįšalutinį poveikį nuo Metronidazol-ratiopharm[®] sustiprinti.

Kokie kiti vaistai yra veikiami jų poveikio Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm[?]
Kraujo krešėjimą mažinantysvaistai

Pacientai , kurie

gydomi tikrais vaistais gydomi vaistais gydomi yra, kurie kurie kraujo krešėjimą slopina (antikoagulantai iš kumarinų tipo, kaip pvz. fenprokumonas, varfarinas), turi prireikus iš naujo nustatyti yra, nes per Metronidazol-ratiopharm[®] mirtis antikoaguliacinį poveikį šiuos vaistus sustiprina yra.

Busulfanas

Toksinis toksinis busulfano (chemoterapinis vaistas) gali žymiai sustiprintas bus.

Ciklosporinas

Kai vienu metu skiriama ciklosporino (vaistas, kuris slopina imuninę reakciją slopina arba silpnina) ir Metronidazol-ratiopharm® gali būti kraujo lygis ciklosporino padidėja būti. Leiskite todėl savo ciklosporino ir kreatinino kiekį kraujyje dažnai tikrinti.

5-fluorouracilas

Toksinis poveikis 5-fluorouracilo (5-Fluorouracil) vaistas chemoterapijai gydyti navikus nuo navikams) padidėja savaime, kadangi vartojant kartu su Metronidazol-ratiopharm® mirtis išsiskyrimas 5-fluorouracilo sumažėjęs yra.

Litis

Vartojant vaistus su litium (vaistai dėl gydymo tam tikrų formų euforinių arba prislėgtų nuotaikų [maniakinės-depresinės būsenos]) yra atsargumas reikalingas, nes po to padidėjimas Padidėjimas des Ličio im kraujyje stebėta buvo (Pavojus lieti lieti su drebulys ir traukuliais). Leiskite todėl savo kraujo lygį ličio, kreatinino ir elektrolitų kontroliuoti.

Tacrolimus

Šis vienalaikis vartojimas su Metronidazol-ratiopharm® sukelia į padidėjimą Padidėjimas kraujo lygio Tacrolimus (vaistas dėl poveikio įtaka imuninės sistemos). Leiskite todėl savo Takrolimuzo-kraujo lygį ir inkstų funkciją dažnai tikrinti.

Amiodaronas

Kartu vartojimas su Metronidazolu ir Amiodaronu (priemonė skirta į Gydymas nuo širdies ritmo sutrikimų) gali sukelti širdies veiklos paveikimą . Todėl širdies veiklaturėtų būti reguliariai stebima EKG pagalba . stebimas bus. Kreipkitės į gydytoją, kai tik pastebėsite širdies ritmo sutrikimo požymių Širdies ritmo sutrikimaskaip galvos svaigimas Galvos svaigimas jaučiamas širdies plakimo pokytis arba trumpalaikis sąmonės netekimas pastebite . pastebėti.

Mikofenolato mofetilas

Kai vienu metu skiriama su antibiotikais gali sumažėti prieinamumas nuo mikofenolato mofetilo (vaistas kuris slopina imuninės sistemos veikimą Imuninės sistemos slopina) im kūne sumažėti gali būti. Todėl rekomenduojama dažna vienu metu dažna stebėseną per laboratorinius tyrimus rekomenduojama.

Vartojimas Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{kartu} su alkoholiu Alkoholis

Der Vartojimas von alkoholio yra gydymo metu su Metronidazolu ir bent 48 48 po to reikia vengti , neskitaip gali pasireikšti netoleravimo reakcijos pasireikšti gali, kaip pvz. odos paraudimai galvos srityje des ir kaklo bei pykinimas, vėmimas ,galvos skausmas ir galvos svaigimas. Nėštumas

Nėštumas, Žindymo laikotarpis ir Vaisingumas

Jei esate nėščia arba žindote ,arba jei manote , kad esatenėščia arba ketinate pastoti arba planuojate, nėščia tapti jei, klausykite savo prieš vartojimą šio vaisto pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

Jei esate nėščia esate, bus Jums Jūsų gydytojas tik tada su Metronidazol-ratiopharm® gydyti, jei jis tai laiko absoliučiai būtina mano.

Žindymo laikotarpis

Metronidazolas pereina į motinos pieną per. Todėl turėtumėte Jūs per gydymą su Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{ir} dar bent 2–3 dienas po to žindymą nutraukti Žindymas nutraukti.

Vaisingumas

Tyrimai su gyvūnais rodo tik galimą neigiamą poveikį Įtaka Metronidazolis Metronidazolas vyriškus lytinius organus Lyties organai kai didelės dozės buvo skiriamos suleista buvo, kurie toliau virš maksimalios rekomenduojamos dozės žmogui yra.

Vairavimo gebėjimai ir gebėjimas valdyti mašinas Ypač

gydymo pradžioje gali Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm[®] Jūsų reakcijos greitį paveikti. Jūs galite tada į netikėtus ir staigius įvykius ne daugiau greitai ir tiksliai pakankamai reaguoti, todėl kad pvz. Gebėjimas dalyvauti aktyviai dalyvauti eisme arba valdyti mašinas arba dirbti be saugaus palaikymo sumažėja . Tai galioja eisme arba valdytимаšinas sustiprintu matu su sąveika su alkoholiu.

Metronidazol-ratiopharm[®] turi laktozės.

Prašome vartoti Jūs Metronidazol-ratiopharm[®] tik po konsultacijos su Jūsų gydytoju praneškite, jei Jums žinoma yra, kad Jūs sergate netolerancija tam tikriems cukrams kenčiate nuo tam tikrų.

3. Kaip yra Metronidazol-ratiopharm[®] vartoti?

Vartokite šį vaistą visada tiksliai pagal susitarimą su savo gydytoju vienas. Klauskite savo pas savo gydytoją arba vaistininkas pagal, jei Jūs nesijaučiate tikri dėl to..

Dozavimas

priklauso nuo ligos tipo ir sunkumo ligos Tipas ir Sunkus der Liga.

Šie toliau nurodyti yra vidutinės vertės ir taikomos tik, jei Metronidazol-ratiopharm[®] Jūsų gydytojas ne kitaip paskyrė nebuvo.

Die dienos dozė gali ½ iki daugiausiai 5 tablečių Metronidazol-ratiopharm[®] (atitinka 200-2.000 mg metronidazolo) sudaryti. Paprastai yra mirtis Tabletės 2-3 kartus per dieną vartojamos.

Nesudėtingos Infekcijos (Užkrėtimai, kurie gydant dažniausiai greitai ir be pasekmių išgyja)Esant

Kai vienos žemos dienos dozės 1½ tablečių (atitinka 600 mg metronidazolo) arba mažiau yra daug dienų gydymas (5-7 dienos) būtinas.

Esant didesnei dozei nuo 2½-5 tablečių (atitinkančiai 1.000-2.000 mg Metronidazolo) per dieną gali trumpas gydymo laikotarpis (13 dienų) būti pakankamas. Bakterinė

vaginozė Bakterinė vaginozė ir trichomonozė pas suaugusiųjų gydymas vienkartinė doze iš 5 tablečių (atitinka 2.000 mg metronidazolo) galimas.

Alternatyviai esant

- bakterinei vaginozei
2½ Tabletės (atitinka 1.000 mg Metronidazolo) per dieną (padalinta į 2-3 vienkartinės dozes) iš viso 7 dienas.
- Trichomonozė (ypač esant užsispyrusiems atvejams)
2-2½-(4) tabletės (atitinkamai 800-1.000-[1.600] mg Metronidazol) per dieną (padalinta į 2-3 vienkartinės dozes) iš viso 7 dienas. Siekiant

abipusės infekcijos esant trichomonozės atvejui Trichomonozė išvengti išvengti, yra būtina, kad seksualinis partneris taip pat tiriamas ir prireikus gydomas metronidazolio turinčiu preparatu Metronidazolo turinčių Preparatas gydomas bus (žr. 2. „Įspėjimai ir Atsargumo priemonės“).

Sudėtingos Infekcijos (Užkrėtimai, kurie taip pat net atsargiai gydant dažnai sunkiai gyja) kaip

- Uždegimas gimdos gleivinės (Endometritas) Uždegimas
- kiaušintakių arba kiaušidžių (Adnexitas) Uždegimai dantų, burnos ir žandikaulio srityje
- Uždegimai gerklės, nosies ir ausų srityje Pilvaplėvės uždegimas dantų, burnos ir žandikaulio
- Uždegimai aš Sritis gerklės, nosies ir ausų
- Pilvaplėvės uždegimas (Peritonitas) ir
- Pūliniai (Abscesai) pilvo ertmėje Dienos

dozė pradžioje 4-5 tabletės (atitinka 1.600-2.000 mg Metronidazolo) ir kitomis dienomis vėliau den toliau pateiktų dienas 2½ tabletes (atitinka 1.000 mg Metronidazolo) 5-7 dienas. Tik išimtiniais atvejais turėtų dozė būti padidinta iki 3½ tablečių (atitinka 1.400 mg Metronidazolo) per dieną padidinta būti.

Im Rėmuose vienos kombinuotosios terapijos dėl eradikacijos Helicobacter pylori yra prieš gydymo pradžią oficialios rekomendacijos terapijai turi būti laikomos.

Prevencinis gydymas Gydymas turėtų ant vienkartinė vienkartinė dozė nuo 1½ iki daugiausiai 5 tablečių (atitinkanti 600-2.000 mg Metronidazolo) apsiriboti turėtų.

Vartojimas vaikams ir paaugliams Infekcijos

Infekcijos, kurios sukelia anaerobinės bakterijos sukeltos yra

Vaikai vyresni nei 8 savaičių iki 12 metų: 20 mg iki 30 mg/kg kūno svorio vieną kartą per dieną kaip vienkartinė dozė arba padalinta į 7,5 mg/kg kas 8 valandas.

Priklausomai nuo sunkumo gali būti dozė iki 40 mg/kg per dieną padidinta būti. Gydymo trukmė paprastai trunka paprastai 7 dienas. Vaikai iki 8 savaičių: Šiai grupei Amžiaus grupė yra vaistas vaistas su mažesne stiprumu reikalingas.

Bakterinė vaginozė

Paaugliai: du kartus 1 tabletė atitinkamai atitinkamai kasdien 400 mg Metronidazol) per 5 iki 7 dienų arba 5 tabletės (atitinka 2.000 mg Metronidazol) kaip vienkartinė dozė.

Perioperacinė profilaktika

Vaikai iki 12 metų: vienkartinė 20 mg iki 30 mg/kg kūno svorio vieną iki dvi valandas prieš procedūrą ..

iki 40-os nėštumo savaitės : Šiaiamžiaus grupei Amžiaus grupė yra vienas Vaistas su mažesne stiprumu reikalingas

Urogenitalinė trichomonozė

Paaugliai: 5 Tabletės (atitinka 2.000 mg Metronidazolo) kaip vienkartinė dozė arba tris kartus kasdien ½ tabletė (atitinka tris kartus kasdien 200 mg Metronidazol) per 7 dienas arba du kartus kasdien 1 tabletė (atitinka du kartus kasdien 400 mg Metronidazol) per 5 iki 7 dienų.
Vaikai iki 10 metų: 40 mg/kg kūno svorio kaip vienkartinė dozė (maks. 2.000 mg Metronidazol) arba 7 dienas 15 mg iki 30 mg/kg kūno svorio per dieną, padalinta ant du iki trys dozės kasdien. Tai gali 2.000 mg per dozė ne viršyti būtina.

Lambliasis (Giardiazė)

Vaikai virš 10 metų: 5 tabletės (atitinka 2.000 mg Metronidazolas) vieną kartą per dieną per 3 dienas arba 1 tabletė (atitinka 400 mg Metronidazolas) tris kartus per dieną per 5 dienas.
Vaikai nuo 7 iki 10 metų: 2½ tabletės (atitinka 1.000 mg metronidazolo) vieną kartą per dieną per 3 dienas.
Vaikai nuo 3 iki 7 metų: 1½-2 tabletės (atitinka 600 mg iki 800 mg metronidazolo) vieną kartą kasdien virš 3 dienas. Vaikams nuo 1 iki 3 metų: ši amžiaus grupė rekomenduojama vaistas su mažesne stiprumu reikalingas ..

išreikšta : Vaikaigauna 15 mg iki 40 mg/kg kūno svorio per dieną, per dieną, padalintas į dvi iki tris dozes kasdien.

Amöbiazė

Vaikai vyresni nei 10 metų: 1-2 tabletės (atitinka 400 mg iki 800 mg Metronidazolo) tris kartus per dieną per 5 iki 10 dienų.
Vaikai nuo 7 iki 10 metų: ½-1 tabletė (atitinka 200 mg iki 400 mg metronidazolo) tris kartus per dieną per 5 iki 10 dienų.
Vaikai nuo 3 iki 7 metų: ½ tabletė (atitinka 200 mg metronidazolo) keturis kartus kasdien per 5 iki 10 dienų.
Vaikai nuo 1 iki 3 metų: ½ tabletės (atitinkamai 200 mg metronidazolo) tris kartus kasdien per 5 iki 10 dienų.

Alternatyviai išreikšta: Vaikai gauna 35-50 mg/kg Kūno svoris per dieną, padalintas į tris dozes kasdien, per 5 iki 10 dienų. Negalima viršyti 2.400 mg per dieną viršyti ..

dėl Helicobacter pylori išnaikinimo Helicobacter pylori

Im Rėmuose vienos kombinuotosios terapijos skiriama 20 mg/kg kūno svorio per dieną, padalinta į dvi dozes kasdien (maks. du kartus 500 mg/dieną), per 7 iki 14 dienų taikoma. Prieš gydymo pradžią yra oficialios rekomendacijos gydymui reikia laikytis.

Vaikams iki 6 metų yra tabletės, kurios nekrantomos vartoti yra, netinka tinkamos.

Vartojimo būdas Vartojimas

Vartokite tabletes nesukramtytas su pakankamu skysčio (pvz., 1 stiklinė vandens) valgio metu arba netrukus po jo . Tabletę galimąj Tabletė gali į tos pačios Dozės padalintos bus.

Vartojimo trukmė Vartojimas

Dėl vartojimo trukmės nusprendžia Jūsų gydytojas. Įspėjimas

Įspėjimas:

Metronidazol-ratiopharm® su Metronidazol-ratiopharm® arba kitu kitu nitroimidazolo turinčiu vaistu neturi paprastai 10 dienų viršyti. Šis terminas gali tik ypatingais atvejais esant ypač griežtai indikacijai (t. y. po atsargaus apsvaistymo per Jūsų gydytojas esant rimtoms prielastims) viršyta būti. Gydomas gydymas turėtų kuo rečiau kartojamas būti. Die Ribojimas der gydymo trukmės yra būtinas, nes gali atsirasti žala žmogaus gemalinėms ląstelėms (galima žala genetinei medžiagai) negalima atmesti atmeti leidžia ir nes į bandymų serijos su gyvūnais vieną padidėjimas iš tam tikrų navikų (auglių) buvo pastebėta ..

vieną vieną didesnį kiekį Metronidazol-ratiopharm® pavartojote turite, nei Jums reikėjo

Jei Jūs vienkartinę dozę nuo Metronidazol-ratiopharm® netyčia dvigubai pavartojote, tai nėra poveikio tolesniam tolimesnis vartojimas, t. y. Jūs vartojate Metronidazol-ratiopharm® po to taip kaip, kaip dozavimo instrukcijoje Dozavimo instrukcija.

vartojimas žymiai reikšmingai per didelis vaistų kiekis gali sukelti per pykinimą, vėmimą, padidėjusius refleksus, ataksiją (sutrikimas tvarkingame judesiu sekoje), pagreitintą Širdies plakimas, Dusulys ir Dezorientacija (Nežinojimas laiko ir vietos) atsiranda.

Priešnuodis nėra žinomas . Po gydytojogydymo simptomų Gydymas skundų Skausmai yra su vienu visišku pasveikimu po kelių dienų tikėtis ..

vartojimą vaisto Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{pamiršote} vartoti nevartokite

nevartokite Jūs ne dvigubą kiekį vieną, jei Jūs ankstesnę dozę pamiršote vartoti. Jei Jūs savo klaidą dar tą pačią dieną pastebite, vartokite Jūs per mažai išgertą vaisto kiekį dar tą pačią dieną papildomai išgerkite.

Pastebėkite Jūs savo klaidą tik kitą dieną , tada gali tai būtina būti, gydymą per vieną dieną pratęsti .. su tokiu atveju prašome su savo gydytoju. Jei Jūs

pamiršote Vartojimas nuo Metronidazol-ratiopharm® nutraukti

Jei Jūs gydymą prieš laiką nutraukiate arba jį laikinai nutraukiate, keliate pavojų gydymo sėkmei Gydymo sėkmėEsant

nemaloniams nemalonus Šalutinis poveikis bus Jūsų gydytojas su Jums aptars, kokios priešpriemonės yra tam ir ar kiti vaistai Jums tinka Vaistai jums tinka Jei Jūs.

Jei jūs tolimesnių klausimų dėl vartojimo šio vaisto turite, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. 4. Kokios

4. gali būti ? galimas?

Kaip ir visi vaistai gali taip pat šis vaistas šalutinius poveikius turėti, kurie tačiau ne kiekvienam pasireikšti turi ..

šalutiniai poveikiai gali būti sunkūs būti. Kreipkitės į nedelsiant į gydytoją, jei pasireiškia Jums viena iš šių šalutinių poveikių ::

Kartais gali būti iki 1 iš 100 gydytų paveikia)

- alerginė reakcija, dažnai kartu su kraujospūdžio sumažėjimu, galvos svaigimu, pykinimu ir galbūt. dusuliu (anafilaksinė reakcija)
- gleivinės patinimu im srityje der kvėpavimo takų su dusuliu (angioneurozinė edema)
- Sutrikimai im sąveikoje der judesių (ataksija), nervų sutrikimai (periferinė neuropatija) ir traukuliai

Jei Jūs jaučiate tirpimą, dilgčiojimą arba dilgčiojimą rankose ir kojose jaučiate, turite nedelsiant kreiptis į savo gydytoją informuoti, taip pat jei šie reiškiniai pasireiškia Jums tik lengva forma pasireiškia!

Labai retai (gali būti iki 1 iš 10 000 gydytų Gydytų paveikti)

- stipriai sumažėjęs skaičius tam tikrų baltųjų kraujo kūnelių (agranulocitozė), prie trombocitų (trombocitopenija) arba. visų kraujo kūnelių Kraujo kūneliai (Pancitopenija). Ligos požymiai yra silpnumas, padidėjęs polinkis į infekcijas ir padidėjęs kraujosruvų. Reikia tokiais atvejais greitai atlikti kraujo tyrimą atlikta yra.
- sunkūs atvejai alerginės reakcijos (anafilaksinis šokas). Atsiranda tai šiuo atveju dėl kraujotakos nepakankamumo su sąmonės sutrikimais , šaltu prakaitu, Šaltas prakaitavimas taip pat blyškias ir šaltas rankas ir kojas reikia nedelsiant gydytoją kviesti į pagalbą iškviesti reikia. Kol iki jo atvykimo yra viršutinė kūno dalis des lignonio lygiai ir jo kojos aukštai į padėti. Siekiant išvengti nuo atvėsimo reikia der lignonį su antklode uždengti šiltai iki laikyti. Gydytojas pradės įprastas atitinkamas neatidėliotinas priemones ..
- ligos smegenų Ligos encefalopatija su pvz.sumišimu su pvz. Sumišimas, karščiavimas, galvos skausmai, haliucinacijos, paralyžius, šviesos jautrumas, sutrikimai regėjimo ir judėjimo gebėjimo, sprando sustingimas), ligos smegenėlių su pvz. pvz. Kalbos-, Judėjimo- ir Eisenos sutrikimai, Drebulys, Akių drebulys (nistagmas). Šie Reiškiniai gali sumažėti po gydymo pabaigos regresuoti.
- Uždegimas der Kasa (Pankreatitas), kuris sukelia stiprų skausmą viršutinėje pilvo dalyje , pykinimą ir vėmimą sukelia Pasireiškimas
- sunkus ilgalaikis viduriavimas per arba per į pirmas savaites po der gydymo (pseudomembraninis enterokolitas). Ši dėl antibiotikų gydymo sukelta žarnyno liga gali būti gyvybei pavojinga ir reikalauja skubaus viena nedelsiant ir tinkamas gydytojo gydymas. Vaistai, kurie žarnyno judesius (peristaltiką) slopina, negalima vartoti išgerta Nežinoma

Ne (Dažnis ant Pagrindas iš turimų duomenų ne įvertinamas)

- ne bakterinis sukeltas smegenų dangalų uždegimas (aseptinis meningitas)
- Liga/Uždegimas iš Regos nervas
- Pas pacientams, kurie vienu metu su kitais antibiotikais gydyti buvo, atsirado atvejų kepenų nepakankamumo Kepenų nepakankamumas kai buvo kepenų transplantacija būtina reikalingas buvo.
- ūminis uždegiminis liga odos arba gleivinės (Erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-sindromas, toksinė epiderminė nekrolizė, fiksuota vaistų bėrimas); dalinai su Sutrikimas dėl bendros savijautos, karščiavimas ir skausmingas pūslių susidarymas

- Ūmus kepenų nepakankamumas pas pacientus su Cockayne-sindromu (žr. 2. „Ką turėtumėte Jūs prieš der Vartojimas nuo Metronidazol-ratiopharm® atkreipkite dėmesį?“, „Įspėjimai ir Atsargumo priemonės“)

Kitos Šalutiniai poveikiai

Prašome pasikalbėti su savo gydytoju apie tolesnis tolimesnis gydymas, jei šios šalutinės reakcijos pasireiškia:

Dažnai (gali iki 1 iš 10 gydomų asmenų)Skonio sutrikimai

(pvz. (pvz. metališkas skonis), kartus atsirūgimas, liežuvio apnašos, uždegimai burnoje (glositas, stomatitas), skrandžio spaudimas , pykinimas,vėmimas ,apetito stoka Apetito praradimasviduriavimas tamsėjimas

Tamsėjimas des Šlapimas (sąlygotas dėl metabolito Metabolitasbe ligos reikšmės Ligos vertėKartais

Kartais galiiki 1 iš 100 gydytų asmenų Gydytų Infekcijos)

- Infekcijos su vienu odos grybeliu (pvz., Candida albicans) lytinių organų srityje
- Baltųjų kraujo kūnelių sumažėjimas (leukopenija ir granulocitopenija). Ilgesnio vartojimo atveju reikalinga reguliari kontrolė Kraujo tyrimų kontrolė atlikti.
- uždegiminis paraudimai, alerginis sloga ir alerginis konjunktyvitas akies, dilgėlinė, vaistų karščiavimas
- galvos skausmas, galvos svaigimas
- mieguistumas, nemiga, Klaidingas pojūtis (Haliucinacija), Sumišimo būsenos, Dirglumas, liūdna Nuotaikos sutrikimas (Depresija)
- dažniausiai laikini Regėjimo sutrikimai kaip Dvigubas matymas ir Trumparegystė
- Sutrikimai kepenų funkcijos, padidėjimas įvairių kepenų fermentų rodiklių
- odos reakcijos (pvz. bėrimas su pūslelėmis- ir dilgėlinės [urtikarinis bėrimas], pūliniai, niežulys, priepuolinis odos paraudimas su karščio pojūtis [Flush])
- skausmingas šlapinimasis (dizurija), šlapimo pūslės uždegimas (cistitas) ir nevalingas šlapimo ištekėjimas (šlapimo nelaikymas)
- silpnumo jausmas

Labai retai (gali iki 1 iš 10 000 gydytų asmenų paveikti)

- Geltonumas, Kepenų uždegimas su tulžies sąstoviu Raumenų skausmas
- Raumenų skausmasSąnarių skausmas Sąnarių skausmas

Nežinoma žinoma (Dažnis pagal pagrindą turimų duomenų nėra įvertinamas apskaičiuojamasKlausos praradimas

- KurtumasKlausos netekimas,Spengimas ausyse arba - -ūžesys (Tinnitus)

Vaikai ir Paaugliai

Dažnis, pobūdis ir sunkumas nepageidaujamų reakcijų yra vaikams ir suaugusiems vienodi ..

apie nepageidaujamas reakcijas Jei Jūs

nepageidaujamas reakcijas Šalutinis poveikis pastebėti, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir šalutiniams poveikiams, kurie nėra šiame pakuotės lapelyje nurodyti. Jūs galite yra. Jūs gali Šalutinis poveikis taip pat tiesiogiai dem Federalinis institutas vaistams ir medicinos produktams, skyrius Farmakologinis budrumas, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, svetainė: www.bfarm.de pranešti. Pranešdami Jūs šalutinį poveikį, galite Jūs Jūs prie prisidėti, kad daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą būtų pateikta. 5..

5. Metronidazol-ratiopharm® Metronidazol-ratiopharm® laikyti?

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūs negalite šio vaisto po ant kartoninės dėžutės ir lizdinių plokštelių po „Tinka vartoti iki“ „Naud. iki“ nurodytos galiojimo datos ne daugiau naudoti. Galiojimo data nurodo į paskutinę dieną nurodyto mėnesio ..

virš 30 °C temperatūroje laikyti.

6. Turinys pakuotės ir kita informacija Kas

Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{sudėtyje} Veiklioji

- medžiaga yra metronidazolas Metronidazolas. tabletė turi sudėtyje yra 400 mg Metronidazol.
- Die kiti komponentai yra:
Laktozės-monohidratas, Mikrokristalinė celiuliozė, Kukurūzų krakmolos, Povidonas K30, Krospovidonas, Makrogolis 6000, Aukštai disperguotas Silicio dioksidas, Magnio stearatas (Ph.Eur.) [augalinis], Celiuliozės milteliai

Kaip Metronidazol-ratiopharm® atrodo ir Pakuotės turinys Pakuotė

Baltos, pailgos Tabletė su lūžio linija ant abiejų pusių.

Metronidazol-ratiopharm® yra pakuotėse su 14 ir 20 tablečių galima įsigyti ..

įmonė ratiopharm

GmbH UAB
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Gamintojas

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren

Šis pakuotės lapelis buvo paskutinį kartą peržiūrėtas 2022 m. lapkritį.