

INFORMACJA DLA PACJENTA

Metronidazol-ratiopharm® 400 mg Tabletki

Metronidazol

Przeczytaj całą ulotkę uważnie , zanim rozpocznieś przyjmowanie tego leku . leku . ponieważ ponieważ ona zawiera ważne informacje.

- Zachowaj tę ulotkę . Może chcesz ją później ponownie przeczytać ..
- dalsze pytania Pytania mieć, zwrócić się do swojego lekarza lub farmaceuty. To lekarstwo
- zostało przepisane osobiście dla Ciebie przepisany. przekazuj go innym osobom Trzecia dalej. To może innym ludziom zaszkodzić, nawet jeśli oni mają takie same dolegliwości jak Ty. Jeśli zauważysz
- działania niepożądane Działania niepożądane zauważysz, zwróć się do swojego lekarza lub farmaceuty. Dotyczy to również działań niepożądanych , które nie są wymienione w tej ulotce informacyjnej . są. punkt 4. 4.

Co w tej ulotce jest

1. Co to jest Metronidazol-ratiopharm® i do czego jest stosowany ?Co
2. powinieneś wiedzieć przed przyjęciem leku Przyjmowanie z Metronidazol-ratiopharm® zwrócić uwagę?
3. Jak jest Metronidazol-ratiopharm® przyjmować?
4. Jakie działania niepożądane są możliwe?
5. Jak jest Metronidazol-ratiopharm® przechowywać?
6. Zawartość opakowania opakowania i dalsze informacje

1. Co to jest jest Metronidazol-ratiopharm® i do czego jest stosowany ?Metronidazol-ratiopharm

Metronidazol-ratiopharm^{jest} jest jeden lek przeciw pasożytom (pasożytom): przeciw pierwotniakom (pierwotniakom) i beztlenowe bakterie (beztlenowe) bakterie ..

Metronidazol-ratiopharm® jest stosowany

- przy rzęsistkowicy
- przy bakteryjnej waginozie (zapalenie pochwy wywołane aminami, niespecyficzne zapalenie pochwy)
- przy amebiozie
- przy lambliozie (giardiozie)
- przy infekcjach (Przenoszenia, Zakażenia) z udziałem bakterii bakterii, które bez tlenu mogą (beztlenowce);szczególnie infekcje , które przez, które są przez żeńskich narządach płciowych, z przewodu pokarmowego oraz uszu, nosa, gardła i zębów, jamy ustnej,szczęki pochodzące.
- przy infekcjach z *Helicobacter pylori* w górnym przewodzie pokarmowymobszarze
- do zapobiegawczego Leczenie przed ochroną przed infekcjami przy operacyjnych zabiegach w żeńskim obszarze płciowym i w przewodziepokarmowym

Wyjaśnienia:

Rzęsistkowica jest chorobą Choroba, która jest wywołana przez wiciowca , *Trichomonas vaginalis*, powodowana jest. Występuje głównie zapalenie pochwy u kobiet i cewki moczowej u mężczyzn . Rozprzestrzenianie następujeprawie wyłącznie przez kontakt seksualny

wyłącznie przez stosunek płciowy. Do rozpoznania choroby choroby wykonuje się wymaz z wydzielinę przygotowuje się.

W przypadku bakteryjnej waginozy jest bakteryjna bakteryjny skład, który naturalnie w żeńskiej pochwie występuje, zmienia. To prowadzi do zapalenia z rybim zapachem rybopodobnych Aminokolpitis. niespecyficzne i niespecyficzne Zapalenie pochwy są inne określenia dla bakteryjnej waginozy.

Pełzakowica (czerwonka pełzakowa) jest chorobą , która jest wywołana przez pierwotniaka pełzaka Entamoeba histolytica „ Entamoeba histolytica, powoduje jest. To dochodzi zwykle do bólów brzucha i ciężkich biegunek przez infekcję w przewodzie pokarmowym. Ponadto może dojść do tego że Zajęcie innych narządów występuje, przy czym choroba nieleczona często śmiertelnie przebiega . Dorozpoznania czerwonki pełzakowej bada się kał . stołek zbadany.

Lamblioza (Giardioza) jest chorobą , która jest wywołana przez wiciowca, Giardia lamblia, pochodzącego Wiciowiec, Giardia lamblia, . Poprzez zakażenie w przewodzie pokarmowym dochodzi głównie do wodnistych biegunek do wodnistej Biegunki. Giardia lamblia jest w kale wykrywana.

2. Co powinieneś Ty przed przyjęciem Metronidazol-ratiopharm® zauważyć? Metronidazol-ratiopharm®

nie wolno® może nie przyjmowane być

- jeśli Pan(i) uczulony(a) na metronidazol, inne 5-nitroimidazole (grupa, do której należy metronidazol)lub którykolwiek z zawartych w Sekcja 6. wymienione inne składniki tego leku są. Wyjątek istnieje ,jeśli występuje zagrażająca życiu infekcja i inne leki są nieskuteczne nieskuteczny są.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Proszę porozmawiać z swoim lekarzem lub farmaceutą, zanim Metronidazol-ratiopharm®
Metronidazol-ratiopharm^{zażyjesz} ..

ostrożność Ostrożność przy przy przyjmowaniu leku Metronidazol-ratiopharm® jest konieczne, jeśli cierpisz na zaburzenia krwiotworzenia oraz choroby mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów Nerwy cierpieć. Podziel się tym swojemu lekarzowi z.

W przypadku rzęsistkowicy jest często partner seksualny również nosicielem rzęsistków, nawet jeśli dotychczas żadne patologicznych zmian zauważono być powinny. Aby wzajemne zakażenie uniknąć ,jest to konieczne ,aby partner seksualny również został zbadany jest i ewentualnie z leczony jest. Na stosunek płciowy należy podczas leczenia terapii zrezygnować należy.

Przypadki z ciężką hepatotoksycznością/ostrym niewydolnością wątroby w tym przypadki z śmiertelnym zakończeniem zaobserwowano u pacjentów z zespołemCockayne'a przy lekach obserwowano, które zawierają metronidazol. Jeśli masz zespół Cockayne'aZespół cierpieć, powinien Twój lekarz podczas leczenia Metronidazolem z Metronidazolem i po zakończeniu leczenia również Twoją funkcję wątroby Funkcja wątroby często monitorować.

Poinformuj swojego lekarza niezwłocznie niezwłocznie przerwij przyjmowanie Metronidazolu , jeśli wystąpią u Ciebie następujące objawy jeśli masz ból brzucha Objawy rozwijać:

- Bóle brzucha, Anoreksja, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie, żółtaczka, ciemny mocz, jasnoszary lub biały stolec lub świąd.

Pacjenci z upośledzoną funkcją wątroby

Jeśli cierpisz na ciężkie uszkodzenia wątroby, porozmawiaj proszę przed przyjęciem Metronidazol-ratiopharm® Metronidazol-ratiopharm^{Twoim} lekarzem . Lekarz.

Przyjmowanie z Metronidazol-ratiopharm® razem z innymi lekami

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz inne leki przyjmujesz przyjmować stosować niedawno inne leki przyjmowane stosowane mają lub zamierzają inne leki przyjmować stosować.

Jakie inne leki wpływają na działanie leku Metronidazol-ratiopharm® ?

Barbiturany, fenytoina

Zmniejszenie skuteczności leku Metronidazol-ratiopharm® występuje przy podaniu barbituranów (leki (Lek z Substancje czynne jak Hexobarbital lub Fenobarbital, które przeciw zaburzeniom snu i napadom drgawkowym oraz do narkozy stosowane są) i przy podawaniu leków z Fenytoiną (Substancja czynna przeciw napadom drgawkowym).

Cymetydyna

Leki z cymetydyną (substancja czynna przeciw zapalenie błony śluzowej żołądka [nieżyt żołądka] oraz przeciw wrzodom żołądka i dwunastnicy) mogą bardzo rzadko wydalanie wydalanie z Metronidazol wpływać i tym samym działanie/działania niepożądane z Metronidazol-ratiopharm® wzmacniać.

Disulfiram

Jednoczesne podawanie leku do leczenia uzależnienia od alkoholu Disulfiram może prowadzić do stanów dezorientacji i określonych zaburzeń psychicznych (psychoz) prowadzić.

Sylimaryna/Sylibinina

Przy jednoczesnym podawaniu sylimaryny/sylibininy (leki do Leczenie z chorób wątroby i dolegliwości trawiennych) jest działanie leku Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{zmniejszone} ..

Diosmina

(lek do leczenia Leczenie od żylny choroby nóg i hemoroidy) może stężenie metronidazolu we krwi zwiększyć i tym samym działaniem/działania niepożądane leku Metronidazol-ratiopharm® wzmocnić.

Jakie inne leki są w swoim działaniu przez Metronidazol-ratiopharm® wpływane?

Leki przeciwzakrzepowe Środki

Pacjenci, którzy są określonymi lekami leczeni są, które które krzepnięcie krwi hamują (antykoagulanty typu kumaryny, takie jak np. fenpropakumon, warfaryna), muszą ewentualnie na

nowo ustawione być, ponieważ przez Metronidazol-ratiopharm® die przeciwwzakrzepowe działanie tych leków zwiększa się.

Busulfan

Toksyczność Busulfanu (chemioterapeutykChemioterapeutykmoże znacznie znaczny wzmocniony zostanie.

Cyklosporyna

Przy jednoczesnym podawaniu cyklosporyny (lek który odpowiedź immunologiczną tłumi lub osłabia) i Metronidazol-ratiopharm® może poziom we krwi cyklosporyny zwiększa być. Pozwól dlatego swoje poziomy cyklosporyny i kreatyniny we krwi często kontrolować.

5-fluorouracyl

Toksyczność toksyczność 5-fluorouracylu (lek chemioterapeutyczny do leczenia guzów Guzy) zwiększa się, ponieważ przy jednoczesnym podaniu Metronidazolratiopharm® wydalanie 5-Fluorouracilu zmniejszone jest ..

Przy podawaniu

leków Leki litem (leki Lit (lek) do leczenia określonych form euforycznego lub przygnębionego nastroju [stany maniakalno-depresyjne]) należy zachować ostrożność ,ponieważ następnie może wystąpić wzrost des litu we krwi zaobserwowano zostało (ryzyko zatrucia litem Zatrucie litem drżeniem i napadami drgawkowymi). Proszędlatego swoje poziomy we krwi litu, kreatyniny Kreatynina i elektrolity kontrolować.

Takrolimus

Podanie jednoczesne podawanie z Metronidazol-ratiopharm® prowadzi do wzrostu poziomu we krwi takrolimusu (środek takrolimus (środek wpływania na układu odpornościowego). Pozwól dlatego swojemu Tacrolimus-poziom we krwi i funkcję nerek często kontrolować.

Amiodaron

Jednoczesne stosowanie z Metronidazolem i Amiodaronem (środek i Amiodaron (środek do Leczenie od zaburzeń rytmu serca) może prowadzić do wpływu na czynność serca prowadzić. Dlatego należy czynność serca regularnie w EKG monitorować być zostaną. Skonsultuj się z lekarzem, gdy tylko zauważysz objawy zaburzeń rytmu serca,takie jak zawroty głowy, odczuwalnezmiany rytmu serca lub krótkotrwałe omdlenie zauważysz krótkoterminowe Omdlenie zauważyć.

Mykofenolan mofetylu

Przy jednoczesnym podawaniu z antybiotykami może zmniejszyć się dostępność z mykofenolanu mofetylu (substancja lecznicza która działa na układ odpornościowy supresyjnie) w ciele zmniejszona być. Dlatego jest zalecane jednoczesne częste monitorowanie przez badania laboratoryjne zalecane.

Przyjmowanie metronidazolu-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{razem} z alkoholem Alkohol

Spżycie alkoholu jest podczas leczenia metronidazolem i przez co najmniej 48 godzin po nim 48 unikać , ponieważ w przeciwnym razie mogąwystąpić objawy nietolerancji wystąpić mogą, jak np. zaczerwienienia skóry w obszarze głowy i szyi oraz nudności, wymioty ,ból głowy i zawroty głowy. Cięża

Ciąża, Karmienie piersią i Zdolność do rozmnażania

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią ,lub jeśli podejrzewasz , że jesteś w ciąży lub zamierzasz być w ciąży lub planujesz, w ciąży do zostać, zapytaj swojego przed przyjęciem tego leku lekarza lub farmaceutę o poradę. Ciąża Jeśli jesteś

w ciąży

jesteś , są, będzie Pan Pana lekarz tylko wtedy za pomocą Metronidazol-ratiopharm® leczyć, jeśli uzna to za absolutnie konieczne uważa.

Okres karmienia piersią

Metronidazol przechodzi do mleka matki przez. Dlatego powinny Panie podczas leczenia Metronidazol-ratiopharm® Metronidazol-ratiopharm^{jeszcze} co najmniej 2–3 dni po tym przerwać karmienie piersią przerwać Karmienie piersią przerwać.

Płodność

Badania na zwierzętach wskazują tylko możliwy negatywny wpływ Wpływ metronidazolu na męskie narządy płciowe Narządy płciowe gdy wysokie dawki zostały podane zostały, die daleko ponad maksymalną zalecaną dawkę dla człowieka leżą.

Zdolność prowadzenia pojazdów i zdolność do obsługi maszyn

Szczególnie na początku leczenia może Metronidazol-ratiopharm® Twój zdolność reakcji wpływać. Ty możesz wtedy na nieoczekiwane i nagłe zdarzenia nie już szybko i celowo wystarczająco reagować, tak że np. zdolność do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym lub do obsługi maszyn lub praca bez bezpiecznego oparcia jest zmniejszona .Dotyczy to wzmocnionym stopniu w współdziałaniu z alkoholem.

Metronidazol-ratiopharm® zawiera laktozę.

Proszę przyjmować Pan/Pani Metronidazol-ratiopharm® dopiero po konsultacji z Twojemu lekarzowi jeden, jeśli Ci wiadomo jest, że cierpisz na nietolerancję wobec niektórych cukrów cierpisz ..

3. Jak jest Metronidazol-ratiopharm® przyjmować?

Przyjmuj ten lek zawsze dokładnie zgodnie z ustaleniami z Twoim lekarzem przyjmować. Zapytaj swojego lekarza Twojego lekarza lub Farmaceuta według, jeśli Pan/Pani nie pewny/pewna jesteś ..

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości choroby i stopnia Choroba.

Die następujące informacje są wartościami średnimi i dotyczą tylko, o ile Metronidazol-ratiopharm® przez Twojego lekarza nie inaczej przepisano zostało.

Die codzienna dawka może ½ do maksymalnie 5 tabletek Metronidazol-ratiopharm® (odpowiadające 200-2.000 mg metronidazolu) wynosić. Zwykle są die Tabletki 2- do 3 razy dziennie przyjmowane.

Nieskomplikowane Infekcje (Zakażenia, które przy leczeniu zwykle szybko i bez następstw goją się)

W przypadku jednej niskiej dziennej dawki 1½ tabletek (odpowiadającej 600 mg metronidazolu) lub mniej jest wymagane wielodniowe leczenie (5-7 dni) konieczne. Przy większej ilości przyjmowania od 2½-5 tabletek (odpowiadającej 1.000-2.000 mg metronidazolu) dziennie może krótki czas leczenia (13 dni) być wystarczający. Bakteryjna

waginoza Waginoza i rzęsistkowica u dorosłych

Leczenie przez jednorazowe podanie 5 tabletek (odpowiadające 2.000 mg metronidazolu) możliwe.

Alternatywnie w

- bakteryjnej waginozie
2½ Tabletki (odpowiadające 1.000 mg Metronidazol) na dzień (podzielone na 2-3 dawki) przez łącznie 7 dni.
- Rzęsistkowica (szczególnie w opornych przypadkach)
2-2½-(4) tabletki (odpowiednio 800-1.000-[1.600] mg Metronidazol) na dobę (podzielone na 2-3 dawki) przez łącznie 7 dni.

Aby wzajemne zakażenie przy jednej rzęsistkowicy uniknąć unikać, jest to konieczne, aby partner seksualny również został zbadany i w razie potrzeby leczony przy użyciu preparatu zawierającego metronidazol był (patrz 2. „Ostrzeżenia i Środki ostrożności”).

Skomplikowane Infekcje (Zakażenia, które nawet przy starannym leczeniu często trudno goją się) jak

- Zapalenie błony śluzowej macicy (Endometritis)
- Zapalenie jajowodów lub jajników (Adnexitis) Zapalenia
- Zapalenia obszarze zębów, jamy ustnej i szczęki Zapalenia
- Zapalenia obszarze gardła, nosa i uszu Zapalenie otrzewnej
- Zapalenie otrzewnej (Peritonitis) i
- Ropnie (ropni) w jamie brzusznej

Dzienna dawka na początku 4-5 tabletek (odpowiadające 1.600-2.000 mg metronidazolu) i w kolejnych dniach dni 2½ tabletki (odpowiadające 1.000 mg metronidazolu) przez 5-7 dni. Tylko w wyjątkowych przypadkach powinno się dawkowanie do 3½ tabletki (odpowiadające 1.400 mg metronidazolu) na dzień zwiększone być.

W ramach terapii skojarzonej w celu eradykacji *Helicobacter pylori* należy przed rozpoczęciem leczenia uwzględnić oficjalne zalecenia terapeutyczne do przestrzegania.

Leczenie profilaktyczne leczenie powinno na jednorazowe podanie dawki od 1½ do maksymalnie 5 tabletek (odpowiadające 600-2.000 mg metronidazolu) ograniczone pozostać.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zakażenia, które przez beztlenowe bakterie spowodowane są

Dzieci powyżej 8 tygodni do 12 lat: 20 mg do 30 mg/kg masy ciała jednorazowo na dobę jako pojedyncza dawka lub podzielone na 7,5 mg/kg co 8 godzin.
Zależnie od stopnia ciężkości może dawka dawka do 40 mg/kg na dzień zwiększona być. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 7 dni. Dzieci poniżej 8 tygodni: Dla tych Grupa wiekowa jest lek Arzneimittel o mniejszej mocy potrzebny.

Bakteryjna waginoza

Młodzież: dwa razy dziennie 1 tabletką (odpowiadający dwa razy codziennie 400 mg Metronidazol) przez 5 do 7 dni lub 5 tabletek (odpowiadające 2.000 mg Metronidazol) jako jednorazowa dawka.

Profilaktyka okołoperacyjna Profilaktyka

Dzieci poniżej 12 lat: jednorazowo 20 mg do 30 mg/kg masy ciała na do dwie godziny przed zabiegiem ..
poniżej 40. tygodnia ciąży : Dłatej grupy wiekowej Grupa wiekowa jest jeden lek z mniejszą mocą potrzebny

Urogenitalna rzęśstkowica

Młodzież: 5 tabletek (odpowiadające 2.000 mg metronidazolu) jako jednorazowa dawka lub trzy razy codziennie ½ tabletką (odpowiadający trzy razy codziennie 200 mg Metronidazol) przez 7 dni lub dwa razy codziennie 1 tabletką (odpowiadający dwa razy codziennie 400 mg Metronidazol) przez 5 do 7 dni.

Dzieci poniżej 10 lat: 40 mg/kg masy ciała jako dawka jednorazowa (maks. 2.000 mg Metronidazol) lub przez 7 dni 15 mg do 30 mg/kg masy ciała na dzień, podzielone na dwie do trzy dawki dziennie. Nie wolno 2.000 mg na dawkę nie przekraczać ..

(Giardia) Dzieci

powyżej 10 lat: 5 tabletek Tabletki (odpowiednio 2.000 mg Metronidazol) raz dziennie przez 3 dni lub 1 tabletką (odpowiednio 400 mg Metronidazol) trzy razy dziennie przez 5 dni.

Dzieci od 7 do 10 lat: 2½ tabletki (odpowiadające 1.000 mg metronidazolu) raz dziennie przez 3 dni.

Dzieci od 3 do 7 lat: 1½-2 tabletki (odpowiadające 600 mg do 800 mg metronidazolu) raz codziennie ponad 3 dni. Dzieci od 1 do 3 lat: Dla tej grupy wiekowej jest lek Lek niższej mocy wymagany ..

wyrażone : Dzieciotrzymują 15 mg do 40 mg/kg masy ciała na dzień, na dzień, podzielone na dwie do trzech dawki dziennie.

Pełzakowica

Dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabletki (odpowiadające 400 mg do 800 mg metronidazolu) trzy razy dziennie przez 5 do 10 dni.

Dzieci od 7 do 10 lat: ½-1 tabletką (odpowiadające 200 mg do 400 mg metronidazolu) trzy razy dziennie przez 5 do 10 dni.

Dzieci od 3 do 7 lat: ½ tabletką (odpowiadające 200 mg metronidazolu) cztery razy dziennie przez 5 do 10 dni.

Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: ½ tabletki (odpowiadające 200 mg metronidazolu) trzy razy dziennie przez 5 do 10 dni.

Alternatywnie wyrażone: Dzieci otrzymują 35-50 mg/kg Masa ciała na dzień, podzielone na trzy dawki dziennie, przez 5 do 10 dni. Nie wolno przekraczać 2.400 mg na dzień przekroczone być.

Terapia skojarzona do eradykacji *Helicobacter pylori*

W ramach terapii skojarzonej stosuje się 20 mg/kg masy ciała dziennie, podzielone na dwie dawki dziennie (maks. dwa razy 500 mg/dzień), przez 7 do 14 dni stosowane .

Przed rozpoczęciem leczenia Rozpoczęcie leczenia są die oficjalne zalecenia terapeutyczne do przestrzegania.

Dla dzieci poniżej 6 lat są tabletki, które należy połykać w całości przyjmować są, nie odpowiednie.

Sposób Zastosowanie

Przyjmować tabletki Tabletten nie rozgryzając z wystarczającą ilością płynu (np. 1 szklanka wody) podczas posiłku jedzenia lub krótko po nim. Tabletki Tablette może w takie same Dawkowanie podzielone zostaną.

Czas trwania stosowania

O czasie trwania stosowania decyduje Twój lekarz.

Ostrzeżenie:

Leczenie Metronidazol-ratiopharm z Metronidazol-ratiopharm® lub innym innym zawierającym nitroimidazol leku nie może zwykle przekraczać 10 dni przekraczać. Ten okres może tylko w pojedynczych przypadkach przy szczególnie surowym ustaleniu wskazań (tzn. po starannym rozważeniu przez Twojego lekarza w przypadku wystąpienia poważnych przyczyn) przekroczone być. Leczenie powinno być możliwie rzadko powtarzane być. Die Ograniczenie der czasu trwania leczenia ist konieczne, ponieważ może wystąpić uszkodzenie ludzkich komórek rozrodczych (możliwe uszkodzenie materiału genetycznego) niemożna wykluczyć wykluczyć pozwala i ponieważ w serie prób z zwierzętami jeden wzrost z określonych guzów (nowotworów) zaobserwowano został.

Jeśli jeden większą ilość Metronidazol-ratiopharm® przyjęli niż, powinni Państwo przyjąć

Jeśli jednorazową dawkę z Metronidazol-ratiopharm® przypadkowo podwójnie przyjmą, to ma to brak wpływu na dalsze przyjmowanie, tj. należy przyjmować Metronidazol-ratiopharm® następnie w taki sposób, jak w instrukcji dawkowania.

W przypadku przyjmowania znacznie do wysokich dawek leku może to do nudności, wymiotów, zwiększonych odruchów, ataksji (zaburzenie w uporządkowanym przebiegu ruchów), przyspieszonego Bicie serca, Dusznosc i Dezorientacja (Nieznajomość czasu i miejsca) występują.

Środek zaradczy nie jest znany . Po leczeniu przez lekarza objawów dolegliwości można złagodzić jest z pełnym wyzdrowieniem po kilku dniach należy się spodziewać.

Jeśli zapomniałeś o przyjęciu Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{nie} przyjmuj dawki

Należy nie brać podwójna ilość jeden, jeśli zapomniałeś poprzednią dawkę pominąć ..

Twoje pomyłkę jeszcze tego samego dnia zauważysz ,, przyjmij Pan/i zbyt małą przyjętą ilość leku jeszcze w tym samym dniu dodatkowo przyjmij.

Zauważ Pan/i swoje pomyłkę dopiero w następnym dniu, to może to konieczne być, aby leczenie o jeden dzień przedłużyć .. się w takim przypadku proszę z swoim lekarzem. Jeśli

pominiesz Przyjmowanie z Metronidazol-ratiopharm® przerwać

Jeśli leczenie przedwcześnie zakończysz lub je czasowo przewiesz, narażasz się na niepowodzenie leczenia!

W przypadku nieprzyjemnych Działania niepożądane będzie Twój lekarz z Tobą omówi, jakie środki zaradcze są na to dostępne i czy inne leki są dla Ciebie odpowiednie mogą.

Jeśli Ty dalsze pytania dotyczące przyjmowania tego leku masz, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. 4.

4. działania niepożądane są są możliwy?

Jak wszystkie leki może również ten lek działania niepożądane mieć, które jednak nie u każdego wystąpić muszą.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne być. Skontaktuj się natychmiast z lekarzem , jeśli u Ciebie wystąpi jeden z następujących działań niepożądanych ::

Sporadycznie mozedo do do 1 z 100 leczonych dotyczą)

- alergiczna reakcja, często występująca z spadkiem ciśnienia krwi, zawrotami głowy, nudnościami i ew.. dusznością (reakcja anafilaktyczna)obrzęk błon śluzowych
 - Obrzęk błony śluzowej w obszarze dróg oddechowych z dusznością (obrzęk naczynioruchowy)Zaburzenia
 - w koordynacji ruchów (ataksja),Zaburzenia nerwowe(Zaburzenia nerwowe (obwodowe neuropatie) i napady drgawkowe
- Jeśli odczuwasz jedno drętwienie, mrowienie lub tingling w ramionach i nogach odczuwasz, musisz natychmiast swojego lekarza lekarz powiadomić, nawet jeśli te objawy u Ciebie tylko w łagodnej formie występują!

Bardzo rzadko (może do 1 na 10 000 leczonych Leczeni dotyczyć)

- silnie zmniejszona liczba określonych białych krwinek (agranulocytoza), na płytki krwi (trombocytopenia) lub. na wszystkie krwinki (Pancytopenia). Objawy choroby są osłabienie, zwiększona podatność na infekcje i zwiększone siniaki. Należy w tych przypadkach szybko przeprowadzić kontrolę morfologii krwi przeprowadzony są.
- ciężkie przypadki reakcji alergicznej (wstrząsanafilaktyczny). Jeśli dochodzi do niewydolności krążenia z zaburzeniami świadomości Zaburzenia świadomości zimne poty jak również bledosc i zimne ręce i stopy należy natychmiast lekarz wezwać na pomoc zostać powinien. Do przybycia jego przybycia należy tułow górna część ciała pacjenta chorego płasko i jego nogi wysoko do ułożenia. Aby uniknąć przed wychłodzeniem należy pacjent chory przykryć kocem kołdrą ciepło do trzymać. Lekarz rozpocznie die zwykłe odpowiednie działania ratunkowe wprowadzi.

- Niezapalne choroby des mózgu (encefalopatia z np. dezorientacją, gorączka, bóle głowy, halucynacje, paraliż, światłowstręt, zaburzenia widzenia i zdolności ruchowych, sztywność karku), choroby mózdzku z np. np. Mowa-, Ruchowe- i Zaburzenia chodu, Drżenie, Oczopląs (Nystagmus). Te Objawy mogą się po zakończeniu leczenia cofać.
- Zapalenie der Trzustka (Zapalenie trzustki), które do silnych bóli w nadbrzuszu, nudności i wymiotów prowadzi
- Wystąpienie ciężkich utrzymujących się biegunek podczas lub w pierwszych tygodniach po leczeniu (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Ta przez leczenie antybiotykami wywołana choroba jelit może zagrażać życiu zagrażający życiu wymaga leczenia jedna natychmiastowe i odpowiednie lekarskie leczenie. Leki, które ruchy jelit (perystaltyka) hamują, nie mogą być przyjmowane .

Nie znane (Częstość na podstawie dostępnych danych nie oszacowana oszacowalnymie

- bakteryjne spowodowane zapalenie opon mózgowych Zapalenie opon mózgowych aseptycznezapalenie opon mózgowych) Choroba
- /ZapalenieZapalenie des nerw wzrokowy
- U pacjentów, którzy jednocześnie z innymi antybiotykami leczeni byli, wystąpiły przypadki z niewydolności wątroby , w których konieczna była transplantacja wątroby wymagany został.
- ostre zapalne schorzenie skóry lub błony śluzowej (rumień wysiękowy wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona-zespół, toksyczna epidermalna martwica, trwała osutka polekowa); cz. z Zaburzenie ogólnego samopoczucia, gorączka i bolesne pęcherze
- Ostra niewydolność wątroby u pacjentów z zespołemCockayne'a (patrz 2. „Co powinieneś zrobić przed der Przyjmowanie z Metronidazol-ratiopharm® zwrócić uwagę?”, „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Dalsze działania niepożądane

Proszę porozmawiać ze swoim lekarzem o die dalsze leczenie, jeśli następujące działania niepożądane wystąpią:

Często (może do 1 na 10 leczonych dotyczyć)zaburzenia smaku

(np. (np. metaliczny smak), gorzka zgaga, nalot na języku, zapalenia w jamie ustnej (zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej), ucisk w żołądku, nudności, wymioty, brak apetytu, biegunka ciemne zabarwienie des moczu (spowodowane przez produkt metabolizmu, bez znaczenia)

Sporadycznie (może do do 1 na 100 leczonych dotyczyć)

- Infekcje z jednym grzybicą skóry (np. Candida albicans) w okolicach płciowych
- Zmniejszenie od białych krwinek (leukopenia i granulocytopenia). Przy dłuższym stosowaniu są dlatego regularne Kontrole morfologii krwi przeprowadzać.
- zapalny zaczerwienienia, alergiczny katar i alergiczne zapalenie spojówek oka, pokrzywka, gorączka polekowa
- bóle głowy, zawroty głowy
- senność, bezsenność, Omamy (Halucynacje), Stany dezorientacji, Pobudliwość, Smutny Nastrój (Depresja)
- zwykle przejściowe Zaburzenia widzenia jak Podwójne widzenie i Krótkowzroczność

- Zaburzenia wątroby funkcji wątroby, wzrost różnych poziomów enzymów wątrobowych
- reakcje skórne (np. wysypka z pęcherzykami- i pokrzywką [wysypka pokrzywkowa], wysypki krostkowe Wysypka krostkowaświąd ,, napadowo zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca [Flush])
- bolesne oddawanie moczu (dysuria), zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza moczowego) i mimowolne oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)
- uczucie osłabienia

Bardzo rzadko (może do 1 na 10 000 leczonych dotyczyć)

- Żółtaczkazapalenie wątroby z zastojem żółci Bóle mięśni
- Bóle mięśniBóle stawów Bóle stawów

Nie znane (Częstość na podstawie dostępnych danych nie możliwa do oszacowania oszacowalnyNiedosłuch

- NiedosłuchUtrata słuchu,Szumy uszne lub - -szumy uszne (Tinnitus)

Dzieci i młodzież

Częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych są u dzieci i dorosłych takie same.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane zauważyć, zwrócić się do swojego lekarza lub farmaceuty. To dotyczy również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce Ulotka dołączona do opakowania Możesz zgłosićje . Działania niepożądane także bezpośrednio dem Federalny Instytut ds. Leków i Produktów Medycznych, Dział Farmakowigilancja, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Strona internetowa: www.bfarm.de zgłaszać. Zgłaszając Państwo działania niepożądane ,mogą Państwo Ty do tego przyczynić się, że więcej informacji o bezpieczeństwie tego leku do dostępne zostaną ..

5. należy Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharmprzechowywać przechowywać?

Przechowuj ten lek z dala od dzieci niedostępny .

Nie wolno tego leku po dacie na kartoniku i na blistrach po „Termin ważności do” „Użyj. do” podanego terminu ważności nie używać .Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca podanego podanych Nie.

w temperaturze powyżej 30 °C przechowywać.

6. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje Co

Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm^{zawiera} Substancją

- czynną jest metronidazol Metronidazol.
tabletkazawiera zawiera 400 mg Metronidazol.
- Die pozostałe składniki to:

Laktoza-monohydrat, Mikrokrystaliczna celuloza, skrobia kukurydziana, Povidon K30, Krospowidon, Makrogol 6000, Krzemionka koloidalna Dwutlenek krzemu, Stearynian magnezu (Ph.Eur.) [roślinny], Proszek celulozowy

Jak Metronidazol-ratiopharm® wygląda i zawartość opakowania Białawy

,podłużny podłużne Tabletka z rowkiem na obu stronach.

Metronidazol-ratiopharm® jest w opakowaniach z 14 i 20 tabletkami dostępny.

Przedsiębiorstwo farmaceutyczne

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Producent

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren

Ta ulotka została ostatnio zaktualizowana w listopadzie 2022.