

## BRUKSANVISNING: INFORMATION FÖR PATIENTER

### Metronidazol-ratiopharm® 400 mg Tabletter

#### Metronidazol

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar ta detta läkemedel. Läkemedels För det är de innehåller viktig information.

- Spara bipacksedeln. Bipacksedel. Kanske vill du läsa den senare igen ..
- har fler frågor. Frågor har, vänd dig till din läkare eller apotekare. Detta läkemedel
- har ordinerats personligen till dig förskrivet. det inte till tredje part vidare. Det kan andra människor skada, även om de har samma besvär som du. Om du
- biverkningar märker ,, vända dig till din läkare eller apotekare. Detta gäller också för biverkningar , som inte anges idenna bipacksedel anges är .. avsnitt 4. 4.

Vad i denna bipacksedel står

1. Vad är Metronidazol-ratiopharm® och vad används det för? Vad
2. bör du innan du tar det av Metronidazol-ratiopharm® observera?
3. Hur är Metronidazol-ratiopharm® att ta?
4. Vilka biverkningar är möjliga?
5. Hur är Metronidazol-ratiopharm® förvara?
6. Innehåll i förpackningen och ytterligare information

1. Vad är Metronidazol-ratiopharm® och vad används det för?

Metronidazol-ratiopharm® är en Läkemedel mot Parasiter (Parasiter): mot Urdjur (Protozoer) och utan Syre levande (anaeroba) Bakterier.

Metronidazol-ratiopharm® används vid

- Trichomoniasis vid
- bakteriell vaginos ( Aminkolpit Aminkolpitospecifik kolpit ) vid
- amöbiasis vid
- lambliasis (Giardiasis) vid
- infektioner Infektioner (Överföringar, Infektioner) med involvering av bakterier, som utan syre kan leva kan (anaeroba); särskilt infektioner, som orsakas av de kvinnliga könsorgan, från mag-tarmkanalen samt öron-näsa-hals- och tand-mun-käkområde utgå.
- vid infektioner med *Helicobacter pylori* i övre mag-tarm-område
- för förebyggande Behandling till skydd mot infektioner vid kirurgiska ingrepp i kvinnliga genitalområdet och i mag-tarmkanalen

Förklaringar:

Trichomoniasis är en Sjukdom, som orsakas av en flagellat, *Trichomonas vaginalis*, orsakad blir. Det förekommer huvudsakligen till inflammationer av kvinnliga slidan och den manliga urinröret. Spridningen sker nästan snabb uteslutande genom samlag. För upptäckt av sjukdomen görs en sekretutstrykning utförd.

Vid bakteriell vaginos är den bakteriella sammansättningen, som naturligtvis i kvinnliga slidan förekommer, förändras. Det kommer till en inflammation med en fiskliknande lukt. Aminkolpit och ospecific kolpit är andra beteckningar för bakteriell vaginos.

Amöbiasis (amöbadysenteri) är en sjukdom, som orsakas av en rotfoting urdjur, *Entamoeba histolytica*, orsakar blir. Det kommer oftast till buksmärtor och svåra diarréer genom en infektion i mag-tarmkanalen. Dessutom kan det leda till Infestation andra organ förekommer, där sjukdomen sjukdomen obehandlad ofta dödlig förlöper. För upptäckt av amöbadysenteri undersöks avföringen undersöks.

Lambliasis (Giardiasis) är en sjukdom, som orsakas av en flagellat, *Giardia lamblia*, utgår. Genom en infektion i mag-tarmkanalen leder det huvudsakligen till vattniga diarréer. *Giardia lamblia* blir i Avföring påvisad.

2. Vad bör du innan du tar från Metronidazol-ratiopharm® tänka påMetronidazol-ratiopharm

Metronidazol-ratiopharm<sup>får</sup> inte inte tas om

- du är allergisk mot Metronidazol, andra 5-nitroimidazoler (grupp, till vilken också Metronidazol hör) eller någon av de i Avsnitt 6. nämnda övriga beståndsdelar detta läkemedel är. Ett undantag finns, om en livshotande infektion föreligger och andra läkemedel verkningslös är.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Vänligen prata med din läkare eller apotekare innan du Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>tar</sup> ..

försiktighet Varning vid den intag av Metronidazol-ratiopharm® är nödvändigt, om du har störningar i blodbildning samt sjukdom i hjärnan, ryggmärgen och nerver lida. Dela detta din läkare med.

Vid trichomoniasis är ofta sexpartnern också bärare av trichomonader, även om hittills inga sjukliga förändringar upptäckts vara borde. För att ömsesidig smitta undvika ,är det nödvändigt ,att den sexpartnern också undersöks undersökt blir och vid behov med behandlad blir. Vid samlag bör under behandlingen avstås från ..

med svår hepatotoxicitet Hepatotoxicitet/akut leversvikt inklusive fall med dödlig utgång har hos patienter med Cockayne-syndrom hos läkemedel observerats, som metronidazol innehåller. Om du har Cockayne-Syndrom lida, bör din läkare under behandlingen med Metronidazol och efter behandlingen också din leverfunktion Behandling också Der Leverfunktion ofta övervaka.

Informera du din läkare omedelbart och avbryt behandlingen med metronidazol om du följande symtom utvecklar ::

- Buksmärtor, Anorexi, illamående, kräkningar, feber, obehag, trötthet, gulsot, mörk urin, ljusgrå eller vit avföring eller klåda.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Om du lider av allvarliga leverskador, tala vänligen med din läkare innan du tar<sup>Metronidazol-ratiopharm®</sup> med Läkare.

Intag av Metronidazol-ratiopharm® tillsammans med andra läkemedel

Informera din läkare eller apotekare, om du tar andra läkemedel använder använda nyligen andra läkemedel intagit använt har eller avser andra läkemedel ta använda.

Vilka andra läkemedel påverka dö effekten av Metronidazol-ratiopharm® ?

Barbiturater, Fenytoin

En effektminskning av Metronidazol-ratiopharm® inträffar vid administrering av barbiturater (läkemedel med med Aktiva substanser som Hexobarbital eller Fenobarbital, som mot sömnstörningar och krampanfall samt för narkos används blir) och vid administrering av läkemedel med Fenytoin (Aktiv substans mot krampanfall).

Cimetidin

Läkemedel med Cimetidin (aktiv substans mot magkatarr [gastrit] samt mot magsår och tarmsår) kan mycket sällan den utsöndringen av Metronidazol påverka och därmed effekten/biverkningar av Metronidazol-ratiopharm® förstärka.

Disulfiram

Den samtidiga administreringen av alkoholavvänjningsmedlet Disulfiram kan leda till förvirringstillstånd och vissa sinnesstörningar (psykoser) orsaka.

SilibininVid

samtidig administrering av Silymarin/ Silibinin(läkemedel för till Behandling av leversjukdomar och matsmältningsbesvär) är effekten av Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm<sup>minskad</sup> ..

Diosmin

(läkemedel för behandling av av venös bensjukdomar och hemorrojder) kan den metronidazolkoncentrationen i blodet öka och därmed effekten2fbiverkningar av Metronidazol-ratiopharm® förstärka.

Vilka andra läkemedel påverkas av sin verkan av Metronidazol-ratiopharm® påverkas?

Blodförtunnande medel

Patienter, som med vissa läkemedel behandlas bli, som som blodkoagulation hämma (antikoagulantia av kumarin-typ, som t.ex. fenprokumon, warfarin), måste vid behov justeras på nytt bli, eftersom genom Metronidazol-ratiopharm® den blodförtunnande effekten dessa läkemedel förstärks blir.

Busulfan

Den toxicitet av Busulfan (kemoterapeutikum) kan betydligt förstärks bli.

Ciklosporin

Vid samtidig administrering av ciklosporin (ett läkemedel som undertrycker immunreaktionen undertrycker eller. försvagar) och Metronidazol-ratiopharm® kan blodnivån i blodet av ciklosporin ökar vara. Låt därför din ciklosporin- och kreatininblodnivå ofta kontrolleras.

5-fluorouracil

Toxiciteten av 5-fluorouracil ( ettkemoterapeutiskt medel för behandling av tumörer Tumörer) ökar sig, eftersom vid samtidig administrering av Metronidazolratiopharm® utsöndringen av 5-Fluorouracil minskar är ..

Vid administrering av läkemedel med litium (läkemedel Litium (läkemedel för behandling av vissa former euforiska eller depressiva stämningslägen [manisk-depressiva tillstånd]) är försiktighet nödvändig, eftersom därefter en ökning av litium i blodet observerats blev (risk för litiumförgiftning med tremor och krampanfall). Låt därför dina blodnivåer av litium, kreatinin och Elektrolyter kontrollera.

#### Takrolimus

Den samtidiga administrationen med Metronidazol-ratiopharm® leder till en ökning av blodnivån av takrolimus (medel för påverkan av immunsystemet). Låt därför din Tacrolimus-blodnivå och njurfunktion ofta kontrolleras kontrollera.

#### Den

samtidiga användningen med Metronidazol och Amiodaron (medel för till Behandling av hjärtrytmrubbningar) kan leda till en påverkan av hjärtaktiviteten. Därför bör hjärtaktiviteten regelbundet övervakas med EKG övervakas bli. Sök en läkare, så snart du tecken på hjärtrytmrubbning, som yrsel, kännbar hjärtslagsförändring eller en kortvarig svimning märker.

#### Mykofenolatmofetil

Vid samtidig administrering med antibiotika kan tillgängligheten av från mykofenolatmofetil (en läkemedelssubstans som effekten av immunsystemet undertrycker) i kroppen minska vara. Därför rekommenderas en samtidig frekvent övervakning genom laboratoriekontroller rekommenderas.

#### Intag av Metronidazol-ratiopharm® tillsammans med alkohol

Den konsum av alkohol är under behandlingen med Metronidazol och i minst 48 48 därefter att undvika , eftersom annars intoleransreaktioner kan uppstå uppträda kan, som t.ex. hudrodnad i området av huvudet och nacken samt illamående, kräkningar, huvudvärk och yrsel.

#### Graviditet, Amning och Fortplantningsförmåga

Om du gravid är eller ammar, eller om du misstänker, gravid att vara eller avser, gravid att bli, fråga du innan du tar detta läkemedel din läkare eller apotekare om råd. Graviditet

#### Om du

är gravid , är, kommer du din läkare endast då med Metronidazol-ratiopharm® behandla, om han anser detta vara absolut nödvändigt anser.

#### Amning

Metronidazol passerar i bröstmjölk över. Därför bör du under en behandling med Metronidazol-ratiopharm® och ännu minst 2–3 dagar därefter amningen avbrytas avbryta.

#### Fortplantningsförmåga

Djurstudier visar endast en möjlig negativ påverkan av Metronidazol på de manliga könsorganen, om höga doser administrerades blev, die långt över den maximala rekommenderade dosen för människor ligger.

## Körförmåga och Förmåga att använda maskiner

Särskilt i början av behandlingen kan Metronidazol-ratiopharm® Er Reaktionsförmåga påverka. Du kan då på oväntade och plötsliga händelser inte längre snabbt och målinriktat nog reagera, så att t.ex. förmågan förmåga till aktivt deltagande i trafiken eller till att hantera maskiner eller att arbeta utan säkert stöd minskas blir. Detta gäller i förstärkt mått i samverkan med alkohol.

Metronidazol-ratiopharm® innehåller laktos.

Vänligen ta du Metronidazol-ratiopharm® endast efter samråd med Din läkare en, om du känd är, att du lider av en intolerans mot vissa sockerarter.

### 3. Hur är Metronidazol-ratiopharm® att ta?

Ta detta läkemedel alltid exakt enligt överenskommelse med din läkare in. Fråga din hos din läkare eller Apotekare efter, om du inte säker är ..

#### Dosen

Doseringen beror på typ och allvarlighetsgrad av sjukdom den Sjukdom.

De följande uppgifter är genomsnittsvärden och gäller endast, såvida Metronidazol-ratiopharm® inte av din läkare annorlunda föreskrivits har.

Den dagliga dosen kan ½ till högst 5 tabletter Metronidazol-ratiopharm® (motsvarande 200-2.000 mg metronidazol) vara. Vanligtvis tas die Tabletter 2- till 3 gånger dagligen intas.

Okomplicerade Infektioner (Smittor, som vid Behandling oftast snabbt och utan Följder läker ut)

Vid en låg daglig doseringsmängd av 1½ tabletter (motsvarande 600 mg Metronidazol) eller mindre är en flerdagars behandling (5-7 dagar) nödvändig.

Vid en högre intagsmängd av 2½-5 tabletter (motsvarande 1.000-2.000 mg Metronidazol) per dag kan en kort behandlingsperiod (13 dagar) vara tillräcklig .

Bakteriell vaginos och trichomoniasis vid vuxna behandling genom engångsdos av 5 tabletter (motsvarande 2.000 mg metronidazol) möjligt.

#### Alternativt vid

- bakteriell vaginos  
2½ Tabletter (motsvarande 1.000 mg Metronidazol) per dag (uppdelat i 2-3 enskilda doser) för totalt 7 dagar.
- Trichomoniasis (särskilt vid svårbehandlade fall)  
2-2½-(4) tabletter (motsvarande 800-1.000-[1.600] mg Metronidazol) per dag (uppdelat i 2-3 enskilda doser) i totalt 7 dagar.

För att ömsesidig smitta vid en Trichomoniasis förhindra undvika, är det nödvändigt, att den sexpartnern också undersöks och vid behov med en metronidazol-innehållande preparat behandlas blir (se 2. „Varningar och Försiktighetsåtgärder“).

Komplicerade Infektioner (Infektioner, som även vid noggrann behandling ofta svårt läker) hur

- inflammation av livmoderslemhinnan (endometrit)
- inflammation av äggledare eller äggstockar (adnexit)
- inflammationer i området av tänder, mun och käke
- inflammationer i området av hals, näsa och öron
- bukhinneinflammation (Peritonit) och
- Varbölder (Abscesser) i bukhålan

Daglig doseringsmängd till början 4-5 tabletter (motsvarande 1.600-2.000 mg Metronidazol) och på de följande dagar 2½ tabletter (motsvarande 1.000 mg Metronidazol) i 5-7 dagar. Endast i undantagsfall bör doseringen öka till 3½ tabletter (motsvarande 1.400 mg Metronidazol) per dag ökas bli.

I ramen av kombinationsterapi för eradikering av *Helicobacter pylori* är före behandlingsstart de officiella terapirekommendationerna att följa.

Den förebyggande behandlingen bör på en engångsdos dos av 1½ till högst 5 tabletter (motsvarande 600-2.000 mg Metronidazol) begränsas till.

Användning hos barn och ungdomar

Infektioner, som orsakas av anaeroba bakterier orsakade är

Barn över 8 veckor till 12 år: 20 mg till 30 mg/kg kroppsvikt en gång per dag som engångsdos eller uppdelat i 7,5 mg/kg var 8:e timme.

Beroende på svårighetsgraden kan dosen Dos till 40 mg/kg per dag ökas bli. Behandlingens varaktighet Behandling är vanligtvis 7 dagar. Barn under 8 veckor: För dessa Åldersgrupp blir en läkemedel med lägre styrka behövs.

Bakteriell vaginos

Ungdomar: två gånger dagligen 1 tablett (motsvarande två gånger dagligen 400 mg Metronidazol) över 5 till 7 dagar eller 5 tabletter (motsvarande 2.000 mg Metronidazol) som engångsdos.

Perioperativ profylax

Barn under 12 år: en gång 20 mg till 30 mg/kg kroppsvikt en till två timmar före ingreppet .. under 40. graviditetsveckan : Fördenna åldersgrupp Åldersgrupp blir en Läkemedel med lägre styrka behövs

Urogenital trichomoniasis

Ungdomar: 5 Tabletter (motsvarande 2.000 mg Metronidazol) som engångsdos eller tre gånger dagligen ½ tablett (motsvarande tre gånger dagligen 200 mg Metronidazol) över 7 dagar eller två gånger dagligen 1 tablett (motsvarande två gånger dagligen 400 mg Metronidazol) över 5 till 7 dagar.

Barn under 10 år: 40 mg/kg kroppsvikt som engångsdos (max. 2.000 mg Metronidazol) eller 7 dagar 15 mg till 30 mg/kg kroppsvikt per dag, uppdelat på två till tre doser dagligen. Det får 2.000 mg per dos inte överskridas bli.

Lambliasis (Giardiasis)

Barn över 10 år: 5 tabletter (motsvarande 2.000 mg Metronidazol) en gång per dag under 3 dagar eller 1 tablett (motsvarande 400 mg Metronidazol) tre gånger dagligen under 5 dagar.

Barn från 7 till 10 år: 2½ tabletter (motsvarande 1.000 mg Metronidazol) en gång dagligen över 3 dagar.

Barn från 3 till 7 år: 1½-2 tabletter (motsvarande 600 mg till 800 mg Metronidazol) en gång dagligen över 3 dagar. Barn från 1 till 3 år: För denna åldersgrupp rekommenderas ett läkemedel med lägre styrka behövs.

Alternativt uttryckt: Barn får 15 mg till 40 mg/kg kroppsvikt per dag, uppdelad på två till tre doser dagligen.

#### Amöbiasis

Barn över 10 år: 1-2 tabletter (motsvarande 400 mg till 800 mg Metronidazol) tre gånger dagligen över 5 till 10 dagar.

Barn från 7 till 10 år: ½-1 tablett (motsvarande 200 mg till 400 mg Metronidazol) tre gånger dagligen över 5 till 10 dagar.

Barn från 3 till 7 år: ½ tablett (motsvarande 200 mg Metronidazol) fyra gånger dagligen över 5 till 10 dagar.

Barn från 1 till 3 år: ½ tablett (motsvarande 200 mg Metronidazol) tre gånger dagligen över 5 till 10 dagar.

Alternativt uttryckt: Barn får 35-50 mg/kg Kroppsvikt per dag, uppdelat på tre doser dagligen, över 5 till 10 dagar. Det får 2.400 mg per dag inte överskridas bli.

#### Kombinationsterapi för utrotning av Helicobacter pylori

I Ram en kombinationsterapi ges 20 mg/kg kroppsvikt per dag, uppdelat på två doser dagligen (max. två gånger 500 mg/dag), under 7 till 14 dagar används. Före behandlingsstart är de officiella terapirekommendationerna att beakta ..

under 6 år är tabletter , som ska sväljas hela att ta , inte lämpliga. Typ av.

#### Typ av Användning

Ta tabletterna hela med tillräcklig vätska (t.ex. 1 glas vatten) under måltiden eller strax efteråt .  
Tabletten kantas in utan att samma Doser delas ska.

#### Varaktighet av användning

Över varaktigheten av användning beslutar din läkare.

#### Varning:

Behandlingen med Metronidazol-ratiopharm Metronidazol-ratiopharm® eller en annan nitroimidazol-innehållande läkemedel får i regel inte överstiga 10 dagar överskrida. Denna tidsfrist får endast i enskilda fall vid särskilt sträng indikationsställning (d.v.s. efter noggrann övervägande av din läkare vid förekomst allvarliga skäl) överskridas kan. Behandlingen bör helst sällan upprepas bör bli. Die Begränsning av behandlingstiden är nödvändig, eftersom det inte kan uteslutas att mänskligaköns-celler ( möjlig skada på arvs massan) låter och eftersom i försöks-serier med djur en ökning av vissa tumörer (svulster) sågs blev.

Om du en större mängd av Metronidazol-ratiopharm® tagit har, än du borde

Om du en engångsdos av Metronidazol-ratiopharm® av misstag dubbel tar, har detta inga effekter på den fortsatta intaget, dvs. du tar Metronidazol-ratiopharm® därefter så som, som i doseringsanvisningen.

Vid intag betydligt till hög läkemedelsmängder kan det till illamående, kräkningar, ökade reflexer, ataxi (störning i ordnad rörelseförlopp), snabbare Hjärtslag, andnöd och desorientering (okunskap om tid och plats) förekommer.

Ett motgift är inte känt. Efter läkar behandling av besvären är med en fullständig återhämtning efter några dagar att förvänta.

Om du har intag av Metronidazol-ratiopharm® glömt har

Ta inte den dubbla mängd en, om du tidigare intag glömt har.

Om du ditt misstag ännu samma dag märker ,, ta du för lite intagen läkemedelsmängd ännu på samma dag i efterhand in.

Märker du ditt misstag först på nästa dag, så kan det nödvändigt vara att behandlingen med en dag förlänga .. med sådan ett fall vänligen med din läkare. Om du

behandlingen Intag av Metronidazol-ratiopharm® avbryta

Om du behandlingen i förtid avslutar eller den tillfälligt avbryter, äventyrar du behandlingsframgången!

Vid obehagliga Biverkningar kommer din läkare med dig diskutera, vilka motåtgärder det finns för detta och om andra läkemedel är aktuella för dig.

Om du ytterligare frågor om intag detta läkemedel har, kontakta din läkare eller apotekare . 4. Vilka

4. finns Biverkningar är möjlig?

Liksom alla läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, som dock inte hos alla uppträda behöver.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga vara. Kontakta dig omedelbart en läkare , om du upplever någon av följande biverkningar ::

Ibland kan upp till vara till 1 av 100 Behandlade påverkar)

- allergisk reaktion, ofta åtföljd av blodtrycksfall, yrsel, illamående och ev.. andnöd (anafylaktisk reaktion)
- slemhinnesvullnad i området av luftvägarna med andnöd (angioneurotiskt ödem)
- Störningar i samspelet av rörelserna (ataxi), nervstörningar (perifera neuropatier) och krampanfall

Om du en domningar, stickningar eller pinnningar i armar och ben känner, måste du omedelbart din läkare underrätta, även om dessa företeelser hos dig endast i mild form uppträder!

Mycket sällan (kan upp till 1 av 10 000 behandlade Behandlade påverka)

- stark minskat antal av vissa vita blodkroppar (agranulocytos), på blodplättar (trombocytopeni) eller av alla blodkroppar (Pancytopeni). Sjukdomstecken är svaghet, ökad känslighet för infektioner och ökade blåmärken. Det måste i dessa fall snabbt en blodbildskontroll utföras bli.
- allvarliga fall av allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Om det leder till en cirkulationskollaps med medvetandestörningar, kallsvettning samt bleka och kalla händer och fötter måste omedelbart en läkare till hjälp kallas in. Tills till dennes ankomst är överkroppen Överkropp av sjuka platt och hans ben högt att placera. För att undvika av nedkylning är den sjuka med en filt varm till hålla. Läkaren kommer de vanliga motsvarande akutåtgärder initiera.
- Icke- inflammatoriska sjukdomar i hjärnan (encefalopati med t.ex. förvirring, feber, huvudvärk, hallucinationer, förlamningar, ljuskänslighet, störningar av syn- och rörelseförmåga, nackstelhet), sjukdomar av lillhjärnan med t.ex. Tal-, Rörelse- och Gångstörningar, Darrningar, Ögondarrningar (Nystagmus). Dessa Företeelser kan återgå efter behandlingsslut tillbakabildas.
- av den Bukspottkörtel (Pankreatit), vilket till starka smärtor i övre buken, illamående och kräkningar leder
- Förekomst allvarliga ihållande diarréer under eller i de första veckorna efter den behandlingen (pseudomembranös enterokolit). Denna genom en antibiotikabehandling utlösta tarmsjukdom kan livshotande vara och kräver en omedelbar och lämplig medicinsk behandling. Läkemedel som tarmrörelser Tarmrörelse peristaltikPeristaltikhämningar ,får inte tas intagen Inte

känd ( (Frekvens på grundval av tillgängliga data inte bedömbart)

- inte bakteriell orsakad hjärnhinneinflammation (aseptisk meningit)
- Sjukdom/inflammation av Synnerv
- Vid patienter, som samtidigt med andra antibiotika behandlades ,uppstod fall av leversvikt där en levertransplantation krävdes Levertransplantation nödvändig blev.
- akut inflammatorisk sjukdom i huden eller slemhinna (Erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-syndrom, toxisk epidermal nekrolys, fixerat läkemedelsexantem); t. ex. med Störning av allmäntillståndet, feber och smärtsam blåsbildning
- Akut leversvikt hos patienter med Cockayne-syndrom (se 2. "Vad bör du innan du Intag av Metronidazol-ratiopharm® observera?", „Varningar och Försiktighetsåtgärder")

Ytterligare Biverkningar

Prata gärna med din läkare om die ytterligare behandling, om följande biverkningar uppträder:

Vanliga (kan upp till 1 av 10 behandlade påverka )smakstörningar

(t.ex. (t.ex. metallisk smak), bitter rapning, tungbeläggning, inflammationer i munnen (glossit, stomatit), magont, illamående, kräkningar, aptitlöshet, diarré mörkfärgning av Urin (orsakad av en metabolit, utan sjukdomsvärde)

Ibland (kan upp till 1 av 100 behandlade drabbas )Infektioner

- Infektioner med en hudsvamp (t.ex. Candida albicans) i genitalområdet

- Minskning av vita blodkroppar (leukopeni och granulocytopeni). Vid längre användning är därför regelbundna Blodbildskontroller att genomföra.
- inflammatorisk Rodnader, allergisk Rinnsnuva och allergisk Konjunktivit i ögat, Nässelutslag, Läkemedelsfeber
- Huvudvärk, Yrsel
- Sömnighet, Sömlöshet, Sinnesvilla (Hallucination), Förvirringstillstånd, Retbarhet, sorgsen Nedstämdhet (Depression)
- oftast övergående Synstörningar som Dubbelseende och Närsynthet
- Störningar leverns leverfunktion, ökning olika leverenzymvärden
- hudreaktioner (t.ex. hudutslag med blåsor- och kvaddelbildning [urtikariellt exantem], pustelutslag, klåda, anfallsvis hudrodnad med värmekänsla [Flush])
- smärtsam urinering (dysuri), blåsinflammation (cystit) och ofrivillig avgång av urin (urininkontinens)
- svaghetskänsla

Mycket sällan (kan upp till 1 av 10 000 behandlade påverkas )Gulsot

- ,leverinflammation med stopp av gallflödet Muskelsmärta
- Muskelvärkledvärk Ledvärk

Inte känd (Frekvens baserat på tillgängliga data inte bedömbart ) Hörselnedsättning/

- Hörselförlust,öronsuseller Öronsusningar brus -susa (Tinnitus)

Barn och ungdomar

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar är hos barn och vuxna lika.

Rapportering av biverkningar

Om du biverkningar observera, vänd dig till din läkare eller apotekare. Detta gäller även för biverkningar , som inte anges idenna bipacksedel Bipacksedel anges är. Du kan Biverkningar också direkt dem Förbundsinstutet för läkemedel och medicintekniska produkter, Avd. Farmakovigilans, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webbplats: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) rapportera. Genom att rapportera biverkningar ,kan du Du till bidra, att mer information om säkerheten för detta läkemedel tillgänglig gjord blir.

5. Hur ska Metronidazol-ratiopharm® förvaras?

Förvara detta läkemedel oåtkomligt för barn förvaras oåtkomligt .

Du får inte detta läkemedel efter det datum som anges på kartongen och blisterförpackningarna efter "Används före"/"Anv. till" angivna utgångsdatum inte mer använda. Det utgångsdatum avser sig till den sista dagen i angivna månaden.

Förvara inte över 30 °C förvara.

6. Innehåll i förpackningen och ytterligare information

Vad Metronidazol-ratiopharm® innehåller

- Den aktiva substansen är Metronidazol.

Varje tablett innehåller 400 mg Metronidazol.

- De övriga beståndsdelarna är:  
Laktos-monohydrat, Mikrokristallin cellulosa, Majsstärkelse, Povidon K30, Krospovidon, makrogol 6000, Högdispergerad Kiseldioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [vegetabilisk], Cellulospulver

Hur Metronidazol-ratiopharm® ser ut och Innehåll i förpackningen

Vitaktig, avlång Tablett med brytskåra på båda sidor.

Metronidazol-ratiopharm® är i förpackningar med 14 och 20 tabletter tillgänglig.

Farmaceutisk företagare

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

Tillverkare

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Str. 3  
89143 Blaubeuren

Denna bipacksedel blev senast reviderad i november 2022.