

Beipackzettel: Information für die Anwenderin

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg überzogene Tabletten

Levonorgestrel / Ethinylestradiol

Lesen sorgfältig den gesamten Beipackzettel bevor Sie dieses Arzneimittel geht verwenden, denn es steht wichtige Informationen in für Sie.

Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht benötigen Sie ihn später wieder ..

Hat u noch Fragen? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Geben dieses Arzneimittel nicht weiter an andere, denn es ist nur für Sie verschrieben.

Het kann schädlich sein für andere, auch wenn haben sie dieselben Beschwerden wie Sie.

Bekommen Sie Beschwerden von einer der Nebenwirkungen die in Rubrik 4 stehen?

Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht?

Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wichtige Dinge die Sie wissen müssen über kombinierte hormonelle Kontrazeptiva:

Diese Mittel stellen eine der zuverlässigsten umkehrbaren Verhütungsmethoden

Empfängnisverhütungsmethoden, vorausgesetzt korrekt verwendet

Sie erhöhen ein etwas höheres Risiko für die Entstehung von einem Blutgerinnsel

(Thrombose) in den Venen und Arterien, vor allem in dem ersten Jahr dass Sie ein

kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden oder wenn Sie nach einer

Unterbrechung von 4 Wochen von länger wieder beginnt mit dem Gebrauch von einem

kombinierten hormonalen Kontrazeptivum

Achten Sie gut auf und kontaktieren Sie Ihren Arzt wenn Sie denkt dass Sie

möglicherweise Symptome eines eines Blutgerinnsels haben (siehe Abschnitt 2

'Blutgerinnsel (Thrombose)').

In diesem Beipackzettel:

1. Was ist Microgynon 30 und wofür wird dieses Mittel verwendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig mit sein?
3. Wie verwenden Sie dieses Mittel?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Mittel?
6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

1. Was ist Microgynon 30 und wofür wird dieses Mittel verwendet?

Microgynon 30 ist eine Antibabypille. Microgynon 30 wird verwendet um Schwangerschaft zu verhindern.

Antibabypillen die zwei Hormone enthalten werden 'Kombinationspillen' genannt. Die zwei verschiedenen weibliche Hormone sind levonorgestrel (ein Hormon mit progesteronähnlicher Wirkung) und Ethinylestradiol (ein Hormon mit östrogener Wirkung). Antibabypillen mit zwei Hormone sind sehr zuverlässig. Wenn sie korrekt eingenommen werden (ohne dass Tabletten vergessen werden) ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sehr klein.

2. Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?

Allgemeine Hinweise

Lesen bevor Sie beginnen mit der Anwendung von Microgynon 30 die Informationen über Blutgerinnsel (Thrombose) in Abschnitt 2. Es ist besonders wichtig dass Sie liest was die Symptome sind von einem Blutgerinnsel – siehe Abschnitt 2 'Blutgerinnsel (Thrombose)'.

Bevor Sie beginnen mit der mit dem Gebrauch von Microgynon 30, wird Ihr Arzt Ihnen ein paar Fragen stellen über Ihre persönliche Krankengeschichte und die Ihrer nächsten Familie stellen. Der Arzt wird auch Ihre Blutdruck messen und, abhängig von Ihrer persönlichen Situation, möglicherweise auch noch andere Untersuchungen durchführen.

In diesem Beipackzettel werden verschiedene Situationen beschrieben in denen Sie aufhören mit der Anwendung von Microgynon 30 oder in denen die Zuverlässigkeit von Microgynon 30 verringert kann sein. In diesen Situationen müssen Sie entweder keinen Geschlechtsverkehr haben, oder ein zusätzliches Verhütungsmittel ohne Hormone verwenden, wie zum Beispiel ein Kondom oder eine andere Barrieremethode. Verwenden Sie nicht die Temperaturmethode oder periodische Enthaltbarkeit .. Diese Methoden können unzuverlässig sein weil Microgynon 30 die monatlichen Veränderungen der Körpertemperatur und das Zervixschleim beeinflusst.

Genau wie andere Verhütungsmittel mit Hormonen schützt Microgynon 30 nicht gegen Infektion mit dem HIV-Virus (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen (STIs).

Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?

Sie dürfen dieses Mittel nicht verwenden wenn Sie eine der unten aufgeführten Erkrankungen haben. Wenn Sie ein oder mehr der unten aufgeführten Erkrankungen hat, sagen Sie es dann Ihrem Arzt. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen welche andere Form von Empfängnisverhütung geeigneter ist für Sie.

Verwenden Microgynon 30 nicht:

wenn Sie ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß von den Beinen (tiefe venöse Thrombose, DVT), die Lungen (Lungenembolie, PE) oder anderes Organ hat, oder dies in der Vergangenheit hatte gehabt

wenn Sie wissen dass Sie eine Störung haben die Ihre Blutgerinnung beeinflusst – zum Beispiel Protein C-Mangel, Protein S-Defizienz, Antithrombin III-Defizienz, Faktor V-Leiden oder Antikörper gegen Phospholipide

wenn Sie operiert werden müssen oder über lange Zeit nicht mobil sind (siehe Rubrik 'Blutgerinnsel (Thrombose)')

wenn Sie jemals einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten wenn Sie Angina pectoris (eine Erkrankung die starke Schmerzen in der Brust verursacht und ein erstes Anzeichen einer eines Herzinfarkts sein) oder einen transitorischen ischämischen Anfall hat (TIA – vorübergehende Symptome von einem Schlaganfall), oder dies jemals hatte wenn

Sie eine der folgenden Krankheiten haben , die das, die es Risiko auf ein Blutgerinnsel in Ihren Arterien können erhöhen:

- o schwere Diabetes (Zuckerkrankheit) mit Schädigung von Blutgefäßen
- o stark erhöhter Blutdruck
- o ein ernsthaft erhöht Fettgehalt in Ihrem Blut (Cholesterin oder Triglyceride)
- o eine Erkrankung die Hyperhomocysteinämie genannt wird

wenn Sie eine Art Migräne dass 'Migräne mit Aura' wird genannt hat (oder hat gehabt)
wenn Sie eine schwere Lebererkrankung oder Gelbsucht haben, oder in der Vergangenheit hatten gehabt

wenn Sie ein Geschwulst in Ihrer Leber haben, oder haben gehabt

wenn Sie Brustkrebs oder Krebs an den Geschlechtsorganen hat, oder in der Vergangenheit hat gehabt

wenn Sie ungewöhnliche Blutungen aus der Vagina haben, deren die Ursache nicht festgestellt ist

wenn u allergisch sind gegen eine der Stoffe in diesem Arzneimittel. Diese Stoffe können Sie finden in Abschnitt 6.

Verwenden Microgynon 30 nicht wenn Sie Hepatitis C haben und hierfür Arzneimittel mit Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir, Dasabuvir, Glecaprevir/Pibrentasvir oder Sofosbuvir/Velpatasvir/voxilaprevir verwendet (siehe auch Abschnitt 2 ,Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?').

Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit diesem Mittel?

Wann müssen Sie Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt?

Rufen notfallmedizinische Hilfe an wenn

- Sie mögliche Beschwerden oder Symptome Symptome von ein Blutgerinnsel bemerkt, die können bedeuten dass Sie leiden an ein Blutgerinnsel in Ihrem Bein (d.h.. tiefe Venenthrombose Thrombose), ein Blutgerinnsel in Ihr Lunge (d.h.. Lungenembolie), ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall (siehe unten die Rubrik 'Blutgerinnsel (Thrombose)').

Gehen für eine Beschreibung der Beschwerden oder Symptome dieser schweren Nebenwirkungen zu 'Wie 'Wie erkennt Sie ein Blutgerinnsel?'.
Sagen es Ihrem Arzt, wenn ein der folgenden Situationen auf Sie zutrifft .

Sagen es Ihrem Arzt, wenn ein der folgenden Situationen auf Sie zutrifft .

Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses Mittel verwenden. In einigen Situationen müssen Sie besonders vorsichtig sein wenn Sie Microgynon 30 oder eine andere Kombinationspille verwendet. Es kann notwendig sein dass Sie regelmäßig von Ihrem Arzt überprüft werden. Wenn die Erkrankung auftritt, oder sich verschlimmert, während u Microgynon 30 verwendet, müssen Sie dies auch Ihrem Arzt mitteilen ..

rauchen ..

Zuckerkrankheit(Diabetes) hat.

Wenn Sie viel zu schwer sind.

Wenn Sie eine erhöhten Blutdruck haben.

Wenn Sie eine Erkrankung der Herzklappen oder eine bestimmte Herzrhythmusstörung hat.

Wenn jemand in Ihrer unmittelbaren Familie jemals Thrombose, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat gehabt.

Wenn Sie an leiden unter Migräne.

Wenn Sie Epilepsie haben (siehe 'Verwenden Sie noch andere Medikamente?').

Wenn jemand in Ihrem direkte Familie jemals Brustkrebs hat gehabt.

Wenn Sie eine Erkrankung der Leber oder der Gallenblase haben.

Wenn Sie die Krankheit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa (chronische entzündlich Darmerkrankung) haben

Wenn Sie systemischer Lupus erythematodes (SLE – eine Erkrankung die Ihr natürliches Abwehrsystem beeinträchtigt) haben.

Wenn Sie hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS – ein Störung des Blutgerinnung die Nierenversagen verursacht) hat.

Wenn Sie Sichelzellenanämie (eine erbliche Krankheit der roten Blutzellen) hat.

Wenn Sie erhöhte Fettwerte in Ihrem Blut (Hypertriglyceridämie) haben, oder diese Erkrankung tritt in Ihrer Familie auf von ist in Ihr Familie aufgetreten.

Hypertriglyceridämie ist in Zusammenhang gebracht mit einem höheren Risiko für Pankreatitis (eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse) zu bekommen.

Wenn Sie operiert werden müssen oder Sie sind während langer Zeit nicht auf den Beinen (siehe 'Blutgerinnsel' in Abschnitt 2).

Wenn Sie kürzlich entbinden sind, haben Sie ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln. Fragen Ihren Arzt, wie schnell nach der Entbindung Sie können beginnen mit der Anwendung von Microgynon 30.

Wenn Sie eine Entzündung in den Venen direkt unter der Haut (oberflächliche Thrombophlebitis) hat

Wenn Sie Krampfadern haben.

Wenn Sie Chloasma haben oder Sie haben jemals Chloasma hatten (gelbbraune Pigmentflecken, sogenannte 'Schwangerschaftsflecken', vor allem im Gesicht); wenn dies der Fall ist, ist es ratsam zu direkte Exposition gegenüber Sonnenlicht oder ultraviolettem Licht zu vermeiden.

Wenn Sie Symptome eines Angio-ödems bekommen, wie ein geschwollenes Gesicht, Zunge und/ oder Rachen und/ oder Probleme beim Schlucken oder Nesselsucht möglich zusammen mit Problemen mit Atmen, nehmen Sie dann sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt. Produkte die östrogene Hormone enthalten, können möglich die Symptome von erblich und erworben angio-ödem verursachen oder verschlimmern.

BLUTGERINNSEL (THROMBOSE)

Wenn Sie ein kombiniertes hormonales Verhütungsmittel wie Microgynon 30 verwenden, hat Sie ein höheres Risiko für Blutgerinnsel zu bekommen als wenn Sie kein kombiniertes hormonelles Verhütungsmittel verwenden. In selten auftretenden Fälle kann ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß verstopfen und ernste Probleme verursachen.

Blutgerinnsel können entstehen

in Venen (dies wird 'venöse Thrombose', 'venöse Thromboembolie' oder VTE genannt),
in Arterien (dies wird 'arterielle Thrombose', 'arterielle Thromboembolie' von ATE genannt).

Man erholt nicht immer vollständig von Blutgerinnseln. In seltenen Fällen können es langfristige schwere Auswirkungen geben sind, oder in sehr selten auftretende Fälle können Blutgerinnsel tödlich sein.

Es ist wichtig dass Sie wissen dass das allgemeine Risiko für ein schädliches Blutgerinnsel durch Microgynon 30 klein ist.

WIE ERKENNEN SIE EIN BLUTGERINNSSEL?

Rufen Sie notfallmäßige medizinische Hilfe in wenn Sie eines der folgenden Beschwerden von Symptome bemerkt.

Bekommen Sie ein von diesen Beschwerden oder Symptome?
darunter leiden?

Wo können Sie

Schwellung von ein Bein oder entlang ein Vene in ein Bein oder Fuß, besonders wenn dies einher geht mit:

Tiefe venöse Thrombose

Schmerzen oder Empfindlichkeit des Beins, die Sie möglicherweise nur spüren beim Stehen oder Gehen erhöhte Temperatur im betroffenen Bein Farbveränderung Farbveränderung der Haut des Beins, zum Beispiel blass, rot oder blau werden

plötzliche unerklärliche Atemnot Lungenembolie oder schnelle Atmung plötzlich Husten ohne ersichtlichen Ursache, wobei Sie Blut husten können scharfer Schmerz in der Brust, der schlimmer werden kann wenn Sie tief einatmen ernst leicht Gefühl im Kopf oder Schwindel schneller oder unregelmäßiger Herzschlag starke Schmerzen in Ihrem Magen.

Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Arzt, denn einige von diesen Symptomen, wie Husten oder Atemnot, können fälschlicherweise als angesehen werden für eine leichtere Erkrankung, wie ein Atemwegsinfektion (z.B.. Erkältung).

Symptome treten meistens in einem Auge auf:
unmittelbar

Venenthrombose in der

sofort Verlust des Sehvermögens, oder Netzhaut (Blutgerinnsel im Auge) schmerzlos verschwommenes Sehen, was sich entwickeln kann zu Verlust des Sehvermögens

Schmerzen, Unbehagen, Druck oder schweres Gefühl auf der Brust beklemmend oder volles Gefühl in der Brust, Arm oder unter das Brustbein

Herzinfarkt

voll Gefühl, Verdauungsstörung oder nach Luft schnappen
Unbehagen im Oberkörper das ausstrahlt in den
Rücken, Kiefer, Hals, Arm und Magen
schwitzen, Übelkeit, Erbrechen oder
Schwindel
extreme Schwäche, Angst oder Atemnot
schneller oder unregelmäßiger Herzschlag

plötzliche Schwäche oder Taubheit Gefühl von Schlaganfall
Gesicht, Arm oder Bein, besonders auf einer Seite
des Körpers
plötzliche Verwirrung, Schwierigkeiten beim Sprechen
oder Verstehen
plötzliche Schwierigkeiten mit Sehen in einem oder beiden Augen
plötzliche Schwierigkeiten mit Gehen, Schwindel,
Verlust des Gleichgewichts oder Koordination
plötzliche, schwere oder langanhaltende Kopfschmerzen
ohne bekannte Ursache
vermindertes Bewusstsein oder Ohnmacht mit oder
ohne epileptischen Anfall.

Die Symptome von ein Schlaganfall können manchmal nur kurz dauern und fast direkt und vollständig erholen. Dennoch müssen Sie dann trotzdem notfallmedizinische medizinische Hilfe anfordern, weil Sie ein Risiko haben können für noch einen Schlaganfall zu erleiden.

Schwellung und leichte Blaufärbung von ein Arm Blutgerinnsel die andere
oder Bein Blutgefäße verstopfen
schwere Schmerzen in Ihrem Bauch (akuter Bauch)

BLUTGERINNSEL IN EINER VENE

Was kann er geschehen wenn er ein Blutgerinnsel gebildet wird in einer Vene?

Der Gebrauch von kombinierten hormonellen Kontrazeptiva steht in Zusammenhang gebracht mit einem höheren Risiko auf Blutgerinnsel in einer Vene (venöse Thrombose). Diese Nebenwirkungen treten jedoch selten auf. Meistens treten sie im ersten Jahr auf, in dem ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwendet.

Wenn ein Blutgerinnsel gebildet wird, in einer Vene in ein Bein oder Fuß, kann es eine tiefe Venenthrombose (DVT) verursachen verursachen.

ein Blutgerinnsel vom Bein das Bein wird mitgeführt und in die Lunge gelangt, kann es eine Lungenembolie verursachen.

Es kommt sehr selten vor dass ein Blutgerinnsel wird gebildet in einer Vene in einem anderen Organ, wie das Auge (venöse Thrombose in der Netzhaut).

Wenn ist das Risiko auf ein Blutgerinnsel in einer Vene am höchsten?

Das Risiko auf ein Blutgerinnsel in einer Vene ist das höchste in dem ersten Jahr dass eine Frau zum ersten Mal ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwendet. Das Risiko kann auch erhöht sind wenn Sie nach einer Unterbrechung von 4 Wochen oder länger wieder beginnen mit der Anwendung von einem kombinierten hormonalen Kontrazeptivum (dasselbe Produkt, oder ein anderes Produkt als zuvor).

Nach dem ersten Jahr wird das Risiko kleiner, aber es bleibt etwas höher als wenn Sie kein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden.

Wenn Sie aufhören mit Microgynon 30, ist Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel innerhalb weniger Wochen wieder normal.

Wie hoch ist das Risiko auf ein Blutgerinnsel?

Das Risiko hängt ab von Ihrem natürlichen Risiko auf VTE, und vom Typ kombiniert hormonell Kontrazeptivum das Sie verwenden.

Das allgemeine Risiko für ein Blutgerinnsel in einem Bein oder Lunge (tiefe venöse Thrombose oder Lungenembolie) mit Microgynon 30 ist gering.

- Von jeweils 10.000 Frauen die kein einziges kombiniertes hormonelles Verhütungsmittel verwenden und nicht schwanger sind, bekommen es ungefähr 2 in einem Zeitraum von einem Jahr ein Blutgerinnsel.
- Von jeweils 10.000 Frauen die ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden das Levonorgestrel enthält wie Microgynon 30, bekommen etwa ungefähr 5-7 in einem Zeitraum von ein Jahr ein Blutgerinnsel.
- Das Risiko ein ein Blutgerinnsel zu bekommen hängt ab von Ihrer persönlichen medizinischen Vorgeschichte (siehe Rubriken 'Faktoren die Ihr Risiko auf ein Blutgerinnsel in einer Vene/Arterie erhöhen' unten)

Risiko, in ein Jahr ein Blutgerinnsel zu bekommen

Frauen die keine kombinierte hormonelle Pille verwenden und nicht schwanger sind

Ungefähr 2 von jeder 10.000 Frauen

Frauen die eine Kombinationspille verwenden die Levonorgestrel enthält

Ungefähr 5-7 von jede 10.000 Frauen

Frauen die Microgynon 30 verwenden

Ungefähr 5-7 von jeder 10.000 Frauen

Faktoren die Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Vene erhöhen

Das Risiko für ein Blutgerinnsel mit Microgynon 30 ist gering, aber es gibt bestimmte Umstände die das Risiko erhöhen. Ihr Risiko ist höher:

wenn Sie ernsthaft Übergewicht hat (BMI [Body-Mass-Index] höher als 30 kg/m²)

wenn einer Ihrer nahen Familienmitglieder in jungen Jahren (zum Beispielvor vor das 50^e Jahr) ein Blutgerinnsel hat gehabt in ein Bein, Lunge oder anderes Organ. In diesem Fall können Sie eine erbliche Blutgerinnungsstörung haben.

wenn Sie eine Operation müssen unterziehen, oder wenn Sie lange Zeit nicht auf den Beinen sind wegen einer Verletzung oder Krankheit, oder wenn Ihr Bein im Gips ist. Es kann notwendig sein um vor einer Operation, oder wenn Sie weniger mobil sind, einige Wochen zu stoppen mit dem Gebrauch von Microgynon 30. Wenn Sie müssen stoppen

mit Microgynon 30, fragen Sie Ihren Arzt wann Sie wieder können beginnen mit der Anwendung.

wenn Sie älter werden (insbesondere ungefähr über 35 Jahre)wenn Sie in den letzten Wochen Wochen entbinden sind.

Das Risiko auf ein Blutgerinnsel steigt je mehr mehr von diesen Umständen auf Sie zutreffen sind.

Eine Reise mit dem Flugzeug (länger als 4 Stunden) kann Ihr Risiko auf ein Blutgerinnsel vorübergehend erhöhen, besonders wenn es noch einige andere von der angegebenen Umstände auf Sie von zutreffend sind.

Es ist wichtig dass Sie es Ihrem Arzt sagen wenn ein oder mehr von diesen Umstände auf Sie von zutreffen sind, sogar wenn Sie darüber zweifeln. Ihr Arzt kann entscheiden dass Sie müssen aufhören mit dem Gebrauch von Microgynon 30.

Wenn eine der oben genannten Umstände ändert während Sie Microgynon 30 verwenden, zum Beispiel wenn ein neben Familienmitglied ein Blutgerinnsel (Thrombose) bekommt ohne bekannte Ursache, oder wenn Sie viel an Gewicht zunehmen, sagen dies dann an Ihr Arzt.

BLUTGERINNSEL IN EINER ARTERIE

Was kann es passieren wenn es ein Blutgerinnsel gebildet wird in einer Arterie?

Net als ein Blutgerinnsel in einer Vene, kann ein Blutgerinnsel in einer Arterie ernsthafte Probleme verursachen. Es kann zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall verursachen.

Faktoren die Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Arterie erhöhen

Es ist wichtig dass Sie wissen dass das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall durch die Anwendung von Microgynon 30 sehr gering ist, aber größer kann werden:

mit zunehmendem Alter (über ungefähr 35 Jahre)

wenn Sie rauchen. Wenn Sie ein kombiniertes hormonelles Kontrazeptivum wie Microgynon 30 verwendet, wird empfohlen dass Sie aufhören mit Rauchen. Wenn Sie nicht können aufhören mit Rauchen und älter sind dann 35 Jahre, kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen um ein anderes Mittel Verhütungsmittel zu verwenden

wenn Sie Übergewicht haben

wenn Sie hoher Blutdruck hat

als ein Mitglied von Ihrer nächsten Familie in jungem Alter (vor dem 50. Lebensjahr)

einen Herzinfarkt von Schlaganfall hat gehabt. In diesem Fall können Sie auch ein

erhöhtes Risiko haben für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen

wenn Sie, oder ein Mitglied Ihrer Ihrer engsten Familie, ein erhöhten Fettgehalt im Blut hat (Cholesterin oder Triglyceride)

wenn Sie an Migräne leidet, insbesondere Migräne mit Aura

wenn Sie eine Herzerkrankung haben (Herzklappenerkrankung, oder eine Herzrhythmusstörung die Vorhofflimmern genannt wird)

wenn Sie Zuckerkrankheit (Diabetes) haben.

Wenn mehr als eine von diesen Bedingungen auf Sie zutrifft, ist, oder wenn eine von von diese Erkrankungen besonders schwerwiegend ist, kann das Risiko auf das Eintreten von einem Blutgerinnsel sogar noch weiter erhöht sein.

Wenn eins von den oben genannten Umständen ändert während Sie Microgynon 30 verwenden, zum Beispiel wenn Sie anfangen zu rauchen oder wenn ein neben Familienmitglied ein Blutgerinnsel (Thrombose) bekommt ohne bekannte Ursache, oder wenn Sie viel an Gewicht zunehmen, erzählen dies dann an Ihren Arzt.

Microgynon 30 und Krebs

Bei Frauen die die Pille verwenden wird etwas häufiger Brustkrebs diagnostiziert dann bei Nicht-Pillenanwenderinnen von derselben Alter. Zehn Jahre nach dem Absetzen der Pille gibt es keinen Unterschied mehr. Es ist nicht bekannt von dies Unterschied wird verursacht durch die Pille. Es kann auch kommen weil Pillenanwenderinnen gründlicher und häufiger werden untersucht, sodass die Brustkrebs früher wird entdeckt. Wie früher die Krebs wird entdeckt, desto besser die Ergebnisse der Behandlung.

In seltenen Fälle sind bei Pillenanwenderinnen gutartige Lebertumoren gefunden und in noch selteneren Fällen bösartige Lebertumoren. Manchmal haben diese Tumoren geführt zu ein lebensbedrohliche innere Blutung. Sollten Sie plötzlich Beschwerden bekommen von starken Bauchschmerzen, dann müssen Sie sofort Kontakt aufnehmen mit Ihr Arzt.

Bei Frauen die die Pille über längere Zeit verwendet haben wurde etwas häufiger Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Dies muss jedoch nicht durch die Pille zu kommen aber kann zu machen haben mit sexuellem Verhalten und anderen Faktoren. Es ist noch nicht klar wie groß die Einfluss hiervon ist auf das bekommen von Gebärmutterhalskrebs. Es ist wohl klar dass die wichtigste Ursache von Gebärmutterhalskrebs eine langfristige Infektion mit dem sogenannten humanen Papillomavirus (HPV) ist.

Psychische Störungen

Einige Frauen die hormonelle Verhütungsmittel einschließlich Microgynon 30 verwenden, haben Bericht erstattet von Depression oder Niedergeschlagenheit. Depression kann ernst sein und kann manchmal zu Selbstmordgedanken führen. Wenn Sie Stimmungsschwankungen und Symptome von Depression erlebt, nehmen Sie dann so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrem Arzt auf weiteren medizinischen Rat.

Zwischenzeitliche Blutungen

Mit allen Pillen kann in den ersten paar Monate manchmal unerwartet Blutverlust auftreten (Schmierblutung oder Durchbruchblutung). Sie können dann vielleicht nicht ohne Binde. Bleiben in jedem Fall einfach Ihr Tabletten einnehmen. Der unregelmäßige Blutverlust hält meistens an wenn Ihr Körper einmal gewöhnt ist an die entsprechende Pille Pille (nach ungefähr 3 Streifen). Wenn es länger dauert, schlimmer wird oder wieder neu beginnt, müssen Sie Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt.

Was Sie tun sollten wenn Sie keine Blutung bekommen während der tablettenfreien Tage
Wenn Sie alle Tabletten korrekt eingenommen haben, keine Beschwerden hat gehabt von Erbrechen und auch keine andere Arzneimittel hat verwendet, ist es höchst unwahrscheinlich dass Sie schwanger sind. Sie können dann beruhigt mit der nächsten Blisterpackung fortfahren.

Wenn die erwartete Blutung jedoch zweimal hintereinander ausbleibt können Sie schwanger sein. Nehmen Sie Kontakt auf sofort Kontakt mit Ihrem Arzt. Gehen Sie nicht weiter mit dem nächsten Blister Microgynon 30 bevor Ihr Arzt festgestellt hat dass Sie nicht schwanger bent.

Gebrauch bei Kindern

Microgynon 30 ist nicht vorgesehen für Frauen die noch nicht menstruieren.

Gebrauch bei älteren Frauen

Microgynon 30 muss nicht verwendet werden nach der Menopause.

Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?

Verwenden Sie neben Microgynon 30 noch andere Arzneimittel, oder haben Sie das kürzlich getan oder besteht die Möglichkeit dass Sie in der nahen Zukunft andere Arzneimittel Arzneimittel geht verwenden? Sagen das dann Ihrem Arzt oder Apotheker. Sie können Ihnen sagen ob es notwendig ist, zusätzliche Verhütungsmaßnahmen zu ergreifen (zum Beispiel Kondome) und, wenn das das Fall ist, wie lange Sie dies müssen tun.

Einige Medikamente können eine Auswirkung haben auf die Blutspiegel von Microgynon 30 und können den Schutz vor Schwangerschaft verringern, oder können unerwartete Blutungen verursachen. Es handelt sich dabei um:

Medikamente zur der Behandlung von

- o Epilepsie (zum Beispiel Primidon, Phenytoin, Barbiturate, Carbamazepin, Oxcarbazepin, Topiramat oder Felbamat)
- o Tuberkulose (zum Beispiel Rifampicin)
- o Infektionen mit dem HIV- und Hepatitis-C-Virus (sogenannte Proteasehemmer und nicht-nukleosidische Reverse-Transkriptase-Hemmer wie Ritonavir, Nevirapin, Efavirenz).
- o Pilzinfektionen (Griseofulvin)
- o Arthritis, Arthrose (Etoricoxib)
- o hoher Blutdruck in den Lungenblutgefäßen (Bosentan).

das Kräutermittel Johanniskraut.

Microgynon 30 kann die Wirkung von anderen Medikamenten beeinflussen, zum Beispiel

Medikamente die Cyclosporin enthalten

das Anti-Epileptikum Lamotrigin (dies kann führen zu einem erhöhten Anzahl Anfälle)

Theophyllin (wird verwendet bei der Behandlung von Atemproblemen)

Tizanidin (wird verwendet bei der Behandlung von Muskelkater und oder

Muskelkrämpfe).

Verwenden Microgynon 30 nicht wenn Sie Hepatitis C haben und hierfür Arzneimittel mit Ombitasvir Paritaprevirritovanir, dasabuvir, glecaprevir pibrentasvir of sofosbuvir velpatasvir voxilaprevir verwendet, weil diese Mittel eine Erhöhung der ALAT- Leberenzym (ein Leberfunktionstest) können verursachen.

Ihr Arzt wird Ihnen ein anderes Verhütungsmittel verschreiben bevor Sie beginnen mit der Behandlung mit diesem Arzneimittel. Microgynon 30 kann ungefähr 2 Wochen nach Ende dieser Behandlung wieder aufgenommen .. Abschnitt 2 , Wann Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?'

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind, oder denken dass Sie schwanger sein könnten , dürfen Sie, dürfen Sie Microgynon 30 nicht verwenden.

Die Verwendung von Microgynon 30 wird im Allgemeinen nicht empfohlen solange eine Frau stillt gibt. Wenn Sie die Pille dennoch möchten verwenden während Sie noch stillen ,können Sie am besten Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt. Fahrtüchtigkeit

Fahrfähigkeit en das Gebrauch von Maschinen

Es gibt keine Hinweise dass die Fahrtüchtigkeit wird beeinflusst.

Microgynon 30 enthält Saccharose und Laktose

Wenn Ihr Arzt Ihnen gesagt hat dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

3. Wie verwenden Sie dieses Mittel?

Verwenden dieses Arzneimittel immer genau wie Ihr Arzt Ihnen es gesagt hat. Zweifeln Sie an der richtige Verwendung? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Wann und wie nehmen Sie die Tabletten ein?

Der Streifen enthält 21 Tabletten. Bei jeder Tablette steht angegeben auf welcher Tag die muss werden eingenommen. Nehmen Sie die Tabletten jeden Tag ungefähr um dieselbe Zeit ein, falls nötig mit etwas Wasser. Folgen der Richtung des Pfeils der auf dem Streifen angegeben ist, bis Sie alle 21 Tabletten eingenommen haben. Danach nehmen Sie 7 Tage keine Tablette. Im Laufe von diesen 7 Tage soll eine Blutung zu beginnen (die sogenannte Abbruchblutung). Diese beginnt gewöhnlich am 2. oder 3. Tag nach die letzte Tablette Microgynon 30. Beginnen Sie am 8^{ten} Tag mit dem nächsten Blister, unabhängig ob die Blutung dann schon vorbei ist oder nicht. Dies bedeutet dass Sie immer am gleichen Tag der Woche mit einem nächsten Blisterpackung beginnen, und auch dass die Abbruchblutung jeden Monat ungefähr an gleichen Tagen fällt.

Wenn Sie Microgynon 30 auf diese Weise verwenden, sind Sie auch während der 7 Tage in denen Sie keine Tablette einnehmen geschützt vor Schwangerschaft.

Wann zu beginnen mit dem ersten Blister?

Sie haben den letzten Monat keine Antibabypille verwendet
Beginnen Sie mit Microgynon 30 am ersten Tag der Zyklus (der erste Tag Ihrer Menstruation). Nehmen Sie eine Tablette bei der entsprechenden Tagesangabe auf dem Blisterstreifen. Sie dürfen auch an Tag 2-5 des Zyklus beginnen aber dann müssen Sie in den ersten 7 Tagen jedoch ein zusätzliches Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Umstellung von einer anderen Kombinationspille, vaginalen Verhütungsring oder Verhütungspflaster Sie können mit Microgynon 30 beginnen am Tag nachdem Sie die letzte Tablette von Ihrer vorherige Pille haben eingenommen (also ohne Pause). Wenn es

bei Ihrer vorherigen Pille auch nicht-wirksame Tabletten in der Packung sitzen, müssen Sie sofort fortfahren nach der letzten wirksamen Tablette von Ihrem vorherigen Pille (wenn Sie nicht wissen welche das ist, fragen es dann an Ihren Arzt oder Apotheker). Sie dürfen auch später beginnen, aber niemals später als am Tag nach Ablauf der tabletteneisfreien Periode von Ihrer vorherigen Pille (oder nach der letzten nicht wirksamen Tablette von Ihrer vorherigen Pille). Wenn Sie einen vaginalen Verhütungsring oder ein Verhütungspflaster haben verwendet, muss Sie vorzugsweise beginnen mit der Anwendung von Microgynon 30 am Tag der Entfernung des letzten Rings oder Pflasters von einer Zyklusverpackung, aber nicht später als am Tag an dem Sie ein neues Ring sollten einsetzen oder ein neues Pflaster sollten einsetzen müssen pflastern.

Umstellung von einer Minipille

Sie können von der einen auf die andere Tag umstellen auf Microgynon 30, aber Sie müssen die erste 7 Tage wohl ein extra Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Wechsel von der Spritzenpille oder ein Implantat

Beginnen Sie mit Microgynon 30 wann Sie anders die nächste Injektion würden erhalten oder am Tag an dem das Implantat wird entfernt. Sie müssen die erste 7 Tage jedoch wohl ein extra Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Nach einer Entbindung

Wenn Sie gerade entbunden geboren, wird Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich empfehlen zu warten bis Ihre erste spontane Menstruation, aber manchmal ist es möglich früher zu beginnen. Folgen Sie dem Rat Ihres Arztes. Das gilt auch für den Fall, dass Sie stillen und die Pille nehmen möchten. verwenden.

Nach einer Fehlgeburt oder Abtreibung

Befolgen Sie den Rat Ihres Arztes. Haben

Sie zu viel von diesem Mittel verwendet verwendet?

Es bestehen keine Meldungen von ernsthaften schädlichen Folgen der Einnahme von vielen Microgynon 30 Tabletten gleichzeitig.

Wenn Sie mehrere Tabletten gleichzeitig haben eingenommen, können Sie Beschwerden bekommen von Übelkeit, Erbrechen oder vaginalen Blutungen. Sogar Mädchen die noch nicht menstruieren können vaginal Blutverlust bekommen wenn sie versehentlich dieses Arzneimittel haben eingenommen.

Haben Sie vergessen dieses Mittel zu verwenden?

Wenn Sie weniger als 12 Stunden zu spät sind mit der Einnahme einer Tablette, ist die Wirkung der Pille nicht vermindert. Nehmen Sie die Tablette dann trotzdem ein sobald Sie daran denken und nehmen Sie die nächsten Tabletten wieder zur gewohnten Zeit ein.

Wenn Sie mehr als 12 Stunden zu spät sind mit der Einnahme von einer Tablette, kann die Wirkung der Pille verringert sein. Wie mehr Tabletten Sie hinter einander vergessen haben, desto größer wird die Chance dass die Wirkung der Pille verringert ist. Die Chance auf unzureichenden Schutz vor Schwangerschaft ist am größten wenn Tabletten ausgelassen werden an dem Anfang oder an dem Ende des Blisters. Deshalb gelten die folgenden Regeln (siehe auch das Schema):

Mehr als 1 Tablette vergessen in diesem Blister

Kontaktieren Sie Ihr Arzt.

1 Tablette vergessen in Woche 1

Nehmen Sie die vergessene Tablette ein sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeuten würde dass Sie zwei Tabletten auf dasselbe Moment muss einnehmen. Nehmen Sie weiter die Tabletten wieder zur üblichen Zeit ein, aber Sie müssen auch während 7 Tagen extra Verhütungsmittel verwenden. Wenn Sie in der Woche vor der vergessenen Tablette Sex hatten haben können Sie schwanger sein. Nehmen Sie in diesem Fall daher sofort Kontakt mit Ihrem Arzt.

1 Tablette vergessen in Woche 2

Nehmen Sie die vergessene Tablette ein sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeuten würde dass Sie zwei Tabletten auf derselben Moment müssen einnehmen. Nehmen weiter die Tabletten wieder zur gewohnten Zeit ein. Die Wirkung der Pille ist nicht vermindert, Sie müssen keine extra Verhütungsmittel zu verwenden.

1 Tablette vergessen in Woche 3

Sie können wählen zwischen zwei Möglichkeiten:

1. Nehmen Sie die vergessene Tablette ein sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeuten würde dass Sie zwei Tabletten zur gleichen Zeit einnehmen müssen einnehmen. Nehmen weiter die Tabletten wieder zur gewohnten Zeit ein. Überspringen Sie außerdem die tablettenfreie Periode und gehen Sie sofort weiter mit der nächsten strip. Höchstwahrscheinlich bekommen Sie erst am Ende der zweiten Blisterpackung eine echte Abbruchblutung , aber Sie können während der zweiten Blisterpackung doch haben letzte bekommen von Schmierblutungen oder ein Zwischenblutung.
2. Sie können auch aufhören mit dem betreffenden Blister und nach einer tablettenfreien Periode von 7 Tagen (tel wel immer die Tag mit an dem Sie die Tablette vergessen) weiter gehen mit dem nächsten Blisterpackung. Wenn Sie an Ihrem festen Starttag mit ein neue Streifen möchten beginnen, dürfen Sie ein tablettenfreie Periode von weniger als 7 Tagen einhalten.

Wenn Sie in ein Streifen Tabletten vergessen haben und Sie Sie bekommt keine Blutung in der nächsten normalen tablettenfreien Periode kann das bedeuten dass Sie schwanger sind. Sie müssen Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt bevor Sie weiter gehen mit dem nächsten Blister.

Was Sie tun müssen im Fall von Erbrechen oder schwerem Durchfall

Wenn Sie innerhalb 3-4 Stunden nach der Einnahme von einer Tablette müssen erbrechen, oder schweren Durchfall bekommen, besteht eine Möglichkeit dass der Wirkstoff Stoffe nicht vollständig in dem Körper werden aufgenommen. Diese Situation ist vergleichbar mit dem Vergessen von einer Tablette.

Nach Erbrechen oder Durchfall müssen Sie so schnell wie möglich eine neue Tablette aus einem Ersatzstreifen einnehmen. Falls möglich innerhalb 12 Stunden nach dem Zeitpunkt an dem Sie normalerweise Ihre Pille einnehmen. Wenn dies nicht möglich ist, oder wenn die 12 Stunden bereits vergangen sind, müssen Sie das Rat befolgen wie oben angegeben bei 'Haben Sie vergessen dieses Mittel zu verwenden? '.

Verschiebung der Menstruation: was Sie wissen müssen

U können Ihr Menstruation verschieben indem ohne tablettenfreie Periode weiter zu gehen mit einem neuen Blister Microgynon 30. Sie können mit diese Streifen fortfahren bis alle Tabletten auf sind oder gegebenenfalls früher beenden. Sie können während der Anwendung von diesem zweiten Streifen wohl letzte haben von Durchbruchblutung oder Schmierblutung. Nach der üblichen tablettenfreien Periode von 7 Tagen beginnen Sie dann wieder mit dem nächsten Streifen.

Der Anfangstag von Ihr Menstruation verändern: was Sie wissen müssen

Wenn Sie Ihre Tabletten gemäß den Anweisungen einnehmen, dann wird Ihre Menstruation immer um ungefähr derselbe Tag beginnen. Als Sie diesen Tag ändern möchten, dann können Sie das tun durch die normale tablettenfreie Periode zwischen zwei Streifen zu verkürzen (aber niemals durch zu verlängern). Zum Beispiel wenn Ihre Menstruation normalerweise am Freitag beginnt und Sie möchten, dass in Zukunft verschieben auf zu Dienstag (3 Tage früher) als müssen Sie jetzt 3 Tage früher als gewöhnlich mit dem neuen Blister beginnen. Wenn Sie die tablettenfreie Periode sehr kurz macht (zum Beispiel 3 Tage oder weniger) kann es vorkommen dass Sie während dieser tablettenfreien Periode keine Blutung haben werden. Sie können dann während der nächsten Blisterpackung Beschwerden haben von Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen.

Wenn Sie aufhören mit der Anwendung von diesem Mittel

Sie können mit Microgynon 30 stoppen wann Sie möchten. Wenn Sie nicht schwanger werden möchten, fragen Sie Ihren Arzt um Rat bezüglich anderer zuverlässiger Verhütungsmethoden zuverlässige Methoden von Empfängnisverhütung. Wenn Sie aufhören weil Sie schwanger werden möchten, wird im Allgemeinen empfohlen zu warten bis dass u ein natürliche Menstruation hatte bevor u versuchen schwanger zu werden. Sie können danneinfacher berechnen wann die berechnen wann die Entbindung wird stattfinden.

Haben Sie noch andere Fragen über die Anwendung dieses Arzneimittels ? Wenden Sie sich dann anIhren Arzt oder Apotheker ..

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie elk Arzneimittel kann dieses Mittel Nebenwirkungen haben, al bekommt nicht jeder damit zu tun. Bekommen Sie ein Nebenwirkung, besonders wenn diese schwerwiegend von Art ist und lange anhält, oder tritt eine ein Veränderung auf in Ihrem Gesundheitszustand wovon Sie denken dass der verursacht werden kann durch Microgynon 30? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt.

Alle Frauen die kombinierte hormonelle Kontrazeptiva verwenden, haben ein höheres Risiko auf Blutgerinnsel in den Venen (venöse Thromboembolie [VTE]) oder Blutgerinnsel in den Arterien (arterielle Thromboembolie [ATE]). Siehe für mehr Informationen über die verschiedenen Risiken der Anwendung von kombinierten hormonellen Kontrazeptiva Abschnitt 2 ‚Wann müssen Sie besonders vorsichtig sind mit diesem Mittel?‘.

Schwere Nebenwirkungen

Schwere Nebenwirkungen die mit der Anwendung der Pille in Zusammenhang gebracht werden beschrieben in 'inBlutgerinnsel (Thrombose)' und 'Microgynon 30 und Krebs'. Lesen diese Abschnitte für mehr Informationen und konsultieren sofort Ihren Arzt falls nötig.

Nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt wenn Sie Symptome von Angio-ödem bekommen wie ein geschwollenes Gesicht, Zunge und/oder Rachen enof Probleme mit Schlucken oder Nesselsucht möglicherweise zusammen mit Problemen mit Atmen (siehe auch Abschnitt 2: 'Wann muss Sie zusätzlich vorsichtig sein mit diesem Mittel?').

Andere mögliche Nebenwirkungen

Die folgenden Nebenwirkungen werden genannt von Pillenanwenderinnen. Diese Nebenwirkungen können vor allem in der ersten paar Monaten der Pilleneinnahme auftreten. Oft verschwinden sie nach einiger Zeit von selbst wieder.

Häufig auftretende Nebenwirkungen (kommen bei bei 1 bis 10 von 100 Anwenderinnen):

- depressive Stimmung, Stimmungsveränderung
- Kopfschmerzen
- Übelkeit, Bauchschmerzen
- Schmerzen in den Brüsten, empfindliche Brüste
- Gewichtszunahme.

Manchmal auftretende Nebenwirkungen (treten auf bei 1 bis 10 von 1.000 Anwenderinnen)

- vermindertes Libido (Lust auf Sex)
- Migräne
- Erbrechen, Durchfall
- Hautausschlag, Hautausschlag mit starkem Juckreiz und Bildung von Knötchen
- größer werden der Brüste
- Zurückhalten von Flüssigkeit.

Selten auftretende Nebenwirkungen (treten auf bei 1 bis 10 von 10.000 Anwenderinnen)

- Überempfindlichkeit
- gesteigertes Libido (Lust auf Sex)
- Reizung von der Augen bei Gebrauch von Kontaktlinsen
- Form von Hautausschlag mit schmerzhaften blau-roten Knötchen, Form von Hautausschlag wobei es auch Sprache kann sein von Knötchen, Bläschen oder Flüssigkeitsansammlung
- vaginal Ausfluss, Ausfluss aus der Brustwarze
- Gewichtsverlust
- schädliche Blutgerinnsel in ein Vene oder Arterie, zum Beispiel:
 - o in einem Bein oder Fuß (d.h.. tiefe Venenthrombose)in
 - o einem ein lang (d.h.. Lungenembolie)
 - o Herzinfarkt
 - o Schlaganfall
 - o 'Mini-Schlaganfall' oder vorübergehende Symptome wie bei einem Schlaganfall, bekannt als TIA (transitorische ischämische Anfall)
 - o Blutgerinnsel in der Leber, Magen2FDarm, Nieren oder Augen.

Die Wahrscheinlichkeit ein Blutgerinnsel zu bekommen ist ist größer als er andere Umstände auf Sie von Anwendung sind die dies Risiko erhöht (siehe Abschnitt 2 für mehr Informationen über die Umstände die das Risiko auf Blutgerinnsel erhöhen und die Symptome eines Blutgerinnsels).Die

folgenden schweren Nebenwirkungen sind etwas häufiger häufiger gemeldet bei Frauen die eine Antibabypille verwendeten, aber es ist nicht bekannt ob dies ist verursacht durch die Behandlung (siehe Abschnitt 2: 'Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit diesem Mittel?').

- erhöhter Blutdruck
- Lebertumoren oder Brustkrebs

Die folgenden Erkrankungen sind auch in Verband gebracht mit Kombinationspillen:

Die Krankheit von Crohn, Colitis ulcerosa, Porphyrie (Stoffwechselkrankheit die Bauchschmerzen und geistige Erkrankungen verursacht), systemischer Lupus erythematodes (wobei der Körper die eigenen Organe und Gewebe angreift und beschädigt), Herpes am Ende von der die Schwangerschaft, Chorea Sydenham (schnelle unwillkürliche zuckende oder schockartige Bewegungen), hämolytisch urämisches Syndrom (eine Erkrankung die auftritt nach Durchfall die verursacht ist durch E.coli), Leberprobleme die sichtbar werden durch Gelbsucht.

Das Melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Beschwerden von Nebenwirkungen, nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage stehen. Sie können Nebenwirkungen auch direkt melden über das Niederländisch Nebenwirkungen Zentrum Lareb, Website www.lareb.nl. Durch Nebenwirkungen zu melden, können Sie uns helfen mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit dieses Arzneimittels Arzneimittel.

5. Wie bewahren Sie dieses Mittel?

Bewahren unter 30°C.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden dieses Arzneimittel nicht mehr nach der Verfallsdatum . Dieses ist zu finden auf der Verpackung und dem Blister nach 'EXP'. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum.

Arzneimittel nicht in die Spüle oder die Toilette und werfen Sie sie nicht in den Mülleimer. Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Arzneimitteln machen sollen die Sie nicht mehr verwenden. Sie werden dann auf eine verantwortungsvolle Weise vernichtet und gelangen nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

Welche Stoffe sind enthalten dies Mittel?

Die wirksamen Stoffe in diesem Mittel sind Levonorgestrel und Ethinylestradiol. Jede Tablette Microgynon 30 enthält 0,030 Milligramm Ethinylestradiol und 0,150 Milligramm Levonorgestrel.

Die anderen Stoffe in diesem Mittel sind Lactosemonohydrat, Maisstärke, Povidon 25 (E1201), Magnesiumstearat (E470B), Saccharose, Povidon 700.000, Polyethylenglykol 6.000, Calciumcarbonat (E170), Talkum (E553b), Montanglykolwachs (E192), Titandioxid (E171), Glycerol 85% (E442) und Eisenoxidpigment (gelb, E172).

Wie sieht Microgynon 30 aus und wieviel ist enthalten ein Verpackung?

Microgynon-30-Tabletten sind überzogene Tabletten; der Kern der Tablette ist überzogen mit einer Deckschicht. Die Tabletten sind gelb.

Eine Verpackung Microgynon 30 enthält 3 Streifen, mit je 21 Tabletten.

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen Handel bringen und Hersteller

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen Handel Bringen
Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp

Hersteller
Bayer AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin, Deutschland

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Doebereinerstraße 20
99427 Weimar, Deutschland

Für Informationen:
Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

Im Register eingetragen unter RVG 08204

Dieser Beipackzettel ist für den zuletzt genehmigt im Juli 2025.