

Pakendi infoleht: teave kasutajale de naissoost

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg kaetud tabletid

levonorgestreel / etünnüülöstradiool

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit läheb kasutama, sest seal seisab oluline teave sees teie jaoks .

Säilitage see infoleht. Võib-olla vajate seda hiljem jälle ..

Kas u veel küsimused? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit mitte edasi teistele , sest see onainult teile määratud u välja kirjutatud. Võib kahjulik olla teistele ,isegi kui neil on samad kaebused nagu teil. Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest kõrvaltoimed mis on rubriigis 4 kirjas? Või saate te kõrvaltoime mis ei ole selles infolehes kirjas ? Võtke siis ühendust omaarsti või apteekriga . apteeker.

Olulised asjad mida te peate teadma kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Need vahendid on üks kõige usaldusväärsemaid pöörduvaid rasestumisvastaseid meetodeid, kui korrektne kasutatakse

Nad annavad ühe midagi kõrgem risk tekkimine tekkimine ühe verehüüve verehüüve tromboos) veenidesja arterites ja arterid, eriti aastal esimene aasta et te kasutate kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutate või kui te pärast pausi katkestus nädalat nädalat of kauem jälle alustab koos kasutamise koos üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend

Pöörake tähelepanu ja ning võtke ühendust oma arstiga kui te arvab et te võimalik sümptomid vere hüübimist verehüüve on (vt jaotis 2 'Verehüübed (tromboos)').

Selles infolehes pakendi infoleht:

1. Mis on Microgynon 30 ja milleks kasutatakse seda ravimit ?Millal
2. ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega ettevaatlik kaasas olema?
3. Kuidas kasutate te seda ravimit?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Sisu kohta pakend ja muu teave

1. Mis on Microgynon 30 ja milleks kasutatakse seda ravimit ?Microgynon

30 on rasestumisvastane tablett . rasestumisvastane tablett. Microgynon 30 kasutatakse raseduse vältimiseks rasedust et ära hoida.

Rasestumisvastased tabletid mis sisaldavad kahte hormooni nimetatakse saama 'kombinatsioonitabeltid' nimetatakse. Kaks erinevat naissoost hormoonid on levonorgestreel (üks hormoon koos progesteronilaadse toimega) ja etünnüülöstradiool (üks hormoon koos östrogeense toimega). Rasestumisvastased tabletid kahe hormooniga on väga usaldusväärsed. Kui neid õigesti võetakse sisse (ilma et tabletid unustatakse) ontõenäosus rasedusele väike rasedus väga väike.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema? Üldised märkused Lugege

Loe enne te alustate kasutamise kasutamine alates Microgynon 30 teave verehüüvete kohta (tromboos) jaotis 2. On eriti oluline et te loeb mis on sümptomid on vere hüüve verehüüve vaata jaotis 2 ' Verehüübed (tromboos)'. Enne kui

te saate alustada raviga koos kasutamine alates Microgynon 30, teie arst esitab teile mõned küsimused teie isikliku haigusloo jaoks teie lähedaste perekonnaliikmete ja teie lähedaste perekonnaliikmete. Arst peab ka teie vererõhku mõõtma ja, sõltuvalt teie isiklikust olukorrast, võib-olla ka veel muid uuringuid teha tegema.

In selles infolehes kirjeldatakse erinevaid olukordi kus te peate lõpetama kasutamise ravimi Microgynon 30 või kus usaldusväärsus on kaheldav ravimi -st Microgynon 30 vähendatud võib olla. Nendes olukordades peate te kas mitte seksida, või kasutada täiendavat rasestumisvastast vahendit ilma ilma hormoonid kasutama, nagu näiteks üks kondoom või mõni teine barjäärimeetod. Ära kasuta kasutamine temperatuurimeetodit või perioodilist hoidumist.. Need meetodid võivad ebausaldusväärsed olla sest Microgynon 30 igakuiseid muutusi kehatemperatuuris ja emakakaela lima mõjutab emakakaela limaskest Nii.

teised ravimid mõjutavad rasestumisvastased vahendid koos hormoonidega kaitseb Microgynon 30 ei nakkuse eest infektsioon koos hiv-viirus (aids) või muud seksuaalsel teel levivad haigused (suguhaigused).

Kui ei tohi seda ravimit kasutada? Te ei tohi

seda ravimit kasutada kui teil on üks allpool loetletud haigustest. Kui teil on, üks või rohkem järgmistest allpool mainitud haigustest on, rääkige sellest siis oma arstile. Teie arst arutab teiega seda lähemalt milline muu vorm alates rasestumisvastane sobivam on teile. u.

Kasutage Microgynon 30 mitte:

- kui teil on verehüüve sisse veresoones veresoone alates jalgade (süvaveeni tromboos, DVT), kopsude (kopsuemboolia, PE) või mõne teise organi on, või see minevikus on on kannatanud kui te teate et teil on häire mis mõjutab teie verehüübimist mõjutab – näiteks valk C puudulikkus, valk S-defitsiit, antitrombiin III-defitsiit, faktor V-Leiden või antikehad fosfolipiidide vastu
- kui te operatsioonile peate minema või pika aja jooksul ei ole liikvel (vt rubriik 'Verehüübed (tromboos)')
- kui te kunagi südameatakk või insult on olnud kui teil on stenokardia (ükshaigus haigus mis tugev valu rinnus põhjustab ja esimene sümptom infarkti võib olla) või mööduv isheemiline atakki) või üks mööduv isheemiline hoog on (TIA – mööduv sümptomid alates insult), või see kunagi on olnud kui teil üks järgmistest haigustest on, mis seda, mis seda risk peal ühe verehüübe sisse teie arterites võivad suurendada:
 - o raske diabeet (suhkruhaigus) koos veresoonte kahjustusega raske
 - o kõrge vererõhk

- o üks raske kõrgenenud rasvasisaldus sisse teie veres (kolesterool või triglütseriidid)
- o üks haigus mida hüperhomotsüsteineemia nimetatakse kui teil üks migreeni tüüp tüüpi migreen et 'migreen auraga' nimetatakse nimetatakse on (või on olnud) kui teil on raske maksahaigus või kollatõbi , või kuiminevikus on on on olnud kui te üks kasvaja teie maksas on teil, või on olnud kui te rinnavähk või vähk suguelunditel de suguelundid on, või minevikus on olnud kui teil ebatavalised veritsused välja tupest on, mille põhjus ei ole kindlaks tehtud kui on määratud u allergiline olete ühe ühe ainete suhtes selles ravimis ravim. ained leiate te jaotisest 6. Kasutamine selles 6.

Kasutamine Microgynon 30 mitte kui teil on C-hepatiit on ja selleks ravimid koos ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir, dasabuviir, glekapreviir/pibrentasviir või sofosbuviir/velpatasviir/voxilaprevir kasutatakse (vt ka jaotis 2 'Kasutate te veel teisi ravimeid?').

Millal peate te eriti ettevaatlik olema selle ravimiga ravim?

Millal peate te ühendust võtma oma arstiga? Kutsuge

kiireloomuline meditsiiniline abi kui teil

- võimalikud kaebused või sümptomid ei sümptomid vahel üks verehüüve täheldatud, mis võivad tähendada et te kannatate all ühest verehüübist teie jalas (s.t.. veenitromboos venoosne tromboos), üks verehüüve sisse teie kops (s.t. kopsuemboolia), üks südameatakk või üks insult (vt allpool see rubriik 'Verehüübed (tromboos)').

Mine ühe kirjelduse nende kaebuste või sümptomite nende nende tõsiste kõrvaltoimete saamiseks 'Kuidas Kuidas tuvastab te üks verehüüve?'.

Rääkige sellest oma arstile, kui üks järgmistest olukordadest kehtib teie kohta . Võtke ühendust

oma arstiga või kunstide apteeker enne te seda ravimit kasutate. Mõnel juhul peate olema eriti ettevaatlik kui te Microgynon 30 või mõnda teist kombinatsioonipilli kasutate kombinatsioonipill kasutatud. See võib vajalik olla et teid regulaarselt läbi teie arst kontrollib kontrollitud. Kui haigus tekib, või halveneb, samal ajal u Microgynon 30 kasutab, peate u seda ka oma arstile rääkima ..

suitsetate ..

suhkruhaigussuhkruhaigus) on.

Kui teil palju liiga raske olete.

Kui teil üks kõrgenenud vererõhk on.

Kui teil üks haigus südameklappide või südameklappide üks teatud südamerütmihäire on.

Kui keegi teie otseses perekonnas kunagi tromboos ,südameatakk või insult on insult on olnud läbinud.

Kui teil on migreen migreeni korral.

Kui teil on epilepsia (vaadake' Kasutatete veel teisi ravimeid ?').Kui

keegi teie peres on otsene perekond kunagi rinnavähk on olnud.

Kui teil on üks haigus maksa või sapipõie sapipõis on.

Kui teil on haigus Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus) on

Kui teil on süsteemne luupus erythematosus (SLE – haigus haigus mis teie loomulikke immuunsüsteemi kahjustab) on.

Kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (HUS – üks häire vere hüübimine mis neerupuudulikkus põhjustab) on.

Kui teil on sirprakuline aneemia (üks pärilik haigus punaste vereliblede) on.

Kui teil kõrge rasvasisaldus veres teie veri (hüpertriglütserideemia) on, või see haigus esineb teie perekonnas esineb jaoks on teie perekond esineb.

Hüpertriglütserideemia on seotud seotud koos kõrgem risk pankreatiidi

(põletikkõhunäärme) tekitamiseks põhjustada kõhunäärme põletikku saama.

Kui te operatsioonile peate minema või olete pika aja jooksul mitte liikvel (vaata 'Verehüübed' jaotises 2). Kui te

hiljuti hiljuti sünnitama olete, on te üks suurenenud risk trombid saamiseks alates

verehüübed. Küsige oma arstilt, kui kiiresti pärast sünnitust sünnitus te võib alustada kasutamist kasutamine alates Microgynon 30.

Kui teil on põletik põletik veenides veenid vahetult naha all nahk (pindmine tromboflebiit) on

Kui teil veenilaiendid on.

Kui teil on kloasma on või teil on kunagi kloasma olnud (kollakaspruunid pigmentilaigud, nn 'raseduslaigud', eriti näol nägu); kui see on juhtum, on mõistlik vältida otsesest kokkupuudet päikesevalgusega või ultravioletti valgusega te vältida.

Kui teil sümptomid angio-ödeem tekivad, nagu näo turse, keelja või kurkja või probleemid neelamisega või nõgestõbi st karbunkul võimalik koos koos probleemid koos hingamine, võtke kohe ühendust oma arstiga. Tooted mis östrogeensed hormoonid sisaldavad, võivad võimalik sümptomid sümptomid alates pärilik ja omandatud angio-ödeem põhjustada või süvendada.

VERESOONTE TROMBID (TROMBOOS)

Kui te kasutate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu Microgynon 30 kasutate, on teil suurem risk verehüüvete tekkeks kui te ei kasuta kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit. Harvadel juhtudel esineb seda sagedamini kui juhtudel võib üks verehüüve üks veresoone ummistada ja tõsisemid probleeme põhjustada.

Verehüübed võivad tekkida

veenides (sedanimetatakse saab 'venoosne tromboos', 'venoosne tromboemboolia' või VTE nimetatud),

arterites (sedanimetatakse 'arteriaalne tromboos', 'arteriaalne tromboemboolia' ATE nimetatud).

Inimesed paranevad mitte alati täielikult verehüüvetest. Harvadel juhtudel võivad esineda pikaajalised tõsised mõjud olla raske mõjud on, või väga harva esinevates juhtudel võivad verehüübed surmavad olla.

Oluline on tähtis et te teate et üldine üldine risk on üks kahjulik verehüüve poolt Microgynon 30 väike on.

KUIDAS TUNNET ÄRA VEREHÜÜBE?

Helista kiireloomulisele meditsiinilisele abile kui sa üks järgmistest kaebustest tunnetad või sümptomid täheldanud.

Kas te üks nendest nende kaebuste või sümptomid?
turse vahel üks jalg või mööda üks veen sisse
üks jalg või jalg, eriti kui see kaasneb kaasneb
koos:

Kus saate te kannatada ?turse
Süvaveeni tromboos tromboos

valu või tundlikkus jalas, mis
te võimalik ainult tunnete kui seistes või kõndides
kõrgenenud
temperatuur kahjustatud jalas
värvimuutus been
värvimuutus naha nahk jala
jalg, näiteks kahvatu, punane või
sinine muutuma

äkiline seletamatu hingeldus Kopsuemboolia
või kiire hingamine
äkiline köha ilma selge
põhjuse, kus te verd võite köhida
terav valu rinnus , mishullem võib olla
kui te sügavalt hingate tõsine
raske kerge tunne peas pea või
pearinglus
kiire või ebaregulaarne südamerütm
tugev valu teie kõhus ..

kahtlete , võtke ühendustmõne üks arst, sest
mõned nendest nendest sümptomitest, nagu köha või
hingeldus, võivad ekslikult valesi olla
peetud kergemaks kui kergem haigus, nagu üks
hingamisteede infektsioon (nt. külmetus).

Sümptomid ilmnevad tavaliselt ühes silmas : Venoosne tromboos sees koheselt
kohe kaotus alates nägemine, võrkkest (verehüüve silmas
või silm)
valutu hägune nägemine, mis võib areneda arenema
kaotuseni kaotus nägemise kaotus

valu, ebamugavustunne, surve või raske tunne rinnal Südameatakk
rind
pingul või täis tunne rinnus , käes võialumine all
rinnaku luu
täis tunne, seedehäired või õhupuudus hingeldamine ebamugavus
ülemises kehaosas mis kiirgab selga, lõualuu,
kõri, käsija ja magu
higistamine, iiveldus, oksendamine või
peapööritus
äärmine nõrkus, ärevus või hingeldus
kiire või ebaregulaarne südamerütm

äkiline nõrkus või tuimus tunne alates
nägu, käsi või jalg, eriti ühel pool keha
alates keha
äkiline segadus, raskused koos rääkimisega
või mõistmisega
äkiline raskused koos nägemisega sisse ühes või mõlemas silmas
äkilised raskused koos kõndimisega, pearinglus,
tasakaalu kaotus tasakaal või koordineatsioon
äkiline, raske või pikaajaline peavalu
ilma tuntud põhjuseta
teadvuse langus või minestamine koos või
ilma epileptilise hooleta.

Insult

Sümptomid sümptomid vahel üks insult võivad mõnikord ainult lühikest aega kesta ja peaaegu kohe ja täielikult taastuda. Siiski peate te siis ikkagi kiirabi meditsiiniline abi kutsuma, kuna te võite risk olla et saada veel üks insult saada ..

ja kerge sinakas värvus sinakas värvimuutus vahel üks käsi või jalg
Verehüübed mis teine veresooneid ummistavad
tõsine valu teie teie kõht (äge kõht)

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib on juhtuma kui on üks verehüüve tekib moodustunud ühes veen ? Kasutamine kasutamine kombineeritud kombineeritud hormonaalsed hormonaalsed rasestumisvastased on seotud toodud koos üks suurem risk verehüüvete tekkeks veenis üks veen (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed esinevad kuid harva jaoks. Tavaliselt esinevad need esimesel aastal kui kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit kasutatakse . Kui tekib üks siis on see sisse tavaliselt veen sisse üks jalg või jalg, võib see üks sügav venoosne tromboos (DVT) põhjustada. Kui üks verehüüve jalast jalg jõuab kaasa kantud ja kopsu satub, võib see tekitada kopsuemboolia põhjustama. esineb väga harva et verehüüve põhjustab kopsuembooliat verehüüve moodustub moodustatud sisse üks veen sisse üks teine organ, nagu silm silm (venoosne tromboos võrkkestas võrkkestas).

Millal on risk trombi tekkeks veresoon kõige suurem ? Risk trombitekkeks

veresoon on kõige suurem verehüüve Risk trombi tekkeks veresoon on kõrgeim aastal esimene aasta et üks naine esmakordselt seda kasutab üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutab. Risk võib ka suurenenud kõrgeim on kui te pärast üks katkestus 4 nädalat või kauem uuesti alustab kasutamist kasutamine alates üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend (sama toode, või mõni teine toode kui selleks).

Pärast esimest aastat muutub risk väiksemaks , kuidsee jääb veidi kõrgemaks kui siis kui te ei kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit kasuta.

Kui te lõpetate Microgynon 30 kasutamise, on teie risk verehüübe tekkeks mõne päeva jooksul vähenenud nädalat taas normaalne.

Kuidas kõrge on risk trombi ühe verehüübe?

Risk sõltub teie loomulikust riskist teguritest teie loomulikust riskist VTE-le, ja tüüp kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend mida te kasutate.

Üldine üldine risk verehüübe tekkeks veresoones jalas või kopsus (süvaveeni tromboosügav venoosne tromboos või kopsuemboolia) koos Microgynon 30 on väike.

- Iga 10 000 naise kohta, kes ei kasuta ühtegi kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit en mitte rase olema, saama seal umbes 2 sisse üks periood jooksul üks aasta üks verehüüve.
- Iga iga 10.000 naised kes kasutavad kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit mis sisaldab levonorgestreeli nagu Microgynon 30, saavad umbes 5-7 perioodi jooksul ühes perioodis alates üks aasta üks verehüüve.
- Risk verehüübe tekkeks üks verehüüve saada on sõltuv teie isiklikust meditsiinilisest ajaloost (anamnees (vt rubriigid 'Tegurid mis teie riski trombi veen veresoones või arteris suurendavadarter suurendavad' allpool)

Risk sattuda üks aasta üks verehüüve saada saama

Naised kes ei kombineeritud hormonaalne pill kasutavad ja mitte rase on

Umbes 2 iga iga 10.000 naised

Naised kes üks kombinatsioonipill kasutavad mis levonorgestreel sisaldab

Umbes 5-7 iga iga 10.000 naised

Naised kes Microgynon 30 kasutavad

Umbes 5-7 iga iga 10.000 naise

Tegurid mis teie riski trombi ühe verehüübe veenis ühe veen suurendavad

Risk riski trombi ühe verehüüve koos Microgynon 30 on väike, kuid on olemas teatud olukorrad mis riski suurendavad. Teie risk on suurem:

- kui te raske ülekaalulisus on (KMI [kehamassiindeks] kõrgem kui 30 kg/m²)
- kui üks teie lähedastest pereliikmetest noores eas (näiteks ennenäiteks enne 50^e aasta) üks verehüüve on olnud sisse üks jalg, kops või muu organ. sellisel juhul saate te üks päriilik hüübimishäire olema.
- kui te üks operatsioon peab läbima, või kui te pikka aega ei ole jalul tõttu üks vigastus või ei haigus, või kui teie jalg on kipsis on. See võib vajalik olla enne operatsiooni , või kuite olete vähem liikuv , ja olete, mõned nädalat et lõpetada kasutamine kasutamine alates Microgynon 30. Kui te peate lõpetama koos Microgynon 30, küsige siis oma arstilt millal te jälle võib alustada kasutamise kasutamine.
- kui te vanemaks saate (eriti umbes üle 35 aasta)kui te viimastel nädalatel nädalat sünnitama oled.

See risk peal ühe verehüübe tõuseb mida rohkem on rohkem neist nendest tingimustest kehtib teie kohta on.

Reis lennukiga lennuk (kauem kui 4 tundi) võib teie riski verehüübe ajutiselt suurendada , eritiki on veel mõned muud tegurid teised kohta mainitud tingimused teid kohaldatakse on.

Oluline on tähtis et te sellest teie arstile räägite kui üks või rohkem neist nendest tingimused teid puudutavad on, isegi kui te selles kahtlete. Teie arst võib otsustada et te peate lõpetama ravimi kasutamine alates Microgynon 30.

Kui üks nendest eespool mainitud tingimustest muutub samal ajal te Microgynon 30 kasutate, näiteks kui üks kõrval pereliige üks verehüüve (tromboos) saab ilma tuntuud põhjusega, või kui te palju kaalus juurde võtate ,rääkige räägi see siis teie teie arst.

VERESOONTE TROMB

Mis võib juhtuda kui kui tekib verehüüve verehüüve moodustub moodustub arteris arteris veresoones?

Net kui üks verehüüve sisse üks veen, võib üks verehüüve sisse arter tõsiseid probleeme põhjustada . Seevõib näiteks näiteks üks südameatakk või üks insult põhjustada.

Tegurid mis teie riski trombi üks verehüüve sisse üks arter suurendavad

Oluline on tähtis et te tead et risk südameatakk on üks südameatakk või insult kasutamise kasutamine Microgynon 30 väike on, kuid suurem suurem võib saada:

- koos kasvava vanusega (üle umbes 35 aasta)
- kui te suitsetate. Kui te kasutate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu Microgynon 30 kasutatakse, soovitatakse et te lõpetaksite suitsetamise .
- Kui te eisuuda lõpetada suitsetamist ja vanem kui olete vanem kui olete üle 35 aasta, võib teie arst teile soovitada kasutada teist tüüpi rasestumisvastast vahendit kui teil on ülekaal
- kui teil on ülekaal kui
- teil on ülekaal kõrge vererõhk on
- kui üks liige teie lähedane perekond noores vanuses (enne50. eluaastat)
- onsüdameatakk üks südameatakk of insult on olnud. In sellisel juhul võite te ka suurem risk olla et infarkt või insult saada insult te saama
- kui te, või üks teie teie lähedane perekond, üks kõrgenenud rasvasisaldus veres veri on (kolesterool või triglütseriidid)
- kui te juures migreen kannatab, eriti migreen auraga
- kui te üks südamehaigus on (südameklapihaigus, või üks südamerütmihäire mida kodade virvendus nimetatakse nimetatakse)
- kui te suhkruhaigus (diabeet) on.

Kui rohkem kui üks nendest tingimustest kehtib teie kohta , või kui üks neist alates see haigused eriti tõsine on, võib see risk saada saamine alates üks verehüüve isegi veel edasi suurenenud olla.

Kui üks kohta eespool mainitud tingimused muutub kui te Microgynon 30 kasutate, näiteks kui te alustate suitsetamisega või kui kui üks kõrval pereliige üks verehüüve (tromboos) saab ilma

tuntud põhjusega, või kui te palju kaalus juurde võtate „ rääkige sellest siis oma arstile.
Microgynon

30 30 vähk Naistel

kes kasutavad pille avastatakse veidi sagedamini rinnavähk diagnoositakse rinnavähk tuvastatud siis juures mitte-pillikasutajatel kui sama vanus. Kümme aastat pärast pillide lõpetamist pillide kasutamine ei ole mingit erinevust .Ei ole teada tuntud of see erinevus on põhjustatud poolt pill. See võib ka tulla sest pillikasutajad põhjalikumalt ja sagedamini on uuritud, et de rinnavähk varem avastatakse avastatakse. Kuidas varem de vähk avastatakse , kuidasparem de tulemused de ravi ravi.

harvadel juhtudel juhud on juures pillikasutajatel healoomulised maksakasvajad leitud ja sisse veel haruldasematel juhtudel pahaloolumulised maksakasvajad. Mõnikord on need kasvaja viinud kuni üks eluohtlik sisemine verejooks. Kui te äkki tunnete tugevat kõhuvalu , siis peatete kohe ühendust võtma kontakt haiglaravile võtma koos teie arst.

Naistel kes pille kasutavad pikema aja jooksul on avastatud veidi sagedamini emakakaelavähk diagnoositud . See ei pea kuidagi olema läbi pill te tulla kuid võib teha teha olla koos seksuaalne käitumine ja muud tegurid. See on veel mitte selge kuidas suur de mõju sellest on saamine alates emakakaelavähk. See on küll selge et de peamine põhjus alates emakakaelavähk on pikaajaline infektsioon koos nn inimese papilloomiviirus (HPV) on.

Psüühilised häired

Mõned naised kes hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid sealhulgas Microgynon 30 kasutavad, on teatanud teinud kohta depressioon või meeleolu langus. Depressioon võib olla tõsine ja võib mõnikord viia enesetapumõteteeni . Kui teil esineb meeleolumuutused ja sümptomid depressiooni sümptomid depressioon depressioon ervaart, võtke siis nii kiiresti kui võimalik ühendust oma arstiga edasiseks täiendavaks meditsiiniliseks nõuandeks.

Vahepealne veritsus

Kõigi tablettidega võib esineda esimestel paaril kuud mõnikord ootamatult veritsus esineb (määrimine või läbimurdeveritsus). Te võite siis võib-olla mitte ilma sidemeta. Jätkake igal juhul tavaliselt lihtsalt teie tabletid võtma. Het ebaregulaarne veritsus jätkub enamasti kui kui teie keha kord harjunud on saanud on selle vastava tableti pill (na umbes 3 ribad). Kui see kauem kestab, halvemaks muutub või uuesti algab ,peate võtma ühendust oma arstiga. koos teie arst.

Mida peate tegema kui te ei veritse saate menstruatsiooni vaba tablettide päevadel Kui olete kõik tabletid õigesti võtnud ,ei ole probleeme on olnud alates oksendamise ja ka mitte muud ravimid on kasutanud, on see väga ebatõenäoline et te rase olete. Te võite siis rahulik koos järgmise ribaga jätkata.

Kui oodatav verejooks kuid kaks korda järjest puudub võite olla rase . Võtke ühendust arstiga kohe võtke ühendust oma arstiga. Ärge jätkake edasi järgmise lehega Microgynon 30 30 kui teie arst on kindlaks teinud et te ei ole rase oled.

Kasutamine lastel lastel

Microgynon 30 on ei ole mõeldud naistele naistele kes veel ei menstrueeri.

Kasutamine vanematel naistel Microgynon

Microgynon 30 tuleb mitte kasutada pärast menopausi ei tohiks.

Kasutate te veel muid ravimeid?

Kasutate te lisaks Microgynon 30 veel teised ravimid, või on teil et hiljuti teinud või on võimalus et võimalus et te lähitulevikus lähedal tulevikus teised ravimid läheb kasutama? Rääkige sellest siis oma arstile või apteekrile. Nad saavad teile öelda kas on vaja võtta lisaks rasestumisvastaseid meetmeid kasutada võtta (näiteks kondoomid) ja, kui et see juhtum on, kui kaua te seda peate tegema.

Mõned ravimid võivad mõju omada olla kohta veretasemed alates Microgynon 30 ja võivad de kaitse raseduse vastu vähendada, või võivad ootamatult veritsust põhjustada. See puudutab seda om:

ravimid jaoks de ravi van

- o epilepsia (näiteks primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat või felbamaat)
- o tuberkuloos (näiteks rifampitsiin)
- o infektsioonid koos HIV- ja C-hepatiidi viirus (nn proteaasinhibiitorid ja mittenukleosiid pöördtranskriptaasi inhibiitorid nagu ritonaviir, nevirapiin, efavirens).
- o seeninfektsioonid (griseofulviin)
- o artriit, artroos (etorikoksiib)
- o kõrge vererõhk kopsu veresoontes (bosentaan).

taimne ravim naistepuna naistepuna.

30 30 võib de toime teiste ravimite mõjutada mõjutamanäiteks ravimid mis sisaldavad tsüklosporiini sisaldavad anti-epilepsiaravimlamotrigiin (seevõib põhjustada kuni kõrgendatud üks tasemeni arv hoogud) teofülliin (kasutatakse raviks juures de ravi alates hingamisprobleemid) tisanidiin (kasutatakse raviks juures de ravi alates lihasvalu ja/või lihaspingeid).

Kasutage Microgynon 30 mitte kui teil on C-hepatiit ja selleks ravimeid koos ombitasviir /paritapreviirparitapreviir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir kasutatakse, kuna need ravimid võivad suurendada ALAT-maksaensüümi (üks maksafunktsiooni vereanalüüs) võivad põhjustada.

Teie arst määrab teile teise rasestumisvastase vahendi välja kirjutama enne kui alustate raviga selle ravimiga selle ravimiga ravimid. Microgynon 30 võib umbes 2 nädalat pärast lõppu sellest sellest ravist alustada .. jaotis 2 ' MillalMillal tohib seda ravimit mitte kasutada?'

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase , või arvate et te võiksite olla rase , ei tohi te olla võimalik, tohib te Microgynon 30 mitte kasutada.

Seda kasutamist ei Microgynon 30 soovitataks üldiselt mitte soovitada kuni naine imetab last rinnaga toitmist. Kui te tabletti ikkagi soovite kasutada samal ajal kui te veel imetate ,võite te kõige parem ühendust võtta oma arstiga. Juhtimisvõime arst.

Sõiduvõime en het kasutamine masinate

On ei ole märke et sõiduvõime mõjutatud sõiduvõime Microgynon 30.

sahharoosi 30 laktoosi sahharoos ja laktoos

Kui teie arst teile on öelnud et te teatud suhkruid ei talu , võtke ühendust omaarstiga enne kui seda ravimit võtate ravim võtab.

3. Kuidas kasutate te seda ravimit?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu teie arst teile seda on öelnud .. te selle üle teie üle õige kasutamine? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Millal ja kuidas võtate te tablette sisse?

Riba sisaldab 21 tabletti. Iga iga tablett seisund näidatud peal milline päev see peab olema võetud. Võtke tabletid iga päev umbes samal ajal sisse, vajadusel vajadusel koos veega. Järgige suunda noole järgi, mis on ribal näidatud kuni olete kõik 21 tabletti võtnud . Seejärel võtke 7 päeva tabletti. Selle aja jooksul selle ei tablett. Aja jooksul see 7 päeva peaks üks veritsus algama algama (nn võõrutusveritsus).See algab tavaliselt teisel või kolmandal päeval pärast päeva pärast ei de viimane tablett Microgynon 30. Alusta 8 päeval järgmise järgmise lehega, olenemata kas veritsus on juba möödunud või mitte. See tähendab et te jätkate samal päeval nädalas järgmise järgmise lehega alustate, ja ka et de ärajäämisveritsus iga kuu umbes samal päevadel päevad valu.

Kui te Microgynon 30 sel viisil kasutate , olete teka nende 7 päeva jooksul , mil te ei tabletti võta kaitstud vastu rasedus.

Millal alustada esimese ribaga? Te olete

viimase kuu ei kasutanud rasestumisvastaseid tablette Alustage Microgynon 30 esimesel päeval oma menstruatsioonitsükli päev kohta tsükkel (esimene päev teie menstruatsioon). Võtke ükstablett vastavalt vastavale päevamärgisele ribal. Võite ka päeval päev ka peal päev 2-5 tsükli tsükkel alustada aga siis peate te esimese 7 päeva kindlasti kasutama lisaks rasestumisvastast vahendit (näiteks kondoomi)kasutama .. Üleminek alates muu kombinatsioonipill kombinatsioonipillvaginaalne rasestumisvastane rõngas või rasestumisvastane plaaster rasestumisvastane plaaster võite alustada Microgynon 30 30 päeval, pärast kui te te viimane tablett teie eelmine pill on võtnud (seega ilma pausita). Kui teie eelmine pill ka mitteaktiivsed tabletid ribas blistris istuma, peab te kohe jätkama pärast viimast aktiivset tabletti oma eelmisest pillist (kuite ei tea milline milline et on, küsi siis oma arstilt või apteekrilt). Te võiteka hiljem alustada , kuid mitte kunagi hiljem kuipäeval pärast lõppu tablettideta perioodi tablettideta periood alates teie eelmine pill (või pärast viimast mitteaktiivset tabletti teie eelmisest pillist). Kui teil onvaginaalne rõngas või kondoom või plaaster rasestumisvastane plaaster olemas kasutab, peab te eelistatavalt alustama kasutamise Microgynon 30 päeval eemaldamise viimasest rõngast või plaastrist eemaldamine ei ole viimane ring of plaaster alates üks tsüklipakend, kuid mitte hiljem kui päeval millel te üks uus rõngas peaks sisestama või üks uus plaaster peaks paigaldama peavad plaaster. Üleminek alates üks minipill

Te saate alates ühest teisele päevale üle minna lülitama Microgynon 30-le, kuid te peate peab esimese esimene 7 päeva jah üks lisaks rasestumisvastane vahend (näiteks üks kondoom) kasutama.

Üleminek süstimisvastaselt või üks implantaadilt Alusta

Alusta koos Microgynon 30 millal te teisiti järgmine järgmine süst saaks saama või päeval millal see implantaadi eemaldatakse .Te peate järgima esimene 7 päeva kuid küll üks lisaks rasestumisvastane vahend (näiteks üks kondoom) kasutada.

Pärast sünnitust Kui olete just

sünnitanud sünnitama olete, soovib teie arst teile tõenäoliselt soovitada ootama kuni teie esimene spontaanne menstruatsioon , kuidmõnikord on see võimalik varem alustada te alustama. Järgige see nõuandeid oma arsti. See kehtib ka juhul kui te imetate ja soovite rinnaga toitmist anda ning pilli võtta . kasutama.

Pärast üht raseduse katkemist või aborti

Järgige arsti nõuannet oma arsti. Kas

teil on liiga palju seda ravimit kasutanud ??

Ei ole teateid tõsistest kahjulikest mõjudest seoses paljude Microgynon 30 tablettide korraga võtmisega 30 Kui te võtate.

tabletti korraga tabletid samal ajal on võtnud, võite teil esineda saada iiveldus iiveldus, oksendamise või vaginaalne veritsus. Isegi tüdrukud kes veel mitte menstrueerima saama vaginaalne veritsus saama kui nad kogemata kogemata seda ravimit on võtnud.

Kas te unustasite seda ravimit kasutada kasutama?

Kui te olete vähem kui 12 tundi hiljaks jäänud tableti võtmisega , siis tableti toime ei ole vähenenud . Võtke see tablett ikkagisisse niipea kui võimalik te eraan mõtleb ja võta järgmised tabletid jälle tavalisel ajal sisse. Kui te rohkem kui 12 tundi hiljaks jäänud olete võtmisega sisse võtma alates üks tablett, võib mõju toime pillide pill vähenenud olla. Kuidas rohkem tabletid te järjest unustanud oled, seda suurem on suurem saab mõju võimalus et de toime van de pill vähenenud on. De võimalus op ebapiisav kaitse vastu rasedus on het kõige suurem kui tabletid jäetakse vahele juures alguses või juures see lõpus ribal. Seetõttu kehtivad järgmised reeglid (vaataka skeemi): Rohkem kui 1 tablett

unustatud selles ribal Võtke ühendust selle ribaga teie arst.

1 tablett unustanud nädalal 1

Võtke unustatud tablett sisse niipea kui te sellele mõtlete, isegi kui see peaks tähendama et te kaks tabletid peal sama hetk peab võtma. Võtke edasi need tabletid jälle tavalisel kasutusaeg ajal, kuid te peate samuti jooksul 7 7 päevad extra rasestumisvastased vahendid kasutama. Kui te nädalal enne tableti unustanud tabletti seks on olnud võite te rase olla. Võtke sellisel juhul seetõttu kohe võtke ühendust teie arstiga.

1 tablett unustatud nädalal 2

Võtke unustatud tablett sisse niipea kui sellele mõtlete, isegi kui see tähendaks et et te kaks tabletti korraga samas hetkes peate võtma. Võtke edasi tabletid jälle tavalisel ajal sisse. Toime tableti toime on pill on mitte vähenenud, te ei pea mingeid lisaks rasestumisvastaseid vahendeid kasutama ..

unustatud nädalal 3 Te

võite valida kahe vahel võimaluse seast:

1. Võtke unustatud tablett sisse niipea kui te sellele mõtlete, isegi kui see tähendaks et te kaks tabletti korraga peate sama ajal võtma võtma. Võtke edasi tablettide tabletid jälle tavapärasel tavapärase ajal sisse. Jätke lisaks tablettideta tablettideta periood vahele ja jätkake kohe järgmisega järgmine strip. Tõenäoliselt saate alles alles lõpus lõpus teisest teisest strip tõelise tõelise ärajäämisverejooksu, kuid te võite teise teise teise strip küll viimase saama määrimisest või üks läbimurdeveritsus.
2. Te võite ka lõpetada vastava vastava lehe ja pärast ühe tablettideta perioodi 7 päeva (tel jah alati de päev mil millal te tableti unustasite)edasi minema järgmise järgmine ribaga. Kui te teie kindel alguspäev koos koos üks uus riba soovite alustada, võite üks tablettideta periood vähem kui 7 päeva hoida.

Kui te üks riba tabletid olete unustanud ja te saab ei verejooks sisse järgmine tavaline tablettideta periood võib see tähendada et te rase olete. Te peate ühendust võtma oma arstiga arst enne te edasi lähete järgmise järgmise ribaga.

Mida te peate tegema juhul kui oksendamine või raske kõhulahtisus Kui te

kahe tunni jooksul 3-4 tundi pärast võtmist tableti võtmisest üks tablett peab oksendama, või raske kõhulahtisus saab, on üks võimalus et toimeaine toimeaine ained mitte täielikult kehas keha imenduda imenduvad. See olukord on võrreldav unustamisega unustamine tableti tableti võtmata jätmisega.

Pärast oksendamist või kõhulahtisus peab te kiiresti võimalik uue tableti võtma varuribalt võtma reservribalt võtma. Kui võimalik 12 12 jooksul pärast seda aeg millal te tavaliselt oma tabletti võtate. Kui see pole võimalik on, või kui 12 tundi juba möödunud on, peate te nõu järgima nagu ülalpool näidatud juures 'Kas te unustasite seda ravimit kasutada?'. Menstruatsiooni

edasilükkamine : mida te peateteadma peab teadma

Te saate oma menstruatsiooni edasi lükata ilma tablettideta perioodi jätkata edasi koos uue uue lehega Microgynon 30. Te saate 30. R koos koos see riba jätkake kuni kõik tabletid otsas on või soovi korral varem lõpetada. Te võite kasutamise ajal kasutamine selle selle teise riba hästi viimane on alates läbimurdeveritsus või määrimine. Pärast tavapärase tablettideta periood 7 päeva alustate te siis uuesti järgmise järgmine riba.

Alguspäev alguspäev vahel teie menstruatsioon muutuvad: mida te peate teadma

Kui te oma tablette vastavalt juhiste võtate , siison teie menstruatsioon alati umbes umbes sama päev alustada. Kui te seda päeva soovite muuta, siis saate te seda teha tavalise tavalise tablettideta perioodi vahel kahe lehe vahel lühendama (kuid mitte kunagi pikendama). Näiteks kui teie menstruatsioon tavaliselt reedel algab ja te soovite et edaspidi nihutada järgmisele päevale nihutama kuni teisipäev (3 päeva varem) kui peate te nüüd 3 päeva varem kui tavaliselt uue uue ribaga alustama. Kui te tablettideta perioodi väga lühikeseks teeb (näiteks 3 päeva või vähem) võib see juhtuda et te selle tablettideta perioodi jooksul ei veritse ole saama. Te võib siis ajal järgmise järgmine lehe ajal on alates läbimurdeveritsus või määrimine.

Kui te lõpetate selle kasutamise selle ravimi ravim

Te võite koos Microgynon 30 lõpetada millal te soovite. Kui te ei rasedaks taha jääda, küsige siis oma arstilt nõu seoses muude usaldusväärsete teiste usaldusväärsete meetodid alates rasestumisvastased vahendid.

Kui te lõpetate sellepärast, et te rasedaks soovite jääda, soovitatakse üldiselt üldiselt soovitatakse kell oodata kuni kuni u üks looduslik menstruatsioon on olnud enne u proovite in ootama jääda . Usaate siis kergemini arvutada millal de de sünnitus saab toimuma.

Kas teil veel muid küsimusi selle kasutamise kohta selle ravimi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuigi ei saa kõik neid tunda .. teil te üks kõrvaltoime, eriti kui see tõsine iseloomuga on ja ning kaua kestab, või tekib seal üks muutus teie teie tervislik seisund millest te arvate et see põhjustatud võib olla poolt Microgynon 30? Võtke siis ühendust oma arstiga.

Kõik naised kes kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutama, on üks suurem risk trombid tekkeks veenides (venoosnetrombembolia [VTE]) või trombid tekkeks arterites (arteriaalnetrombembolia tromboembolia [ATE]). Vaata lisateavet rohkem teavet erinevate riskide kohta kombineeritud kasutamise kohta hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite jaotis 2 'Millal peate olema eriti ettevaatlik on koos see ravim?'

Tõsised kõrvaltoimed

Tõsised kõrvaltoimed mis on seotud kasutamise tableti tablett seoses seotud on toodud kirjeldatud kirjeldatud teoses 'Verehüübed (tromboos)' ja 'Microgynon 30 ja vähk'. Lugege neid paragrahve lisateabe saamiseks ja konsulteerige kohe oma arstiga arst kui vajalik.

Võtke kohe ühendust oma arstiga kui teil sümptomid angio-ödeem saate nagu paistes nägu , keelja /või kurk/kõri en/of probleemid koos neelamisega või nõgestõbi võimalik koos koos probleemid koos hingamisega (vt ka jaotis 2: 'Millal peab te ettevaatlik olema selle ravimiga?').Muud

võimalikud kõrvaltoimed Järgmised

kõrvaltoimed on nimetatud pillikasutajate poolt . Need. See kõrvaltoimed võivad eriti sisse esimestel paaril kuul pillide kasutamisel esinevad. Sageli kaovad need mõne aja möödudes iseenesest. Sageli

esinevad kõrvaltoimed kõrvaltoimed (esinevad kuni 10 1 kuni 10 100-st kasutajast):

- depressiivne meeleolu, meeleolumuutused
- peavalu
- iiveldus, kõhuvalu
- valu rindades rindades, tundlikud rinnad
- kaalutõus.

Mõnikord esinevad kõrvaltoimed (esinevad juures 1 1 10 1.000-st kasutajast kasutajad vähenenud

- libiido (huvi seksi vastu)
- migreen
- oksendamine, kõhulahtisus

- nahalööve, nahalööve koos tugev sügelus ja moodustumine of muhud
- suuremaks muutumine rindade rindade
- vedelikupeetus of niiskus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad juhtudel 1 1 10 10 000-st kasutajast kasutajadülitundlikkus

- suurenenud
- libiido (soov seks)ärritus
- ärritus kohta silmad juures kasutamine alates kontaktläätsed
- kuju alates nahalööve koos valulik sinakas-punased muhud, kuju alates nahalööve kus on ka kõne võib olla alates muhud, villid või vedelikupeetus
- vaginaalne eritis, eritis välja nibu kaalulangus
- kahjulikud
- verehüübed verehüübed sisse üks veen või arter, näiteks:
 - o sisse üks jalg või jalg (s.t. süvaveenide tromboos)sisse
 - o üks üks pikk (s.t.. kopsuemboolia)
 - o südameatakk
 - o insult
 - o 'mini-insult' või ajutised sümptomid nagu insuldi korral ,tuntud kui TIA (mööduvisheemiline isheemiline hoogkoht)
 - o verehüübed maksas, magu/sooled, neerud või silmad.

Tõenäosus verehüübe saamiseks on verehüüve saada on on suurem kui on muud tingimused teie kohta kehtivad on mis seda riski suurendab (vt jaotis 2 lisateabe saamiseks teave kohta tingimused mis riski peal verehüüvete suurendavad ja de sümptomid alates ühe verehüübe).

Järgmised tõsised kõrvaltoimed on veidi sagedasemad sagedamini teatatud juures naistel kes kasutasid rasestumisvastast tabletti kasutasid, kuid see on pole teada kas see on põhjustatud ravi poolt ravi vtjaotis 2: ' Millal peate olema eriti ettevaatlik selle ravimiga ?').

kõrgenenudvererõhk

- maksakasvajad või
- rinnavähk Järgmised haigusseisundid

on samuti seotud ka ka sisse side toodud koos kombinatsioonipillid:

Crohni haigus , haavandiline koliit, porfüüria (ainevahetushaigus , mis kõhuvalu ja vaimseid häireid põhjustab), süsteemne luupus erütematoos (kusjuures keha enda organeid ja kudesid rünnatakse ja kahjustatakse), herpeslõpus keha lõpus keha lõpus keha rasedus, Sydenhami korea (kiired tahtmatud tõmblused või värinad liigutused), hemolüütiline ureemiline sündroom (seisund mis esineb pärast kõhulahtisust mis see põhjustab on põhjustatud E.coli poolt), maksaprobleemid mis nähtav muutuvad läbi kollatõbi.

Teatamine kõrvaltoimetest kõrvaltoimetest Kui teil tekivad kõrvaltoimed , võtke ühendust omaarstiga või apteekriga kunstide apteeker. See kehtib ka selle võimalike kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles pakendi infoleheskirjas . Te võite kõrvaltoimetest ka otse teatada Hollandi Kõrvaltoimed Centrum Lareb, veebisait www.lareb.nl. Läbi kõrvaltoimete te teatamise, saate te meid aidata rohkem teavet saada selle ohutuse kohta selle ravimi ravim.

5. Kuidas säilitate te seda ravimit?

Säilitada alla 30°C.

Hoida nähtavuse ja kättesaamatus laste eest ..

seda see ravim mitte enam pärast de aegumiskuupäeva . See on leitud pakendil ja blisterpakendil 'EXP'. Seal on kuu ja aasta märgitud kuupäev ning aasta üks aasta. viimane päev sellest kuust on viimane kõlblikkusaeg.

Ärge loputage ravimeid mitte kraanikausist või tualetist alla ja visake neid mitte prügikasti prügikasti.

Küsige oma apteekrilt mida teha ravimitega peate tegema mida te enam ei kasuta. Neid kogutakse siis ühes vastutustundlik viis hävitatud ja jõuavad mitte keskkonda sattuda.

6. Sisu pakendist ja muud teave Millised

ained sisaldavad seal on see ravim?

Toimeained toimeained ained selles see ravim on levonorgestreel ja etünüülöstradiool. Iga tablett Microgynon 30 sisaldab 0,030 milligrammi etünüülöstradiooli ja 0,150 milligrammi levonorgestreeli.

De teised ained selles ravimis on laktoosmonohüdraat laktoosmonohüdraatmaisitärklis maisitärklispovidoon 25 (E1201), magneesiumstearaat (E470B), sahharoos ,povidoon 700.000, 700.000, polüetüleenglükool 6.000, kaltsiumkarbonaat (E170), talk (E553b), montaaniglükoolvaha (E192), titaandioksiid (E171), glütserool 85% (E442) ja raudoksiidpigment (kollane, E172).

Kuidas näeb Microgynon 30 välja ja kui palju kui palju sisaldab üks pakend?

Microgynon-30 tabletid on kaetud tabletid; tableti südamik on kaetud koos kattekihiga . Tabletidon kollased . Üks.

Üks pakend Microgynon 30 sisaldab 3 ribad, igaüks 21 tabletti.

Luba omanik müügiloo jaoks turule viimine ja tootja Luba

omanik müügiloo jaoks turule viimine kaubandus tooma

Bayer B.V.

Siriusdreef 36

2132 WT Hoofddorp

Tootja

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berliin, Saksamaa

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Doebereinerstrasse 20
99427 Weimar, Saksamaa

Teave päringud:
Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

Registris registreeritud all RVG 08204

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud juulis 2025. Pakendi infoleht Microgynon®

Transtoyou