

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de Microgynon

30, 0,15 mg/0,03 mg päällystetyt tabletit levonorgestreeli /

etinyyliestradioli Lue

huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä menee käyttäen, sillä lukee tärkeää tietoa sisällä sinulle .

Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä tarvitset sitä myöhemmin uudelleen ..

Onko u vielä kysymyksiä? Ota yhteyttä lääkärisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Älä anna tätä lääkettä ei eteenpäin muille , koska se onvain sinulle määrätty u määrätty.

Het voi haitallinen olla muille ,myös jos heillä on samat oireet kuin teillä. Jos

teille ilmenee yksi seuraavista sivuvaikutuksista haittavaikutukset jotka kohdassa 4 on

mainittu? Tai saatteko te sivuvaikutuksen joka ei ole tässä pakkausselosteessa

mainittu ? Ota sitten yhteyttäteidän lääkäriin tai apteekkiin ..

Tärkeitä asioita jotka sinun täytyy tietää yhdistetyistä hormonaalisista ehkäisyvalmisteista ehkäisyvalmisteet:

valmisteet ovat yksi luotettavimmista käänteisistä ehkäisymenetelmistä luotettava käännettävä ehkäisymenetelmä, edellyttäen correct käytetty

He antavat yhden hieman korkeamman riskin trombin muodostumiselle alkaen yhden

veritulpan (tromboosi) suonissa ja valtimoissa valtimot, etenkin sisään ensimmäisen

vuoden kun käytät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta tai jos käytät uudelleen

tauon jälkeen 4 viikon jälkeen viikot of pidempään taas alkaa kanssa käyttö alkaen yksi

yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste

Huomioi hyvin päällä ja ota yhteyttä sinun lääkäriin jos sinä ajattelee että te

mahdollisesti oireita veritulppa on veritulppa on (katso kohta 2 'Veritulpat (tromboosi)').

Tässä tämä pakkausseloste:

1. Mikä on Microgynon 30 ja mihin tätä lääkettä käytetään ?Milloin
2. et saa tätä lääkettä käyttäen tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa varovainen mukana olla?
3. Kuinka käytetään te tätä lääkettä?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?
6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot

1. Mikä on Microgynon 30 ja mihin sitä käytetään ? Microgynon30 on

ehkäisytabletti . yksi ehkäisytabletti. Microgynon 30 käytetään ehkäisemään raskauden ehkäisyä estämään ..

jotka sisältävät kaksi hormonia kutsutaan ' yhdistelmätabletteiksi 'nimellä. Kaksi erilaistaKaksi eri naispuoliset hormonit ovat levonorgestreeli (yksi hormoni jolla on progesteronimainen vaikutus) ja etinyyliestradioli (yksi hormoni jolla on estrogeeninen vaikutus). Ehkäisytabletit kahdella hormonilla ovat erittäin luotettavia. Jos ne oikein otetaan (ilmanettä tabletteja unohdetaan) on mahdollisuusraskauteen mahdollisuus päällä raskaus erittäin pieni.

2. Milloin et saa tätä lääkettä käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla ? Yleiset

huomautukset Lue

Lue ennen sinä aloitat käytön käyttö alkaen Microgynon 30 tiedot yli verihyytymät (tromboosi) kohdassa 2. On erityisen tärkeää että sinä lukee mitä oireet ovat alkaen yksi veritulppa – katso kohta 2 'Veritulpat (tromboosi) Ennen kuin

voit aloittaa kunt alkaa kanssa käyttö alkaen Microgynon 30, lääkäri sinulle esittää joitakin kysymyksiä kysymykset terveydentilastasi yli ja henkilökohtaisesta sairauskertomuksestasi sekä joka on läheistesi perheenjäsenten sairauskertomuksesta. Lääkäri tulee myös sinun verenpaineesi mitata ja, riippuen sinun henkilökohtaisesta tilanteestasi ,mahdollisesti myös muita tutkimuksia tehdä tutkimukset tehdä.

Tässä esitteessä kuvataan eri tilanteita joissa sinun tulee lopettaa käyttö Microgynon 30 tai joissa luotettavuus voi heikentyä ja mitä tehdä van Microgynon 30 vähentynyt voi olla. Näissä tilanteissa täytyy sinun joko ei seksiä harrastaa, tai käyttää lisä ehkäisyväline ilman hormonit käyttää, kuten esimerkiksi yksi kondomi tai yksi muu esteen menetelmä. Älä käytä käyttö lämpötilamenetelmää tai jaksoittaista pidättäytymistä .. Nämä menetelmät voivat olla epäluotettavia koska Microgynon 30 kuukausittaisia muutoksia kehonlämpötilassa ja kohdunkaulan limakalvoa vaikuttaa kohdunkaulan limakalvo Aivan.

muutkin kuten muu ehkäisyvälineet kanssa hormonit suojaa Microgynon 30 ei vastaan infektio kanssa hiv-virus (aids) tai muut seksuaalisesti tarttuvat taudit (sukupuolitaudit).

Kun et saa tätä lääkettä ei käyttää?

Et saa tätä lääkettä ei käyttää jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista . Jos sinulla on yksi tai enemmän näistä alla mainituista sairauksista on, kerro tämä sitten sinun lääkärillesi. Sinun lääkäri keskusteleee kanssasi kanssasi keskusteleee mikä muu muoto alkaen ehkäisy sopivampi on sinulle. u.

Käytä Microgynon 30 ei:

jos sinulla on veritulppa sisään jossakin verisuoni ei voida kääntää ilman kontekstia jalkojen (syvä laskimotukos , DVT),keuhkojen (keuhkoembolia, PE) taimuu elin on , taitämä tämä menneisydessä on ollut ollut jos te tiedätte että te on häiriö joka vaikuttaa teidän verenhyytymiseen vaikuttaa – esimerkiksi proteiini C-puutos, proteiini S-puutos, antitrombiini III-puutos, tekijä V-Leiden tai vasta-aineita vastaan fosfolipidejä jos olette leikattavana tai joudutte olemaan pitkään aikaa poissa jaloilta (liikkeellä ollessasi (katso kohta 'Veritulpat (tromboosi)') jos olette koskaan saanut sydänkohtauksen tai aivohalvauksen on ollut jos teillä on angina pectoris (yksisairaus sairaus joka voimakasta kipua rintaan aiheuttaa ja ensimmäinen oire sydänkohtauksen voi olla) tai ohimenevä iskeeminen kohtaus) tai yksi ohimenevä iskeeminen kohtaus on (TIA – ohimenevä oireet alkaen yksi aivohalvaus), tai tämä koskaan on ollut jos sinä yksi seuraavista sairauksista on , jotka sairauksen, riski päällä yksi veritulppa sisään sinun valtimot voi lisätä:

- o vakava diabetes (sokeritauti) vaurio verisuonet vakava
- o kohonnut verenpaine verenpaine
- o yksi vakava kohonnut rasvapitoisuus sisään sinun veresi (kolesteroli tai triglyseridit)
- o yksi sairaus joka hyperhomokysteinemia kutsutaan jos

sinä yksi migreenityyppi migreeni tyyppi että 'migreeni auralla' kutsutaan nimeltään on (tai on ollut)

jos sinulla on vakava maksasairaus tai keltaisuus on, tai aiemmin on on ollut

jos te yksi kasvain maksassanne on ollut tai, tai on ollut

jos te rintasyöpä tai syöpä sukupuolielimissä de sukuelimet on, tai menneisyydessä on ollut

jos sinulla epätavallisia verenvuotoja emättimestä on ,jonka syy ei ole määritetty jos määritetty

kun u allerginen olette yhdelle yhdelle näistä aineista tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit löydät löytää kohdasta kohdasta 6.

Käyttö Microgynon 30 ei jos sinulla on hepatiitti C on ja tähän lääkkeitä joissa on ombitasvirparitaprevirritonaviiri, dasabuviiri, glekapreviiripibrentasviiri tai sofosbuviirivelpatasviirivoxilaprevir käytetty (katso myös kohta 2 'Käytättekö te muita lääkkeitä?').Milloin

täytyy teidän olla erityisen varovainen tämän kanssa tässä tapauksessa lääke?

Milloin täytyy ottaa yhteyttä ottaa yhteyttä lääkärisi sinun lääkäriin?

Kutsu kiireellinen lääketieteellinen apu jos

- jos sinulla mahdollisia oireita tai oireita alkaen yksi veritulppa huomaa, jotka voivat tarkoittaa että te kärsitte jostakin yksi veritulppa jalassa (teidän jalka (eli. syvä laskimotromboosi tromboosi), yksi veritulppa keuhkossasi (sinun keuhko (ts.. keuhkoembolia), yksi sydänkohtaus tai yksi aivohalvaus (katso alla se otsikko 'Veritulpat (tromboosi)').

Mene kuvausta varten näistä oireista tai oireista näiden vakavien sivuvaikutusten kohdalle 'Miten käyttää ' tunnistaa sinä yksi veritulppa?'

Kerro se lääkärillesi , jos yksi seuraavista tilanteista koskee sinua soveltuu . Ota yhteyttä

lääkärisi tai lääkäriin apteekki ennen te tätä lääkettä käytät. Joissakin tilanteissa on teidän oltava erityisen varovainen olla jos te Microgynon 30 tai jokin muu yhdistelmäpilleri käytetty. Se voi olla tarpeen että että te säännöllisesti kautta teidän lääkäri tarkastetaan tarkastetaan. Jos sairaus ilmenee, tai pahenee, kun taas u Microgynon 30 käyttää, täytyy u tämä myös ilmoittaa teidän lääkäriille kertoa.

Jos te poltatte.

Jos teillä on diabetes (sokeritauti) on.

Jos sinulla on paljon liian painava olet.

Jos sinulla on yksi kohonnut verenpaine on.

Jos sinulla on yksi sairaus sydänläppien sydänläppien tai yksi tietty rytmihäiriö on.

Jos jollakin perheessänne läheisessä suvussa on ollut tromboosi, sydänkohtaus tai aivohalvaus tai aivohalvaus on ollut.

Jos sinulla on migreeni migreeniä vastaan.

Jos sinulla on epilepsia (katso ' Käytännömuuta lääkkeitä ?'). Jos jollakinperheessäsi on migreeni tai epilepsia suora perhe koskaan rintasyöpä on ollut.

Jos sinulla on yksi sairaus maksasta tai sappirakosta on.

Jos sinulla on tauti Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus) on

Jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – sairaus joka vaikuttaa sinun luonnolliseen immuunijärjestelmään)on ..

hemolyttis-ureeminen oireyhtymä oireyhtymä (HUS – yksi häiriö veren hyytymisessä joka munuaisten vajaatoimintaa aiheuttaa) on.

Jos sinulla on sirppisoluanemia (yksi perinnöllinen sairaus punaisissa verisoluissa) on.

Jos sinulla on kohonnut rasva-arvot veressäsi (hypertriglyseridemia)on, tai tämänsairaus esiintyy perheessäsi tulee sisään sinun perhe varten of is in sinun perhe esiintynyt. Hypertriglyseridemia on yhteydessä tuotu kanssa yksi korkeampi riski haimatulehduksen (yksi tulehdus haiman haima) saada saada.

Jos sinut leikataan täytyy olla tai olet pitkän ajan pois jalkeilla (katso ' Veritulpat' kohdassakohta 2). Jos olet

äskettäin äskettäin synnyttää olet, on sinä yksi lisääntynyt riski saada saada alkaen veritulppia. Kysy lääkäriltäsi kuinka nopeasti jälkeen synnytyksen synnytyksen sinä voit aloittaa käytön käytön alkaen Microgynon 30.

Jos sinulla on tulehdus tulehdus suonissa suonissa pinnalla pinnalla ihon ihon (pinnallinen tromboflebiitti) on

Jos sinulla on suonikohjuja on.

Jos sinulla on kloasma on tai sinulla on koskaan kloasmaa ollut (kellanuskeita pigmenttiläiskiä, niin sanottuja 'raskaustäiskiä', etenkin kasvoissa kasvot); jos tämä on tilanne , on järkevää välttää suoraa altistumista auringonvalolle tai ultravioletti valolle välttää ..

Jos sinulla on oireita angio-edeemasta ,kuten turvonnut kasvot , kieli jatai kurkku jatai vaikeuksianiellä tai nokkosihottuma niellä of karbunkkeli mahdollisesti yhdessä kanssa ongelmia hengittämisen kanssa, ota heti yhteyttä lääkäriisi. Tuotteet jotka estrogeenisia hormoneja sisältävät ,voivat mahdollisesti oireet peittää oireet alkaen perinnöllinen ja hankittu angio-edeema aiheuttaa tai pahentaa.

VERITULPAT (TROMBOOSI)

Jos käytät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta kuten Microgynon 30 30 ,, on teillä on suurempi riski saada verihyytymiä kuin jos ette käytä yhdistelmä hormonaalista ehkäisyä . Harvoin esiintyvä tilanneon harvinainen esiintyminen tapauksissa voi yksi verihyytymä yksi verisuoni tukkia ja vakavia ongelmia aiheuttaa.

Verihyytymät voivat muodostua

laskimoissa (tätäkutsutaan tulee 'laskimo- tromboosi', 'laskimo- tromboembolia' tai VTE kutsutaan),

valtimoissa (tätäkutsutaan ' valtimotromboosi', ' valtimotromboembolia', 'valtimotie tromboembolia' of ATE nimeltään).

Mies toipuu ei aina täysin alkaen verihyytymistä. In harvoin esiintyviä tapauksia voi tai pitkäaikaisia vakavia vaikutuksia olla, tai hyvin harvoin esiintyvät tapaukset voivat verihyytymät kuolemaan johtavia olla.

On tärkeää että tiedätte että yleinen riski on yleinen riski yksi haitallinen veritulppa kautta Microgynon 30 pieni on.

MITEN TUNNISTAT VERITULPAN?

Ota päivystyksellinen lääketieteellinen apu yhteyttä jos sinä yksi seuraavista oireista kärsit of oireita huomannut.

Saatteko te yksi näistä näitä vaivoja tai oireita? Missä voitte te kärsiä ?turvotus
turvotus - yksi jalka tai pitkin yksi laskimo sisään Syvä laskimotukos
tromboosi
yksi jalka tai jalka, erityisesti jos tämä liittyy mukana
met:

kipu tai arkuus jalassa, joka
sinä mahdollisesti vain tunnet seistessä tai kävellessä kohonnut
lämpötila
vaurioituneessa jalassa värimuutos
vaikuttanut ollut
värimuutos ihon iho jalan
esimerkiksi kalpea , punainen taisininen
tulla äkillinen

selittämätön hengitysvaikeus Keuhkoembolia tai
nopea hengitys äkillinen
yskä ilman selvää syytä
syy, jolloin te verta voitte yskiä
terävä kipu rinnassa , jokapahempi voi tulla
kun te syvään hengitätte vakava
vakava kevyt tunne päässä pää tai
huimaus
nopea tai epäsäännöllinen sydämenlyönti
vakava kipu vatsassa sinun vatsa.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä yhteen lääkäri, koska jotkut näistä oireista ,kuten yskä tai hengenahdistus hengenahdistusvoidaan virheellisesti pitää kevyempänä sairautena koska se on vähemmän vakava, kuten yksi hengitystieinfektio (esim. flunssa).

Oireet ilmenevät yleensä yhdessä silmässä : Laskimotromboosi laskimossa
välittömästi sisällä

välittömästi näkökyvyn menettäminen näkö, verkkokalvo (verihyytymä silmässä
tai silmä)
kivuton sumea näkö, mikä voi kehittyä kehittää
menetykseksi menetys of näkökyky

kipu, epämukavuus, paine tai raskas tunne rinnassa Sydänkohtaus
rinta
puristava tai täysi tunne rinnassa , käsivarressa taiala alla
rintalasta täysi
tunne ,ruoansulatushäiriö tai hengästyminen vaikeus ylävartalossa joka

säteilee selkään, leuka , kurkku, käsivarsi ja kohti
selkä, leuka, kurkku, käsivarsi ja vatsa
hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai
huimaus
äärimmäinen heikkous, ahdistus tai hengenahdistus
nopea tai epäsäännöllinen sydämenlyönti

äkillinen heikkous tai tunnottomuus tunne alkaen Aivohalvaus
kasvot, käsivarsi tai jalka, erityisesti yhdellä puolella kehoa
alkaen keho
äkillinen sekavuus, vaikeus kanssa puhua
tai ymmärtää
äkillinen vaikeuksia kanssa nähdä sisään yhdessä tai molemmissa silmissä
äkillinen vaikeuksia kanssa kävellä, huimaus,
tasapainon menetys tasapaino tai koordinaation
äkillinen, vakava tai pitkäaikainen päänsärky
ilman tunnettua syytä
heikentynyt tajunta tai pyörtyminen kanssa tai
ilman epileptistä kohtausta.

Oireet oireet alkaen yksi aivohalvaus voivat joskus vain lyhyen kestää ja lähes välittömästi ja
täysin toipua. Kuitenkin täytyy sinun silti kiireellinen lääketieteellinen apu pyytää, koska teillä
on riski voida saada klo vielä yksi aivohalvaus saada ..

ja lievä sinertävyys sinertäminen alkaen yksi käsivarsi Veritulpat jotka muu
tai jalka verisuonet tukkivat
vakava kipu sisään sinun vatsa (akuutti vatsa)

VERITULPAT LASKIMOSSA

Mitä voi er tapahtua jos er yksi verihyytymä muodostuu muodostuu sisään yksi laskimo?

Käyttö käyttö yhdistettyjen yhdistettyjen hormonaalisten ehkäisyvälineiden on
yhteydessä tuotu kanssa yksi korkeampi riski veritulppien veritulpat sisään yksi laskimo
(laskimotromboosi).Nämä haittavaikutukset esiintyvät kuitenkin harvoin esiintyä
varten. Yleensä ilmenevät ne ensimmäisenä vuotena kun yhdistelmä hormonaalista
ehkäisyvalmistetta käytetään ehkäisyvalmiste Jos verihyytymä.

Jos on johonkin verisuoneen tulee muodostunut sisään yksi laskimo sisään yksi jalka tai
jalka, voi se yksi syvä laskimo tromboosi (DVT) aiheuttaa.

Jos yksi veritulppa jalasta jalasta kuljetetaan mukana ja keuhkoon päätyy, voi se
aiheuttaa keuhkoembolia aiheuttaa.

Se esiintyy hyvin harvoin että veritulppa veritulppa veritulppa muodostuu muodostunut
sisään suoni laskimo sisään toinen elin ,kuten silmä silmä (laskimotromboositromboosi
verkkokalvossa verkkokalvossa).Kun

Kun onko riski päällä yksi veritulppa sisään yksi laskimo on korkein?

Riski riski yksi veritulppa veritulppa yksi laskimo on korkein korkein sisällä ensimmäinen vuosi
että yksi nainen ensimmäistä kertaa kun ensimmäistä kertaa yksi yhdistetty hormonaalinen
ehkäisyvalmiste käyttää. Riski voi myös lisääntynyt kohonnut ovat jos te jälkeen yksi keskeytys

4 viikkoa tai pidempään uudelleen aloittaa käytön käyttö yhdistetyn yksi yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste (sama tuote, tai toinen tuote kuin sitä ennen).Ensimmäisen

vuoden jälkeen riski pienenee , mutta se pysyyhieman korkeampana kuin jotain korkeampi sitten jos sinä ei yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste käyttää.

Jos sinä lopetat käyttämästä Microgynon 30, on sinun riski veritulppaan yksi veritulppa muutaman päivän viikkoa taas normaali.

Kuinka korkea on riski veritulppaan yksi veritulppa?

Riski riippuu siitä ei sinun luonnollinen riski riski VTE:ssä, ja tyyppiä yhdistelmä hormonaalinen ehkäisyvalmiste jota käytät käyttää.

Kokonais riski veritulppaan jalassa tai keuhkossa (syvä verihyytymä sisään yksi ollut pitkään (syvä laskimo tromboosi tai keuhkoembolia) kanssa Microgynon 30 on pieni.

- Jokaisesta 10.000 naisesta jotka eivät käytä yhtään yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta käyttävät en ei raskaana olla, saada noin 2 2 yksi jakso alkaen yksi vuosi yksi veritulppa.
- Jokaisesta jokainen 10 000 naiset jotka käyttävät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyä joka sisältää levonorgestreeliä kuten Microgynon 30, saavat noin 5-7 tapauksessa 5-7 in ajanjakson aikana alkaen yksi vuosi yksi veritulppa.
- Riski veritulppa saada yksi veritulppa saada on riippuvainen henkilökohtaisesta lääketieteellisestä historiastasi henkilökohtainen henkilökohtainen lääketieteellinen historiakatso kohdat 'Tekijät jotka lisäävät riskiäsi veritulppaan laskimossa tai valtimossa ' alla)Riski saadaveritulppa laskimossatai

valtimossa yksi vuosi yksi veritulppa saada saada

Naiset jotka eivät yhdistelmä hormonaalinen pilleri käyttävät ja eivät raskaana olevat

Noin 2 jokaista joka 10.000 naiset

Naiset jotka yksi yhdistelmäpilleri käyttävät joka levonorgestreeli sisältää

Noin 5-7 jokaista jokainen 10.000 naiset

Naiset jotka Microgynon 30 käyttävät

Noin 5-7 jokaisesta 10.000 naisesta

Tekijät jotka sinun riskiäsi saada veritulppa laskimossa lisäävät Riski saada veritulppa

laskimossa kasvaa Riski saada verihyytymä kanssa Microgynon 30 on pieni, mutta on tietyt olosuhteet jotka riskiä lisäävät. Sinun riskisi on suurempi:

jos sinä vakava ylipaino on (BMI [body mass index] korkeampi kuin 30 kg/m²)

jos yksi teistä läheisistä perheenjäsenistä nuorena nuori ikä (esimerkiksiennen ennen 50^e vuosi) yksi veritulppa on ollut sisään yksi jalka, keuhko tai muu elin. Sisään se tapauksessa voit sinä yksi perinnöllinen hyytymishäiriö olla.

jos te on leikkaus täytyy käydä läpi, tai jos te pitkän ajan et ole jaloillasi johtuen vammasta tai sairaus, tai jos sinun jalka on kipsissä on. Se voi olla tarpeen olla ennen leikkausta , tai kunolet vähemmän liikkuva , ja olet, muutama viikkoa lopettaa käyttö Microgynon 30. Jos sinun täytyy lopettaa Microgynon 30, kysy sitten lääkäriltäsi milloin voit taas sinä lääkäri milloin sinä uudelleen voi aloittaa käytön .. olet vanhempi tulossa (erityisesti noin yli 35 vuotta) josolet viime viikkoina viimeinen viikkoa synnyttää olette.

Se riski että yksi veritulppa kasvaa sitä mukaa kun enemmän näistä näistä olosuhteista koskee teitä soveltuu ovat.

Matka lentokoneella (pidempään kuin 4 tuntia) voi lisätä riskiäsi veritulppaan tilapäisesti veritulppa tilapäisesti lisätä, erityisesti jos on vielä joitakin muita de mainittu olosuhteet sinuun sovellettavissa ovat.

On tärkeää että kerrot sinun lääkärille kerrot jos yksi tai useampi näistä näistä olosuhteet sinuun soveltuvat ovat, jopa jos sinä epäilet tästä. Sinun lääkäri voi päättää että sinun täytyy lopettaa lääkkeen käyttö alkaen Microgynon 30.

Jos yksi ei voida yllä mainituista tilanteista muuttuu kun käytät Microgynon 30 käytössä, esimerkiksi jos yksi vieressä perheenjäsen yksi veritulppa (tromboosi) saa ilman tunnettua syytä, tai jos sinä paljon painossa lisää ,kerro kerro tämä sitten ottaa teidän lääkärille.

VERIHYYTYMÄ VALTIMOSSA

Mitä voi tapahtua jos kun tai yksi verihyytymä muodostuu muodostunut valtimo ssa valtimo?

Vain jos yksi verihyytymä sisällä yksi laskimo, voi yksi verihyytymä sisällä yksi valtimo vakavia ongelmia aiheuttaa. Se voi esimerkiksi yksi sydänkohtaus tai yksi aivohalvaus aiheuttaa.

Tekijät jotka sinun riski veritulppaan yksi veritulppa sisällä yksi valtimo lisäävät

On tärkeää että sinä tiedät että riski sydänkohtaukseen tai aivohalvaukseen Microgynon 30:n käytön vuoksi on erittäin pieni 30 suurempi pieni on, mutta suurempi voi tulla:

kasvavan iän myötä (yli noin 35 vuotta)

jos poltat . Joskäytät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta ehkäisyvalmiste kuten Microgynon 30 käytetään, suositellaan että te lopetatte tupakoinnin . Jos te ette voi lopettaa tupakointia ja vanhempi tupakointi ja vanhempi yli 35 vuotta, voi lääkärisi suositella sinulle suositella että toinen tyyppi ehkäisyväline käyttää jos sinulla ylipaino on jos on

jos sinulla korkea verenpaine on

jos yksi perheenjäsen sinun läheinen perhe nuorena nuori ikä (ennen 50 vuotta)

sydänkohtaus sydänkohtaus of aivohalvaus on ollut. In siinä tapauksessa voit sinä myös olla lisääntynyt riski olla saada sydänkohtaus tai aivohalvaus olla tehdä saada

jos sinä, tai yksi jäsen sinun läheinen perhe, yksi kohonnut rasvapitoisuus veressä veri on (kolesteroli tai triglyseridit)

jos sinä aan migreeni kärsii, erityisesti migreeni auralla

jos te yksi sydänsairaus on (sydänlappäsairaus, tai yksi sydämen rytmihäiriö joka eteisvärinä kutsutaan nimeltään)

jos sinä sokeritauti (diabetes) on.

Jos enemmän kuin yksi näistä näistä olosuhteista koskee sinua soveltuu on, tai jos yksi näistä tämä sairaudet erityinen vakava on, voi riski veritulppa saaminen olla alkaen yksi veritulppa jopa vielä lisää kohonnut olla.

Jos yksi ei käännettävää sisältöä yllä mainituista olosuhteista muuttuu sillä aikaa kun Microgynon 30 käytät, esimerkiksi jos alat polttaa tai jos tai jos yksi lähellä perheenjäsen yksi veritulppa (tromboosi) saa ilman tunnettua syytä, tai jos sinä paljon painossa lisäät „ kerro tämä sitten lääkärillesi. Sinun lääkärille.

Microgynon 30 ja syöpä

Naisilla jotka käyttävät pilleriä havaitaan hieman useammin rintasyöpä todetaan todettu kuin ei-pillerinkäyttäjillä samanikäisillä . Kymmenen vuotta jälkeä lopettamisen pillerin ei ole enää eroa . Ei ole tunnettu onko ei ero lisää. Se on ei tunnettu of tämä ero tulee aiheutuu johtuen pilleri. Se voi myös johtua koska pillerinkäyttäjät tarkemmin ja useammin tutkitaan ,jotta jotta de rintasyöpä aikaisemmin tulee havaitaan. Kuinka aikaisemmin de syöpä tulee havaitaan, sitä parempi de tulokset van de hoito.

Harvinaisissa tapauksissa tapauksia ovat käyttäjillä pillerinkäyttäjillä hyvänlaatuisia maksakasvaimia löydetty ja in vielä harvinaisemmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia. Joskus ovat nämä kasvaimet johtaneet asti yksi hengenvaarallinen sisäinen verenvuoto. Jos te äkillisesti kärsitte saada voimakkaasta kovasta vatsakipu, niin täytyy te välittömästi ottaa yhteyttä ottaa yhteyttä kanssa teidän lääkäri.

Kun naisilla jotka ovat pilleriä pidemmän ajan käyttäneet on havaittu hieman useammin kohdunkaulan syöpää diagnosoitu . Tämä ei kuitenkaan tarvitse olla kautta pilleri tulla tulla mutta voi tehdä tehdä olla kanssa seksuaalinen käyttäytyminen ja muut tekijät. Se on vielä ei selvää miten suuri de vaikutus tämän on saaminen alkaen kohdunkaulan syöpä. Se on kyllä selvää että de tärkein syy alkaen kohdunkaulan syöpä on pitkäaikainen infektio kanssa niin kutsuttu ihmisen papilloomavirus (HPV) on.

Psyykkiset häiriöt

Jotkut naiset jotka hormonaaliset ehkäisyvalmisteet mukaan lukien Microgynon 30 käyttävät, ovat ilmoituksen tehneet alkaen masennus tai alakuloisuus. Masennus voi olla vakava ja voi joskus johtaa itsemurha-ajatuksiin . Jos sinulla on mielialanvaihteluitaja oireita masennuksesta oireet alkaen masennus koe, ota sitten niin nopeasti kuin mahdollista yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisää lääketieteellistä neuvoa ..

verenvuoto Kaikkien

pillereiden kanssa voi ensimmäisten viikkojen aikana kuukautta joskus odottamaton verenvuoto esiintyä (tiputteluvuoto tai läpäisyvuoto). S voit silloin ehkä ei ilman kuukautissuojaa. Jatka joka tapauksessa normaalisti tavallinen teidän tabletit ottaa. Se epäsäännöllinen verenvuoto pysähtyy yleensä kun kun teidän keho kerran tottunut on on tähän tiettyyn kyseinen pilleri (noin 3 liuskaa). Jos se kestää kauemmin ,pahenee tai alkaa uudelleen , sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriisi . kanssa te lääkäri

Mitä sinun tulee tehdä jos et saa vuotoa tablettivapaiden päivien aikana Jos olet ottanut kaikki tabletit oikein eikä ole ollut vaivaa on ollut alkaen oksentelu ja myös ei muita lääkkeitä on käyttänyt, on se erittäin epätodennäköistä että olette raskaana . Te voitte sitten rauhallinen kanssa seuraava liuska jatkaa.

Jos odotettu verenvuoto kuitenkin kaksi kertaa peräkkäin puuttuu voit olla raskaana . Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi ota yhteyttä lääkäriisi . Älä jatka seuraavan levyn Microgynon 30 ennen kuin 30 on todennut että et ole raskaana määritetty että sinä ei raskaana käytät.

Käyttö lapsilla lapsilla

Microgynon 30 ei ole tarkoitettu tarkoitettu naisille naisille jotka eivät eivät menstruaatiota.

Käyttö vanhemmilla vanhemmilla naisilla

Microgynon 30 täytyy ei käytetty olla jälkeen de menopaussi.

Käytätkö sinä vielä muita lääkkeitä?

Käytätkö sinä lisäksi Microgynon 30 vielä muita lääkkeitä, tai on te että äskettäin tehnyt tai on mahdollisuus että te lähitulevaisuudessa muita lääkkeitä käyttää aikoo muita lääkkeitä menee käyttää? Kerro että sitten sinun lääkäriille tai apteekkarille. He voivat sinulle kertoa onko tarpeen käyttää lisä ehkäisymenetelmiä ottaa käyttöön (esimerkiksi kondomit) ja, jos että se tapaus on, kuinka kauan sinun tätä täytyy tehdä.

Jotkut lääkkeet voivat vaikutus olla vaikuttaa op de veripitoisuudet van Microgynon 30 ja voivat de suoja raskaudelta heikentyä , taivoivat aiheuttaa odottamatonta verenvuotoa . Hetkoskee tässä tässä om:

lääkkeet sairauden de hoitoon van

- o epilepsia (esimerkiksi primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti tai felbamaatti)
- o tuberkuloosi (esimerkiksi rifampisiini)
- o infektiot kanssa hiv- ja hepatiitti C-virus (niin sanotut proteaasi-inhibiittorit ja ei-nukleosidiset käänteiskopioijaentsyymien estäjät kuten ritonaviiri, nevirapiini, efavirensi).
- o sieni-infektiot (griseofulviini)
- o niveltulehdus, nivelrikko (etorikoksibi)
- o korkea verenpaine keuhkojen verisuonissa (bosentaani).

yrttivalmiste mäkikuisma mäkikuisma.

30 30 voi de vaikutus alkaen muiden lääkkeiden vaikuttaa, esimerkiksi lääkkeet jotka sisältävät siklosporiinia sisältävät anti-epilepsialääke lamotrigiini (tämä voi johtaa asti kohonneeseen lisääntyneeseen määrä kohtaukset) teofylliini (käytetään käytetään hengitysvaikeuksien hoidossa hoidossa alkaen hengitysvaikeudet) titaanidiini (käytetään käytetään kohdalla hoidossa hoidossa alkaen lihaskipu jaai lihascrampit).

Käytä Microgynon 30 ei jos sinulla on hepatiitti C on ja tähän lääkkeitä joissa on ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir, glekapreviiripibrentasviiri of sofosbuviriivelpatasviirivoksilapreviiri käytetään, koska nämä aineet voivat lisätä ALAT-maksaentsyymintaso (yksi maksan toimintakoe) voivat aiheuttaa.

Teidän lääkäri määrää teille toisen ehkäisyvalmisteen ennen kuin te aloitate hoidon tämän kanssa hoidon tämän lääkkeet. Microgynon 30 voi noin 2 viikkoa jälkeen päättymisen jälkeen tämän hoidon voidaan jatkaa. Katso kohta 2 'Milloin saako tätä lääkettä ei käyttää?'

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana , tai luulet että olet raskaana voisit olla , saako, saat Microgynon 30 ei käyttää.

Se käyttö of Microgynon 30 ei yleensä suositella niin kauan kuin nainen imetys antaa yksi nainen imetys. Jos pilleri kuitenkin haluat käyttää sillä aikaa kun vielä imetat ,voit parhaiten ottaa yhteyttä lääkäriisi. Ota yhteyttä omaan lääkäriisi. Lääkärisi

Ajokyky en het käyttö koneiden

On ei merkkejä että ajokyky vaikuttaa ajokyky Microgynon 30.

sakkarosia 30 laktoosia sakkarosii ja laktoosi

Jos sinun lääkärisi on kertonut että et siedä tiettyjä sokereita , ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin otat tämän lääkkeen lääkeaine ottaa.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä ?Käytä

tätä lääkettä aina tarkalleen kuten lääkärisi on sinulle kertonut . Epäiletkö. käyttöä ? oikea käyttö? Ota yhteyttä lääkärisi tai apteekkari.

Milloin ja miten otat sinä tabletit ?

Liuska sisältää 21 tablettia. Jos jokainen tabletti ilmoitettu merkitty on mikä päivä se täytyy olla otettu. Ota tabletit joka päivä noin samaan aikaan päivittäin , tarvittaessa veden kanssa. Noudata de suuntaa nuolen mukaan joka on merkitty liuskaan kunnes olet ottanut kaikki 21 tablettia . otettu. pidä 7 päivän tauko ilman tablettia. Tämän aikana tämä 7 päivää kuuluu yksi vuoto alkaa alkaa (ns. ns. tyhjennysvuoto). Tämä alkaa yleensä 2^{tai} 3^{päivänä} jälkeen ei de viimeinen tabletti Microgynon 30. Aloita 8^s päivänä seuraavan seuraava liuska, riippumatta siitä, vuoto onko jo ohi vai ei. Tämä tarkoittaa että sinä aina sama päivä viikon aikana yksi seuraava liuska alkaa, ja myös että vieroituvuoto tapahtuu joka kuukausi noin samana päivinä päivät vaikuttaa.

Jos käytät Microgynon 30 tällä tavalla , olet myösniiden 7 päivän aikana kun et ota tablettia suojattu raskaudelta vastaan vastaan raskaus.

Milloin aloittaa aloittaa ensimmäisen ensimmäinen liuska?

Sinä olet viimeisen kuukauden aikana et ehkäisytablettiä käyttänyt
Aloita Microgynon 30 ensimmäisenä päivänä päivä ei voida sykli (ensimmäinen ensimmäinen päivä alkaen sinun kuukautiset). Ota yksi tabletti kohdalla de asianmukainen päivämerkintä liuskalla. Voit myös päällä päivä 2-5 sykli aloittaa mutta sitten täytyy sinun ensimmäiset 7 päivää kuitenkin yksi ylimääräinen ehkäisymenetelmä (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää.

Siirtyminen alkaen toisesta yhdistelmäpilleristä yhdistelmäpilleriemättimen ehkäisyrenkaasta tai ehkäisylaastarista Voitte aloittaa Microgynon 30 käytön 30 sen

jälkeen kun olette lopettanut sinä viimeinen tabletti sinun edellinen pilleri on ottanut (joten ilman taukoa). Jossinun edellinen pilleri myös ei-aktiivisia tabletteja liuskassa tabletit läpipainopakauksessa istua, täytyy sinun heti jatkaa jälkeen viimeisen aktiivisen tabletin sinun edellisestä pilleristäsi (jos et tiedä mikä tietää mikä että on, kysy sitten lääkäriltäsi tai apteekkariltasi). Voit myös aloittaa myöhemmin alkaapäivänä jälkeen päättymisen jälkeen tablettivapaan jakson aikana alkaen sinun edellinen pilleri (tai jälkeen viimeisen ei-aktiivisen tabletin sinun edellinen pilleri). Jos sinulla on vaginaalinen ehkäisyrengas tai ehkäisyalaastari on yksi ehkäisyalaastari on käyttää, täytyy sinun mieluiten aloittaa Microgynon 30:n käyttö poistopäivänä viimeisen renkaan tai laastarin poistamisen jälkeen ei ole viimeinen rengas laastari alkaen yksi sykli pakkaus, mutta ei myöhemmin kuin päivänä jolloin sinä yksi uusi rengas pitäisi asettaa tai yksi uusi laastari pitäisi asettaa täytyy laastarit.

Siirtyminen alkaen yksi minipilleri

Voitte siirtyä ei voida kääntää ilman kontekstia yhdestä päällä toiseen päivä siirtyä päällä Microgynon 30, mutta teidän täytyy de ensimmäinen 7 päivää kyllä yksi ylimääräinen ehkäisyväline (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää.

Siirtyminen pistos ehkäisytablettien tai yksi implantaatti Aloita

Aloita Microgynon 30 milloin sinä muuten seuraava seuraava injektio saisit saada tai päivä jolloin se implantaatti poistetaan . Sinun täytyy poistaa de ensimmäinen 7 päivää kuitenkin kyllä yksi ylimääräinen ehkäisyväline (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää.

Synnytyksen jälkeen yksi synnytys

Jos olet juuri synnyttänyt olet, suosittelee lääkärisi sinulle todennäköisesti suosittelee odottamaan odottaa kunnes ensimmäinen ensimmäinen spontaani kuukautisesi, mutta joskus on mahdollista aloittaa aikaisemmin aloittaa. Noudata se neuvoa alkaen lääkärisi . Tämä koskee myös varten tapauksessa tapaus että u imetät antaa ja de pilleriä haluat käyttää.

Keskenmenon tai abortin jälkeen

Noudata lääkärisi ohjeita . Oletko käyttänyt

liikaa tätä lääkettä ? alkaen tämä lääke käytetty?

Ei ole ilmoituksia vakavista haittavaikutuksista Microgynon 30 tablettien samanaikaisesta nauttimisesta . Jos otat useita 30 30 tabletteja.

. Jos otat tabletit samanaikaisesti on otettu, voit saada kärsiä alkaen pahoinvointi, oksentelu tai emätin verenvuoto. Jopa tytöt jotka vielä ei menstruaatio voida vaginaalinen verenvuoto saada jos he per vahingossa tätä lääkettä ovat ottaneet.

Unohtitko unohtanut tätä lääkettä käyttää käyttää?

Jos otat alle 12 tuntia myöhässä jätä tabletin ottamisessa , ei tabletti, vaikutus ei ole pilleri heikentynyt . Ota tablettikuitenkin kuitenkin heti kun sinä eraan ajattelee ja ota seuraavat tabletit taas tavanomaiseen aikaan sisään. Jos olet enemmän kuin 12 tuntia myöhässä olet ottamisessa myöhässä ottaminen alkaen yksi tabletti, voi heikentää vaikutusta pillerin pilleri heikentynyt olla. Kuinka enemmän tabletteja peräkkäin unohtanut olet, sitä suurempi on suurempi tulee se mahdollisuus että de vaikutus de pilleri heikentynyt on. De mahdollisuus riittämättömään suojaan raskaudelta vastaan raskaus on suurin kun tabletit jäävät väliin alkaen alussa tai alkaen se lopussa liuskan. Siksi koskevat seuraavat säännöt (katsomyös kaavio): Yli 1 tabletti unohtunut tässä liuska Ota yhteyttä tähän

liuskaan teidän lääkäri.

1 tabletti unohtanut viikolla 1

Ota unohtunut tabletti heti kun te siitä ajattelette, myös jos tämä saattaisi tarkoittaa että te kaksi tablettia päällä samaan aikaan täytyy ottaa. Ota lisäksi de tabletit taas tavanomaiseen aikaan aika ottaen, mutta sinun täytyy myös kestää 7 päivää extra ehkäisyvälineet käyttää. Jos olet viikolla ennen unohdettua tablettia seksin kanssa ollut voit olla raskaana . Ota siinä tapauksessa siksi heti siksi heti ota yhteyttä sinun lääkäriin.

1 tabletti unohtunut viikolla 2

Ota unohtunut tabletti heti kun sinä muistat sen, vaikka jos tämä saattaisi tarkoittaa että u kaksi tablettia kerralla samaan aikaan täytyy ottaa. Ota lisäksi tabletit uudelleen tavalliseen aikaan sisään. Vaikutus pillerin on lääke on on ei vähentynyt, te ei tarvitse mitään ylimääräistä ehkäisyvälinettä käyttää ..

unohtunut viikolla 3

Voitte valita kahdesta vaihtoehdosta : kaksi mahdollisuudet:

1. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat sen ajatella, vaikka jos se tarkoittaisi että otat kaksi tablettia samana aikana sama täytyy täytyy ottaa. Ota lisäksi tablettien tabletit uudelleen tavanomaiseen tavanomainen aikaan sisään. Jätä lisäksi tablettivapaan tablettivapaa jakson väliin ja jatka heti seuraavalla seuraava strip. Todennäköisesti saatte vasta lopussa toisen stripin lopussa toisen stripin todellisen vieroitusvuodon , mutta tevoitte toisen stripin aikana toisen stripin kuitenkin viimeinen saada tiputteluvuotoa tai yksi läpäisyvuoto.
2. Voitte myös lopettaa kyseisen liuskasta ja aloittaa jälkeen yksi tabletitonta jaksoa 7 päivän ajan (tel wel aina de päivä mukana jolloin unohditte ottaa tablettin unohtanut) jatkaa kanssa seuraava liuska. Jos olette teidän vakio aloituspäivä kanssa kanssa yksi uusi liuska haluat aloittaa, voit yksi tabletitonta jakso alle 7 päivää pitää.

Jos olet yksi liuska tabletteja unohtanut unohtanut ja sinä saa ei verenvuotoa sisään seuraavassa normaalissa tablettivapaassa jaksossa voi se tarkoittaa että olet raskaana . Sinun täytyy ottaa yhteyttä kanssa lääkäriisi lääkäri ennen te jatkatte kanssa seuraavan liuskan kanssa.

Mitä teidän täytyy tehdä tapauksessa tapauksessa oksentelua tai vakavaa ripulia Jos te

sisällä 24 tuntia 3-4 tuntia ottaen lääkkeen nauttimisen jälkeen jos tabletti täytyy oksentaa, tai vakava ripuli ilmenee, on mahdollisuus että vaikuttava aine aineet ei täysin sisällä kehoon tulevat imeytymään. Tämä tilanne on verrattavissa unohtamiseen unohtamiseen unohtamiseen unohtamiseen unohtamiseen ripuli täytyy te nopeasti mahdollisimman uusi uusi tabletti ottaa uusi varanauhasta ottaa. Jos mahdollista 12 12 kuluessa jälkeen se aika jolloin sinä normaalisti sinun pilleri otat. Jos tämä ei mahdollista on, tai jos 12 tuntia jo ohi ovat, täytyy sinä neuvo seurata kuten yllä mainittu kohdassa 'Oletko unohtanut tätä lääkettä käyttää ?'.Kuukautisten

lykkäminen : mitä sinuntäytyy tietää tietää

U kunt teidän kuukautiset siirtää kautta ilman tablettivapaata jaksoa jatkaa tee uuden kanssa levyn Microgynon 30. Voitte kunt jatkaa kunto kanssa tämä strip jatkaa kunnes kaikki tabletit loppu ovat tai halutessasi aikaisemmin lopettaa. Sinä voit aikana käytön käyttö tämän tämän toinen liuska hyvin viimeinen olla kautta läpäisyvuoto tai tiputteluvuoto. Tavanomaisen

käytännöllinen tablettivapaa jakso 7 päivää aloitatte sitten uudelleen seuraavan liuskan.
Aloituspäivä

on alkupäivä alkaen sinun kuukautiset muuttuvat: mitä sinun täytyy tietää

Jos otat tablettisi ohjeiden mukaan ohjeet otat , niintulee sinun kuukautiset aina noin noin sama päivä aloittaa. Jos tämän päivän haluat muuttaa, niin voit tehdä sen tekemällä normaalin tablettivapaan jakson kahden liuskan välillä kaksi liuskaa tee lyhentää (mutta ei koskaan pidentää).Esimerkiksi jos kuukautisesi normaalisti perjantaina alkavat ja haluat että jatkossa siirtyvät toiseen sisään jatko siirtää kohti tiistai (3 päivää aikaisemmin) kuin täytyy sinun nyt 3 päivää aikaisemmin kuin tavallisesti uudella uudella liuskalla aloittaa. Jos sinulla on tablettivapaa jakso hyvin lyhyt tekee (esimerkiksi 3 päivää tai vähemmän) voi se tapahtua että te tämän tablettivapaan jakson aikana ei vuotoa tule olemaan. Te voit dan aikana de seuraavan strip last olla van läpäisyvuoto tai tiputteluvuoto.

Jos lopetat met het käyttö van tätä lääkettä

Sinä voit met Microgynon 30 lopettaa milloin haluatte. Jos ette raskaaksi halua tulla, kysy sitten lääkäritänne neuvoa neuvoa koskien muita luotettavia muita luotettavia menetelmät alkaen ehkäisy.

Jos lopetat koska haluat raskaaksi tulla ,suositellaan yleensä odottamaan kunnes yleisesti suositellaan te odottaa kunnes u yksi luonnollinen kuukautiset on ollut ennen kuin yrität tulla raskaaksi odotettavissa olla . Sinävoit sitten helpommin laskea milloin se de synnytys tulee tapahtua.

Onko teillä vielä muita kysymyksiä koskien käyttöä tästä lääkkeestä ? Ota sitten yhteyttäteidän lääkäriin tai apteekkariin ..

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten jokainen lääke voi tämä lääke haittavaikutuksia olla, vaikka ei kaikki saa niitä kohdata .. te sinä yksi sivuvaikutus, varsinkin jos tämä vakava luonteeltaan on ja pitkittyy , tai ilmeneejokin muutos teidän terveydentilassanne tai käytöksessänne . terveydentila joista sinä ajattelet että se aiheutuu voi johtua Microgynon 30:stä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi. Kaikki naiset

jotka yhdistelmä hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttävät ehkäisyvalmisteet käyttää, on korkeampi riski verihyytymiin laskimoissa verihyytymät laskimotromboembolia [VTE]) tai verihyytymiinvaltimoissa tromboembolia valtimotromboembolia verihyytymät sisään valtimot (valtimotie tromboembolia [ATE]). Katso lisää tietoa eri riskeistä yhdistelmä hormonaalisten ehkäisyvälineiden käytöstä kohdasta 2 ' Milloin sinun tulee ollaerityisen varovainen sinä ylimääräinen varovainen ovat kanssa tämä lääke?'

Vakavat sivuvaikutukset

Vakavat sivuvaikutukset jotka liittyvät käyttöön pillerin käytön yhteydessä ovat yhteydessä tuotu esille kuvataan kohdassa 'Veritulpat (tromboosi)' ja 'Microgynon 30 ja syöpä'. Lue nämä kohdat lisää tietoa ja kysy heti lääkäritäsi sinun lääkäri jos tarpeen.

Ota heti yhteyttä sinun lääkäri jos sinä oireita angio-edeema saat kuten turvonnut kasvot , kielija / tai kurkku/kurkku enof ongelmat kanssa nieleminen tai nokkosihottuma mahdollisesti

yhdessä kanssa ongelmat kanssa hengittäminen (katso myös kohta 2: 'Milloin täytyy u extra varovainen olla tämän lääkkeen kanssa?').

Muut mahdolliset sivuvaikutukset

Seuraavat sivuvaikutukset mainitaan pillerinkäyttäjien toimesta . Nämä. Tämä haittavaikutukset voida erityisesti in de ensimmäiset pari kuukautta van het pillerin käyttö esiintyä. Usein menevät ne jonkin ajan kuluttua itsestään ohi.

Usein esiintyvät sivuvaikutukset (esiintyy 1 10 1): masentunut mieliala,mielialanmuutos

- päänsärky pahoinvointi mielialanmuutos
- vatsakipu
- kipurintojen ,
- kipu sisään rinnat, herkäät rinnat
- painonnousu.

Joskus esiintyvät sivuvaikutukset (esiintyvät 1 kanssa 1 jopa 10 1.000:sta käyttäjästä)

- vähentynyt libido (halu seksiin)
- migreeni
- oksentelu, ripuli
- ihottuma, ihottuma ja voimakas kutina ja muodostuminen alkaen kyhmyjä
- suuremmaksi tuleminen ei ole mitään käännettävää sisältöä rinnat
- nestettä alkaen kosteus.

Harvoin esiintyvät sivuvaikutukset (esiintyvät 1 kanssa 1 jopa 10 10 000:sta käyttäjästä)

- yliherkkyys
- lisääntynyt libido (halu seksi)
- ärsytys silmien silmät käytettäessä käyttö yhteydessä piilolinssit
- muoto ihottuma ihottuma ja kivuliaita sinipunaisia kyhmyjä, muoto ihottuma ihottuma jossa on myös kielellä voi olla alkaen kyhmyjä, rakkuloita tai nesteen kertymistä
- emättimen vuoto, vuoto nisästä de nännistä
- painonlasku
- haitallisia verihyytymiä sisään yksi laskimo tai valtimo, esimerkiksi:
 - o jalassa yksi jalka tai jalka (ts.. syvä laskimotromboosi tromboosi)
 - o jalassa yksi pitkä (ts.. keuhkoembolia)
 - o sydänkohtaus
 - o aivohalvaus
 - o 'mini-aivohalvaus' tai tilapäinen oireet kuten aivohalvauksen yhteydessä ,tunnetaan nimellä TIA (ohimeneväiskeeminen iskeeminen kohtaus)
 - o verihyytymät maksassa, vatsasuolisto, munuaiset tai silmät.

Mahdollisuus saada verihyytymä on yksi verihyytymä saada on suurempi kuin on muut olosuhteet koskee sinua soveltuu ovat jotka tämä riski lisää (katso kohta 2 lisää tietoa tiedot yli olosuhteet jotka riski veritulppien veritulpat lisäävät ja oireet oireet veritulpan yksi veritulppa).

Seuraavat seuraavat vakavat haittavaikutukset ovat hieman yleisempiä raportoitu naisten jotka käyttivät ehkäisytablettiä , mutta ei ole tiedossaonko tämä aiheutunut hoidosta (katso kohta 2: ' hoito (katso osasto 2: 'Milloin täytyy olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa ?').kohonnut

- verenpaine maksakasvaimet
- tai rintasyöpä Seuraavat

sairaudet ovat myös mukana myös sisään side tuotu kanssa yhdistelmäpillerit:

Crohnin tauti , haavainen paksusuolitulehdus ulserosa, porfyria (aineenvaihduntasairaus joka vatsakipu ja henkiset häiriöt aiheuttaa), systeeminen lupus erythematosus (jossa keho hyökkää omia elimiä ja kudoksia vastaan ja vahingoittaa), herpes lopussa se loppu alkaen de raskaus, Sydenhamin korea (nopeat tahattomat nykivät tai nykivä liikkeet), hemolyyttinen ureeminen oireyhtymä (tila joka esiintyy ripulin jälkeen joka kuolema aiheuttaa on E.coli-bakteerin aiheuttama), maksavaivat jotka näkyvät tulevat esiin keltaisuuden kautta ..

ilmoittaminen haittavaikutuksista Haittavaikutusten ilmetessä

Ota yhteyttä haittavaikutuksista, ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia sivuvaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa mainittu . Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraan ilmoittaa kautta Suomen kautta Haittavaikutukset Centrum Lareb, verkkosivusto www.lareb.nl. Haittavaikutuksia ilmoittaa ilmoittaa, voit auttaa meitä saamaan lisää tietoa tee turvallisuudesta tästä lääkkeestä . tämä lääkeaine.

5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?

Säilytä alle 30°C.

Pidä poissa näkyvistä ja ulottuvilta lasten käsistä ..

tätä tämä lääke ei enää jälkeen de viimeinen käyttöpäivä. Se on löydettävissä löytää pakkauksesta ja ja läpipainopakkauksesta jälkeen 'EXP'. Siinä on kuukausi ja ja yksi vuosi. De viimeinen päivä van die kuukausi is de viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin tai wc en heitä pois ne ei roskakoriin roskakori.

Kysy apteekkariltasi apteekkariltasi mitä sinun pitäisi tehdä lääkkeillä tehdä tehdä joita et ei enää käytä. Ne hävitetään sitten yksi vastuullinen tapa hävitetty ja tulevat eivät ympäristöön päädy.

6. Sisältö pakkauksen sisältö ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät siihen tämä aine?

Valmiste vaikuttavat aineet tässä valmisteessa ovat levonorgestreeli ja etinyyliestradioli . Jokainen tabletti Microgynon 30 30 0,030 milligrammaa etinyyliestradiolia ja ja 0,150 milligrammaa levonorgestreeliä.

De muut aineet tässä lääkkeessä ovat laktoosimonohydraatti laktoosimonohydraattimaissitärkkelys maissitärkkelyspovidoni 25 (E1201), magnesiumstearaatti (E470B), sakkaroosi ,povidoni 700.000, 700.000, polyeteeniglykoli 6.000, kalsiumkarbonaatti (E170), talkki (E553b), montaaniglykoli (E192), titaanidioksidi (E171), glyseroli 85% (E442) ja rautaoksidipigmentti (keltainen, E172).

Miltä näyttää Microgynon 30 ja kuinka paljon sisältää yksi pakkaus?

Microgynon-30-tabletit ovat päällystettyjä tabletteja; tabletin ydin on päällystetty kanssa kerroksella . Tabletit ovat keltaisia . Yksi.

Yksi pakkaus Microgynon 30 sisältää 3 liuskaa, joissa jokaisessa 21 tablettia.

Haltija myöntämis- lupa myöntämiseen markkinoille saattaminen ja valmistaja Haltija

myöntämis- lupa myöntämiseen markkinoille saattaminen kauppa tuoda
Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp

Valmistaja
Bayer AG
Müllerstraße 178
13353 Berliini, Saksa

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Doebereinerstrasse 20
99427 Weimar, Saksa

Lisätietoja tiedustelut:
Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

Rekisterissä rekisteröity alla RVG 08204

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty heinäkuussa 2025. Pakkausseloste Microgynon ®