

Notice: information pour la utilisatrice

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg comprimés enrobés

lévonorgestrel / éthinylestradiol

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament va utiliser, car il indique importante information dans pour vous.

Conservez cette notice. Peut-être aurez vous en aurez besoin de nouveau ..

A-t-il u encore questions? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Ne donnez ce médicament pas à d'autres , car il est seulement prescrit à vous uniquement. Le peut être nocif pour les autres, même si ils ont les mêmes symptômes que vous.

Avez-vous des effets indésirables ? effets secondaires qui dans rubrique 4 sont? Ou recevez vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice figure? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Important choses que vous devez savoir sur les contraceptifs hormonaux combinés:

Ces médicaments constituent l'une des plus fiables méthodes contraceptives réversibles, à condition correct utilisé

Ils présentent un légèrement plus élevé risque de développer un caillot sanguin (thrombose) dans les veines et artères en artères, surtout dans le première année que vous un combiné hormonal contraceptif utilisez ou si vous après une interruption de 4 semaines de plus longtemps encore commence avec le utilisation de un combiné hormonal contraceptif

Faites attention à et contactez votre médecin si vous pense que vous éventuellement symptômes d'un un caillot sanguin avez (voir rubrique 2 'Caillots sanguins (thrombose)').

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Microgynon 30 et pourquoi ce médicament est-il utilisé?
2. Quand ne devez-vous pas ce médicament utiliser ou devez-vous faire attention supplémentaire prudemment avec être?
3. Comment utilisez vous ce médicament?
4. Effets secondaires
5. Comment conservez vous ce médicament?
6. Contenu de la emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Microgynon 30 et à quoi sert ce médicament ? Microgynon

30 est une pilule contraceptive pilule contraceptive. Microgynon 30 est utilisé pour prévenir la grossesse.

Les pilules contraceptives qui contiennent deux hormones sont appelées 'pilules combinées' appelées. Les deux différentes féminines hormones sont levonorgestrel (une hormone avec effet progestatif) et éthinylestradiol éthinylestradiol une hormone avec effet œstrogénique). Pilules contraceptives). Pilules contraceptives avec deux hormones sont très fiables. Si elles correctement sont prises (sans que comprimés soient oubliés) la probabilité de grossesse très petit.

2. Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser ou devez vous faire particulièrement prudent avec être?

Remarques générales

Lisez avant vous commencez à utiliser l'utilisation de Microgynon 30 l'information sur caillots sanguins (thrombose) dans rubrique 2. Il est particulièrement important que vous lit ce que symptômes sont d'un un caillot sanguin – voir rubrique 2 'Caillots sanguins (thrombose)'.

Avant que vous puissiez commencer avec le utilisation de Microgynon 30, va votre médecin vous quelques questions poser sur votre historique médical personnel et celui de vos proches membres de la famille. Le médecin va également votre pression artérielle mesurer et, en fonction de votre situation personnelle, peut-être également d'autres examens faire faire.

Dans cette notice sont différentes situations décrites dans lesquelles vous devez arrêter l'utilisation de Microgynon 30 ou dans lesquelles la fiabilité de Microgynon 30 réduit peut être. Dans ces situations vous devez soit ne pas avoir de rapports sexuels, soit utiliser un contraceptif sans hormones utiliser, comme par exemple un préservatif ou un autre méthode barrière. Ne pas utiliser la méthode de température ou abstinence périodique .. Ces méthodes peuvent être peu fiables car Microgynon 30 les changements mensuels de la température corporelle et la muqueuse cervicale affecte.

Tout comme d'autres contraceptifs avec hormones protège Microgynon 30 ne contre infection par le VIH-virus (sida) ou d'autres sexuellement transmissibles maladies (IST).

Quand pouvez-vous ce médicament pas utiliser?

Vous pouvez ce médicament pas utiliser si vous un des ci-dessous mentionnées affections avez. Si vous un ou plus des ci-dessous mentionnées affections avez, dites cela alors à votre médecin. Votre médecin discutera avec vous discuter quelle autre forme de contraception plus appropriée est pour vous.

Utilisez Microgynon 30 pas:

- si vous un caillot sanguin dans une vaisseau sanguin de jambes (profonde veineuse thrombose, TVP), les poumons (embolie pulmonaire, EP) ou autre organe a, ou cela dans le passé a eu eu
- si vous savez que vous avez un trouble qui affecte votre coagulation sanguine affecte – par exemple protéine C déficience, protéine S-déficience, antithrombine III-déficience, facteur V-Leiden ou anticorps contre phospholipides
- si vous devez être opéré ou si pendant une longue période vous n'êtes pas mobile (voir rubrique 'Caillots sanguins (thrombose)')
- si vous avez eu une crise cardiaque ou un AVC avez eu
- si vous avez une angine de poitrine (une affection qui intense douleur dans la poitrine provoque et un premier symptôme d' une crise cardiaque peut être) ou un accident ischémique transitoire a (AIT – transitoires symptômes d' un AVC), ou cela a eu si vous un des suivantes maladies avez , qui le, qui le risque de un caillot sanguin dans vos artères peuvent augmenter:

- o diabète (diabète sucré) avec lésion des vaisseaux sanguins
- o hypertension artérielle sévère
- o un grave élevé taux de lipides dans votre sang (cholestérol ou triglycérides)
- o une affection appelée hyperhomocystéinémie est nommée

si vous un type de migraine que 'migraine avec aura' est appelé a (ou a eu)

si vous une maladie hépatique grave ou jaunisse avez , ou dans le passé avez a eu

si vous un tumeur dans votre foie avez, ou avez eu

si vous cancer du sein ou cancer des organes génitaux a, ou dans le passé a eu

si vous saignements inhabituels de le vagin avez, dont la cause n'est pas établie

si u allergique êtes à un des composants de ce médicament. Ces composants pouvez vous trouver dans la section 6.

Utilisation Microgynon 30 ne si vous avez l'hépatite C avez et prenez médicaments avec ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, dasabuvir, glécaprévir/pibrentasvir ou sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir utilisé (voir aussi rubrique 2 'Utilisez vous encore d'autres médicaments?').

Quand devez vous faire attention être avec ceci médicament?

Quand devez vous contacter contacter avec votre médecin?

Appelez urgence médicale aide en

- si vous possibles symptômes ou symptômes de un caillot sanguin remarqué, qui peuvent signifier que vous souffrez d' un caillot sanguin dans votre jambe (c.-à-d.. veineuse profonde thrombose), un caillot sanguin dans votre poumon (c.-à-d.. embolie pulmonaire), une crise cardiaque ou un AVC (voir ci-dessous le rubrique 'Caillots sanguins (thrombose)').

Allez pour une description des symptômes ou signes de ces effets indésirables graves à 'Comment reconnaît vous un caillot sanguin?'.

Informez le votre médecin, si un des suivantes situations s'applique à vous est. Contactez

votre médecin ou arts of pharmacien avant vous ce médicament utilisez. Dans certaines situations vous devez faire preuve de prudence être si vous Microgynon 30 ou une autre pilule combinée utilisé. Le peut être nécessaire que vous régulièrement par votre médecin soit contrôlé . Si la affection apparaît , ous'aggrave , pendant que tandis que u Microgynon 30 utilisé, devez vous cela également à votre médecin informer.

Si vous fumez.

Si vous avez le diabète (diabète sucré) a.

Si vous beaucoup trop lourd êtes.

Si vous un hypertension artérielle avez.

Si vous une maladie des valvules cardiaques ou un certain arythmie a.

Si quelqu'un dans votre proche famille a déjà thrombose, une crise cardiaque ou un AVC a eu.

Si vous souffrez de migraine.

Si vous avez de l'épilepsie a (voir 'Utilisez-vous d' autres médicaments ?').Si

quelqu'un dans votre votre directe famille jamais cancer du sein a eu.

Si vous un affection du foie ou de la vésicule biliaire avez.

Si vous avez la maladie de Crohn ou colite ulcéreuse (chronique inflammatoire maladie intestinale) a

Si vous systémique lupus érythémateux disséminé (LED – une maladie qui votre système immunitaire affecte) a.

Si vous hémolytique-urémique syndrome (SHU – un trouble de la coagulation qui insuffisance rénale provoque) a.

Si vous avez drépanocytose (une maladie héréditaire des globules rouges) a.

Si vous élevés taux de lipides dans votre sang (hypertriglycémie) avez, ou cette affection existe dans votre famille se présente de est dans votre famille survenu.

Hypertriglycémie est dans relation associé avec un plus élevé risque de pancréatite (une inflammation du pancréas) à recevoir.

Si vous opéré devez être ou vous êtes pendant longue durée pas sur pied (voir 'Caillots sanguins' dans rubrique 2).

Si vous récemment accoucher êtes, avez vous un risque élevé de développer des caillots sanguins. Demandez votre médecin comment rapidement après l'accouchement vous pouvez commencer à l'utilisation de Microgynon 30.

Si vous une inflammation dans les veines juste sous la peau (thrombophlébite superficielle) a

Si vous varices avez.

Si vous avez un chloasma ou avez déjà eu un chloasma (taches pigmentaires brun-jaune taches pigmentaires appelées ' masque de grossesse', , surtout dans le visage); si ce est le cas , il est prudent de l'exposition directe exposition la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets lumière d'éviter . éviter.

Si vous symptômes d'angio-œdème présentez, comme un visage gonflé, langue etou gorge etou difficultés à avaler ou urticaire possible ensemble avec problèmes de respiration, contactez immédiatement votre médecin. Produits contenant des hormones œstrogènes ,peuvent éventuellement les symptômes de de héréditaire et acquis angio-œdème causer ou aggraver.

CLOUS DE SANG (THROMBOSE)

Si vous un combiné hormonal contraceptif comme Microgynon 30 utilisez, a vous un risque plus élevé de caillots sanguins avoir que si vous n' utilisez pas de contraceptif hormonal combiné . Dans rarement cas peut un caillot sanguin un vaisseau sanguin obstruer et graves problèmes causer.

Les caillots sanguins peuvent se former

dans les veines (cela s'appelle 'veineuse thrombose', 'veineuse thrombo-embolie' ou VTE appelé),

dans artères (ceci est 'artérielle thrombose', 'artérielle thrombo-embolie' d'ATE nommé).

On récupère pas toujours complètement de caillots sanguins. Dans rarement rencontrés cas peuvent y avoir des graves effets durables, ou dans très rarement cas peuvent caillots sanguins mortels être ..

important que vous sachiez que le risque global de risque de un nocif caillot sanguin par Microgynon 30 petit est.

COMMENT RECONNAÎTRE UN CAILLOT SANGUIN?

Contactez les urgences médicales immédiatement si vous avez un des symptômes suivants de symptômes remarqué.

Avez -vous un de ces plaintes ou symptômes? Où pouvez -vous souffrir de?
gonflement de un jambe ou le long de une veine dans Thrombose veineuse
profonde
une jambe ou pied, surtout si cela s'accompagne de
avec :

douleur ou sensibilité de la jambe, qui
vous peut-être seulement ressentez en position debout ou
en marchant
température élevée dans la
jambe touchée
changement de couleur de peau de la
jambe, par exemple pâle, rouge ou
bleu devenir

soudain inexplicquée essoufflement Embolie pulmonaire
ou rapide respiration
soudainement toux sans claire
cause, où vous sang pouvez cracher
douleur aiguë douleur dans la poitrine, qui pire peut
devenir si vous profondément respirez
grave léger sensation dans le tête ou
vertiges
rapide ou irrégulier rythme cardiaque
douleur sévère dans votre estomac.

Si vous hésitez, contactez un médecin, car
certains de ces symptômes, comme la toux ou
la dyspnée, peuvent à tort être
considérés comme une affection bénigne, comme un
infection des voies respiratoires (par ex. rhume).

Les symptômes apparaissent généralement dans un œil : Thrombose veineuse dans
le
immédiatement perte de la vision, rétine (caillot de sang dans le
ou œil)
indolore vision floue , ce qui peut se développer en
perte de la vision

douleur, inconfort, pression ou lourd sensation sur le Crise cardiaque
poitrine
serré ou plein sensation dans la poitrine, bras ou dessous
le sternum
plein sensation, indigestion ou à souffle haletant
inconfort dans le haut du corps qui irradie vers
le dos, mâchoire, gorge, bras et estomac
transpirer, nausée, vomissements ou
vertiges

extrême faiblesse, anxiété ou essoufflement
rapide ou irrégulier rythme cardiaque

faiblesse soudaine ou engourdi anesthésié sensation de
cérébral
visage, bras ou jambe, surtout d'un seul côté
du corps
soudaine confusion, difficulté à parler
ou comprendre
soudaine difficulté avec voir dans un ou les deux yeux
soudaine difficulté à marcher, vertiges,
perte d' équilibre ou coordination
soudaine, grave ou prolongée céphalée
sans cause connue
diminution de la conscience ou évanouissement avec ou
sans crise épileptique.

Accident vasculaire

Les symptômes de un AVC peuvent parfois seulement brièvement durer et presque immédiatement et complètement récupérer. Pourtant vous devez alors quand même urgence médicale aide demander, parce que vous un risque pouvez courir de encore un AVC avoir ..

et légère coloration bleue cyanose de un bras ou jambe
grave douleur dans votre ventre (abdomen aigu ventre)

Caillots sanguins qui autre vaisseaux sanguins bouchent

CAILLOTS SANGUINS DANS UNE VEINE

Que peut er se produire si er un caillot sanguin est formé dans une veine?

L' utilisation de contraceptifs hormonaux combinés est en rapport apporté avec un risque accru de caillots sanguins dans une veine (thromboseveineuse).Ces effets secondaires sont cependant rares rarement pour. Généralement surviennent ils se produisent dans la première année que un combiné hormonal contraceptif est utilisé. Si un caillot de sang se forme dans un un veine dans une jambe ou pied, peut provoquer une thrombose veineuse profonde (TVP) causer.

Si un caillot sanguin depuis la jambe est emporté et dans le poumon se retrouve, peut cela une embolie pulmonaire provoquer.

Il arrive très rarement que un caillot sanguin caillot sanguin est formé dans une veine dans un autre organe, comme l' œil (thrombose veineuse dans la rétine).

Quand est-il risque de un caillot sanguin dans une veine le plus élevé?

Le risque de un caillot sanguin dans une veine est le le plus élevé dans le première année que une femme pour la première fois un contraceptif hormonal combinéutilise . Le risque peut également sont si vous après un interruption de 4 semaines ou plus recommencez à utiliser un contraceptif hormonal combiné (contraceptif (le même produit, ou un autre produit que précédemment).

Après la première année le risque diminue , maisil reste légèrement plus élevé que si vous n'utilisez combiné hormonal contraceptif utilisez.

Si vous arrêtez avec Microgynon 30, votre risque de un caillot sanguin dans quelques semaines encore normal.

Comment élevé est le risque de un caillot sanguin?

Le risque dépend de votre naturel risque sur la TEV, et du type combiné hormonal contraceptif que vous utilisez.

Le risque global d' un caillot sanguin dans une jambe ou un poumon (veineuse thrombose ou embolie pulmonaire) avec Microgynon 30 est faible.

- Sur chaque 10.000 femmes qui n'utilisent aucun contraceptif hormonal combiné utilisent en pas enceinte être, avoir il environ 2 sur une période de un an un caillot sanguin.
- Sur chaque 10.000 femmes qui un combiné hormonal contraceptif utilisent qui levonorgestrel contient comme Microgynon 30, reçoivent environ environ 5-7 dans une période de un an un caillot sanguin.
- Le risque de un caillot sanguin avoir est dépendant de votre historique médical personnel antécédents (voir rubriques 'Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans une veine2Fartère augmentent' ci-dessous)

Risque de un an un
caillot sanguin à obtenir

Femmes qui ne combiné hormone
pilule utilisent et ne enceintes sont

Environ 2 sur chaque
10.000 femmes

Femmes qui un pilule combinée utilisent qui
lévonorgestrel contient

Environ 5-7 sur chaque
10.000 femmes

Femmes qui Microgynon 30 utilisent

Environ 5-7 sur chaque
10.000 femmes

Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans une veine augmentent

Le risque de un caillot sanguin avec Microgynon 30 est faible, mais il y a certaines circonstances qui augmentent le risque. Votre risque est plus élevé:

si vous grave surpoids a (IMC [indice de masse corporelle] supérieur à 30 kg/m²)

si un de vos proches membres de la famille un jeune âge (par exemple avant le 50^e année) un caillot sanguin a eu dans une jambe, poumon ou autre organe. Dans ce cas pouvez vous un héréditaire trouble de la coagulation avoir.

si vous une opération devez subir, ou si vous longtemps temps n'êtes pas sur pied en raison d'une blessure ou de maladie, ou si votre jambe dans le plâtre est. Il peut être nécessaire de avant une chirurgie, ou lorsque vous êtes moins mobile , quelques semaines à arrêter avec le usage de Microgynon 30. Si vous devez arrêter avec Microgynon 30, demandez alors votre médecin quand vous de nouveau pouvez commencer à l' utilisation.

si vous vieillissez (en particulier environ au-dessus de 35 ans)si vous avez dernières semaines semaines accoucher êtes.

Le risque de un caillot sanguin augmente à mesure que il plus de ces circonstances s'appliquent à vous être ..

avion avion (plus de 4 heures) peut votre risque de un caillot sanguin temporairement augmenter, surtout si il y a quelques autres de mentionnées circonstances sur vous de applicables sont.

Il est important que vous le votre médecin dites si un ou plusieurs de ces circonstances sur vous de applicables sont, même si vous en doutez. Votre médecin peut décider que vous devez arrêter le utilisation de Microgynon 30.

Si un des ci-dessus mentionnées circonstances change pendant que vous Microgynon 30 utilisez, par exemple si un à côté membre de la famille un caillot de sang (thrombose) reçoit sans cause connue, ou si vous beaucoup en poids prenez, dites raconter ceci puis à votre médecin.

CLOT DE SANG DANS UNE ARTÈRE

Que peut il se passer si il un caillot de sang se forme dans une artère?

Net comme un caillot sanguin dans une veine, peut un caillot sanguin dans une artère provoquer des problèmes graves. Il peut un crise cardiaque ou un AVC provoquer.

Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans une artère augmenter

Il est important que vous savez que le risque de une crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral par l' utilisation de Microgynon 30 très faible est, mais plus grand peut être:

- avec l'âge croissant (au-dessus d'environ 35) si
- vous fumez. Si vous un contraceptif hormonal combiné contraceptif comme Microgynon 30 utilisé, il est recommandé que vous arrêtiez de fumer. Si vous ne pouvez pas arrêter de fumer et avez plus de 35 ans, peut votre médecin vous conseiller de un autre type contraceptif à utiliser
- si vous surpoids avez
- si vous haute pression artérielle a
- si un membre de votre proche famille à un jeune âge (avant 50^e année) une crise cardiaque de AVC a eu. Dans ce cas pouvez vous également un risque accru avoir d' une crise cardiaque ou AVC avoir recevoir
- si vous, ou un membre de votre proche famille, un taux élevé de lipides dans le sang avez (cholestérol ou triglycérides)
- si vous à migraine souffre, surtout migraine avec aura
- si vous une maladie cardiaque avez (valvulopathie, ou une arythmie appelée fibrillation auriculaire est appelée)
- si vous diabète (diabète) avez.

Si plus de un de ces conditions s'applique à vous est, ou si un de de ces affections particulièrement grave est, peut le risque de contracter un un caillot sanguin même encore davantage augmenté être.

Si un des ci-dessus mentionnées circonstances change pendant vous Microgynon 30 utilisez, par exemple si vous commencez à fumer ou si un à côté de membre de la famille un caillot de sang (thrombose) attrape sans cause connue, ou si vous beaucoup en poids prenez, dit cela à votre médecin. Microgynon

30 30 cancer Chez

les femmes qui utilisent la pilule on observe un peu plus souvent un cancer du sein diagnostiqué cancer du sein constaté que chez les non-utilisatrices de pilule de même âge. Dix ans après l'arrêt de la pilule il n'y a aucune différence supplémentaire. Il n'est pas connu de ceci différence est causée par la pilule. Le peut aussi venir parce que utilisatrices de pilule plus minutieusement et plus souvent sont examinées, de sorte que de cancer du sein plus tôt est détecté. Comment plus tôt le cancer est détecté, plus meilleurs les résultats du traitement.

Dans rares cas sont chez utilisatrices de pilule bénignes tumeurs hépatiques trouvées et dans encore plus rares cas malignes tumeurs hépatiques. Parfois ont ces tumeurs conduit à un potentiellement mortelle interne hémorragie. Si vous soudainement ressentez des douleurs intenses abdominales, alors vous devez immédiatement contacter un professionnel de la santé votre médecin.

Chez les femmes qui prennent la pilule pendant une période prolongée, ont utilisé il a été un peu plus souvent cancer du col de l'utérus diagnostiqué. Cela ne doit cependant pas par le pilule à venir mais peut à faire avoir avec comportement sexuel et d'autres facteurs. Il est encore pas clair comment grand le influence de cela est sur le obtenir de cancer du col de l'utérus. C'est bien clair que la principale cause de cancer du col de l'utérus une infection prolongée avec le soi-disant humain papillomavirus (HPV) est.

Troubles psychiques

Certaines femmes qui hormonaux contraceptifs y compris Microgynon 30 utilisent, ont signalé fait de dépression ou mélancolie. La dépression peut être grave et peut parfois conduire à des pensées suicidaires. Si vous avez des sautes d'humeur et des symptômes de dépression de dépression ressent, contactez alors aussi rapidement que possible votre médecin pour des conseils médicaux ..

intermenstruel Avec toutes les

pilules peut dans les premières semaines de mois parfois inattendu saignement survenir (spotting ou hémorragie de rupture). Vous pouvez alors peut-être pas sans serviette hygiénique. Continuez dans tous les cas normalement votre comprimés prendre. Le irrégulière saignement cesse généralement lorsque votre corps s'est habitué à la pilule en question concernant pilule (après environ 3 plaquettes). Si cela plus longtemps dure, s'aggrave ou recommence, vous devez contactervotre médecin. u contact admettre avec votre médecin.

Que vous devez faire si vous n'avez pas de saignement pendant les jours sans comprimé Si vous avez pris tous les comprimés correctement pris, aucun problèmen'avez pas de souci a eu de vomissements et aussi aucun autres médicaments a utilisé, il est hautement improbable que vous enceinte êtes. Vous pouvez alors tranquille avec le suivant bande continuer.

Si le saignement attendu cependant deux fois de suite consécutivement ne se produit pas pouvez vous être enceinte. Contactez. Prenez immédiatement contactez votre médecin. Ne

pas continuez avec la prochaine plaquette Microgynon 30 avant que votre médecin ait déterminé que vous n'êtes pas enceinte êtes.

Utilisation chez enfants

Microgynon 30 est pas destiné pour femmes qui pas encore menstruent.

Utilisation chez femmes âgées

Microgynon 30 doit pas utilisé être après la ménopause.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez vous en plus de Microgynon 30 encore d'autres médicaments, ou avez vous cela récemment fait ou existe la possibilité que vous dans un avenir proche d'autres médicaments médicaments va utiliser? Dites le alors votre médecin ou pharmacien. Ils peuvent vous dire si c'est nécessaire de prendre des mesures contraceptives supplémentaires prendre (par exemple préservatifs) et, si que le cas est, combien de temps vous cela devez faire.

Certains médicaments peuvent un effet avoir sur le niveaux sanguins de Microgynon 30 et peuvent la protection contre la grossesse réduire, ou peuvent provoquer des saignements inattendus. Il s'agit ici pour :

médicaments pour le traitement de

- o l'épilepsie (par exemple primidone, phénytoïne, barbituriques, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate ou felbamate)
- o tuberculose (par exemple rifampicine)
- o infections avec le VIH- et virus de l'hépatite C (dits inhibiteurs de protéase et non-nucléosidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse comme ritonavir, névirapine, éfavirenz).
- o infections fongiques (griséofulvine)
- o arthrite, arthrose (étoricoxib)
- o élevée pression artérielle dans les vaisseaux sanguins pulmonaires (bosentan).

le remède à base de plantes millepertuis.

Microgynon 30 peut de fonctionnement de autres médicaments influencer, par exemple médicaments contenant de la cyclosporine contenir l'anti-épileptique lamotrigine (cela peut conduire à une augmentation nombre crises) théophylline (est utilisé pour le traitement des problèmes respiratoires) tizanidine (est utilisé pour le traitement de douleurs musculaires etou crampes musculaires).

Utilisez Microgynon 30 pas si vous avez l'hépatite C avez et pour cela médicaments avec ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir de sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir utilisé, parce que ces médicaments une augmentation de l'enzyme hépatique ALAT-hépatique (un test sanguin de la fonction hépatique) peuvent provoquer.

Votre médecin vous un autre contraceptif prescrire avant que vous commenciez le traitement avec ce médicament médicaments. Microgynon 30 peut environ 2 semaines après fin de ce traitement être repris. Voir rubrique 2 'Quand pouvez-vous ce médicament pas utiliser?'.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte , ou pensez que vous pourriez être enceinte , vous ne devez pas utiliser Microgynon 30.

L' utilisation de Microgynon 30 n'est généralement pas recommandée tant que une femme allaite son enfant. Si vous voulez utiliser pendant que vous encore allaitez ,pouvez vous le mieux contacter votre médecin. Aptitude à conduire

un véhicule en le utilisation de machines

Il n'y a aucune indication que la capacité à conduire est affectée.

Microgynon 30 contient saccharose et lactose

Si votre médecin vous a dit que vous ne tolérez pas certains sucres , contactez votre médecin avant de prendre ce médicament ..

3. Comment utilisez -vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme votre médecin vous l' a indiqué. Avez-vous des doutes sur le correcte utilisation? Contactez votre médecin ou pharmacien.

Quand et comment prenez vous les comprimés ?

La plaquette contient 21 comprimés. En cas de chaque comprimé indique sur quel jour il doit être pris. Prenez les comprimés chaque jour environ à la même heure , si nécessaire avec un peu d'eau. Suivez la direction de la flèche indiquée sur la plaquette jusqu'à ce que vous ayez pris les 21 comprimés . Ensuite. ne prenez pas de comprimé pendant 7 jours . Au cours de cette 7 jours devrait un saignement à commencer (le soi-disant saignement de privation). Cela commence généralement le 2^e ou 3^e jour après de dernière tablette Microgynon 30. Commencez le 8^e jour avec la suivante plaquette, indépendamment si le saignement est déjà terminé ou non. Cela signifie que vous toujours le même jour de la semaine avec un suivant plaquette commencez, et aussi que le saignement de privation chaque mois environ le même jours tombe.

Si vous Microgynon 30 de cette façon utilisez , vous êtes également pendant les 7 jours que vous ne prenez pas de comprimé protégé contre grossesse.

Quand à commencer avec la première plaquette?

Vous n'avez pas utilisé de pilule contraceptive le

Commencez avec Microgynon 30 le premier jour de la cycle (le premier jour de votre menstruation). Prenez un comprimé à la correspondante indication du jour sur la plaquette. Vous pouvez également le jour 2-5 du cycle commencer mais alors vous devez dans les premiers 7 jours bien un moyen contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Changement de un autre pilule combinée, anneau vaginal contraceptif ou patch contraceptif Vous pouvez commencer Microgynon 30 le jour après que vous ayez u de dernier comprimé de votre précédent pilule a pris (donc sans pause). S'il y a avec votre précédent pilule aussi comprimés non-actifs dans la plaquette s'asseoir, doit vous

immédiatement continuer après le dernier comprimé actif de votre précédente pilule (si vous ne savez pas laquelle que est, demandez alors à votre médecin ou pharmacien). Vous pouvez également commencer plus tard, mais jamais plus tard que le jour après la fin de la période sans comprimé de de votre précédente pilule (ou après le dernier comprimé inactif de votre précédente pilule). Si vous un anneau contraceptif ou un patch contraceptif utilisé, doit vous de préférence commencer avec l' utilisation de Microgynon 30 le jour de retrait du dernier anneau ou patch de de un emballage de cycle, mais pas plus tard que le jour où vous un nouveau anneau devriez insérer ou un nouveau patch devriez insérer doivent patches.

Transition de une minipilule

Vous pouvez de la une à la autre jour passer à Microgynon 30, mais vous devez le premier 7 jours oui un extra contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Passage de la piqure contraceptive ou un implant

Commencez par Microgynon 30 quand vous autrement la prochaine injection devriez recevoir ou le jour où il implant est retiré. Vous devez le premier 7 jours cependant bien un extra contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Après un accouchement

Si vous venez de accoucher êtes, va votre médecin vous probablement recommander de attendre jusqu'à votre première spontanée menstruation, mais parfois il est possible plus tôt de commencer. Suivez le conseil de votre médecin. Cela s'applique également pour le cas où vous allaitez et la pilule voulez veuillez utiliser.

Après une fausse couche ou avortement

Suivez le conseil de votre médecin.

Avez -vous trop de ce médicament utilisé utilisé?

Il existe aucun signalement de graves effets indésirables de la prise de beaucoup Microgynon 30 comprimés en même temps.

Si vous plusieurs comprimés en même temps avez pris, pouvez vous ressentir avoir de nausées, vomissements ou pertes vaginales de sang. Même les filles qui pas encore ne pas menstruer pouvoir vaginal saignement obtenir si elles par accident ce médicament ont pris.

Avez-vous oublié ce médicament à utiliser?

Si vous avez moins de 12 heures de retard avec la prise de un comprimé, l' efficacité de la pilule n'est pas réduite. Prenez ce comprimé quand même dès que vous à pense et prenez le prochain comprimés de nouveau à l' habituelle heure .

Si vous plus de 12 heures trop tard êtes pour le prendre de un comprimé, peut l' efficacité de la pilule réduite être. Plus de comprimés vous avez consécutivement oublié , plus le grand devient le chance que le fonctionnement de la pilule réduit est. La chance de protection insuffisante contre la grossesse est le plus grand si comprimés sont oubliés à le début ou à le fin de la plaquette. C'est pourquoi s'appliquent les règles suivantes (voire aussi le schéma) : Plus d'un comprimé

oublié dans cette plaquette Contactez

Prenez contact avec votre médecin.

1 comprimé oublié dans la semaine 1

Prenez le oublié comprimé dès que vous y pensez, même si cela devait signifier que vous deux comprimés sur le même moment doit prendre. Prenez ensuite les comprimés de nouveau à l' habituelle heure , mais vous devez également

pendant 7 jours extra contraceptifs utiliser. Si vous dans la semaine avant le oublié comprimé sexe avez eu pouvez vous être enceinte . Prenez dans ce cas donc immédiatement contactez votre médecin.

1 comprimé oublié en semaine 2

Prenez le comprimé oublié dès que vous y pensez ,même si cela devait signifier que cela vous deux comprimés à le même moment devez prendre. Prenez ensuite les comprimés de nouveau à l' heure habituelle en. L' efficacité de la pilule est non diminué, vous n'avez pas besoin de contraceptifs supplémentaires à utiliser.

1 comprimé oublié pendant la semaine 3

Vous pouvez choisir parmi deux options:

1. Prenez le comprimé oublié dès que vous y pensez, même si cela devait signifier que vous preniez deux comprimés au même moment devez prendre. Prenez ensuite le comprimés de nouveau à l' habituelle heure . Omettez en outre la période sans comprimé période et continuez immédiatement avec le suivant suivant strip.

Très probablement recevrez vous seulement à la fin de la deuxième bande un véritable saignement de privation, mais vous pouvez pendant la deuxième bande bien dernier obtenir de spotting ou un saignement de rupture.

2. Vous pouvez aussi arrêter avec la concernée plaquette et après une période sans comprimé de 7 jours (tel tel toujours le jour avec où vous avez oublié le comprimé)continuer avec la suivante plaquette. Si vous commencez le votre jour fixe de début avec un nouveau strip voulez commencer, vous pouvez un sans comprimé période de moins de 7 jours maintenir.

Si vous dans un strip comprimés avez oublié et vous reçoit aucun saignement dans la prochaine normale période sans comprimé période peut cela signifier que vous enceinte êtes. Vous devez contacter prendre avec votre médecin avant vous continuez avec la suivante plaquette.

Ce que vous devez faire en cas de vomissements ou diarrhée sévère

Si vous dans 3-4 heures après la prise d' un comprimé vous devez vomir, ou une diarrhée sévère produit , il y a une chance que l'ingrédient actif substances pas complètement dans le corps sont absorbées. Cette situation est comparable à l' oubli d'un comprimé. Après vomissements ou de diarrhée doit vous rapidement possible un nouveau comprimé de un bande de réserve prendre. Si possible dans 12 heures après le moment où vous normalement votre pilule prenez. Si ce n'est possible est, ou si les 12 heures déjà passées sont, doit vous le conseil suivre comme ci-dessus indiqué dans 'Avez-vous oublié ce médicament à utiliser? '.

Reporter des menstruations: ce que vous devez savoir

U pouvez votre menstruation retarder en sans période sans comprimé continuer à prendre une nouvelle plaquette Microgynon 30. Vous pouvez avec avec ce strip continuer jusqu'à ce que tous comprimés soient consommés ou si désiré arrêter plus tôt. Vous pouvez pendant l' utilisation de ce deuxième strip bien dernier avoir de saignement de rupture ou spotting. Après la habituelle période sans comprimé période de 7 jours commencez vous alors de nouveau avec la suivante plaquette.

Le jour de début de votre menstruation changer: ce que vous devez savoir

Si vous vos comprimés selon les instructions prenez, alors votre menstruation toujours à environ environ le même jour commencer. Si vous ce jour voulez changer, alors pouvez vous le faire en réduisant la normale période sans comprimé entre deux plaquettes deux plaquettes à raccourcir (mais jamais par à prolonger). Par exemple si votre menstruation normalement le vendredi commence et vous voulez que à l'avenir décaler vers mardi (3 jours plus tôt) que vous devez maintenant 3 jours plus tôt que d'habitude avec la nouvelle plaquette commencer. Si vous trouvez la période sans comprimé très courte court fait (par exemple 3 jours ou moins) peut il arriver que vous pendant cette période sans comprimé n'avez pas de saignement . Vous. V pouvez alors pendant le suivant plaquette gêne avoir de saignement de rupture ou spotting.

Si vous arrêtez avec l' utilisation de ce médicament

Vous pouvez avec Microgynon 30 arrêter quand vous le souhaitez. Si vous ne tomber enceinte voulez devenir, demandez alors votre médecin pour conseil concernant d'autres méthodes fiables fiable méthodes de contraception.

Si vous arrêtez parce que vous voulez devenir enceinte, il est généralement recommandé de attendre jusqu'à ce que jusqu'à u un naturelle menstruation a eu avant u essayez à attendre de tomber. U pouvez alors plus facilement calculer quand le accouchement va avoir lieu.

Avez -vous d'autres questions sur l' utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien ..

4. Effets indésirables

Comme chaque médicament peut ce médicament avoir des effets indésirables, bien que tout le monde ne les ressentent pas .. -vous vous un effet secondaire, surtout si celui-ci grave de nature est et longtemps persiste, ou se produit il un changement dans votre état de santé dont vous pensez que cela peut être causé par être par Microgynon 30? Contactez alors votre médecin.

Toutes les femmes qui utilisent hormonaux contraceptifs utiliser, avoir un risque plus élevé de caillots sanguins dans les veines (thrombo-embolie veineuse [VTE]) ou caillots sanguins dans les artères (thrombo-embolie artérielle [ATE]). Voir pour plus d'informations sur les différents risques de l' utilisation des contraceptifs hormonaux combinés rubrique 2 'Quand devez -vous être prudent sont avec ce médicament?'.
Tous les hommes qui utilisent hormonaux contraceptifs utiliser, avoir un risque plus élevé de caillots sanguins dans les artères (thrombo-embolie artérielle [ATE]). Voir pour plus d'informations sur les différents risques de l' utilisation des contraceptifs hormonaux combinés rubrique 2 'Quand devez -vous être prudent sont avec ce médicament?'.
Tous les hommes qui utilisent hormonaux contraceptifs utiliser, avoir un risque plus élevé de caillots sanguins dans les artères (thrombo-embolie artérielle [ATE]). Voir pour plus d'informations sur les différents risques de l' utilisation des contraceptifs hormonaux combinés rubrique 2 'Quand devez -vous être prudent sont avec ce médicament?'.

Effets indésirables

graves Effets indésirables qui avec l' utilisation de la pilule en relation ont été rapportés dans 'Caillots sanguins (thrombose)' et 'Microgynon 30 et cancer'. Lisez ces paragraphes pour plus d'informations et consultez immédiatement votre médecin si nécessaire.

Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes d'angio-œdème comme un gonflement du visage , de la langue et ou de la gorge/de la gorge enof problèmes avec avaler ou urticaire possible ensemble avec problèmes avec respirer (voir aussi rubrique 2: 'Quand doit u extra prudent être avec ce médicament?').

Autres possibles effets secondaires

Les suivants effets secondaires sont mentionnés par les utilisatrices de pilules. Ces effets secondaires peuvent surtout dans le premier quelques mois de l'utilisation de la pilule survenir. Souvent disparaissent ils après quelque temps d'eux-mêmes .

Souvent effets secondaires fréquents (surviennent chez 11 sur 100 utilisatrices):humeur dépressive,

- changement d'humeur maux de tête nausées
- ,
- douleurs abdominalesdouleur dans les
- seins , seins, sensibles seins
- prise de poids.

Parfois fréquents effets secondaires (surviennent chez 11 sur 1.000 utilisatrices utilisatricesdiminution

- libido (désir de sexe)
- migraine
- vomissements, diarrhée
- éruption cutanée, éruption cutanée avec forte démangeaisons et formation de boutons
- augmentation devenir des seins
- rétention de humidité.

Rarement survenant effets secondaires (se produisent chez 11 sur 10.000 utilisatrices utilisatriceshypersensibilité

- augmentation
- libido (envie de sexe)irritation
- irritation de yeux en cas de utilisation de lentilles de contact
- forme de éruption cutanée avec douloureux nodules bleu-rouge ,forme de éruption cutanée où il y a aussi langage peut être de nodules, vésicules ou rétention d'eau
- vaginale sécrétion, écoulement du mamelon perte de poids
- caillots sanguins
- nocifs dans dans un veine ou artère, par exemple:
 - o dans un jambe ou pied (c.-à-d.. thrombose veineuse profonde)
 - o dans un long (c.-à-d.. embolie pulmonaire)
 - o crise cardiaque
 - o AVC
 - o 'mini-AVC' ou temporaire symptômes comme dans un AVC, connu comme AIT (ischémique transitoire attaque)
 - o caillots sanguins dans le foie, estomacintestins, reins ou yeux.

La probabilité de un caillot sanguin d' avoir est plus grand que il autres conditions sur vous de applicables sont qui ce risque augmente (voir rubrique 2 pour plus d'informations sur le conditions qui risque de caillots sanguins augmentent et les symptômes d'un un caillot sanguin).

Les suivants graves effets secondaires sont un peu plus fréquents signalé chez les femmes qui prenaient une pilule contraceptive utilisaient, mais il n'est pas connu si cela est causé par le traitement (voir rubrique 2 : 'Quand devez -vous faire attention avec ce médicament ?').hypertension

- tumeurs hépatiques ou
- cancer du sein Les conditions

suivantes sont également à prendre en pansement apporté avec pilules combinées:

La maladie de Crohn, colite ulcéreuse, porphyrie (maladie métabolique qui douleurs abdominales et troubles mentaux provoque), systémique lupus érythémateux (où le corps attaque les propres organes et tissus et endommagement), herpès à la fin de la grossesse, chorée de Sydenham (rapides involontaires saccadés ou saccadés mouvements), hémolytique urémique syndrome (une affection qui survient après diarrhée qui provoque est par E.coli), problèmes hépatiques qui visible deviennent par jaunisse.

Le signaler des effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires, contactez votre médecin ou pharmacien. Dit s'applique également pour les effets secondaires qui ne figurent pas dans cette notice. Vous pouvez signaler les effets secondaires directement via le néerlandais Effets secondaires Centre Lareb, site web www.lareb.nl. En effets secondaires à signaler, pouvez vous nous aider plus d'informations à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conservez -vous ce médicament?

Conserver en dessous de 30°C.

Hors de la vue et portée des enfants garder.

Utilisez ce médicament ne plus après la date limite de péremption. Elle est à trouver sur l' emballage et la plaquette après 'EXP'. Là figure un mois et un an. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l' évier ou les toilettes et jetez les pas dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Ils sont ensuite un responsable manière détruit et n'entrent pas dans l'environnement finalement.

6. Contenu de l' emballage et autres informations

Quelles substances sont présentes ce médicament?

Le principes actifs dans ce médicament sont levonorgestrel et éthinylestradiol . Chaque comprimé Microgynon 30 30 0,030 milligramme éthinylestradiol et et 0,150 milligramme de lévonorgestrel.

Les autres substances dans ce médicament sont lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone 25 (E1201), stéarate de magnésium (E470B), saccharose, povidone 700.000, polyéthylène glycol 6.000, carbonate de calcium (E170), talc (E553b), cire de montanglycol (E192), dioxyde de titane (E171), glycérol 85% (E442) et pigment d'oxyde de fer (jaune, E172).

Comment apparaît Microgynon 30 et combien contient-il un emballage?

Comprimés Microgynon-30 sont enrobés comprimés; le noyau du comprimé est enrobé avec un revêtement. Les comprimés sont jaunes.

Un emballage Microgynon 30 contient 3 plaquettes, chacune avec 21 comprimés.

Titulaire de l' autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire

de l' autorisation de mise sur le dans le commerce apporter

Bayer B.V.

Siriusdreef 36

2132 WT Hoofddorp

Fabricant

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlin, Allemagne

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Doebereinerstrasse 20

99427 Weimar, Allemagne

Pour informations:

Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

Dans le registre inscrit sous RVG 08204

Cette notice est pour la dernière approuvée en juillet 2025.