

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui apie vartotoją

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg dengtos tabletės

levonorgestrelis / etinilestradiolis

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą eina naudoti, nes yra yra svarbi informacija joje jums .

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt turite jį vėliau vėl reikės.

Ar u dar klausimai? Tada susisiekitė su jūsu gydytoju arba vaistininku.

Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms , nes jis skirtastik jums paskirtas u paskirtas.

Gali būti kenksmingas kitiems žmonėms ,net jei jie turi tuos pačius simptomus kaip jūs.

Je

jums pasireiškia vienas iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Ar jums pasireiškė u šalutinis poveikis kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekitė susavo gydytoju arba vaistininku ..

Svarbūs dalykai kuriuos turite žinoti apie kombinuotus hormoninius kontraceptikus kontraceptikai:

priemonės yra viena iš patikimiausių grįžtamųjų kontracepcijos metodų kontracepcijos metodai, su sąlyga teisingai naudojamas

Jie suteikia vieną šiek tiek didesnę riziką susidarymui kraujo krešulio (trombozė) venose irarterijosebei venose ir arterijose, ypač į pirmaisiais metais kai jūs vartojate kombinuotą hormoninį kontraceptiką arba jei jūs po pertraukos 4 savaites nuo 4 savaitės iš ilgiau vėl pradeda su vartojimu iš vienas kombinuotas hormoninis kontraceptikas

Atkreipkite dėmesį į ir susisiekitė su jūsu gydytoju jei jūs mano kad jūs galbūt simptomus kraujo krešulio turite (žr.skyrių 2 ' Kraujo krešuliaiKraujo krešuliai trombozė)').Šioje

pakuotės lapelyje pakuotės lapelis:

1. Kas yra Microgynon 30 ir kam šis vaistas naudojamas ?Kada
2. negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo atsargiai su būti?
3. Kaip naudojate jūs šį vaistą?
4. Galimos šalutinės reakcijos
5. Kaip laikote jūs šį vaistą?
6. Turinys pakuotės pakuotė ir kita informacija

1. Kas yra Microgynon 30 ir kam šis vaistas naudojamas ?Microgynon

30 yra kontraceptinė tabletė . kontraceptinės tabletės. Microgynon 30 naudojamas apsaugoti nuo nėštumo apsaugoti nuo.

Kontraceptinės tabletės kurios turi du hormonus turinčios vadinamos 'kombinuotos tabletės' vadinamos. Du skirtingi moteriški hormonai yra levonorgestrelis (hormonas su progesterono tipo veikimu)ir etinilestradiolis etinilestradiolis hormonassu estrogeniniu veikimu).

Kontraceptinės tabletės). Kontraceptinės tabletės su dviem hormonais yra labai patikimi. Jei jie teisingai vartojami (nepamirštantkad tabletės yra pamirštos) yratikimybė pastoti nėštumo nėštumas labai mažas.

2. Kada galite šį vaistą ne vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Bendrosios pastabos

Perskaitykite prieš jūs pradėsite su vartojimu vaisto Microgynon 30 informaciją apie kraujo krešulius (trombozė) skyriuje 2. Tai yra ypač svarbu kad jūs skaito kokie simptomai yra nuo kraujo krešulio – žr. skyrių 2 'Kraujo krešuliai (trombozė)'.

Prieš jūs galite pradėti su naudojimas nuo Microgynon 30, gydytojas jums užduos keletą klausimų apie jūsų asmens ligos istoriją ir jūsų artimųjų šeimos narių ligos istoriją šalia šeimos nariai. Gydytojas taip pat jums kraujospūdį matuos ir ,priklausomai nuo jūsų asmeninės situacijos ,galbūt taip pat dar kitus tyrimus atliks daryti.

Šioje pakuotės lapelyje aprašomos skirtingos situacijos kai turite nutraukti vartojimą Microgynon 30 arba kai patikimumas gali būti sumažėjęs dėl tam tikrų iš Microgynon 30 sumažintas gali būti. Tokiose situacijose turite jūs arba neturėti lytinio akto ,arba naudoti papildomą kontraceptiką be be recepto hormonai naudoti, tokie kaip pavyzdžiui prezervatyvas arba kitas barjerinis metodas . Nenaudokite temperatūros metodo ar periodinio susilaikymo . temperatūros metodas iš periodinis susilaikymas. Šie metodai gali būti nepatikimi nes Microgynon 30 mėnesinius pokyčius kūno temperatūroje ir gimdos kaklelio gleivinėje veikia . Kaip ir.

vaistai gali turėti kontraceptikai su hormonais apsaugo Microgynon 30 ne nuo infekcijos su ŽIV-virusu (AIDS) ar kitomis lytiškai plintančiomis ligomis (LPL).

Kai galite šio vaisto negalima vartoti?

Jūs galite šio vaisto negalima vartoti jei turite vieną iš žemiau nurodytų ligų .Jei jūs vieną arba daugiau iš žemiau nurodytų ligų turite, pasakykite tai tada savo gydytojui. Jūsų gydytojas aptars su jumis aptars aptarti kuris kitas forma iš kontracepcijos tinkamesnė yra jums. Naudokite

Microgynon 30 30 ::

jūs turite kraujo krešulį kraujo krešulys vieną vienas kraujagyslė iš kojų (giliųjų venų trombozė, DVT), plaučių (plaučių embolija, PE) arba kito organo turite, arba tai praityje turėjote turi turėjote jei jūs žinote kad jūs turite sutrikimą kuris jūsų kraujo krešėjimą veikia – pavyzdžiui baltymo C trūkumas C trūkumas baltymo S- S-deficitas, antitrombinas III-deficitas, faktorius V-Leiden arba antikūnai prieš fosfolipidus
jei jums operacija reikia būti arba ilgą laiką ne judate (ant kojomis esate žr. skyrių 'Kraujo krešuliai (trombozė)')
jei jūs kada nors patyrėte širdies smūgį ar insultą turėjote jei jums yra krūtinės angina (ligabūklė turite kuri stiprus skausmas krūtinėje sukelia ir pirmasis simptomas širdies priepuolio gali būti) arba tranzitorinė išemijosataka vienas tranzitorinis išeminis priepuolis turi (TIA – praeinantis simptomai insulto turite insultas), arba tai kada nors turėjo jei

Jei jums skauda galvą nuo migrenos.

Jei jūs sergate epilepsija turi (žr. 'Ar vartojate kitus vaistus?'). Jeikažkas iš jūsų šeimos narių tiesioginis šeima kada nors krūtis vėžys turi turėjo.

Jei jūs vienas liga kepenų ar tulžies pūslės turite.

Jei jūs liga Krono ar opinis kolitas opinis (lėtinis uždegiminė žarnyno liga) turite

Jei jūs sisteminė vilkligė (SLE – liga liga kuri jūsų natūralią imuninę sistemą pažeidžia) turite.

Jei jūs hemolizinis-ureminis sindromas (HUS – viena sutrikimas kraujo krešėjimo kuris inkstų nepakankamumą sukelia) turi.

Jei turite pjautuvinė anemija (paveldima liga raudonųjų kraujo kūnelių kraujo ląstelės) turi.

Jei jūs padidėjęs riebalų kiekis kraujyje jūsų kraujyje (hipertrigliceridemija) turite, arba ši būklė pasireiškia jūsų šeimoje dažnai už of is in jūsų šeimoje pasitaikė.

Hipertrigliceridemija yra susijusi su padidėjusia rizika susirgti ūminiu pankreatitu dėl pankreatitokasos uždegimu) kasa) te gauti.

Jei jums operuotas reikia būti arba jūs esate ilgą laiką ne ant kojų (žr.' Kraujo krešuliaiKraujo krešuliaiskyriuje 2). Jei jūs

neseniai neseniai gimdyti esate, turite jūs padidėjusią riziką susirgti kraujo krešuliais .

Klauskite savo. greitai po gimdymo jūs padidėjusią riziką susirgti kraujo krešuliais galite pradėti su vartojimu nuo Microgynon 30.

Jei turite uždegimą uždegimas venose skausmą malšinantys vaistai po po oda (paviršinėtromboflebitas tromboflebitas) turi

Jei jūs venų varikozė turi.

Jei turite chloasmą turi arba jūs turi kada nors chloasmą turėjote (geltonai rudos pigmentinės dėmės, vadinamos 'nėštumo dėmės', ypač veide veide); jei tai yra atvejis , yra protinga apie tiesioginį poveikį saulės šviesai arba ultravioletinei šviesai te vengti.

Jei jūs simptomai angio-edema gaunate, tokie kaip patinęs veidas , liežuvisir /ar gerklėir /arproblemų su rijimu ar dilgėlinė galvutė galimas kartu su problemomis su kvėpavimu, nedelsdami susisieki su savo gydytoju. Produktai kurie estrogeninius hormonus turi, gali galimai simptomus pasireiškimus nuo paveldimas ir įgytas angio-edema sukelti arba pabloginti.

KRAUJO KREŠULIAI (TROMBOZĖ)

Jei jūs vartojate kombinuotą hormoninį kontraceptiką tokį kaip Microgynon 30 naudojate, turi jūs didesnę riziką susidaryti kraujo krešuliams nei jei nenaudojate kombinuotos hormoninės kontracepcijos . Retai pasitaikančiais atvejais gali pasireikštisunkios komplikacijos dažnai pasitaikantys atvejai gali kraujo krešulys kraujo indą užkimšti ir rimtų problemų sukelti.

Kraujo krešuliai gali susidaryti

venose (taivadinama yra 'veninė trombozė', 'veninė tromboembolija' arba VTE vadinama),

arterijose (taivadinama ' arterinėtrombozė ', 'arterinėtromboembolija tromboembolija' ATE vadinama).

Žmonės atsigauna ne visada visiškai nuo kraujo krešulių. Retais atvejais pasitaikančiais atvejais gali būti ilgalaikiai sunkūs poveikiai būti, arba labai retai pasitaikančiais atvejais gali kraujo krešuliai mirtini būti.

Svarbu, kad svarbu kad jūs žinotumėte kad bendras bendras rizika dėl vienas kenksmingas kraujo krešulys dėl Microgynon 30 mažas yra.

KAIP ATPAŽINTI KRAUJO KREŠULĮ?

Kreipkitės skubios medicininės pagalbos jei jūs turite vieną iš šių simptomų iš simptomai pastebėta.

Ar gaunate jūs vieną iš šių skundų ar simptomų?
patinimas iš vieno kojos ar išilgai vieno venos į
vienos kojos ar pėdos, ypač kai tai lydi vyksta
su:

Kur galite jūs kentėti? patinimas
Giliųjų venų trombozė

skausmas arba jautrumas kojoje, kuris
jūs galbūt tik jaučiate kai stovite arba einant
padidėjusi
temperatūra pažeistoje kojoje
spalvos pokytis
kojoje iš oda iš
kijos, pavyzdžiui blyški, raudona arba
mėlyna tampa

staigus nepaaiškinamas dusulys Plaučių embolija
arba greitas kvėpavimas
staiga kosulys be aiškios
priežastis, kai jūs kraują galite atsikosėti
aštrus skausmas krūtinėje, kuris gali stiprėti kai
jūs giliai įkvepiate rimtas kvėpuoja
sunkus šviesos jausmas galvoje galva arba
galvos svaigimas
greitas arba nereguliarus širdies plakimas
stiprus skausmas skrandyje jūsų skrandis.

Jei abejojate, susisiekiite su gydytoju vienas gydytojas, nes
kai kurie iš šių simptomų, tokie kaip kosulys arba
dusulys, gali klaidingai būti laikomi
kaip lengvesnė liga lengvesnis liga, kaip viena
kvėpavimo takų infekcija (pvz. peršalimas).

Simptomai dažniausiai pasireiškia vienoje akies: Venų
nedelsiant

trombozė venoje

nedelsiant praradimas iš regėjimo, tinklainė (kraujo krešulys akyje
arba akis)
neskausmingas neryškus matymas, kuris gali vystytis iki
praradimo praradimas iš regėjimo

skausmas, diskomfortas, spaudimas arba sunkus jausmas ant Širdies priepuolis
krūtinės
suspaudimas arba pilnas jausmas krūtinėje, rankoje arba apatinėje po
krūtinkaulis jausmas
nevirškinimas ar dusulys diskomfortas viršutinėje kūno dalyje kuris plinta į nugarą,
žandikaulį, gerklę, ranką ir tas skleidžia į

pirmųjų metų rizika mažėja, bet ji išlieka šiek tiek didesnė nei kažkas aukštesnis ir jei jūs nėra kombinuotas hormoninis kontraceptikas naudojate.

Jeigu jūs nustoja vartoti Microgynon 30, jūsų rizika dėl kraujo krešulio per kelias savaites vėl normalus.

Kaip didelė yra rizika dėl kraujo krešulio?

Rizika priklauso nuo jūsų natūralios rizikos natūralus rizika dėl VTE, ir tipo kombinuotas hormoninis kontraceptikas kurį jūs naudojate.

Bendras bendras rizika dėl kraujo krešulio kojoje arba plaučiuose (giliųjų venų trombozė) venų trombozė arba plaučių embolija) su Microgynon 30 yra maža.

- Iš kiekvienos 10.000 moterų kurios nėra jokio kombinuoto hormoninio kontraceptiko naudoja en ne nėščia būti, gauti ten maždaug 2 iš vienas laikotarpis iš vienas metai vienas kraujo krešulys.
- Iš kiekvienos 10.000 moterims kurios vartoja kombinuotą hormoninį kontraceptiką kuris levonorgestrelį turi kaip Microgynon 30, gauna apie 5-7 iš laikotarpio 5-7 metų amžiaus vienas laikotarpis nuo vienas metai vienas kraujo krešulys.
- Het rizika om vienas kraujo krešulys gauti yra priklauso nuo jūsų asmeninė medicininė istorija anamnezė (žr. skyriai 'Veiksniai kurie jūsų riziką dėl kraujo krešulio venose ar arterijose padidina 'žemiau)Rizika

patekti į vienas metai vienas kraujo krešulys gauti gauti

Moterys kurios nėra kombinuotas hormoninis tabletės vartoja ir ne nėščios yra

Apie 2 iš kiekvienos 10.000 moterų

Moterų kurios vartoja kombinuotą tabletę naudoja kuri levonorgestrelis turi

Apie 5-7 iš kiekvienos 10.000 moterų

Moterų kurios Microgynon 30 vartoja

Apie 5-7 iš kiekvienos 10.000 moterų

Veiksniai kurie jūsų riziką dėl kraujo krešulio į veną padidina Rizika

riziką dėl kraujo krešulio kraujo krešulys su Microgynon 30 yra mažas, bet yra tam tikros aplinkybės kurios riziką padidina .. rizika yra didesnė ::

jūs u sunkus antsvoris turi (KMI [kūno masės indeksas] didesnis nei 30 kg/m²)

jei vienas iš jūsų artimųjų šeimos narių jauname amžiuje (pavyzdžiui prieš het 50^e metai) trombas buvo turėjęs kojoje, plaučiuose ar kitame organe . Tokiu atveju galite paveldimą polinkį turėti į trombozės susidarymą . krešėjimo sutrikimas turite.

jei jūs turite operaciją turite patirti, arba jei jūs ilgą laiką ne ant kojų esate dėl traumos arba iš liga, arba jei jūsų koja yra gipse yra. Tai gali būti reikalinga prieš operaciją , arba kai jūs mažiau judrus esate, keletą sulenкта, keletas savaites nutraukti naudojimą su vartojimu vaisto Microgynon 30. Jei turite nutraukti vartojimą vaisto Microgynon 30, paklauskite tada savo gydytojo kada jūs vėl gali pradėti su vartojimu.

jei jūs senstate (ypač apie virš 35 metų) jei jūs
pastarosiomis savaitėmis praėjęs savaitės gimdyti esate.

Tai rizika dėl vieno kraujo krešulio didėja kai yra daugiau iš šių sąlygų jums taikoma yra.

Kelionė lėktuvu lėktuvas (ilgiau nei 4 valandas) gali jūsų riziką dėl kraujo krešulio laikinai padidinti, ypač jei yra dar keletas kitų iš nurodytų aplinkybių jums taikomos yra.

Svarbu, kad jūs tai jūsų gydytojui pasakytumėte jei viena ar daugiau iš šių sąlygų jums taikomos yra, net jei jūs apie tai abejojate. Jūsų gydytojas gali nuspręsti kad jūs turite nutraukti vaisto naudojimą iš Microgynon 30.

Jei viena iš aukščiau paminėtų aplinkybių pasikeičia kol jūs Microgynon 30 naudojate, pavyzdžiui jei viena šalia šeimos narys vienas kraujo krešulys (trombozė) gauna be žinomos priežasties, arba jei jūs daug svorio priaugate ,pasakykite pasakyk šis tada prie jūsų gydytojas.

KRAUJO KREŠULYS ARTERIJOJE

Kas gali atsitikti jei kai yra kraujo krešulys susidaro arterijoje į arterijoje ??

Net kaip kraujo krešulys į veną ,gali kraujo krešulys kraujo krešulys arteriją sukelti rimtų problemų . Jis galipavyzdžiui gali pavyzdžiui vienas širdies priepuolis arba vienas insultas sukelti.

Veiksniai kurie jūsų riziką dėl vienas kraujo krešulys į vienas arterija padidinti

Svarbu svarbu kad jūs žinote kad rizika širdies smūgio dėl vieno širdies priepuolio ar insulto dėl vartojimo vaisto Microgynon 30 labai maža yra, bet didesnė gali būti:

su didėjančiu amžiumi (virš maždaug 35 metų)

jei rūkote . Jeivartojate kombinuotą hormoninį kontraceptiką kontraceptikas kaip Microgynon 30 vartojamas, rekomenduojama kad jūs nustotumėte rūkyti . Jei jūs negalitenustoti rūkyti ir vyresni nei rūkyti ir vyresni bent dan 35 metų, gali jūsų gydytojas jums pasiūlyti naudoti kitą rūšį kontraceptiką naudoti jei turite antsvorio jei jūs turite

jei jūs aukštas kraujospūdis turi

jei narys jūsų jūsų artimiausios šeimos jauname amžiuje (prieš50 -uosius^{metus})širdies priepuolį širdies priepuolis iš insultas turėjo buvo. In tokiu atveju galite jūs taip pat padidėjusi rizika turėti dėl širdies priepuolis arba insultas turėti insultas turėti gauti jei jūs, arba narys jūsų artimos šeimos ,padidėjęs riebalų kiekis kraujyje (cholesterolis arba trigliceridai) jei jūs)

kaip u prie migrena kenčia, ypač migrena su aura

jei jūs turite širdies ligą turite (širdies vožtuvų liga, arba širdies aritmiją kuri prieširdžių virpėjimas vadinama vadinama)

jei jūs cukrinis diabetas (diabetas) turite.

Jeif daugiau nei viena iš šių būsenų jums taikoma yra, arba jei viena iš ši ligos ypač sunkus yra, gali rizika rizika susirgti gauti nuo vienas kraujo krešulys net dar toliau padidėjęs būti.

Jeif viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeičia kol jūs Microgynon 30 vartojate, pavyzdžiui jei jūs pradodate rūkyti arba jei kaip vienas šalia šeimos narys vienas kraujo krešulys

(trombozė) gauna be žinomos priežasties, arba jei jūs daug svorio priaugate „, pasakykite tai tada savo gydytojui. Microgynon

30 30 vėžys Pas

moteris kurios vartoja kontraceptines tabletes dažniau nustatomas šiek tiek dažniau krūtis vėžys diagnozuojamas ir prie nepilų vartotojoms iš tos pačios amžiaus. Dešimt metų po nutraukimo nutraukimo su tablete nėra nėra skirtumo daugiau. Tai yra ne žinoma iš tai skirtumas yra sukeltas dėl tabletė. Tai gali taip pat būti kadangi tablečių vartotojos nuodugniau ir dažniau yra tiriamos, kad de krūtis vėžys anksčiau yra aptinkamas. Kaip anksčiau de vėžys yra aptinkamas, kaip geriau de rezultatai gydymo gydymo.

Retais atvejais atvejai yra pas tablečių vartotojas gerybiniai kepenų navikai rasti ir j dar retesniais atvejais piktybiniai kepenų navikai. Kartais šitie navikai sukėlė vadovaujamas iki viena gyvybei pavojingas vidinis kraujavimas. Jei jūs staiga patiriate stiprų pilvo skausmą , tadaturite jūs nedelsiant susisiekti su gydytoju su jūsų gydytojas.

Pas moteris kurios tabletę ilgą laiką laiką naudojo naudojo yra šiek tiek dažniau gimdos kaklelio vėžys nustatytas. Tai nebūtinai tačiau ne per tabletė per ateiti bet gali per padaryti turėti su seksualiniu elgesiu ir kitais veiksniais. Tai yra dar ne aišku kaip didelis de poveikis to yra gavimas iš gimdos kaklelio vėžio. Tai yra gerai aišku kad de pagrindinė priežastis iš gimdos kaklelio vėžio yra ilgalaikė infekcija su vadinamasis žmogaus papilomos virusu (ŽPV) yra.

Psichikos sutrikimai

Kai kurios moterys kurios hormoninės kontraceptinės priemonės tarp jų Microgynon 30 naudoja, yra pranešę apie nuo depresija arba prislėgtumas. Depresija gali būti rimta ir gali kartais sukelti savižudybės mintis . Jei jūs nuotaikos svyravimaiir simptomai depresijos depresija depresija depresija patiria, kreipkitės kuo greičiau galima susisiekti su savo gydytoją dėl tolimesnės medicininės konsultacijos.

Tarpinis kraujavimas

Su visomis tabletėmis gali per pirmas kelias mėnesiai kartais netikėtas kraujavimas pasireikšti (tepimas arba pralaužimo kraujavimas). Jūs galite tada galbūt ne be higieninių įklotų. Tęskite bet kokiu atveju įprastai jūsų tabletės vartoti. Het nereguliarus kraujavimas dažniausiai sustoja kai kai jūsų kūnas kartą pripranta priprato yra prie atitinkamos atitinkamos tabletės (po apie 3 juosteles). Jei ilgiau tęsiasi, blogiau tampa arba vėl iš naujo prasideda, turite susisiekti su savo gydytoju. menas.

Ką turite daryti jei jūs nepatiriate kraujavimo per tablečių nevartojimo dienas Jei jūs visas tabletes teisingai vartojote , nepatyrėtojokio nepatogumo paskutinis turi turėjo iš vėmimas ir taip pat jokio kiti vaistai turi naudojamas, yra labai neįtikėtina kad jūs nėščia esate. Jūs galite tada ramiai su sekantis juostelė tęsti.

Jei tikėtinas kraujavimas tačiau du kartus iš eilės neįvyksta galite būti nėščia . Kreipkitės. Vartokite nedelsiant susisiekti su savo gydytoju. Nepradėkite toliau su sekantį pakuotę Microgynon 30 30 jūsų gydytojas nustatė kad jūs nesate nėščia ne nėščia sulenka.

Naudojimas vaikams vaikams

Microgynon 30 yra nėra skirtas moterims moterims kurios dar nėra menstruavusios.

Naudojimas vyresnėms moterims Microgynon

Microgynon 30 turi ne naudojamas būti po menopauzės menopauzės.

Ar naudojate jūs kitus kitus vaistus?

Ar naudojate jūs be Microgynon 30 dar kiti vaistai, ar turite jūs tai neseniai padarėte ar egzistuoja galimybė kad jūs artimiausiu laiku kiti vaistai ateitis kitas vaistai eina naudoti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojui arba vaistininkui. Jie gali jums pasakyti ar reikia imtis papildomų kontracepcijos priemonių imtis imtis (pavyzdžiui prezervatyvai) ir, jei tai tai atvejis yra, kiek laiko jūs tai turite daryti.

Kai kurie vaistai gali turėti poveikį turėti ant kraujo lygį iš Microgynon 30 ir gali apsaugą nuo nėštumo sumažinti, arbagali netikėtą kraujavimą sukelti. Taiyra apie šiuo atveju om:

vaistai nuo de gydymo van

- o epilepsijos (pavyzdžiui primidonas, fenitoinas, barbitūratai, karbamazepinas, okskarbazepinas, topiramatas arba felbamatas)
- o tuberkuliozė (pavyzdžiui rifampicinas)
- o infekcijos su ŽIV- ir hepatito C virusu (vadinamieji proteazės inhibitoriai ir ne-nukleozidas grybelinės infekcijos (ritonaviras, nevirapinas, efavirenzas).
- o grybelinės infekcijos (grizeofulvinas)
- o artritas, artrozė (etoricoxib)
- o aukštas kraujospūdis plaučių kraujagyslėse (bosentanas).

žolelių jonažolė jonažolė.

30 30 gali de veikimą kitų kitų vaistų paveikti, pavyzdžiui vaistai kuriuose yra ciklosporino turi anti-epilepsijos vaistas lamotriginas (tai gali sukelti iki padidėjusio padidėjęs kiekis priepuoliai) teofilinas (naudojamas gydant esant de gydymui nuo kvėpavimo problemoms) tizanidinas (naudojamas gydant esant de gydymui nuo raumenų skausmas ir arba raumenų spazmai).

Vartokite Microgynon 30 ne jei sergate hepatitu C turite ir tam vaistus su ombitasviruparitapreviruritanas, dasabuviras, glekapreviras/pibrentasviro iš sofosbuviro/velpatasviro/voksilapreviras naudojamas, nes šie vaistai gali padidinti ALAT-kepenų fermento (vienas kepenų funkcijos kraujo tyrimas) gali sukelti. Jūsų gydytojas paskirs jums kitą kontraceptiką prieš jums pradėdant gydymą su šiuo vaistu su šiuo vaistai. Microgynon 30 gali maždaug 2 savaitės po pabaigos šio šio gydymo būti atnaujintas. Žr. skyrių 2 'Kada ar galite šio vaisto negalima vartoti?'

Nėštumas ir žindymas

Jei esate nėščia, arba manote kad esate nėščia galėtumėte būti, negalite vartoti Microgynon 30 ne naudoti.

Vartojimas Microgynon 30 paprastai 30 rekomenduojamas kol moteris žindo kūdikį kol vienas moteris žindymas suteikia. Jei jūs tabletę vis dėlto norite naudoti kol jūs dar maitinate krūtimi, galite geriausia kreiptis į savo gydytoją. Vairavimo gebėjimai ir

saugumas. en het naudojimas mašinų

Yra nėra jokių nurodymų kad vairavimo gebėjimas yra paveiktas.

Microgynon 30 turi sacharozės ir laktozės

Jei jūsų gydytojas jums pasakė kad jūs tam tikrų cukrų netoleruojate , susisiekitė su savogydytoju prieš jūs šį vaistą vartojate vaistas vartojate.

3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas jums tai pasakė .. jūs dėl to teisingas naudojimas? Tada susisiekitė su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Kada ir kaip vartojate jūs tabletes ?

Juostelė turi 21 tabletę. Kiekvieną kartą tabletę nurodyta nurodyta ant kurią dieną tą reikia būti išgerta. Išgerkite tabletes kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu laiku laikas jei reikia zonodig su šiek tiek vandens. Sekite kryptį rodyklės ant juostelės nurodytą iki kol išgersite visas 21 tabletę . Po to. 7 dienas jokios tabletės. Per šį laikotarpį ši 7 dienų turėtų kraujavimas prasideda (vadinamasis nutraukimo kraujavimas). Šis paprastai prasideda 2 -ąją arba 3 -ąją dieną po e diena ne de paskutinė tabletė Microgynon 30. Pradėkite 8 -ąją dieną su kita pakuote, nepaisant ar kraujavimas jau pasibaigęs yra ar ne. Tai reiškia kad jūs visada tą pačią dieną savaitės su kita sekanti pakuotė pradėkite, ir taip pat kad nutraukimo kraujavimas kiekvieną mėnesį maždaug tą pačią dieną dienomis nukrenta.

Jei jūs Microgynon 30 tokiu būdu naudojate , esatetaip pat per 7 dienas kai jūs nevartojate tabletės apsaugota nuo apsaugotas prieš nėštumas.

Kada pradėti naudoti pirmąją juostelę? Jūs

neturėjote per pastarąjį mėnesį kontraceptinių tablečių nenaudojote Pradėkite su Microgynon

30 pirmąją dieną menstruacijų ciklo diena iš ciklo (pirmoji diena jūsų menstruacijų). Išgerkite vieną tabletę prie atitinkamos dienos žymos ant juostelės. Galite taip pat ant dienos taip ant diena 2-5 iš ciklo pradėti bet tada turite per pirmąsias septynias 7 dienas būtina naudoti papildomą kontracepcijos priemonę (pavyzdžiui prezervatyvą)naudoti ..

Perėjimas nuo kito kombinuoto kontraceptiko, makšties kontraceptinio žiedo ar kontraceptinio pleistro Jūs galite su Microgynon 30 pradėti kitą dieną po to kai paskutinė tabletė iš jūsų ankstesnės tabletės yra išgerta (taigi be pertraukos). Jei yra prie jūsų ankstesnės tabletės taip pat neveiklios tabletės pakuotėje sėdėti, turite jūs nedelsiant tęsti po paskutinės veikliosios tabletės iš jūsų ankstesnės tabletės (jei jūs nežinote kuris žinau kuris kad yra, paklauskite tada savo gydytojo arba vaistininko). Jūs galite taip pat vėliau pradėti , bet niekada vėliau ne dieną po pabaigos be tablečių periodo be nuo jūsų ankstesnė tabletė (arba po paskutinės neveiksmingos tabletės iš jūsų ankstesnės tabletės). Jei turite makšties kontraceptinį žiedą arba kontraceptinį pleistrą turite turi naudojamas, turite jūs geriausia pradėti su naudojimu Microgynon 30 dieną po pašalinimo paskutinio žiedo arba pleistro nuo kūno . vienas ciklo pakuotė, bet ne vėliau nei dieną kai jūs vienas naujas žiedas turėtumėte įdėti arba vienas naujas pleistras turėtumėte įdėti turi pleistrai.

Perėjimas nuo vienos minipiliulės

Jūs galite nuo vienos prie kitos dienos pereiti prie Microgynon 30, bet jūs turite pirmąją dieną 7 dienas taip vieną papildomą kontraceptiką (pavyzdžiui vieną prezervatyvą) naudoti.

Perėjimas nuo prikpilulė arba implanto Pradėkite nuo

Pradėkite nuo Microgynon 30 kada jūs kitaip kitą injekciją gautumėte arba dieną kai implantas yra pašalinamas . Jūs turite kitą injekciją gauti de pirmas 7 dienas tačiau taip vienas papildoma kontracepcijos priemonė (pavyzdžiui prezervatyvas)naudoti .. vieno gimdymo Jei ką tik

pagimdėte gimdyti esate, tikriausiai jūsų gydytojas jums tikriausiai patarė laukti iki jūsų pirmųjų spontaniškų menstruacijų , betkartais yra įmanoma anksčiau pradėti ar pradėti. Sekite tas patarimą nuo savo gydytojo. Tai taikoma taip pat jei tas atvejis kad jūs maitinate krūtimi suteikia ir de tablečių norite naudoti.

Po persileidimo arba aborto Laikykitės gydytojo patarimo. Ar jūs per daug

šio vaisto pavartojote ? nuo šis vaistas naudojamas?

Yra nėra jokių pranešimų apie rimtus neigiamus padarinius dėl vartojimo daug Microgynon 30 30 vienu metu ..

keltas tabletes tabletes tuo pačiu metu turite išgėrėte, galite turėti gauti nuo pykinimo, vėmimo arba makšties kraujavimo. Net mergaitės kurios dar ne menstruoti gali vaginalinis kraujavimas gauti jei jos per klaidą šį vaistą yra išgėrę.

Ar pamiršote pamiršote šį vaistą naudoti naudoti?

Jei pavėlavote mažiau nei 12 valandų per vėlai išgerti vaistą iš tabletes, veiksmingumas vaisto nėra sumažėjęs . Išgerkite tą tabletę vis tiekkuo greičiau kai tik galite apie tai galvoja ir paimkite kitą tabletes vėl į įprastą laiką j.

Jei jūs daugiau nei 12 valandų per vėlai esate su vartojimu iš viena tabletė, gali sumažinti veiksmingumą kontraceptinės tabletes sumažintas būti. Kaip daugiau tablečių jūs iš eilės pamiršote esate, tuo didesnė didesnė tampa rizika de tikimybė kad de veikimas iš tabletes sumažėjęs . Tikimybė ant nepakankamos apsaugos nuo nėštumo yra didžiausia kai tabletes praleidžiamos praleistas pradžioje juostos pradžioje arba pradžioje juostos pabaigoje juostos pabaigoje. Todėl taikomos šios taisykles (žr.taip pat schemą): Daugiau nei 1 tabletė

pamiršta šioje juostoje Susisieki su juostelė

Susisieki su jūsų gydytojas.

1 tabletė pamiršote 1 savaitę

Išgerkite pamirštą tabletę kai tik jūs apie tai pagalvojate, net jei tai reikštų kad jūs dvi tabletes tabletes ant tą patį momentą turite vartoti. Vartokite toliau tabletes vėl įprastu laiku , bet jūs turite taip pat per 7 dienas 7 dienas extra kontraceptikai naudoti. Jei per savaitę prieš pamirštą tabletę turėjote seksą turėjote galite būti nėščia . Kreipkitės tokiu atveju todėl nedelsiant todėl nedelsiant susisieki su jūsų gydytoju.

1 tabletė pamiršta 2 savaitę

Išgerkite pamirštą tabletę kai tik jūs apie tai pagalvojate, net jei tai reikštų kad tas jūs du tabletes tuo pačiu laiku turite vartoti . Vartokite toliau tabletes vėl įprastu

laiku . Veikimas tabletės yra efektyvus nuo pirmos dienos ne sumažintas, jūs neturite jokių papildomų kontraceptikų naudoti ..

pamiršta 3 savaitę Jūs

galite pasirinkti iš dviejų galimybių galimybės:

1. Išgerkite pamirštą tabletę kai tik jūs apie tai pagalvojate, net jei tai reikštų kad jūs dvi tabletes tuo pačiu laiku turite momentas turi vartoti. Vartokite toliau tabletes tabletes vėl įprastu įprastu laiku metu. Praleiskite be to tablečių be tablečių laikotarpį praleiskite ir tęskite nedelsiant toliau su kitu strip. Labiausiai tikėtina gausite tik prie pabaigos pabaigos antrojo antrojo strip tikrą tikrą nutraukimo kraujavimą, bet jūs galite per antrąją antrąją strip taip pat paskutinis gauti iš tepimo arba vienas pralaužimo kraujavimas.
2. Jūs galite taip pat nutraukti su atitinkama juostele ir po vieno tabletės neturėjimo laikotarpio 7 dienų (tel gerai visada de diena su kurią pamiršote tabletę pamiršote) toliau tęsti su kita juostele. Jei jūsų nuolatinė pradžios diena su vieną naują juostelę norite pradėti, galite vieną be tablečių laikotarpį mažiau nei 7 dienas laikyti.

Jei jūs vieną juostelę tablečių pamiršote pamiršote ir jūs gauna nėra kraujavimas į artimiausią normalų be tablečių laikotarpį gali tai reikšti kad jūs nėščia esate. Jūs turite susisiekti su savo jūsų gydytojas prieš jūs toliau einate su kita juostele.

Ką jūs turite daryti jei atvejis vėmimo arba sunkus viduriavimas Jei jūs

per viduje 3-4 valandos po vaisto vartojimo nuo tabletės tabletė reikia vėmti, arba stiprus viduriavimas atsiranda, yra tikimybė kad veiklioji medžiaga veiklioji medžiagos ne visiškai organizme kūne yra absorbuojamos. Ši situacija yra panaši į pamiršimą nuo tabletės . Po vėmimo ar viduriavimas turi jūs taip greitai galima naują tabletę iš atsarginės juostelės išgerti .. galima per 12 po to tas laikas kuriuo jūs paprastai savo tabletę išgeriate. Jei tai neįmanoma yra, arba jei 12 valandų jau praėjo , turite, turi jūs patarimo laikytis kaip aukščiau nurodyta prie 'Ar jūs pamiršote šį vaistą naudoti ? '.Menstruacijų

atidėjimas : ką jūs turite žinoti turi žinoti

Jūs galite savo menstruacijas atidėti per be tablečių laisvos periodo toliau tęsti su nauja pakuote Microgynon 30. Jūs galite su gali su šią juostelę tęsti kol visos tabletės baigsis arba jei pageidaujama anksčiau nutraukti . Jūs galite vartojimo metu naudojimo šios juostelės šios antros juostelė gerai paskutinis turėti nuo pralaužimo kraujavimas arba tepimas. Po įprastinio be tablečių laikotarpio 7 dienų pradėkite tada vėl su kita juostele.

Pradžios diena iš jūsų menstruacijos keičiasi: ką jūs turite žinoti

Jei jūs jūsų tabletes pagal nurodymus vartojate , tadabus jūsų menstruacijos visada apie maždaug apie tą pačią dieną pradėti. Jei jūs šią dieną norite pakeisti, tada galite jūs tai padaryti per įprastą be tablečių periodą tarp dviejų juostelių padaryti sutrumpinti (bet niekada per pratęsti).Pavyzdžiui jei jūsų menstruacijos paprastai penktadienį prasideda ir norite kad ateityje perkelti į tęsinys perkelti į antradienis (3 dienas anksčiau) nei turite dabar 3 dienas anksčiau nei įprasta su nauja pakuote pradėti. Jei jūsų be tablečių laikotarpis labai trumpas sukelia (pavyzdžiui 3 dienas ar mažiau) gali tai atsitikti kad jūs per šį tablečių neturintį laikotarpį ne kraujuosite . Jūs. U gali tada per kitą sekantį pakuotę diskomfortą turėti dėl pralaužimo kraujavimo ar tepimo.

Jei jūs nutraukiate vartojimą vartojimas šio šio vaisto

Jūs gali su Microgynon 30 nutraukti kada tik norite. Jei nenorite pastoti norite tapti, paklauskite tada savo gydytojo dėl patarimo dėl kitos patikimos kitų patikimų metodai iš kontracepcijos.

Jei jūs nustoate nes jūs nėsčia norite tapti, yra bendrai rekomenduojama rekomenduojama laukti kol laukti kol u vieną natūralią menstruaciją turėjote prieš pradėdami u bandyti pastoti tikėtis tapti nėsčia. Jūs galite tada lengviau apskaičiuoti kada tas gimdymas bus vyks.

Ar turite jūs kitų klausimų apie vartojimą šio vaisto ? Susisieki su savogydytoju arba vaistininku . 4..

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali šis vaistas šalutinį poveikį turėti, nors ne visi patiria tai susidurti .. jūs jūs vienas šalutinis poveikis, ypač jei šis sunkus pobūdžio yra ir ilgai tęsiasi , arba atsiranda įsigalioja vienas pokytis pokytis jūsų jūsų sveikatos būklė kurios jūs manote kad tai sukelia gali būti dėl Microgynon 30? Susisieki su savo gydytoju.

Visos moterys kurios kombinuotus hormoninius kontraceptikus naudoti, turi didesnę riziką dėl kraujo krešulių venose (veninė tromboembolija[VTE]) arba kraujo krešulių arterijose kraujo krešuliai arterinė tromboembolija (arterinė tromboembolija [ATE]). Žr. dėl daugiau informacijos apie skirtingas rizikas vartojant naudojimą nuo kombinuotus hormoninius kontraceptikus skyrių 2 'Kada turite būti papildomai atsargūs yra su šis vaistas?'

Sunkios šalutinės reakcijos

Sunkios šalutinės reakcijos kurios susijusios su vartojimu tablečių naudojimu ryšium yra susijusios aprašytos yra aprašytos 'Kraujo krešuliai (trombozė)' ir 'Microgynon 30 ir vėžys'. Skaitykite šias pastraipas daugiau informacijos ir kreipkitės nedelsiant nedelsiant savo gydytojas jei reikia.

Nedelsdami susisieki su savo gydytoju jeigu jūs simptomus angio-edemos patiriate tokius kaip patinęs veidas , liežuvisir /or gerklė/gerklės enof problemų su rijimu ar dilgeline galimai kartu su problemomis su kvėpavimu (žr. taip pat skyrių 2: 'Kada reikia u papildomai atsargūs būti su šiuo vaistu?').

Kiti galimi šalutiniai poveikiai

Šie sekantys šalutiniai poveikiai yra minimi vartotojų tablečių. Šie šalutiniai poveikiai gali ypač j pirmus kelis mėnesius iš vartojant tabletes pasireikšti. Dažnai praeina jie po kurio laiko savaime

Dažnai pasireiškiantys šalutiniai poveikiai (pasitaiko dėl nuo 1 iki 10 iš 100 vartotojų):

- depresinė nuotaika, nuotaikos pokytis
- galvos skausmas
- pykinimas, pilvo skausmas
- skausmas krūtyse ,, jautrios krūtys
- svorio padidėjimas.

Kartais pasitaikančios šalutinės reakcijos (pasitaiko pas 1 1 10 iš 1 000 vartotojų vartotojų sumažėjęs

- libido (potraukis seksui))
- migrena
- vėmimas, viduriavimas
- odos bėrimas, odos bėrimas su stiprus niežulys ir susidarymas iš gumbelių
- didesnis tapti krūtų padidėjimas
- sulaikymas iš skystis.

Retai pasitaikančios šalutinės reakcijos (pasitaiko pas 1 1 10 iš 10.000 vartotojų vartotojospadidėjęs jautrumas

- padidėjęs
- libido (norėjimas sekso)dirginimas
- dirginimas iš akys prie naudojimas iš kontaktiniai lęšiai
- forma iš odos bėrimas su skausmingas mėlynai raudoni gumbeliai, forma iš odos bėrimas kai yra taip pat kalba gali būti iš gumbelių, pūslelių arba skysčių kaupimosi
- makšties išskyros, išskyros iš spenelio svorio sumažėjimas
- kenksmingi
- kraujo krešuliai kraujo krešuliai in viena vena arba arterija, pavyzdžiui:
 - o į vieną koją arba pėdą (t.y.. giliųjų venų trombozė)
 - o į vieną ilgą (t.y.. plaučių embolija)
 - o širdies priepuolis
 - o insultas
 - o 'mini-insultas' arba laikini simptomai tokie kaip prie a insulto, žinomas kaip TIA (tranzitorinė išemija priepuolis)
 - o kraujo krešuliai kepenyse, skrandisžarnos, inkstai arba akys.

Tikimybė gauti kraujo krešulį yra didelė jei turite didesnis kaip yra kitos sąlygos jums taikomos taikoma yra kurios tai riziką padidina (žr. skyrių 2 daugiau informacijos apie apie sąlygos kurios riziką dėl kraujo krešulių padidina ir simptomus simptomai kraujo krešulio kraujo krešulys).Šie

rimti šalutiniai poveikiai yra šiek tiek dažnesni dažniau pranešta apie moteris kurios vartojo kontraceptines tabletes , tačiau nežinoma ar tai buvo sukelta dėl gydymo (žr. skyrių2: ' antraštė 2: 'Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo vaistu ?').padidėjęs

- kraujospūdis kepenų navikai
- arba krūtis vėžys Šios

būklės taip pat yra ir į į tvarstis atnešė su kombinuotomis tabletėmis:

Liga Krono liga, kolitas opinis ,porfirija (medžiagų apykaitos ligakuri pilvo skausmas ir psichikos sutrikimai sukelia),, sisteminė lupus eritematozė (kai kūnas puola savo organus ir audinius ir pažeidžia)herpesas ant pabaigos de de de nėštumas, Sydenhamo chorėja (greiti nevalingi traukuliai arba trūkčiojantys judesiai), hemolizinis ureminis sindromas (būklė kuri atsiranda po viduriavimo kuris mirti sukelia yra dėl E.coli), kepenų problemos kurie matomi tampa dėl gelta.

Pranešti apie šalutinį poveikį Jei

jums pasireiškia šalutinis poveikis , susisiekite susavo gydytoju arba vaistininku vaistininkas. Šis taikoma taip pat dėl galimų šalutinių poveikių kurie nėra šiame lapelyje nurodyti . Jūs galite šalutinius poveikius taip pat tiesiogiai pranešti per Nyderlandų Olandų Šalutinis poveikis Centras Lareb, svetainė www.lareb.nl. Per šalutinį poveikį pranešti ,galite jūs mums padėti daugiau informacijos gauti apie saugumą šio vaisto . šis vaistas.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti žemiau 30°C.

Laikyti nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje vaikams ..

Šį vaistą vaistas ne daugiau po de galiojimo data. Ji yra rasti ant pakuotės ir juostelės po 'EXP'. Ten nurodytas mėnuo ir metai ir vieneri metai. paskutinė diena to mėnesio yra galiojimo data.

Neleiskite vaistų į kriauklę ar tualetą ir išmeskite mesti juos ne į šiukšliadėžę.

Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais reikia daryti kurių ne be naudojate. Jie bus tada vieną atsakingas būdas sunaikintas ir patenka ne į aplinką patenka.

6. Turinys pakuotės pakuotės ir kita informacija

Kokios medžiagos yra joje šis vaistas?

Veikliosios medžiagos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra levonorgestrelis ir etinilestradiolis. Kiekviena tabletė Microgynon 30 turi 0,030 miligramo etinilestradiolio ir 0,150 miligramo levonorgestrelio.

De kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra laktozės monohidratas, kukurūzų krakmolas, povidonas 25 (E1201), magnio stearatas (E470B), sacharozė, povidonas 700.000, polietilenglikolis 6.000, kalcio karbonatas (E170), talkas (E553b), montanglikolio vaškas (E192), titano dioksidas (E171), glicerolis 85% (E442) ir geležies oksido pigmentas (geltona, E172).

Kaip atrodo Microgynon 30 ir kiek kiek yra sudėtyje vienas pakuotė?

Microgynon-30 tabletės yra padengtos tabletės; tabletės šerdis yra padengta su vienu sluoksniu. Tabletės yra geltonos.

Vienas pakuotė Microgynon 30 sudėtyje yra 3 juostelės, kiekvienoje po 21 tabletę.

Leidimo turėtojas leidimo dėl pateikimo į rinką ir gamintojas Leidimo

turėtojas leidimo dėl pateikimo į prekybą atnešti

Bayer B.V.

Siriusdreef 36

2132 WT Hoofddorp

Gamintojas

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlynas, Vokietija

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Doebereinerstrasse 20

99427 Weimaras, Vokietija

Dėl informacijos:
Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

Registruota įregistruota po RVG 08204

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas liepą 2025 m. Pakuotės lapelis Microgynon[®]

Transtoyou