

Folheto informativo: informação para a utilizadora

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg comprimidos revestidos comprimidos

levonorgestrel / etinilestradiol

Leia cuidadosamente todo o folheto informativo antes de você este medicamento vai usar, pois há está importante informação em para você.

Guarde este folheto. Talvez precise dele mais tarde novamente necessário.

Tem u ainda perguntas? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Não dê este medicamento a outras pessoas , pois é apenas para você prescrito você prescrito. Het pode prejudicial ser para outros, mesmo se tiverem eles os mesmos sintomas que você.

Se você sentir um dos efeitos colaterais que na seção 4 estão? Ou tem você um efeito colateral que não neste este folheto informativo está? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Importante coisas que você deve saber sobre contraceptivos hormonais combinados:

Estes medicamentos são um dos mais confiáveis métodos contraceptivos reversíveis, desde que correct usado

Elas dão um pouco maior risco de desenvolvimento de um coágulo sanguíneo (trombose) nas veias e artérias, sobretudo no primeiro ano que você um combinado hormonal contraceptivo usa ou se você após uma interrupção de 4 semanas de mais longo novamente começa com o uso de um combinado hormonal contraceptivo Preste atenção e entre em contato com seu médico se você você pensa que você possivelmente sintomas de um coágulo sanguíneo tem (veja seção 2 'Coágulos Sanguíneos (trombose)').

Neste folheto informativo:

1. O que é Microgynon 30 e para que é este medicamento usado?
2. Quando não deve este medicamento ser usado ou deve ter cuidado cautelosamente com ser?
3. Como usa você este medicamento?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazena você este medicamento?
6. Conteúdo do embalagem e outras informações

1. O que é Microgynon 30 e para que é este medicamento usado?

Microgynon 30 é um anticoncepcional. Microgynon 30 é usado para prevenir gravidez chá prevenir.

Pílulas anticoncepcionais que contêm dois hormônios contêm são 'pílulas combinadas' chamadas. Os dois diferentes femininos hormônios são levonorgestrel (um hormônio com ação semelhante à progesterona) e etinilestradiol etinilestradiol um hormônio com ação estrogênica). Pílulas anticoncepcionais). Pílulas anticoncepcionais com dois hormônios são muito confiáveis. Se elas corretamente forem tomadas (sem que comprimidos sejam esquecidos) é a probabilidade de gravidez muito pequeno.

2. Quando pode você este medicamento não usar ou deve ter cuidado especial com ser?

Observações gerais

Leia antes você começar com o uso de Microgynon 30 a informação sobre coágulos sanguíneos (trombose) na seção 2. É especialmente importante que você leia quais os sintomas são de um coágulo sanguíneo – veja seção 2 'Coágulos sanguíneos (trombose)'.

Antes de poder começar com o uso de Microgynon 30, irá seu médico lhe um número de perguntas fazer sobre sua história médica pessoal e a de seus familiares próximos. O médico irá também sua pressão arterial medir e, dependendo da sua situação pessoal, possivelmente também outros exames realizar fazer.

Em este folheto são descritas várias situações em que você deve parar de usar o uso de Microgynon 30 ou em que a confiabilidade de Microgynon 30 reduzida pode ser. Nesses casos deve você ou não ter relações sexuais ,ou um método contraceptivo adicional sem hormônios usar, como por exemplo um preservativo ou outro método de barreira . Não use o método de temperatura ou abstinência periódica . abstinência. Estas métodos podem não confiáveis ser porque Microgynon 30 o mensais mudanças do temperatura corporal e o muco cervical afeta.

Assim como outros anticoncepcionais com hormônios protege Microgynon 30 não contra infecção com o hiv-vírus (aids) ou outras sexualmente transmissíveis doenças (dsts).

Quando pode este medicamento não usar?

Você pode este medicamento não usar se você uma das abaixo mencionadas condições tem. Se você um de mais das abaixo mencionadas condições tem, informe isso então ao seu médico. Seu médico irá discutir com você discutir qual outro forma de anticoncepção mais adequada é para você.

Use Microgynon 30 não:

- se você um coágulo de sangue em um vaso sanguíneo de pernas (profunda venosa trombose, DVT), os pulmões (embolia pulmonar, PE) ou outro órgão tem, ou isso no passado teve tido
- se você sabe que você tem um distúrbio que afeta sua coagulação sanguínea – por exemplo deficiência de proteína Deficiência de C, proteína S-deficiência, antitrombina III-deficiência, fator V-Leiden ou anticorpos contra fosfolípidos
- se você precisar ser operado ou estiver por um longo período sem se mover (em pé veja seção 'Coágulos sanguíneos (trombose)')
- se você alguma vez um ataque cardíaco ou derrame teve se você angina pectoris (uma condição doença que intensa dor no peito causa e um primeiro sintoma de um ataque cardíaco pode ser) ou um ataque isquêmico transitório tem (AIT – transitórios sintomas de um acidente vascular cerebral), ou isso alguma vez teve se
- você um dos seguintes doenças tem , que o, que o risco em um coágulo de sangue nas suas artérias podem aumentar:
 - o diabetes mellitus (diabetes) com danos aos vasos sanguíneos

- o pressão arterial elevada
 - o um grave aumentado nível de gordura em seu sangue (colesterol ou triglicerídeos)
 - o uma condição que hiper-homocisteinemia é chamada
- se você um tipo de enxaqueca que 'enxaqueca com aura' é chamado tem (ou tem tido) se você uma doença hepática grave ou icterícia tem , ou no passado teve tem teve se você um tumor no seu fígado tem, ou tem teve se você câncer de mama ou câncer nos órgãos genitais tem, ou no passado tem tido se você sangramentos incomuns da vagina tem, cuja causa não foi determinada se como u alérgico está a um dos componentes neste medicamento medicamento. substâncias pode encontrar na seção 6. Uso 6.

medicamento Microgynon 30 não se você tem hepatite C tem e para isso medicamentos com ombitasvirparitaprevirritonavir, dasabuvir, glecaprevirpibrentasvir ou sofosbuvirvelpatasvirvoxilaprevir usado (veja também seção 2 'Usa você outros medicamentos ?').Quando

deve você extra cuidado ser com este isto meio?

Quando deve você contatar entrar em contato com seu médico?

Chame emergência médica ajuda em

- se você possíveis sintomas ou sintomas de um coágulo de sangue observado, que podem significar que você sofre de um coágulo de sangue na sua perna (ou seja. trombose venosa profunda trombose), um coágulo de sangue em seu pulmão (ou seja. embolia pulmonar), um ataque cardíaco ou um derrame (veja abaixo o rubrica 'Coágulos de sangue (trombose)').

Vá para uma descrição dos sintomas ou sinais destes efeitos adversos graves para 'Como reconhece você um coágulo de sangue?'

Informe o seu médico, se um dos seguintes casos se aplica a você for aplicável .

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes você este medicamento usar. Em algumas situações deve você extra cauteloso ser se você Microgynon 30 ou um outro comprimido combinado usado. O pode necessário ser que você regularmente por seu médico seja controlado. Se a condição ocorrer, ou piorar, enquanto u Microgynon 30 usado, deve u isso também ao seu médico informar.

Se você fuma.

Se você tem diabetes (diabetes) tem.

Se você muito acima do peso está.

Se você um aumento pressão arterial tem.

Se você uma condição das válvulas cardíacas ou um determinada arritmia cardíaca tem.

Se alguém na sua direta família alguma vez trombose, um ataque cardíaco ou um derrame teve teve.

Se você sofre de enxaqueca.

Se você tem epilepsia tem (veja 'Usa você outros medicamentos ?').Se

alguém em seu seu direta família alguma vez câncer de mama tem tido.

Se você uma doença do fígado ou da vesícula biliar tem.

Se você tem a doença de Crohn ou colite ulcerativa (crônica inflamatória doença intestinal) tem

Se você sistêmica lúpus eritematoso sistêmico (LES – uma doença que seu sistema imunológico afeta) tem.

Se você hemolítico-urêmico síndrome (HUS – um distúrbio da coagulação sanguínea que insuficiência renal causa) tem.

Se você tem anemia falciforme (uma doença hereditária das hemácias glóbulos vermelhos) tem.

Se você aumentados níveis de gordura no seu sangue (hipertrigliceridemia) tem, ou esta condição ocorre na sua família frequentemente de é em sua família ocorrido.

Hipertrigliceridemia é em associação trazido com um maior risco de pancreatite (uma inflamação do pâncreas) para receber.

Se você operado precisar ser ou você está durante longo tempo não de pé (veja 'Coágulos de sangue' na seção 2).

Se você recentemente dar à luz está, tem você um aumentado risco de ter de coágulos sanguíneos. Pergunte seu médico como rapidamente após o parto você pode começar com o uso de Microgynon 30.

Se você uma infecção nas veias logo abaixo da pele (tromboflebite superficial) tem
Se você varizes tem.

Se você tem cloasma tem ou você tem alguma vez teve cloasma teve (manchas pigmentares amareladas manchas de pigmentação também chamadas de 'manchas de gravidez', sobretudo no rosto); se isto for o caso, é aconselhável evitar exposição direta à luz solar ou luz ultravioleta luz. evitar.

Se você sintomas de angio-edema tiver, como um rosto inchado, língua / ou garganta / ou problemas ao engolir ou urticária furúnculos possível juntos com problemas com respiração, entre em contato imediatamente com seu médico.

Produtos que hormônios estrogênicos contêm, podem possivelmente os sintomas de hereditário e adquirido angio-edema causar ou agravar.

COÁGULOS DE SANGUE (TROMBOSE)

Se você um combinado hormonal contraceptivo como Microgynon 30 usa, tem você um maior risco de coágulos sanguíneos de obter do que se você não combinado hormonal contraceptivo usa. Em raramente ocorrentes casos pode um coágulo de sangue um vaso sanguíneo obstruir e graves problemas causar.

Coágulos de sangue podem formar-se

em veias (isto é 'venosa trombose', 'venosa tromboembolia' ou VTE chamada),
em artérias (isto é chamado 'arterial trombose', 'arterial tromboembolia' de ATE chamado).

As pessoas recuperam não sempre completamente de coágulos sanguíneos. Em raramente ocorrentes casos podem haver duradouros graves efeitos existir, de ou em muito raramente casos podem ocorrer coágulos sanguíneos fatal ser.

É importante que você saiba que o risco geral de em um prejudicial coágulo de sangue por Microgynon 30 pequeno é.

COMO RECONHECER UM COÁGULO DE SANGUE?

Procure atendimento médico de emergência se você tiver um dos seguintes sintomas de sintomas notado.

Tem você um de estes sintomas ou sintomas? Onde pode você sofrer de?
inchaço de um perna ou ao longo uma veia em Trombose venosa profunda
uma perna ou pé, especialmente se isto estiver associado
met:

dor ou sensibilidade da perna, que
você possivelmente apenas sente ao ficar em pé ou
andar
aumento da temperatura na
perna afetada benzoato de benzila
mudança de cor da pele da
perna, por exemplo pálida, vermelha ou
azul ficar

súbita inexplicada falta de ar Embolia pulmonar
ou rápida respiração
subitamente tosse sem clara
causa, em que você sangue pode expectorar
dor aguda no peito, que pior pode
ficar se você profundamente respira
grave leve sensação na cabeça ou
tontura
rápido ou irregular batimento cardíaco
grave dor no seu estômago.

Se você duvida, entre em contato com um médico, pois
alguns de estes sintomas, como tosse ou
falta de ar, podem erroneamente ser considerados
como uma condição menos grave, como um
infecção respiratória (por ex. resfriado).

Sintomas ocorrem geralmente em um olho : Trombose venosa na
imediatamente perda da visão, retina (coágulo de sangue no
ou olho)
indolor visão turva , o que pode se desenvolver em
perda perda do visão

dor, desconforto, pressão ou pesado sensação no Ataque cardíaco
peito
apertado ou cheio sensação no peito, braço ou inferior
o esterno
cheio sensação, indigestão ou falta de ar ofegante
desconforto no tronco superior que irradia para
as costas, mandíbula, garganta, braço e estômago
transpirar, náusea, vômito ou
tontura
extrema fraqueza, ansiedade ou falta de ar
rápido ou irregular batimento cardíaco

repentina fraqueza ou dormente sensação de rosto, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo

repentina confusão, dificuldade em falar ou compreender

repentina dificuldade com ver em um ou ambos olhos

súbita dificuldade com andar, tontura,

perda de equilíbrio ou coordenação

repentina, grave ou prolongada dor de cabeça sem causa conhecida

consciência reduzida ou desmaio com ou sem crise epiléptica.

Acidente Vascular Cerebral

Os sintomas de um acidente vascular cerebral podem às vezes apenas curta durar e quase imediatamente e completamente recuperar. No entanto, deve você então ainda emergência médica ajuda chamar, porque você um risco pode correr de outro um derrame ter ..

e leve coloração azulada cianose de um braço ou perna
grave dor no seu abdômen (abdômen agudo)
COÁGULOS SANGUÍNEOS EM UMA VEIA

O que

pode acontecer se um coágulo de sangue é formado em uma veia?

O uso de contraceptivos hormonais combinados está associado trazido com um maior risco de coágulos sanguíneos em uma veia (trombose venosa). Esses efeitos colaterais ocorrem no entanto raramente para. Meestal ocorrem eles ocorrem no primeiro ano em que um combinado hormonal contraceptivo é usado.

Se houver um coágulo de sangue é formado em uma veia em uma perna ou pé, pode causar uma trombose venosa profunda (TVP) causar.

Se um coágulo sanguíneo do a perna é transportado e no pulmão chega, pode o um embolia pulmonar causar.

É muito raro que um coágulo de sangue é formado em uma veia em outro órgão ,como o olho (trombosevenosa na retina).Quando

Quando é o risco de um coágulo sanguíneo em uma veia o mais alto?

O risco de um coágulo sanguíneo em uma veia é o mais alto no primeiro ano que uma mulher pela primeira vez um contraceptivo hormonal combinado usa. O risco pode também aumentar são como você após um interrupção de 4 semanas ou mais novamente começa com o uso de um combinado hormonal contraceptivo (o mesmo produto, ou um outro produto do que antes).

Após o primeiro ano o risco diminui , masele permanece um pouco mais alto do que então se você não combinado hormonal contraceptivo usa.

Se você parar de Microgynon 30, o seu risco de um coágulo sanguíneo dentro de alguns semanas novamente normal.

Como alto é o risco de um coágulo sanguíneo?

O risco depende de seu seu natural risco em TEV, e do tipo combinado hormonal contraceptivo que você usa.

O risco geral de um coágulo sanguíneo em uma perna ou pulmão (profunda venosa trombose ou embolia pulmonar) com Microgynon 30 é pequeno.

- De cada 10.000 mulheres que não nenhum combinado hormonal contraceptivo usam em não grávida estar, recebem há aproximadamente 2 em um período de um ano um coágulo sanguíneo.
- De cada 10.000 mulheres que um combinado hormonal contraceptivo usam que levonorgestrel contém como Microgynon 30, recebem cerca de aproximadamente 5-7 em um período de um ano um coágulo de sangue.
- O risco de um coágulo de sangue ter é dependente de sua história médica pessoal histórico médico (veja seções 'Fatores que seu risco de um coágulo sanguíneo em uma veia2Fartéria aumentam' abaixo)

Risco de em um ano um coágulo de sangue ter obter

Mulheres que não combinado hormonal pílula usam e não grávidas estão

Cerca de 2 de cada 10.000 mulheres

Mulheres que um pílula combinada usam que levonorgestrel contém

Aproximadamente 5-7 de cada 10.000 mulheres

Mulheres que Microgynon 30 usam

Aproximadamente 5-7 de cada 10.000 mulheres

Fatores que seu risco de um coágulo sanguíneo em uma veia aumentam

O risco de um coágulo de sangue com Microgynon 30 é pequeno, mas há são certas circunstâncias que aumentam o risco aumentam. Seu risco é maior:

se você grave excesso de peso tem (IMC [índice de massa corporal] superior a 30 kg/m²)

se um dos seus parentes em idade jovem (por exemplo antes o 50^o ano) um coágulo de sangue teve teve em uma perna, pulmão ou outro órgão. Em esse caso pode você um hereditário distúrbio de coagulação ter.

se você uma cirurgia precisar submeter-se, ou se você longo tempo não de pé devido a uma lesão ou doença, ou se seu perna no gesso está. O pode necessário ser para antes uma cirurgia, ou quando você menos móvel está, alguns semanas para parar com o uso de Microgynon 30. Se você precisar parar com Microgynon 30, pergunte então seu médico quando você novamente pode começar com o uso.

se você envelhece (em particular aproximadamente acima dos 35 anos)se você nas últimas semanas semanas dar à luz está.

O risco de um coágulo sanguíneo aumenta à medida que há mais dessas condições se aplicam a você aplicáveis são.

Uma viagem de avião (mais de 4 horas) pode o seu risco de um coágulo sanguíneo temporariamente aumentar, especialmente se houver alguns outros fatores de mencionadas circunstâncias em você de aplicáveis são.

É importante que você o seu médico informe se uma ou mais de estas condições em você de aplicação são, mesmo se você sobre isso duvida. Seu médico pode decidir que você deve parar com o uso de Microgynon 30.

Se um dos acima mencionadas circunstâncias muda enquanto você Microgynon 30 usa, por exemplo se um ao lado parente um coágulo de sangue (trombose) obtém sem causa conhecida, ou se você muito em peso ganha, informe este então a seu médico.

COÁGULO DE SANGUE EM UMA ARTÉRIA

O que pode acontecer se um coágulo de sangue for formado em uma artéria ? artéria?

Net como um coágulo sanguíneo em uma veia, pode um coágulo sanguíneo em uma artéria causar problemas graves. Pode por exemplo por exemplo um ataque cardíaco ou um derrame causar.

Fatores que seu risco de um coágulo sanguíneo em uma artéria aumentar

É importante que você sabe que o risco de um ataque cardíaco ou derrame pelo uso de Microgynon 30 é muito pequeno , mas maior pode ser:

- com aumentando idade (acima aproximadamente 35 anos)
- se você fuma. Se você um combinado hormonal contraceptivo como Microgynon 30 usado, é recomendado que você pare de fumar. Se você não conseguir parar de fumar e mais velho mais de 35 anos, pode seu médico lhe recomendar para um outro tipo contraceptivo usar se
- você tiver excesso de peso se
- você u alta pressão arterial tem
- como um membro da sua próxima família em idade jovem (antes dos 50° ano) um ataque cardíaco de acidente vascular cerebral tem tido. Em esse caso pode você também um aumentado risco ter de um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral ter receber
- se você, ou um membro da sua próxima família, um nível elevado de gordura no sangue tem (colesterol ou triglicerídeos)
- se você a enxaqueca sofre, especialmente enxaqueca com aura
- se você uma doença cardíaca tem (doença valvular cardíaca, ou uma arritmia que fibrilação atrial é chamada)
- se você diabetes (diabetes) tem.

Se mais que um de estas condições se aplica a você aplicável é, ou se uma de este doenças particular grave é, pode o risco de obter de um coágulo sanguíneo ainda mais aumentado ser ..

Se um dos acima mencionadas condições muda enquanto você Microgynon 30 usa, por exemplo se você começa a fumar ou se um próximo parente um coágulo de sangue (trombose) tem sem causa conhecida, ou se você muito em peso ganha, diga isto então ao seu médico.

Microgynon 30 e câncer

Em mulheres que usam pílula usam é um pouco mais frequentemente câncer de mama diagnosticado do que entre não usuárias de pílula da mesma idade. Dez anos após a parada com a pílula não há nenhuma diferença mais. Não é conhecido conhecido de este diferença é causada pelo pílula. O pode também ocorrer porque usuárias de pílula mais minuciosamente e mais frequentemente são examinadas, de modo que de câncer de mama mais cedo é detectado. Como mais cedo o câncer é detectado, quanto melhor os resultados do tratamento.

Em raros casos são em usuárias de pílula tumores hepáticos benignos encontrados e in ainda mais raros casos tumores hepáticos malignos. Às vezes estes tumores levaram a até um com risco de vida interna hemorragia. Se você de repente sentir dor de forte abdominal, então deve você imediatamente entrar em contato com seu médico.

Em mulheres que tomaram pílula por longos períodos têm usado é um pouco mais frequentemente câncer do colo do útero diagnosticado. Isso não precisa no entanto ser pela pílula a vir mas pode a fazer ter com comportamento sexual e outros fatores. É ainda não claro como grande de influência disto é sobre o obter de câncer do colo do útero. É bem claro que a principal causa de câncer do colo do útero uma infecção prolongada com o chamado humano papilomavírus (HPV) é.

Transtornos mentais

Algumas mulheres que hormonais contraceptivos incluindo Microgynon 30 usam, têm relato feito de depressão ou tristeza. A depressão pode ser grave e pode às vezes levar a pensamentos suicidas . Se você mudanças de humore sintomas de depressão de depressão experimenta, entre em rápido possível contato com seu médico para mais médico conselho.

Sangramento intermenstrual

Com todos os comprimidos pode nos primeiros poucos meses às vezes inesperado sangramento ocorrer (spotting ou sangramento de escape). Você pode então talvez não sem absorvente. Continue em qualquer caso normalmente seu comprimidos tomar. O irregular sangramento geralmente para quando se seu corpo uma vez acostumado ficar é a a referida pílula (na aproximadamente 3 tiras). Se o durar mais, piorar ou se repetir novamente ,deve entrar em contato com seu médico. médico.

O que deve fazer se não tiver sangramento durante os dias sem comprimidos dias Se tomou todos os comprimidos corretamente tomou ingeridonão teve último tem teve de vômito e também nenhum outros medicamentos tem usado, é altamente improvável que você grávida está. Você pode então tranquilo com o seguinte cartela continuar.

Se o esperado sangramento no entanto duas vezes consecutivas não ocorrer pode estar grávida . Consulte. Tome imediatamente entre em contato com seu médico. Não continue com a próxima cartela Microgynon 30 30 seu médico tenha determinado que você não está grávida bent.

Uso em crianças

Microgynon 30 é não destinado para mulheres que ainda não menstruam.

Uso em mulheres mais velhas

Microgynon 30 deve não usado ser após a menopausa.

Usa você outros medicamentos medicamentos Usa

Além de Microgynon 30, você usa outros medicamentos, ou tem você isso recentemente feito ou existe a possibilidade de que você no futuro próximo outros medicamentos vai usar? Informe isso então seu médico ou farmacêutico. Eles podem lhe informar se é necessário tomar medidas contraceptivas adicionais contraceptivas tomar (por exemplo preservativos) e, se que o caso é, quanto tempo você isto deve fazer.

Alguns medicamentos podem um efeito ter no níveis sanguíneos de Microgynon 30 e podem a proteção contra gravidez reduzir, ou podem inesperado sangramento causar. O trata-se disso om:

medicamentos para o tratamento de

- o epilepsia (por exemplo primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato ou felbamato)
- o tuberculose (por exemplo rifampicina)
- o infecções com o HIV- e vírus da hepatite C (chamados inibidores de protease e não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa como ritonavir, nevirapina, efavirenz).
- o infecções fúngicas (griseofulvina)
- o artrite, artrose (etoricoxib)
- o alta pressão arterial nos vasos sanguíneos pulmonares (bosentan).
- o fitoterápico erva-de-são-joão.

Microgynon 30 pode de ação de outros medicamentos influenciar, por exemplo

medicamentos que contêm ciclosporina contêm

- o anti-epiléptico lamotrigina (isto pode levar a um aumentado número ataques)
- teofilina (é usado em o tratamento de problemas respiratórios)
- tizanidina (é usado em o tratamento de dor muscular eou câibras musculares).

Use Microgynon 30 não se você tem hepatite C tem e para isso medicamentos com

ombitasvirparitaprevirritovanir, dasabuvir, glecaprevir2Fpibrentasvir de

sofosbuvir2Fvelpatasvir2Fvoxilaprevir usado, porque estes medicamentos um aumento da enzima hepática ALAT-enzima hepática (um teste de função hepática) podem causar.

Seu médico irá lhe um outro contraceptivo prescrever antes de começar com o tratamento com este medicamentos. Microgynon 30 pode aproximadamente 2 semanas após término de este tratamento ser retomado. Veja seção 2 'Quando pode este medicamento não usar?'

Gravidez e amamentação

Se você está grávida, ou acha que você poderia estar grávida poderia estar, pode, pode você Microgynon 30 não usar.

O uso de Microgynon 30 não é geralmente recomendado enquanto uma mulher amamenta. Se você ainda quiser usar enquanto amamenta, pode consultar seu médico. Capacidade de condução

Habilidade de condução em uso de máquinas

Há nenhuma indicação de que a capacidade de condução seja afetada.

Microgynon 30 contém sacarose e lactose

Se o seu médico lhe disse que você não tolera certos açúcares, entre em contato com seu médico antes de tomar este medicamento ..

3. Como usar este medicamento?

Use este medicamento sempre exatamente como seu médico lhe disse .. dúvidas sobre o uso correto? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Quando e como tomar os comprimidos ?

A cartela contém 21 comprimidos. Em cada comprimido está indicado em qual dia deve ser tomado. Tome os comprimidos todos os dias aproximadamente na mesma hora, se necessário com um pouco de água. Siga a direção da seta que está na tira indicada até que você tenha tomado todos os 21 comprimidos. Depois não tome nenhum comprimido. Durante estes 7 dias deve começar uma hemorragia (a chamada hemorragia de privação). Esta começa normalmente no 2º ou 3º dia após o último comprimido de Microgynon 30. Comece no 8º dia com a próxima cartela, independentemente se o sangramento já terminou ou não. Isso significa que você sempre no mesmo dia da semana com uma próxima cartela começa, e também que a hemorragia de privação cada mês aproximadamente no mesmo dia cai.

Se você usar Microgynon 30 desta forma, você também está protegida contra a gravidez durante os 7 dias que você não toma comprimidos.

Quando começar a usar a primeira cartela?

Você não tomou nenhuma pílula anticoncepcional no mês passado. Comece com Microgynon 30 no dia do ciclo (o primeiro dia da sua menstruação). Tome um comprimido na indicação correspondente no blister. Você pode também no dia 2-5 do ciclo começar, mas então deve usar um extra contraceptivo (por exemplo um preservativo) durante os primeiros 7 dias. Mudança de um outro contraceptivo combinado, anel vaginal ou adesivo contraceptivo. Você pode começar com Microgynon 30 no dia após o último comprimido de seu anterior pílula tomou ingerido (então sem pausa). Se houver com sua anterior pílula também não-ativos comprimidos na cartela, deve imediatamente continuar após o último ativo comprimido de seu anterior pílula (se você não sabe qual que é, pergunte então ao seu médico ou farmacêutico). Você pode também começar mais tarde, mas nunca mais tarde do que no dia após o término do período sem comprimidos de seu anterior pílula (ou após o último não ativo comprimido de seu

anterior pílula). Se você um anel vaginal anticoncepcional ou um adesivo anticoncepcional tem usado, deve você de preferência começar com o uso de Microgynon 30 no dia da remoção do último anel ou adesivo de de um embalagem de ciclo, mas não mais tarde do que no dia em que você um novo anel deveria inserir ou um novo adesivo deveria inserir devem adesivos.

Transição de uma minipílula

Você pode de uma para a outra dia mudar para Microgynon 30, mas você deve o primeiro primeiro 7 dias sim um extra contraceptivo (por exemplo um preservativo) usar.

Mudança da injeção contraceptiva ou um implante

Comece com Microgynon 30 quando você diferente a próxima injeção iria receber ou no dia em que o implante é removido. Você deve a primeiro 7 dias porém sim um extra contraceptivo (por exemplo um preservativo) usar.

Após um parto

Se você acabou de dar à luz está, irá seu médico lhe provavelmente recomendar a esperar até sua primeira espontânea menstruação, mas às vezes é possível mais cedo a começar. Siga o conselho do seu médico. Isso também se aplica ao caso de você estar amamentando amamentação querer tomar a pílula deseja usar.

Após um aborto espontâneo ou aborto

Siga o conselho do seu médico.

Você usou demais deste medicamento ? medicamento usado?

Há não existem relatos de efeitos adversos graves da ingestão de muitos Microgynon 30 comprimidos ao mesmo tempo.

Se você vários comprimidos ao mesmo tempo tem ingerido, pode ter desconforto ter de náusea, vômito ou vaginal sangramento. Mesmo meninas que ainda não menstruar poder vaginal perda de sangue obter se elas por acidente este medicamento ter ingerido.

Esqueceu-se de esquecer este medicamento de usar?

Se você estiver menos de 12 horas atrasado com a tomada de um comprimido, a eficácia do anticoncepcional não está reduzida . Tome o comprimido assim mesmo assim que você puder u a pensa e tome os próximos comprimidos novamente no horário habitual .

Se você mais de 12 horas atrasado está com a tomada de um comprimido, pode o efeito do anticoncepcional reduzido ser. Como mais comprimidos você em sequência esqueceu está, mais o maior fica o chance que a eficácia da pílula reduzida está. A chance de proteção insuficiente contra gravidez é a maior se comprimidos forem omitidos a no início ou a o fim da cartela. Portanto aplicam-se as seguintes regras (veja também o esquema):

Mais de 1 comprimido esquecido nesta cartela Entre em contato com
Entre em contato com seu médico.

1 comprimido esquecido na semana 1

Tome o esquecido comprimido assim que você se lembrar, mesmo se isso significar que você tome dois você dois comprimidos em mesmo momento deve tomar. Tome além disso os comprimidos novamente no habitual horário , mas você deve também durante 7 dias extra contraceptivos usar. Se você na semana

antes da esquecida pílula sexo teve tido pode estar grávida . Tome emesse caso portanto imediatamente imediatamente entre em contato com seu médico.

1 comprimido esquecido na semana 2

Tome o esquecido comprimido assim que logo que você se lembrar, mesmo se isso pudesse significar que você dois comprimidos em mesmo momento deve tomar. Tome além disso os comprimidos novamente no horário habitual . A eficácia da pílula é não reduzido, você não precisa nenhum extra contraceptivos usar usar.

1 comprimido esquecido na semana 3

Você pode escolher entre duas opções:

1. Tome o esquecido comprimido assim que você se lembrar, mesmo se isso significar que você tome dois comprimidos no mesmo momento deve deve tomar. Tome além disso o comprimidos novamente no habitual horário novamente. Pule além disso o período sem comprimidos e continue e vá imediatamente para o seguinte strip.
Muito provavelmente receberá apenas no final do segundo blister uma verdadeira hemorragia de privação , mas vocêpode durante o segundo blister também bem último obter de spotting ou um sangramento de escape.
2. Você pode também parar com a respectiva cartela e após um período sem comprimidos de 7 dias dias (tel bem sempre o dia com em que você esqueceu o comprimido)continuar com a próxima cartela. Se você no seu dia fixo de início com um novo tira quiser começar, pode um período sem comprimidos de menos de 7 dias manter.

Se você em um tira comprimidos esqueceu esquecer e você recebe nenhum sangramento na próxima normal sem comprimidos período pode isso significar que você grávida está. Você deve contato fazer com seu médico antes você continuar com a próxima cartela. O que você

deve fazer em caso de vômito ou diarreia grave Se você

dentro de dentro 3-4 horas após o tomar de um comprimido vomitar oudiarreia grave tiver , háuma chance de o ativo ingrediente substâncias não completamente no corpo são absorvidas. Esta situação é comparável ao esquecimento de um comprimido.

Após vômito ou diarreia deve você assim rápido possível um novo comprimido de uma tira de reserva tomar. Se possível dentro 12 horas após o hora em que você normalmente sua pílula toma. Se isso não possível é, ou se as 12 horas já passaram ,deve deve u o conselho seguir como acima indicado em 'Esqueceu-se esquecer este medicamento usar ? '.Adiar

a menstruação : o que vocêprecisa saber saber

U pode seu menstruação adiar ao sem período sem comprimidos continuar a ir com uma nova cartela Microgynon 30. Você pode com com esta tira continuar até que todos comprimidos acabem estejam ou se desejado parar antes. Você pode durante o uso de este segundo strip bem último ter de sangramento de escape ou spotting. Após o habitual sem comprimidos período de 7 dias começa você então novamente com o próximo strip.

O dia de início de seu menstruação mudar: o que você precisa saber

Se você seus comprimidos conforme as instruções tomar, então sua menstruação sempre em aproximadamente aproximadamente mesmo dia começar. Se você este dia quiser mudar,

então pode você isso fazer reduzindo o normal período sem comprimidos entre duas cartelas para chá encurtar (mas nunca por a prolongar). Por exemplo se sua menstruação normalmente na sexta-feira começa e você quer que no futuro mudar para terça-feira (3 dias antes) do que deve agora 3 dias antes do habitual com a nova cartela começar. Se a período sem comprimidos for muito curto curto faz (por exemplo 3 dias ou menos) pode acontecer que você durante este período sem comprimidos não terá sangramento . Você. U pode então durante o próximo cartela incômodo ter de sangramento de escape ou spotting.

Se você parar com o uso de este medicamento

Você pode com Microgynon 30 parar quando você quiser. Se você não grávida quiser ficar, peça então seu médico para aconselhamento com relação a outros confiáveis métodos de contracepção.

Se você parar porque deseja engravidar , é recomendado geralmente esperar até que para chá esperar até u um natural menstruação teve tido antes de tentar engravidar grávida ficar . Você pode então mais facilmente calcular quando o de parto irá ocorrer.

Tem você mais outras perguntas sobre o uso deste medicamento ? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico ..

4. Possíveis efeitos colaterais

Como cada medicamento pode este medicamento efeitos colaterais ter, embora não todos tenham com isso que. . Recebe um efeito colateral, especialmente se este grave de natureza é e por muito tempo persiste, ou ocorre uma uma mudança em seu estado de saúde do qual você pensa que isso causado pode ser por Microgynon 30? Entre em contato com seu médico.

Todas as mulheres que combinam hormonais contraceptivos usar, ter um maior risco de coágulos sanguíneos nas veias (tromboembolismo venoso [TEV]) ou coágulos sanguíneos nas artérias (tromboembolismo arterial [ATE]). Veja para mais informações sobre os diferentes riscos do uso de combinados hormonais contraceptivos seção 2 'Quando deve ter cuidado extra são com este medicamento?'

Graves efeitos colaterais

Graves efeitos colaterais que com o uso da pílula em relação são trazidos são descritos em 'Coágulos sanguíneos (trombose)' e 'Microgynon 30 e câncer'. Leia estes parágrafos para mais informações e consulte imediatamente seu médico se necessário.

Entre em contato imediatamente com seu médico se você sintomas de angio-edema apresentar como um inchaço rosto, língua e/ou garganta enof problemas com engolir ou urticária possivelmente junto com problemas com respirar (ver também seção 2: 'Quando deve u extra cauteloso ser com este medicamento?').

Outros possíveis efeitos colaterais

Os seguintes efeitos colaterais são mencionados por usuárias de pílula. Estes efeitos colaterais poder sobretudo na primeiros poucos meses do uso da pílula ocorrer. Frequentemente desaparecem eles após algum tempo sozinhos .

Frequentemente ocorrendo efeitos colaterais (ocorrem em cerca de 1 a 10 em cada 100 usuárias):

- humor depressivo, alteração de humor
- dor de cabeça
- náusea, dor abdominal
- dor nos seios, sensíveis seios
- ganho de peso.

Às vezes ocorrentes efeitos colaterais (ocorrem em 1 a 10 em 1.000 usuárias)

- diminuição da libido (desejo por sexo))
- enxaqueca
- vômito, diarreia
- erupção cutânea, erupção cutânea com intensa coceira e formação de caroços
- aumento das mamas retenção de líquido.

Raramente ocorrentes efeitos colaterais (ocorrem em 1 a 10 em 10.000 usuárias)

- hipersensibilidade
- aumento da libido (desejo por sexo) irritação
- irritação de olhos em uso de lentes de contato
- forma de erupção cutânea com dolorosos nódulos azul-avermelhados, forma de erupção cutânea em que há também também fala pode ser de nódulos, vesículas ou edema
- vaginal secreção, secreção do mamilo perda de peso
- coágulos sanguíneos em em uma veia ou artéria, por exemplo:
 - o em uma perna ou pé (ou seja. trombose venosa profunda)
 - o em uma long (d.w.z. embolia pulmonar)
 - o ataque cardíaco
 - o derrame
 - o 'mini-derrame' ou temporários sintomas como em um derrame, conhecido como TIA (transitório isquêmico ataque)
 - o coágulos sanguíneos no fígado, estômago intestinos, rins ou olhos.

A probabilidade de um coágulo sanguíneo ocorrer é maior se há outras condições em você aplicável são que este risco aumenta (ver seção 2 para mais informações sobre as condições que aumentam o risco de coágulos sanguíneos aumentam e os sintomas de um coágulo sanguíneo).

Os seguintes efeitos colaterais graves são um pouco mais frequentes relatado em mulheres que um anticoncepcional usaram, mas não é não conhecido se isto é causado pelo tratamento (ver seção 2: 'Quando deve ter cuidado especial com este medicamento?').

- pressão arterial tumores
- hepáticos ou câncer de mama

As seguintes condições também estão em ligação trazido com pílulas combinadas:

A doença de Crohn, colite ulcerativa, porfiria (doença metabólica que dor abdominal e distúrbios mentais causa), sistêmico lúpus eritematoso (onde o corpo ataca os próprios órgãos e tecidos e danifica), herpesno final do corpo de uma gravidez, coreia de Sydenham (rápidos involuntários espasmódicos ou sacudidelas movimentos), hemolítico urêmico síndrome (uma condição que ocorre após diarreia que causado é por E.coli), problemas hepáticos que visíveis tornam-se por icterícia.

O relatar de efeitos colaterais

Se você tiver efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Dit aplica também para possíveis efeitos secundários que não neste folheto estão. Você pode efeitos secundários também diretamente relatar através do Holandês Holandês Efeitos colaterais Centro Lareb, site www.lareb.nl. Ao efeitos colaterais relatar, você pode nos ajudar a obter mais informações sobre a segurança deste medicamento. medicamento.

5. Como armazenar você este medicamento?

Armazenar abaixo de 30°C.

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Utilize este medicamento não mais após o prazo de validade. Ele está a encontrar na embalagem e a tira após 'EXP'. Lá está um mês e um ano. O último dia desse mês é a data de validade data de validade.

medicamentos não pelo ralo ou o vaso sanitário e jogue fora eles não no lixo. Pergunte ao seu farmacêutico o que você deve fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usa. Eles são então em um responsável maneira destruído e chegar não no meio ambiente acabar.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Quais substâncias estão presentes em este medicamento?

O princípios ativos no este medicamento são levonorgestrel levonorgestrel etinilestradiol. Cada comprimido Microgynon 30 30 0,030 miligramas etinilestradiol etinilestradiol em 0,150 miligramas de levonorgestrel.

De outras substâncias em este medicamento são lactose monoidratada, amido de milho, povidona 25 (E1201), estearato de magnésio (E470B), sacarose, povidona 700.000, polietilenoglicol 6.000, carbonato de cálcio (E170), talco (E553b), cera de montanglicol (E192), dióxido de titânio (E171), glicerol 85% (E442) e pigmento de óxido de ferro (amarelo, E172).

Como parece Microgynon 30 e quantos quanto está em um embalagem?

Comprimidos de Microgynon-30 são comprimidos revestidos; o núcleo do comprimido é revestido com uma camada. Os comprimidos são amarelos..

embalagem embalagem Microgynon 30 contém 3 tiras, cada uma com 21 comprimidos.

Titular da autorização para a introdução no mercado e fabricante Titular

da autorização para a introdução no noodgeval, bel 112. comércio trazer

Bayer B.V.

Siriusdreef 36

2132 WT Hoofddorp

Fabricante

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlim, Alemanha

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Doebereinerstrasse 20

99427 Weimar, Alemanha

Para informações:

Bayer B.V., Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp,

No registro inscrito sob RVG 08204

Este folheto é para o última aprovado em julho 2025.