

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Minocyclin Aurobindo 50 und 100 mg, überzogene Tabletten Minocyclinhydrochlorid

Lesen sorgfältig die gesamte Packungsbeilage bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen , denn es enthält wichtige Informationen für Sie.

Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht benötigen Sie ihn später wieder .. Sie noch Fragen Fragen Ihren Ihr Arzt oder Apotheker.

Geben Sie dieses Medikament nicht an andere, da es nur Ihnen verschrieben wurde. Es kann schädlich sein für anderen, auch schon haben sie dieselben Beschwerden wie Sie. Bekommen Sie viel Beschwerden durch eine der Nebenwirkungen die in Abschnitt 4 stehen? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser diese Beipackzettel

1. Was ist Minocycline Aurobindo und wofür wird dieses Medikament verwendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein sind?
3. Wie verwenden Sie dieses Medikament?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Medikament?
6. Inhalt der Verpackung und andere Informationen

1. Was ist Minocycline Aurobindo und wofür wird dieses Medikament verwendet?

Minocyclin ist ein halb-synthetisches Tetracyclin- Derivat. Es ist ein orales wirksam Antibiotikum das verwendet wird für die Behandlung von Infektionen, Geschlechtskrankheiten und Aktinomykose (Infektion mit einem bestimmten Art Schimmel).

Minocyclin ist bestimmt für die Behandlung von Infektionen der Atemwege, des Magen-Darm-Trakts, der Harnwege, der Haut, sowie Hals-, Nase- in Ohrinfektionen, verursacht durch für Minocyclin empfindliche Mikro-organismen. Minocyclin kann ebenfalls werden angewendet bei der Behandlung von Geschlechtskrankheiten, Pilzinfektionen oder Milzbrand bei Patienten die allergisch sind gegen Penicillin.

2. Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden von müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?

Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden?

Minocyclin sollte nicht angewendet werden angewendet bei:

- Patienten die allergisch sind gegen Minocyclin oder gegen eine der Substanzen in diesem Medikament. Diese Substanzen können Sie finden in Rubrik 6
- bei einem schweren Verschlechterung der Leberfunktion
- bei Schwangerschaft und der Gabe von Stillen
- bei Kindern unter de 8 Jahr.

Wann müssen Sie extra vorsichtig sein mit diesem Medikament?

Minocyclin ummantelte Tabletten sollen ausschließlich unter genauer ärztlicher Überwachung zu werden verabreicht an die folgenden Patientengruppen:

- Patienten mit Leber- und Nierenfunktionsstörungen
- Patienten mit Störungen in der Blutgerinnung
- Patienten die leiden an dem Syndrom von Ménière.

Es ist möglich dass es während der Anwendung von Minocyclin eine Infektion auftritt, die verursacht wird durch Organismen die nicht empfindlich sind gegenüber Minocyclin. Bei längerer Therapiedauer ist es empfehlenswert zu raten regelmäßig Kontrollen des Blutbildes, Leber- und Nierenfunktion aus zu führen, insbesondere bei Patienten mit einer schlechten Leber- oder Nierenfunktion.

Bei Infektionen verursacht durch Organismen die nicht empfindlich sind für minocyclin und Hautprobleme (manifestiert sich als Sonnenbrand), muss die Verabreichung abgebrochen werden.

Beim Auftreten von Schwindel kann es wünschenswert sein die Dosierung anzupassen zu ändern, bei dem Auftreten von Gleichgewichtsstörungen und bei Symptomen, wie Doppelsehen, Halluzinationen und dunkle Flecken im Gesichtsfeld, soll die Behandlung mit Minocyclin abgebrochen werden .. ist ist geboten, vor allem bei Patienten leidend an dem Syndrom von Ménière (bestimmte Störung des Gleichgewichtsorgans).Beim Auftreten von schweren ernst Durchfall begleitet mit mit Fieber während der Therapie soll die Therapie abgebrochen werden ..

können die Blutgerinnung beeinflussen beeinflussen. In Bezug hiermit sollte Anwendung von Tetracyclinen, bei Patienten mit Störung in der Blutgerinnung, vorsichtig zu erfolgen. Falls man überempfindlich ist für Minocyclin, scheint man dies oft auch zu sein für verwandte Verbindungen (z.B. Doxycyclin).

Verabreichung von Isotretinoin sollte zu werden vermieden vor, während und nach Behandlung mit Minocyclin.

Besondere Vorsicht ist geboten bei bestehender systemischer Lupus erythematodes (SLE, ein bestimmte Auto-immunkrankheit) oder wenn sich dies entwickelt; dies wird gekennzeichnet durch Hautausschlag (vor allem im Gesicht), Haarausfall, Fieber, ein Gefühl von Unwohlsein sein und Krankheit und Gelenkschmerzen. Das Einnehmen von Minocyclin kann ein Mangel an Vitamin B, Ascorbinsäure und Folsäure verursachen und kann Labortests beeinflussen.

Minocyclin kann die Wirkung der Schilddrüse verändern; dies wird gekennzeichnet durch eine Schwellung an der Schilddrüse oder Schmerzen im Nacken oder im Hals.

Konsultieren Ihren Arzt falls eine der obigen Warnungen für Sie von Anwendung ist oder dass in der Vergangenheit ist gewesen.

Verwenden Sie noch andere Medikamente?

Verwenden Sie neben Minocycline Aurobindo noch andere Medikamente, haben Sie das kürzlich getan oder besteht die Möglichkeit dass Sie in der nahen Zukunft andere Medikamente einnehmen werden verwenden? Sagen Sie dann Ihrem Arzt oder Apotheker. Das gilt auch für Medikamente bei denen kein Rezept erforderlich ist hat.

Ein Wechselwirkung kann auftreten bei gleichzeitiger Anwendung von Minocyclin und einer Anzahl anderer Medikamente, wie:

- blutverdünnende Mittel
- Penicilline
- säurebindende Mittel für den Magen, diese vermindern die Aufnahme von Minocyclin
- Eisenpräparate, diese vermindern die Aufnahme von Minocyclin

aktive Kohle en Ionenaustauscher, diese verringern die Aufnahme von Minocyclin Isotretinoin.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie Ihr Baby? Dann kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie Medikamente einnehmen.

Schwangerschaft

Minocyclin dient nicht zu werden verwendet während Schwangerschaft.

Stillzeit

Beim Gebrauch von Minocyclin soll keine Stillzeit werden gegeben.

Fahrtüchtigkeit en das Gebrauch von Maschinen

Angesichts der möglichen Gleichgewichtsstörungen und Problemen mit dem Sehvermögen, welche Minocyclin verursachen kann, ist Vorsicht empfohlen bei dem Führen von Fahrzeugen oder dem Bedienen von Maschinen.

Minocyclin Aurobindo enthält Laktose

Falls Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat dass Sie bestimmte Zucker nicht verträgt, wenden Sie sich an Ihren Arzt bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

Minocyclin Aurobindo enthält Natrium

Dieses Medikament enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, was bedeutet sagen dass es in Wirklichkeit „natriumfrei“ ist.

3. Wie verwenden Sie dieses Medikament?

Verwenden dieses Medikament immer genau wie Ihr Arzt oder Apotheker Sie dass hat gesagt. Zweifeln Sie an der richtigen Anwendung? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Ihr Arzt wird ein persönliche, an Ihre Beschwerden angepasste, Dosierung verschreiben.

Dosierung

Beginnen und Erhaltungstherapie: 50 mg alle 12 Stunden.

Die Therapie dient zu werden fortgesetzt während 4-6 Wochen.

Bei schweren Infektionen

Erwachsene: 200 mg als Anfangsdosis, gefolgt von 100 mg alle 12 Stunden. Bei viele Fälle kann eine Dosierung von 200 mg am ersten Tag, gefolgt von einer täglichen Gabe von 100 mg, ausreichend sein. Kinder: Bei Kindern von 9 bis 12 Jahre beträgt die übliche initiale Dosis 100 bis 200 mg, gefolgt von einer Dosis von 50 bis 100 mg, alle 12 Stunden. Diese Dosierung entspricht 2 bis 4 mg/kg pro Tag . Minocyclin darfnicht verschrieben werden an Kinder unter 8 Jahren ..

Infektionen an dem Harnwegen

Bei der Behandlung von Infektionen an den Harnwegen bei dem Mann beträgt die Anfangsdosis 200 mg, gefolgt von 100 mg alle 12 Stunden, während minimum 4 Tagen und gefolgt durch eine Kontrolle Woche 2-3 Tagen nach der Behandlung. Eine einmalige Dosierung von 200 bis 300 mg erwies sich in mehr als 90% der Fälle wirksam zu sein. Der Einfachheit halber oder bei Kontrollschwierigkeiten kann daher diese Einmaldosierungstherapie angewendet werden.

Für Erwachsene Frauen mit akuten Harnwegsinfektionen ist manchmal eine längere dauerhafte Therapie erforderlich (10 Tage).

Tetracycline haben den Vorteil gleichzeitig wirksam zu sind gegen die Bakterien von „nicht spezifische Harnwegsinfektionen“, wodurch das Auftreten von post-Harnwegsinfektionen wird verringert. Die Dosierung für diese akute Infektionen beträgt 100 mg pro Tag. Die Therapie soll fortgesetzt werden für 1 1 3 3 ,nachdem die die charakteristische Symptome oder das Fieber sind verschwunden.

Bei Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion muss die Dosis angepasst werden. Patienten mit einer schwerer eingeschränkter Leberfunktion dürfen, nur wenn es nicht anders geht, Minocyclin verschrieben bekommen.

Art der Verabreichung

Die Tabletten müssen mit viel Wasser eingenommen werden um Reizung der Speiseröhre zu vermeiden. Nach der Einnahme dürfen Sie nicht sofort gehen liegen. Die Tabletten dürfen während der Mahlzeiten und gegebenenfalls auch mit Milch eingenommen werden, falls die Einnahme Magenbeschwerden verursacht.

Dosierungsanpassungen

Bei Gleichgewichtsproblemen oder Schwierigkeiten beim Sehen soll die Dosierung angepasst werden . Was.

wenn es zu kommt er plötzlich gestoppt wird mit der Anwendung des Medikaments Falls Sie die von Ihrem Arzt verschriebenen Kur nicht beenden, kann es sein dass die Infektion nicht ganz verschwunden ist und wieder zurückkommt.

Haben Sie zu viel von diesem Medikament eingenommen?

Falls Sie eine schwere Überdosierung vermuten, sollten Sie die Anwendung von Minocycline Aurobindo beenden und Kontakt mit aufnehmen Ihrem Arzt . Ihr Arzt.

Erscheinungen von Überdosierung die vor können kommen sind: Leberschädigung mit Symptomen wie Erbrechen, Fieberschübe, Gelbsucht, Blutergüsse, Blut enthaltende pechschwarzer Stuhl und Flüssigkeitsverlust.

Die Behandlung einer Überdosierung besteht aus : Wasser trinken lassentrinken ,Erbrechen herbeiführen anregen, Magenspülung (bei großen Mengen), abführen. Säurebindende Mittel verabreichen um die Absorption zu verringern.

Haben Sie vergessen dies Medikament in zu nehmen?

Nehmen Sie die Dosis trotzdem ein wenn Sie entdecken dass Sie vergessen haben diese einzunehmen zu nehmen, es sei denn Sie es gerade entdeckt wenn es Zeit ist für Ihre nächste Dosis. In diesem letzten Fall müssen Sie die vergessene Dosis nicht extra einnehmen, aber einfach Ihr Schema weiter befolgen. Es ist wichtig die Tabletten gemäß Schema in zu nehmen. Konsultieren in Fall von Zweifel Ihr Arzt.

Wenn Sie aufhören mit der Einnahme von diesem Medikament

Ihr Arzt hat angegeben wie lange Sie Minocyclin nehmen sollen. Stoppen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ohne mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Haben Sie noch andere Fragen zur Anwendung von diesem Medikament? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Medikament kann auch dieses Medikament Nebenwirkungen haben. Nicht jeder bekommt damit zu tun.

Stoppen sofort mit der Einnahme der Tabletten und suchen sofort medizinische Hilfe, wenn Sie Beschwerden erhält von dem folgenden:

allergische Reaktionen (Anaphylaxie, Überempfindlichkeit): Petechien, Prellungen und Verfärbung der Haut (Purpura), Schock, fleckige Haut (exfoliative Dermatitis), Erhöhung der Anzahl weißen Blutkörperchen und ein oder mehr der folgenden Erscheinungen: Entzündung der Leber (Hepatitis), Lungenentzündung die wird verursacht durch eine Infektion (Pneumonitis), Entzündung der Nieren, Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder des Herzbeutels (Perikarditis), Fieber, geschwollene Lymphknoten

lupusartig Syndrom: die Anwesenheit von antinukleären Antikörpern im Blut, Gelenkschmerzen (Arthralgie), Steifheit oder Schwellung der Gelenke en eins von mehr der folgenden Symptome: Fieber, Muskelschmerzen (Myalgie), Leberentzündung (Hepatitis), Hautausschlag, Entzündung der Blutgefäße

serumkrankheitsähnlich Syndrom: Fieber, juckende Hautausschlag, Hautausschlag, Gelenkschmerzen (Arthralgie), Gelenkentzündung (Arthritis), Steifheit von Schwellung der Gelenke, erhöhte Anzahl weißer Blutzellen im Blut

erhöhter Hirndruck: Kopfschmerzen, Probleme mit dem Sehvermögen, wie verschwommen sehen, "blinde" Flecken, doppelt sehen, permanent Verlust von Sehkraft. Bei Kindern kann der Schädel anschwellen

Wachstum von Bakterien die unempfindlich sind gegenüber Tetracyclin: Entzündung des Darms, Entzündung der Zunge und des Mundes, Entzündung des weibliche Geschlechtsorgane (verursacht Juckreiz), Schmerzen beim Wasserlassen ,Reizung am Gesäß , aufkommendeMagen Entwicklung oder

Entwicklung von Verschlechterung von systemischem Lupus erythematodes (SLE), Symptome umfassen große Bereiche mit roten Flecken auf der Haut, Haarausfall, Gewichtsverlust, schmerzhaft Gelenke und Fieber

Symptome von Leberschäden: Müdigkeit, Schwäche, Appetitverlust von Appetit, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Fieber

veränderte Farbe der Haut, Nägel, Zähne, Schleimhäute der Mund, Knochen, Schilddrüse, Augen, Muttermilch, Tränen oder Schweiß (Hyperpigmentierung).

Konsultieren Sie Ihren Arzt wenn die folgenden Nebenwirkungen auftreten:

Nebenwirkungen die manchmal auftreten (bei 1 bis 10 von 1000 Patienten)

Veränderungen im Anzahl und Arten Blutzellen

Hautausschlag der jucken kann mit oder ohne blasse oder rote Knötchen in der Haut, Schwellung des Gesichts, Lippen, Zunge oder Rachen

Fieber.

Nebenwirkungen , die selten auftreten (bei 1 bis 10 von 10.000 Patienten)

mehr blaue Flecken, Nasenbluten, Halsentzündung, Infektionen, extreme Müdigkeit, Atemnot bei Anstrengung oder ungewöhnlich Blässe der Haut. Ihr Arzt kann Sie bitten um einen Bluttest zu machen

Schwindel, Kopfschmerzen

Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Verlust von Appetit, Unterentwicklung des Zahnschmelzes, Entzündung der Speiseröhre

Pilzinfektion auf Ihrem Gesäß, Geschlechtsorgane oder der Mund, Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane

erhöhte Harnstoffwerte im Blut

Haarausfall, Hautreaktionen einschließlich rote Flecken (Erythema multiforme), schwere Hautreaktionen mit Rötung, Fieber, Blasen oder Geschwüre (Stevens-Johnson- Syndrom), schwere Hautausschlag mit Rötung, Schuppung und Schwellung der Haut, die scheint auf Verbrennung (toxische epidermale Nekrolyse), rote Knötchen an den Beinen (Erythema nodosum), Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht oder künstlich Licht (zum Beispiel Sonnenbank)

Gelenkschmerzen (Arthralgie), Gelenkentzündung (Arthritis), steife oder geschwollene Gelenke, Muskelschmerzen (Myalgie), systemisch Lupus erythematoses (SLE); wenn Sie bereits an SLE leiden, dann kann Minocyclin Aurobindo das verschlimmern Entzündung der Leber (Hepatitis) oder der Nieren.

Nebenwirkungen die sehr selten auftreten (bei weniger als 1 von 10.000 Patienten)

Entzündung der Zunge, Mund oder Darm, Schwierigkeiten beim Schlucken, gestörte Verdauung von wässrige Durchfall, Fieber und Krämpfe (pseudomembranöse Kolitis) akutes Nierenversagen

veränderte Schilddrüsenfunktion. Sagen Sie Ihrem wenn Sie bemerkt dass Sie Beschwerden bekommen von einer Schwellung an der Schilddrüse oder wenn Sie Schmerzen im Nacken oder im Hals fühlen

Leberversagen, Gelbsucht (gelb werden der Haut oder das Augenweiß), Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis), abnormale Leberfunktionstests.

Weitere Nebenwirkungen

Weitere Nebenwirkungen traten auf bei einer sehr kleinen Anzahl Patienten, die genaue Häufigkeit ist nicht bekannt:

verringerte Spiegel von Vitamin B, Ascorbinsäure und Folsäure

Wahnvorstellungen (Halluzination), Kribbeln oder stechende Schmerzen in den Händen und Füßen, Gefühl von Schwindel und Drehschwindel (Vertigo), verminderte Tastsinn, Anfälle, Schläfrigkeit

Blutgefäßentzündung

vermindertes Hörvermögen, Klingeln im Ohr

Entzündung der Leber, weil das Immunsystem sich gegen die Leber richtet (auto-immun Hepatitis)

Knochenschmerzen, Brüchigkeit oder Schwäche der Knochen

schmerzhaft, blaurote Knoten in der Haut (Erythema nodosum).

Das Melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Beschwerden von Nebenwirkungen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen die nicht in diesem Beipackzettel stehen. Sie können Nebenwirkungen auch melden über das Niederländische Nebenwirkungen

Zentrum Lareb, Website www.lareb.nl. Durch Nebenwirkungen zu melden, helfen Sie uns um mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit von diesem Medikament.

5. Wie bewahren Sie dieses Medikament?

Für dieses Medikament gibt es keine besonderen Lagerungsbedingungen.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden dieses Medikament nicht mehr nach dem Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum. Diese ist zu finden auf der Verpackung nach „Exp.“. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist der äußerste Haltbarkeitsdatum. Konsultieren bei Zweifel über die Haltbarkeit Ihren Apotheker.

Spülen Medikamente nicht durch das Spülbecken oder die Toilette und werfen sie nicht in der Mülltonne. Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Medikamenten tun sollen die nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie Medikamente auf die richtige Methode entsorgt werden sie auf eine richtige Weise vernichtet und gelangen sie nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt der Verpackung und andere Informationen

Welche Stoffe sind in diesem Medikament?

Der Wirkstoff in diesem Medikament ist Minocyclinhydrochlorid.

Minocyclin Aurobindo 50 100 mg, überzogene Tabletten Tabletten enthalten pro Tablette beziehungsweise 50 und 100 mg Minocyclin-Basis.

Die anderen Stoffe in diesem Medikament sind: Polyvidon, Lactosemonohydrat, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellosematrium, kolloidales Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Methylhydroxypropylcellulose, Macrogol 6000, gelbes Eisenoxid (E172), Titandioxid (E171).

Wie sieht Minocyclin Aurobindo aus und was ist enthalten ein Verpackung?

Minocyclin Aurobindo 50 mg: runde hellgelbe, konvexe Tabletten.

Minocyclin Aurobindo 100 mg: längliche hellgelbe, konvexe Tabletten.

Minocyclin Aurobindo 50 mg: 30 überzogene Tabletten in 3 Blisterpackungen (PVC/PVDC/Al) à 10 Stück.

Minocyclin Aurobindo 100 mg: 30 überzogene Tabletten in 3 Blisterpackungen (PVC/PVDC/Al) à 10 Stück.

Inhaber der Zulassung für in der Handel bringen und Hersteller Zulassungsinhaber

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Hersteller

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minocyclin Aurobindo 50 mg, überzogene Tabletten ist im Register eingetragen unter RVG 22098.

Minocyclin Aurobindo 100 mg, überzogene Tabletten ist im Register eingetragen unter RVG 22099.

Dieser Beipackzettel ist zuletzt im September genehmigt worden September 2024

Mehr Information über dieses Medikament können Sie finden auf der Website des College ter Beurteilung von Medicamenten, www.cbg-meb.nl.

Transtoyou