

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Minocycline Aurobindo 50 y 100 mg, recubiertas comprimidos
minociclina hidrocloreuro

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento vaya a usar, porque contiene importante información en para usted.

Guarde este prospecto. Quizás necesite usted más tarde nuevamente ..
usted más preguntas preguntas? Entonces póngase en contacto con su médico de
farmacéutico.

No este medicamento a otras personas , porque essolo para usted prescrito . Puedeser
perjudicial para otros para otros, también ya tienen ellos los mismos síntomas que
usted.

¿Tiene usted mucho malestar por uno de los efectos secundarios que en sección 4
están? O recibe usted un efecto secundario que no en este prospecto aparece?

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Minocycline Aurobindo y para qué se este medicamento utiliza?
2. Cuándo no debe este medicamento usar o debe tener especial cuidado con él son?
3. Cómo usa usted este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido del empaque y otros información

1. Qué es Minocycline Aurobindo y para qué se este medicamento utiliza?

Minocycline es un semi-sintético tetraciclina derivado. Es un oral eficaz antibiótico que se
utiliza para el de tratamiento de infecciones, enfermedades de transmisión sexual y
actinomicosis (infección con un tipo específico hongo).

Minociclina es destinado para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias, el tracto
gastrointestinal, las vías urinarias, la piel, así como garganta, nariz- en infecciones de oído,
causadas por para minociclina sensibles micro-organismos. Minociclina puede también ser
utilizada en el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, infecciones por hongos o
ántrax en pacientes que son alérgicos a la penicilina penicilina.

2. no debe este medicamento no usar usar de debe usted tener cuidado con ser?

Cuándo no debe este medicamento no usar?

Minociclina debe no ser aplicado aplicado en:

pacientes que alérgicos son a minociclina o a un de los componentes en este
medicamento. Estos componentes puede usted encontrar en sección 6
en un grave empeoramiento de la función hepática
en embarazo y la administración de lactancia
en niños menores de 8 año.

Cuándo debe tener cuidado ser con este medicamento?

Minociclina recubiertas comprimidos deben exclusivamente bajo estricta médica supervisión a ser administrado a el siguiente grupos de pacientes:

- pacientes con función hepática y trastornos renales
- pacientes con trastornos en la coagulación sanguínea
- pacientes que sufren a el síndrome de Ménière.

Es posible que haya durante el uso de minociclina una infección ocurra, que es causada por organismos que no sensibles son a minociclina.

En tratamientos prolongados es aconsejable realizar recomendable controles periódicos del hemograma, función hepática y renal de a realizar, en particular en pacientes con una mala función hepática o renal.

En infecciones causadas por organismos que no sensibles son para minociclina y problemas de piel (se manifiesta como una quemadura solar),debe la administración suspendida . En caso de.

de actuar de mareo puede el deseado ser la dosis a ajustar ,en el aparición de trastornos del equilibrio trastornos del equilibrio en síntomas síntomas, como visión doble, alucinaciones y manchas oscuras en el campo visual, debe interrumpirse el tratamiento con minociclina . ser tener. es es proporcionado, especialmente en pacientes que sufren de el síndrome de Ménière (cierto trastorno del el órgano del equilibrio).

En el caso de grave diarrea acompañado en curso con fiebre durante la terapia debe la terapia ser suspendida ..

pueden afectar la coagulación sanguínea influir. En relación con esto debe aplicación de tetraciclinas, en pacientes con trastorno en la coagulación sanguínea, con cuidado realizarse .. se hipersensible hipersensible es para minociclina, resulta se esto a menudo también ser ser para compuestos relacionados (p. ej. doxiciclina).

Administración de isotretinoína debe te ser evitado antes, durante y después del tratamiento con minociclina.

Se requiere precaución es necesaria en casos de lupus sistémico eritematoso (LES, un cierta auto-enfermedad autoinmune) o cuando esto se desarrolla; esto se caracteriza por erupción cutánea (especialmente en la cara), pérdida de cabello, fiebre, una sensación de malestar estar y enfermedad y dolor articular. El consumo de minociclina puede una deficiencia de vitamina B, ácido ascórbico y ácido fólico causar y puede pruebas de laboratorio afectar. Minociclina puede la función de la glándula tiroides cambiar; esto se caracteriza por una hinchazón en la glándula tiroides o dolor en el cuello o la garganta.

Consulte a su médico si una de las advertencias mencionadas anteriormente usted de aplicación es de eso en el pasado es ha sido.

Usa usted aún otros medicamentos?

Usa usted además de Minocycline Aurobindo aún otros medicamentos, ha usted eso recientemente hecho o existe la posibilidad de que usted en el futuro cercano otros medicamentos vaya a tomar usar? Diga eso entonces su médico o farmacéutico. Eso también se aplica a medicamentos para los que no necesita receta para tener.

Un interacción puede ocurrir con uso simultáneo de minociclina y un número de otrosmedicamentos ,:

- anticoagulante anticoagulantes
- penicilinas
- antiácidos medicamentos para el estómago, estos reducen la absorción de minociclina
- preparados de hierro, estos reducen la absorción de minociclina

carbón activo en intercambiadores de iones, estos reducen la absorción de minociclina isotretinoína.

Embarazo, lactancia y fertilidad

¿Está embarazada, piensa usted embarazada a estar, desea embarazada quedar o da usted lactancia? Entonces contacte a su médico o farmacéutico antes de que usted medicamentos use.

Embarazo

Minociclina sirve no a ser utilizado durante embarazo.

Lactancia

Al uso de minociclina debe no lactancia ser dada.

Habilidad para conducir en el uso de máquinas

Dado el posible trastornos del equilibrio y problemas con la visión, que minociclina puede causar, se recomienda precaución en el manejar de vehículos o el operar de máquinas.

Minocycline Aurobindo contiene lactosa

Si su médico le ha informado que usted ciertos azúcares no tolera, póngase en contacto con su médico antes de que este medicamento tome.

Minocycline Aurobindo contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por tableta, que quiere decir que en esencia "libre de sodio" es.

3. Cómo usa usted este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico usted que ha dicho. ¿Duda usted sobre el correcto uso? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Su médico le uno personal, a sus síntomas ajustada, dosis prescribir.

Dosis

Comenzar y terapia de mantenimiento: 50 mg cada 12 horas.

La terapia debe continuarse durante 4-6 semanas 4-6 En.

graves Adultos : 200 mg

comodosis inicial , seguidode 100 mg cada 12 horas por 100 mg cada 12 En. En muchos casos puede una dosis de 200 mg en el primer día, seguido por una dosis diaria de 100 mg, ser suficiente .. : Enniños niños de 9 a 12 años es la habitual inicial dosis 100 a 200 mg, seguido por una dosis de 50 a 100 mg, cada 12 horas. Esta dosificación corresponde a con 2 a 4 mg/kg por día. Minociclina no debe ser prescrita prescrito niños menores de 8 años.

Infecciones a el tracto urinario

En el tratamiento de infecciones a el tracto urinario en el hombre es la dosis inicial 200 mg, seguido por 100 mg cada 12 horas, durante mínimo 4 días y seguido por un control semana 2-3 días después de el tratamiento. Una dosis única de 200 a 300 mg resultó pálido en más del

90% de los casos eficaz para ser. Para mayor comodidad o en dificultades de control puede por lo tanto esta terapia de dosis única ser aplicada.

Para adultos mujeres con infecciones urinarias es a veces un más prolongado tratamiento necesario (10 días).

Las tetraciclinas tienen la ventaja simultáneamente eficaz te son contra el bacterias de “no específicas infecciones urinarias”, lo que el prevención de post-infecciones urinarias se reduce. La dosis para esta aguda infecciones es 100 mg por día. La terapia debe ser continuada durante 1 1 3 3 ,después de la características síntomas o la fiebre han desaparecido.

En pacientes con una función renal reducida debe ajustarse la dosis ajustada .. Pacientes con un grave disminuida función hepática pueden, solo si no es de otra manera, minociclina prescrita recibir.

Modo de administración

De tabletas deben con mucho agua tomarse para evitar irritación del esófago para evitar. Después de la ingestión no debe inmediatamente ir a acostarse. De comprimidos pueden durante la comidas y posiblemente también con leche ser tomados, si la ingesta problemas estomacales causa.

Ajustes de dosificación

En problemas de equilibrio o dificultades al ver debe ajustarse la dosificación de ser ajustada.

Qué sucede si se er repentinamente detenido se con el uso del medicamento

Si usted la por su médico prescrita tratamiento no completa, puede que sea que la infección no completamente desaparecido está y vuelve a aparecer.

¿Ha usted demasiado de este medicamento tomado ?¿

Si usted sospecha una sobredosis grave, debe suspender el uso de Minocycline Aurobindo y contactar con su médico . con su médico.

Síntomas de sobredosis que pueden ocurrir son :: con síntomas como vómitos ,fiebre ataques de fiebreictericia ,hematomas hematomas, sangre conteniendo negro azabache heces y pérdida de líquidos.

El tratamiento de una sobredosis consiste en: hacer beber, provocar vómito, lavado gástrico (en grandes cantidades), laxar. Administrar antiácidos para reducir la absorción reducir.

tomar este esto medicamento en tomar tomar?

Tome la dosis aún en cuando usted descubra que usted olvidó está esta en tomar tomar, a menos que lo haya descubierto cuando sea hora de su próxima dosis . Enese último caso debe tomar la dosis olvidada dosis no extra tomar, pero simplemente su esquema seguir seguir. Es importante las tabletas según esquema en que tomar. Consulte en caso de duda su médico.

Si usted deja de tomar este medicamento Su médico

ha indicado cuánto tiempo debe tomar minociclina debe usar debe usar. Detenga el tratamiento no prematuramente sin con su médico consultar ..

usted más preguntas sobre el uso de este esto medicamento? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento tener efectos secundarios. No todos recibe con eso a hacer.

Deje inmediatamente con la ingestión de las tabletas y busque directamente ayuda médica, si tiene recibe del siguiente:

alérgicas reacciones (anafilaxia, hipersensibilidad): petequias, hematomas y decoloración de la piel (púrpura), shock, moteada piel (exfoliativa dermatitis), aumento de la cantidad de glóbulos blancos y uno o más de los siguientes síntomas: inflamación del hígado (hepatitis), neumonía que se produce por una infección (neumonitis), inflamación de los riñones ,inflamación del miocardio (miocarditis) o del pericardio (pericarditis), fiebre ,hinchazón hinchado ganglios linfáticos

similar al lupus síndrome: la presencia de anticuerpos antinucleares en la sangre, dolor articular (artralgia), rigidez o hinchazón de las articulaciones en uno de más de los siguientes síntomas: fiebre, dolor muscular (mialgia), hepatitis (hepatitis), erupción cutánea, inflamación de los vasos sanguíneos

similar a la enfermedad del suero síndrome: fiebre, pruriginoso erupción cutánea, erupción cutánea, dolor articular (artralgia), inflamación articular (artritis), rigidez de hinchazón de los articulaciones, aumento número glóbulos blancos en la sangre aumento presión intracraneal: dolor de cabeza, problemas con la visión, como borrosa visión, "puntos" ciegos, visión doble, permanente pérdida de visión. En niños puede el cráneo abombarse

crecimiento de bacterias que son resistentes a la tetraciclina: inflamación del intestino, inflamación de la lengua y de la boca, inflamación del femeninos órganos genitales (causa picazón), dolor al orinar ,irritación en las nalgas ,reflujo estomacal desarrollo desarrollo de exacerbación de sistémico lupus eritematoso (SLE), síntomas incluyen grandes áreas con manchas rojas en la piel, pérdida de cabello, pérdida de peso, doloroso articulaciones y fiebre

síntomas de daño hepático: fatiga, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre

cambiado color de la piel, uñas, dientes, mucosas de la boca, huesos, tiroides, ojos, leche materna, lágrimas de sudor (hiperpigmentación).

Consulte su médico si los siguientes efectos secundarios ocurren:

Efectos secundarios que a veces ocurren (en 1 a 10 de cada 1000 pacientes)

cambios en el número y tipos de células sanguíneas
erupción cutánea que puede picar con o sin páldida o rojas bultos en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta
fiebre.

Efectos secundarios que raramente ocurren (en 1 hasta 10 de cada 10.000 pacientes)

más moretones ,hemorragias nasales epistaxisfaringitis faringitisinfecciones ,
extremafatiga fatigadificultad para respirar al esfuerzo o de inusual palidez de la piel. Su médico puede pedirle que se haga un análisis de sangre para realizar mareos, dolor de cabeza náuseas, diarrea, vómitos, pérdida de apetito, subdesarrollo del esmalte dental, inflamación del esófago

infección por hongos en su nalgas, órganos genitales o de la boca, inflamación de los masculinos órganos genitales
aumento de niveles de urea en la sangre
pérdida de cabello, reacciones cutáneas incluyendo manchas rojas (eritema multiforme), grave reacciones cutáneas con enrojecimiento, fiebre, ampollas o úlceras (síndrome de Stevens-Johnson), grave erupción cutánea con enrojecimiento, descamación descamación hinchazón hinchazón de la piel, que parece a quemadura (tóxica epidérmica necrólisis), bultos rojos en las piernas (eritema nodoso), sensibilidad a la luz solar o artificial luz (por ejemplo solárium)
dolor articular (artralgia), inflamación articular (artritis), rígidas o hinchadas articulaciones, dolor muscular (mialgia), sistémica lupus eritematoso (LES); si ya tiene problemas de LES, entonces puede Minocycline Aurobindo eso empeorar inflamación del hígado (hepatitis) o de los riñones.

Efectos secundarios que muy raramente ocurrir (en menos de 1 de cada 10.000 pacientes)
inflamación de la lengua, boca o intestinos, dificultad para tragar, digestión alterada de acuosa diarrea, fiebre y calambres (pseudomembranosa colitis)
aguda insuficiencia renal
función tiroidea alterada función tiroidea. a su médico cuando usted u nota que tiene molestias obtiene de un hinchazón en la glándula tiroides o si usted dolor en el cuello o la garganta siente
insuficiencia hepática, ictericia (amarillo volverse de la piel o el blanco del ojo), inflamación del páncreas (pancreatitis), pruebas de función hepática anormales.

Otros efectos secundarios

Otros efectos secundarios ocurrieron en en un muy pequeño número de pacientes, la frecuencia precisa no es:

: niveles reducidos de vitamina B, ácido ascórbico ácido fólico
delirios (alucinación), hormigueo o punzadas en las manos y pies, sensación de mareo y vértigo (vértigo), disminución sentido del gusto, convulsiones, somnolencia
vasculitis
disminución audición, tinnitus en el oído
inflamación del hígado, debido a que el sistema inmunológico se vuelve contra el hígado dirige (auto-inmunitario hepatitis)
dolor óseo, fragilidad o debilidad de los huesos
dolorosos, nódulos azulados en la piel (eritema nodoso).

El informe de efectos secundarios

Tiene molestias de efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no están en este prospecto estar. U puede efectos secundarios también reportar a través del Neerlandés Efectos secundarios reportar efectos secundarios informar, ayuda usted nosotros a más información información te obtener sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacena usted este medicamento?

Para este medicamento hay er ninguna especiales condiciones de almacenamiento.

Fuera de la vista y alcance de los niños mantener.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad fecha de caducidad. Está para encontrar en el empaque después de “Exp.:”. Allí aparece un mes y un año. El último día de ese mes es el última fecha de caducidad. Consulte en caso de duda sobre la caducidad su farmacéutico.

No tire medicamentos por el fregadero o el inodoro y deseche ellos no en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que no más necesarios son. Si usted medicamentos en el correcto manera desecha sean se una correcta manera destruidos y no se no en el medio ambiente terminen.

6. Contenido del empaque y otros información

¿Qué sustancias contiene este medicamento ?La

sustancia activa en este medicamento es minociclina hidrocloreto. Minociclina Aurobindo 50 y 100 mg, comprimidos recubiertos con película contienen por tableta respectivamente 50 y 100 mg de base de minociclina.

Los otros componentes en este medicamento son: polividona, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, coloidal dióxido de silicio, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, macrogol 6000, óxido de hierro (E172), dióxido de titanio (E171). Cómo

se ve Minocycline Aurobindo Minociclina Aurobindo qué contiene en qué contiene uno empaque?

Minocycline Aurobindo 50 mg: redonda amarillo claro, biconvexa tabletas.

Minocycline Aurobindo 100 mg: oblonga amarillo claro, biconvexa tabletas.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 recubiertas tabletas en 3 empaques blíster (PVC/PVDC/Al) a 10 unidades.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 comprimidos recubiertos tabletas en 3 empaques blíster (PVC/PVDC/Al) a 10 unidades.

Titular de la autorización de en el comercialización introducir y fabricante Titular de la autorización

Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Fabricante

Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, recubiertas comprimidos está inscrito en el registro registrado bajo RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, recubiertas comprimidos está inscrito en el registro inscrito bajo RVG 22099.

Este prospecto fue por última vez aprobado en septiembre 2024

Más información sobre este medicamento puede encontrar en el sitio web del Colegio para la Evaluación de medicamentos, www.cbg-meb.nl.

Transtoyou