

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Minocycline Aurobindo 50 ja 100 mg, kaetud tabletid minotsükliinvesinikkloriid

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit hakkate kasutama, sest siin on oluline teave sisse teie jaoks .

Säilitage see pakendi infoleht. Võib-olla vajate seda hiljem jälle ..

teil on veel küsimusi ? Võtke siis ühendust oma teie arst apteeker.

Andke seda ravimit mitte edasi teistele , sest see on ainult teile määratud . See võib kahjulik olla teistele on jaoks teised, ka juba on nemad samasugused kaebused kui teie.

Kas teil palju vaevusi üks kõrvaltoimetest, mis on jaotises 4 4 seisab? Või saate te ühe kõrvaltoime mis ei ole selles pakendi infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Sisu sellest infolehest pakendi infoleht

1. Mis on Minocycline Aurobindo ja milleks kasutatakse seda ravimit ? Millal
2. ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega ettevaatlik kaasa on?
3. Kuidas kasutate te seda ravimit?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Pakendi sisu ja ja muud teave

1. Mis on Minocycline Aurobindo ja milleks kasutatakse seda ravimit ? Minotsükliin on

üks pool- sünteetilise tetratsükliini derivaat . See on üks suukaudne oraalne tõhus antibiootikum mis kasutatakse raviks jaoks de ravi alates infektsioonid, suguhaigused ja aktinomükoos (infektsioon koos teatud liigiga tüüp seen).

Minotsükliin on ettenähtud jaoks de ravi alates infektsioonide hingamisteede , seedetrakti seedetrakti kuseteede , naha , samuti kurgu-, nina- nina- kõrva infektsioonid, põhjustatud poolt minotsükliinile tundlike mikro- organismide. Minotsükliinivõib samuti kasutada raviks juures juures ravi ravi alates sugulisel teel levivad haigused, seeninfektsioonid või siberi katk patsientidel kes on allergilised penitsilliini vastu penitsilliin.

2. ei tohi te seda ravimit kasutada mitte kasutama of peab te lisaks ettevaatlik olema olema?

Millal ei tohi te seda ravimit mitte kasutada?

Minotsükliin ei tohi olla kasutatud olema rakendatud juures:

patsientidel kes allergilised on minotsükliini või mõne selle ravimi koostisosa vastu selles ravimis. Need koostisosad saate te leida sisse rubriik 6 juures üks raske halvenemine maksa funktsiooni juures rasedus ja see andmine rinnaga toitmine juures lapsed alla de 8 aasta.

Millal peate te eriti ettevaatlik olema selle selle ravimiga?

Minotsükliin kaetud tabletid peavad ainult täpse meditsiinilise järelevalve järelevalve et saada manustada kellele järgmistele patsientide rühmadele:

- patsiendid maksafunktsiooni- ja neerufunktsiooni häiretega
- patsiendid kellel on häired vere hüübimises
- patsiendid kes kannatavad juures see sündroom Ménière'i.

See on võimalik et seal kestel see kasutamine minotsükliin üks infektsioon esineb, mis on põhjustatud poolt organismid mis mitte tundlikud on minotsükliinile. minotsükliinile. Pikaajalisel pikema ravi kestusel on soovitatav teha regulaarselt kontrollida vereanalüüse vereanalüüse verepilti, maksa- ja neerufunktsiooni välja teha , eriti juures patsientidel kellel on halb maksa- või neerufunktsioon . Infektsioonide korral. poolt organismid mis ei ole tundlikud sureb ei tundlik on jaoks minotsükliin ja nahaprobleemid (avaldub ennast nagu päikesepõletus), peab manustamine katkestama olema .. ilmneb esinevad alates pearinglus võib see soovitatav olla annust kohandada et seda kohandada, kui see ilmneb tasakaaluhäireid tasakaaluhäired kui sümptomid sümptomid, nagu kahelinägemine, hallutsinatsioonid ja tumedaid laike vaateväljas vaatevälituleb ravi minotsükliiniga katkestada minotsükliiniga Ettevaatlikkus on katkestatud. Ettevaatust on pakutud, eriti juures patsientidel kannatavad all see sündroom Ménière'i (teatud häire juures see tasakaaluorgan).

Kui esineb alates raske kõhulahtisus kaasneb koos koos palavikuga ravi ajal de ravi tuleb de ravi tee katkestada ..

võivad saada verehüübimist mõjutada mõjutama. In seoses sellega peab kasutamine tetratsükliinide, patsientidel kellel on häire verehüübimises , ettevaatlikulttoimuma ettevaatlik Kui on. . Kui on ülitundlik on jaoks minotsükliin, selgub inimene seda tihti ka olema olema jaoks seotud ühendid (nt. doksütsükliin).

Manustamine of isotretinoiin peab te saama vältima enne, ajal ja pärast ravi minotsükliiniga. Lisaks ettevaatlikkus on vajalik olemasoleva süsteemse luupuse erütematoos (SLE, (SLE, üks kindel auto-immuunhaigus) või kui see see areneb; seda iseloomustab lööve nahal lööve (eriti näol näol), juuste väljalangemine, palavik, üks tunne alates halb olek ja haigus ja liigesvalu. võtmine minotsükliin võib üks puudus kohta vitamiin B, askorbiinhape ja foolhape põhjustavad ja võib laboratoorsed testid mõjutada.

Minotsükliin võib kilpnäärme toimet muuta kilpnääre ;see see on iseloomustab poolt üks turse juures kilpnäärme kilpnääre või valu kaelas või kurgus.

Konsultereige oma arstiga kui üks järgmistest ülaltoodud hoiatused kehtib u kohaldamine on või et minevikus olnud on olnud.

Kasutate te veel muid ravimeid?

Kasutate te lisaks Minocycline Aurobindo veel teised ravimid, kas te et hiljuti teinud või on olemas võimalus et sa lähitulevikus teisi ravimeid kasutate või hakkate kasutama? Rääkige et siis teie arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta mille te ei retsepti vaja ole on.

Üks koostoime võib tekkida samaaegsel kasutamisel minotsükliiniga ja mõne teise ravimiga , nagu: verevedeldajad:

- verehendavaid ravimid
- penitsilliinid
- happesiduv ained jaoks de magu, need vähendavad de imendumist minotsükliinist
- raudpreparaadid, need vähendavad de imendumist minotsükliinist
- aktiivsüsi kivisüsi en ionivahetajad, need vähendavad imendumist minotsükliin
- isotretinoiin

isotretinoiin.

Rasedusimetamine ja viljakus Kas olete rase ,arvate te te rase et olla, soovite rase jääda või annate te rinnaga? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui ravimeid kasutate.

Rasedus

Minotsükliin ei tohi olla kasutatud raseduse ajal . Imetamine.

kasutamisel

ei tohi imetada . Autojuhtimine imetamine sama antud.

Sõiduvõime en het kasutamine masinate

Arvestades võimalikke tasakaaluhäireid tasakaaluhäired probleeme nägemisega , midaminotsükliin võib põhjustada , on ettevaatussoovitatav ettevaatlikkus soovitatud mesilase juures juhtimine sõidukite või masinate töötamine. Minotsükliin Aurobindo sisaldab

laktoosi Kui teie

arst on teile öelnud et te teatud suhkrud sina teatud suhkrud mitte talub, võtke ühendust teie arstiga enne kui seda ravimit võtate.

Minocycline Aurobindo sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab ütlema et see on olemus "naatriumivaba" on.

3. Kuidas kasutate te seda ravimit?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu teie arst või apteeker teid et on öelnud .. te õige kasutamise ? Võtke siis ühendust teie arst või apteeker . Teie.

ütleb arst saab üks isiklik, teie kaebustele kohandatud ,annustamine määrata välja kirjutama.

Alustamine

ja säilitusravi : 50 mg iga 12tunni ..

teraapia teraapia tuleb olema jätkatud 4-6 nädalat 4-6 Raskete.

korral Täiskasvanud : 200 mg

algannusena, järgneb 100 mg iga 12tunni tagant iga 12 tunni järel 100 mg Juures. In paljudel juhtudel võib üks annus 200 mg esimesel päeval päeval, järgneb ukse kaudu üks igapäevane annus 100 mg, piisav olla. Lapsed: Lastel lastel van 9 kuni 12 aastat on tavaline algne annus 100 100 200 mg, järgneb annus 50 kuni 100 mg, iga 12 tunni tagant 100 mg, iga 12 tund. See annus vastab 2 kuni 4 mg/kg kohta päevas . Minotsükliini ei tohimäärata lastele alla välja kirjutatud aasta . Infektsioonid 8 aasta.

Infektsioonid juures kuseteede kuseteed

Kuseteede ravi infektsioonide infektsioonid juures kuseteede kuseteed meestel mehel on algannus algannus 200 mg, järgneb 100 mg iga 12 tund, jooksul minimum 4 päeva ja järgneb pärast ühe kontrolli nädal 2-3 päeva pärast ravi lõppu. Ühekordne annus 200 kuni 300 mg

osutus kahvatu sisse rohkem kui 90% juhtudest juhtudest tõhus olema .. või kontrolliraskuste korral võib seetõttu seda ühekordse annuse ravi rakendada ühekordne doosravi Jaoks rakendatud.

Jaoks täiskasvanud naised ägedate kuseteede infektsioonidega on mõnikord vajalik rohkem pikaajaline ravi vajalik (10 päeva).

Tetratsükliinid omavad eelist samaaegselt tõhus tõhus te on vastu de bakterid van "mitte spetsiifilised kuseteedeinfektsioonid", mille tõttu see esinemine post-kuseteedeinfektsioonid väheneb . Deannus jaoks jaoks need äge infektsioonid on 100 mg päevas päev. ravi peab olema jätkatud kestel 1 1 3 3 ,pärast kui see iseloomulikud sümptomid või palavik on kadunud. Kell patsiendid koos ühe vähenenud neerufunktsioon peab annus kohandatud olema .. Patsiendid koos üks raske vähenenud maksafunktsiooniga võivad, ainult kui see pole teisiti võimalik, minotsükliin välja kirjutatud saada.

Manustamisviis alates andmine

De tabletid peavad koos palju veega võtma et vältida ärritust söögitoru peal vältida .Pärast manustamist ei tohi kohe lamama minna lamama. De tabletid tohib ajal de söögikordade ja võimalusel ka koos piimaga võtta ,kui de manustamine kõhuvaevusi põhjustab põhjustab.

Annustamise kohandamine

Juures tasakaaluprobleemid või raskused juures nägemise nägemine peab annus kohandama olema kohandatud ..

juhtub kui kui kui seal järsku lõpetatud saab koos kasutamine ravimi ravim

Kui te arsti teie arst määratud kuuri ei lõpeta, võib see olla et see infektsioon ei ole täielikult kadunud on ja tuleb tagasi.

Kas te liiga palju sellest ravimist võtnud ??

Kui te kahtlustate tõsist üleannustamist ,peate te Minocycline Aurobindo kasutamise lõpetama ja võtma ühendust oma arstiga. võtma koos teie arst.

Sümptomid alates üleannustamine mis võivad esineda on :: koos sümptomitega nagu oksendamine ,palavikuhood palavikuhoodkollatõbi ,verevalumid verevalumid, veri sisaldav tõrvamust väljaheide ja vedelikukaotus.

Ravi üleannustamise korral koosneb veest joomine ja: vee joomine, oksendamise esilekutsumine, maoloputus (juures suured kogused), lahtistid. Happesiduvad ained manustada et imendumist vähendada vähendada.

unustasite seda see ravim sisse võtta ?Võtke

annus ikkagi sisse kui te avastate et te unustasite olete selle sisse võtta te võtma, välja arvatud juhul kui te just avastasite millal see aeg on järgmise teie annuse . Kuisee viimane juhtum on peate te unustatud annuse annus mitte extra võtta, kuid lihtsalt oma ajakava edasi järgida. On oluline tablette vastavalt ajakavale võtta . Konsulterige. Konsulter sisse juhtum alates kahtlus teie arst.

Kui te lõpetate võtmise selle ravimi selle ravimi

Teie arst on näidanud kui kaua te minotsükliini peate kasutama. Lõpetage ravi mitte enneaegselt ilma oma arstiga konsulteerimata . Kas.

on veel muid küsimusi selle kasutamise kohta selle kohta ravim? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada. Mitte igaüks saab sellega tegelema ..

kohe ravimi võtmine tablettide ja otsige kohe meditsiinilist abi , kui teil on probleeme saab alates järgmine:

allergilised reaktsioonid (anafülaksia, ülitundlikkus): punktiverejooksud, verevalumid ja värvimuutus nahal (purpur), šokk, laiguline laiguline nahk (eksfoliatiivne dermatiit), tõus alates arv valgeid vereliblesid ja üks või rohkem järgmistest sümptomitest sümptomid: kopsupõletik maksapõletik (hepatiit), kopsupõletik mis põhjustatud poolt infektsioon (pneumoniit), põletik neerude , põletik südamelihase(müokardiit) või südamepauna (perikardiit), palavik (müokardiit) või paistes (perikardiit), palavik, paistes lümfisõlmed luupusesarnane sündroom: de esinemine van antinukleaarsete antikehade veres veri, liigesvalu (artralgia), jäikus või turse liigestes liigesed en üks of rohkem järgmistest sümptomitest sümptomid: ,lihasvalu (müalgia),maksapõletik (hepatiit), nahalööve nahalöövepõletik järgmistest alates veresooned seerumhaiguse-laadne sündroom: palavik, sügelev nahalööve, nahalööve, liigesvalu (artralgia), liigesepõletik (artriit), jäikus of turse van de liigesed, suurenenud arv valgeid vereliblesid in het veri suurenenud koljusisene rõhk: peavalu, probleemid nägemisega nägemine, nagu hägune nägemine, "pimedad" laigud, kahekordne nägemine, püsiv nägemise kaotus . Lastellastel võib kolju paisuda kolju paisuma kasv alates bakterid mis tundetud on tetratsükliini suhtes: tetratsükliin: põletik soolestikus ,põletik keelel ja suus , põletiksuus põletik alates naissoost suguelundid (põhjustab sügelust), valu juures urineerimine ,ärritus kuni tuharad , ärritunudmagu areng või arendamine ei ägenemine alates süsteemne luupus erythematodes (SLE), sümptomid hõlmavad suuri piirkondi punaste laikudega nahal ,juuste väljalangemine ,kaalulangus kaalulangusvalulikud valulik liigesed ja palavik sümptomid alates maksakahjustus: väsimus, nõrkus, kaotus alates isu, kaalukaotus, kõhuvalu, palavik muutunud värv nahal nahk, küüned, hambad, limaskestad suus ,luud ,kilpnääre kilpnääresilmad ,rinnapiim rinnapiim, pisarad või higi (hüperpigmentatsioon).

Konsulteerige oma arstiga kui järgmised kõrvaltoimed ilmnevad ::

mis mõnikord ilmnevad esinevad (juures 1 kuni 10 1000-st patsiendist)

muutused veres rakkude ja tüüpide arv
nahalööve mis võib sügelda koos või ilma kahvatu või punased muhud nahas nahk, turse näo nägu, huuled, keel või kurk
palavik.

Kõrvaltoimed mis harva esinevad (juures 1 kuni 10 10 000-st patsienti)

rohkem siniseid laike, ninaverejooks, kurguvalu, infektsioonid, äärmine väsimus, hingeldus pingutusel või of ebataoline kahvatus naha nahk. Teie arst võib teid paluda teha vereanalüüs teha teha peeringlus peeringluspeavalu iiveldus

iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, kaotus alates isutus, alaareng alates hambavaap, põletik alates söögitoru
seeninfektsioon peal teie istmik, suguelundid või suu, põletik mehe meessuguelundite suguelundid
suurenenud urea tase veres veri
juuste väljalangemine, nahareaktsioonid sealhulgas punased laigud (erüteem multiforme), raske nahareaktsioonid koos punetus, palavik, villid või haavandid (Stevens-Johnsoni sündroom), raske nahalööve koos punetus, ketendus ja turse naha nahk, mis näib nagu põletus (toksiiline epidermaalne nekrolüüs), punased punnid jälgadel (erythema nodosum), tundlikkus päikesevalguse suhtes või kunstlik kunstlik kerge (näiteks päevituslamp)
liigesvalu (artralgia), liigespõletik (artriit), jäigad või paistes liigesed, lihasvalu (müalgia), süsteemne luupus erythematoses (SLE); kui teil on juba SLE , siis võib Minocycline Aurobindo seda halvendada
maksapõletik (hepatiit) või neerud.

Kõrvaltoimed mis väga harva esinevad (juures vähem kui 1 10 000-st patsiendist)
põletik keelel, suus või soolestikus, raskused neelamisel ,häiritud seedimine seedimine of vesine kõhulahtisus, palavik ja krampid (pseudomembranoosne koliit)
äge neerupuudulikkus
muutunud kilpnäärmefunktsioon. Rääkige oma arstile kui te täheldab et teil on ebamugavustunne saate alates ühest turses juures kilpnäärme või kui teil valu kaelas või kurgus tunnete maksapuudulikkus
,kollatõbi (kollane muutuma nahk või silmakõvakest),põletik kõhunääre (pankreatiit), ebanormaalsed maksafunktsiooni testid . Muud.

Muud kõrvaltoimed

ilmnesid kõrvaltoimed kaubamärgid peal juures üks väga väike arv patsiente, täpne sagedus on pole teada:

alandatud tasemed vitamiin B, askorbiinhape ja ja foolhape
luulud (hallutsinatsioon), surinad või torked kätes ja jalgades ,tunne peapööritusest ja pööritustunne (vertiigo), vähenenud (peapööritus), vähenenud maitsetundlikkus, krampid, unisus
veresoonte põletik
kuulmise vähenemine ,kõrinate kõrvas kõrv maksapõletik
, põhjustatud immuunsüsteemi poolt maksale vastu suunatud reaktsioonist suunab (auto-immuun hepatiit)
luuvalu, haprus või nõrkus luude luud
valulikud, sinakas-punased muhud nahal (erythema nodosum). See

teatamine teatama kohta kõrvaltoimed

Kas teil on probleeme kõrvaltoimetega, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles infolehes pakendi infoleht seisma. U saate kõrvaltoimed ka teatada kaudu Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb, veebisait www.lareb.nl. Teatades kõrvaltoimetest teatada ,aitate te meid et rohkem teavet teave te saama üle ohutus selle see ravim.

5. Kuidas säilitate te see ravim?

Selle see ravim on on ei erilised säilitamistingimused.

Hoida nähtavusest ja kättesaamatus laste kaugusel ..

kasutage seda ravimit enam pärast aegumiskuupäeva . tähtaega aegumiskuupäev. See on leida pakendil pärast märgistust „Exp.:“. Seal on kuupäev ja aasta . Viimane päev sellestkuust on aegumiskuupäev selle kuu viimane päev aegumiskuupäev kõlblikkusaeg. Konsulterige kahtluse korral kõlblikkuse osakohaselt oma apteekriga.

Ärge ravimeid visake kraanikausist või WC-st alla ja visake need mitte sisse prügikast. Küsige oma apteekrilt mida teha ravimitega peate tegema mis enam pole vajalikud on. Kui te ravimid õigesse kohta viis eemaldab saavad nad üks õige viis hävitatud ja jõuavad nad ei keskkonda sattuda.

6. Sisu pakendi pakend ja muud teave

Millised ained sisaldab see ravim ?Toimeaine

selles ravimis on minotsükliinvesinikkloriid. Minocycline Aurobindo 50 ja 100 mg, kaetud tabletid 100 mg, kapseldamine tabletid sisaldavad tableti kohta vastavalt 50 ja 100 mg minotsükliini alust.

Teised ained selles ravimis on : polüvidoon: laktoosmonohüdraat, mikrokristalnetselluloos, mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne ränioksiid, magneesiumstearaat, metüülhüdroksüpropüültselluloos, makrogool 6000, kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171).

Kuidas näeb Minotsükliin Aurobindo välja ja mis sisaldab üks pakend?

Minotsükliin Aurobindo 50 mg: ümmargused helekollased, kumerad tabletid.

Minotsükliin Aurobindo 100 mg: piklikud helekollased, kumerad tabletid.

Minotsükliin Aurobindo 50 mg: 30 kaetud tabletti 3 blisterpakendid (PVC/PVDC/Al) à 10 tükki.

Minotsükliin Aurobindo 100 mg: 30 kaetud tabletti 3 blisterpakendis (PVC/PVDC/Al) à 10 tükki.

Luba omanik ravimi jaoks kaubandusse toomine ja tootja litsentsiomanik Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche

Dijk 1 3741 LN Baarn

Tootja

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche

Dijk 1 3741 LN Baarn

Minotsükliin Aurobindo 50 mg,

kaetud tabletid on registreeritud kantud registreeritud all RVG 22098.

Minotsükliin Aurobindo 100 mg, kaetud tabletid on registreeritud kantud all RVG 22099.

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud septembris 2024 Rohkem september 2024

Rohkem teave kohta selle ravimi saate leida veebisaidilt Ravimiameti Hindamine ravimite kohta, www.cbg-meb.nl.

Transtoyou