

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Minocycline Aurobindo 50 ja 100 mg, päällystetyt tabletit
minosykliinihydrokloridi

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä , koska siinä on tärkeitä tietoja sinulle tietoa sisään sinulle .

Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä tarvitset sitä myöhemmin uudelleen .. sinulla lisää kysymyksiä ? Ota sitten yhteyttäsinun te lääkäri apteekkari. Anna tätä lääkettä ei eteenpäin muille , koska se on vain sinulle määrätty . Se voi olla haitallista olla vaarallista sinulle varten muut, myös jo on he samat oireet kuin te. Saatteko te paljon haittaa yhdestä näistä sivuvaikutuksista jotka on kohdassa 4 seiso? Tai saat sinä yksi sivuvaikutus joka ei tässä tässä pakkausselosteessa lukee? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.

Sisältö tästä tästä pakkausseloste

1. Mikä on Minocycline Aurobindo ja mihin käytetään tätä lääkettä ? Milloin
2. et saa tätä lääkettä käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa ovat?
3. Kuinka käytetään te tätä lääkettä?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?
6. Pakkaus sisältö pakkauksen ja muut tiedot

1. Mikä on Minocycline Aurobindo ja mihin käytetään tätä lääkettä ? Minosykliini on

puoli- synteettinen tetrasykliinijohdannainen . Se on suun kautta otettava lääke . tehokas antibiootti joka käytetään hoitoon infektioiden de hoito alkaen infektiot, sukupuolitaudit ja aktiinomykosi (infektio kanssa tietyn lajin tyyppi sieni).

Minosykliini on tarkoitettu sille de hoitoon alkaen infektioiden ei käännettävää sisältöä hengitysteissä, ruoansulatuskanavassa, virtsateissä, ihossa, sekä kurkku-, nenä- ja korvatulehdukset, aiheuttamat kautta minosykliinille herkät mikro- organismit. Minosykliinivoi myös käyttää olla sovellettu kohdalla hoitoon hoito alkaen sukupuolitaudit, sieni-infektiot tai pernarutto potilailla jotka ovat allergisia penisilliinille . 2. Milloin.

2. lääkettä käyttää tämä lääke ei käyttää of täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?

Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää?

Minosykliini ei saa olla käytetty olla sovellettu mehiläisen:

potilaat jotka allergisia ovat minosykliinille tai minosykliinille tai yhdelle aineista tässä lääkkeessä . Nämä aineet. löytää tästä lääkkeestä . löytää sisään osio 6 kohdalla yksi vakava huonontuminen maksan toiminnassa raskauden aikana ja imetys antaa imetys lapsille alle lapsille alle de 8 vuosi.

Milloin täytyy teidän erityisesti varovainen olla tämän lääkkeen kanssa?

Minosykliini päällystetyt tabletit tulee ainoastaan tarkassa lääkärin valvonnassa valvonta että tulla annosteltavaksi kohteena de seuraavat potilasryhmät:

potilaat joilla on maksa- ja munuaisten toimintahäiriöt
potilaat joilla on häiriöt veren hyytymisessä
potilaat jotka kärsivät an het Ménièreen oireyhtymä.

Se on mahdollista että siellä käytön aikana het käyttö minosykliinin voi infektiota esiintyä, joka aiheutuu aiheuttama organismit organismit jotka eivät herkkiä ole minosykliinille.

Pitkäaikaisessa

hoidossa on suositeltavaa tehdä säännöllisesti verikokeita , maksan- ja munuaisten toiminnan seurantaan suositeltavaa munuaistoiminta ulos tehdä suorittaa, erityisesti potilailla joilla on huono maksa- tai munuaistoiminta . Infektioissa.

organismien jotka eivät herkkiä organismit kuolema ei herkkä ovat varten minosykliini ja iho-ongelmat (ilmenee itse kuten auringonpolttama), täytyy annostelu keskeyttää . Jos.

Kun esiintyä alkaen huimaus voi se olla toivottavaa olla annos annostus sovitaa sovitaa ,kun se esiintyy tasapainohäiriöiden tasapainohäiriöiden tasapainohäiriöt kun oireet oireet, kuten kaksoiskuvat, hallusinaatiot ja tummat täplät näkökentässä näköalatuulee hoito minosykliinillä keskeyttää minosykliinillä Varovaisuutta on keskeytetty. Varovaisuus on tarjotaan, erityisesti potilailla kärsivillä Ménièreen oireyhtymästä (tietty häiriötasapainoelimeen). Kun esiintyy vakavia).

Kun esiintyä alkaen vakava ripuli yhdessä oleva kanssa kuume aikana hoidon hoito tulee hoito hoito keskeyttää olla keskeytetty.

Tetrasykliinit voivat veren hyytymistä vaikuttaa. In yhteydessä tähän tulee käyttö tetrasykliinien, potilailla joilla on häiriö veren hyytymisessä verenkiertovaroituksesta tapahtua . Jos. on yliherkkä yliherkkä on varten minosykliini, osoittautuu ihmiset tämä usein myös olevan olevan varten sukulaisten yhdisteet (esim. doksisykliini).

Antaminen of isotretinoiini tulee te tulla vältettävä ennen, aikana ja jälkeen hoito minosykliinillä.

Lisä varovaisuutta on noudatettava olemassa olevan systeemisen lupuksen erythematosus (SLE, (SLE, yksi tietty auto-immuunisairaus) tai kun tämä kehittyy ;tätä leimaa ihottuma (erityisesti kasvoissa),etenkin sisään kasvot), hiustenlähtö, kuume, yksi tunne alkaen huonovointisuus oleminen ja sairaus ja nivelkipu. minosykliinin ottaminen voi yksi puute puute kanssa vitamiini B, askorbiinihappo ja foolihappo aiheuttaa ja voi laboratoriotestit vaikuttaa. Minosykliini voi vaikuttaa toimintaan kilpirauhasen muuttaa ;tämä tämä on tunnusomaista kautta turvotus kilpirauhasessa tai kipu kaulassa tai kurkussa. Ota yhteyttä lääkäriisi

jos jokin yllä mainituista varoista koskee sinua. Kilpirauhasen suurentuminen voi u soveltaminen on että menneisyydessä ollut on ollut.

Käytätkö sinä vielä muita lääkkeitä?

Käytätkö sinä lisäksi Minocycline Aurobindo vielä muita lääkkeitä, on te että äskettäin tehnyt tai on mahdollisuus että te lähitulevaisuudessa muita lääkkeitä aiotte ottaa muita lääkkeitä käyttää? Kerro että sitten sinun lääkäriille tai apteekkarille. Tämä koskee myös lääkkeitä joita sinä et tarvitse reseptiä varten tarvitse on.

Yksi yhteisvaikutus voi esiintyä samanaikaisessa käytössä minosykliinin ja eräiden muiden lääkkeiden , kuten: verenhennuslääkkeet:

penisilliinit lääkkeet

penisilliinit

happoa sitovat aineet varten de maha, nämä vähentävät de imeytymistä minosykliini

rautavalmisteet, nämä vähentävät de imeytymistä minosykliini

aktiivihiihi kool en ioninvaihtajat, nämä vähentävät de imeytymistä minosykliinin

isotretinoiini.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletteko raskaana, luuletteko te raskaana olla ovat, haluatko raskaaksi tulla tai imetätkö sinä imetät? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät lääkkeitä ..

Raskaus

Minosykliini ei saa käyttää raskauden aikana . Imetys.

käytön

yhteydessä ei tule imettää . Ajokyky tulla annettu.

Ajokyky en het käyttö koneiden

Koska de mahdolliset tasapainohäiriöt ja ongelmat näkökyvyn kanssa, jotka minosykliini voi aiheuttaa, on varovaisuus suositeltavaa mehiläisen ajaminen ajoneuvojen ajoneuvoja tai käyttö koneiden käyttö.

Minocycline Aurobindo sisältää laktoosia

Jos sinun lääkäri on kertonut sinulle että sinä tietyt sokerit ei sietää, ota yhteyttä teidän lääkäriin ennen kuin käytätte tätä lääkettä otatte.

Minocycline Aurobindo sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää vähemmän kuin 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, joka tarkoittaa sanoa että se on olemukseltaan "natriumvapaa" on.

3. Kuinka käytätte te tätä lääkettä?

Käyttäkää tätä lääkettä aina tarkalleen kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinä että on kertonut. Epäiletkö sinä oikeasta käytöstä ? Ota sitten yhteyttäsinun lääkäriin tai apteekkariin ..

lääkäri tulee ei yksi henkilökohtainen, sopiva teidän oireisiin sovellettu, annostus määrätä.

Annostus

Aloitust ja ylläpitohoito: 50 mg 12 tunnin.

. Hoito tulee olla jatkettava 4-6 viikkoa 4-6 Vakavissa.

Aikuiset : 200 mg aloitusannoksena

Aikuiset seurattuna 100 mg joka 12. tunti. Vakavissa infektioissa Aikuiset: 200 mg monet tapauksissa voi annos 200 mg ensimmäisenä päivänä ,seurattuna päivittäisellä annoksella 100 mg, riittävä olla . Lapset. Lapsilla: Kun lapset 9 asti 12 vuotta on tavanomainen alkuannos 100 200 mg, 100 annoksella 50 100 mg, joka 12. tunti yksi annos 50 asti 100 mg, joka 12. tunti. Tämä annostus vastaa 2 – 4 mg/kg per päivä . Minosykliiniä ei saa määrätäalle 8-vuotiaille lapsille määrätty Infektiot lapset alla 8 vuosi.

Infektiot virtsateihin de virtsateiden

Virtsateiden hoito alkaen infektioita virtsateihin de virtsateiden miehillä mies on de aloitusannos 200 mg, seurattuna 100 mg joka 12. tunti, kestää vähintään 4 päivää ja seurattu jälkeen yksi tarkastus viikko 2-3 päivää jälkeen hoidon hoito. Yksi kertaluonteinen annos 200 ja

300 mg osoittautui in enemmän kuin 90% tapauksista tapauksista tehokas olla olemaan. Mukavuuden vuoksi tai tarkastuksen vaikeuksissa voidaan siksi tämä kertaluonteinen annosteraapia voida soveltaa.

Sillä aikuiset naiset joilla on akuutti virtsatieinfektiot on joskus tarvitaan enemmän pitkäaikainen hoito tarpeen (10 päivää).

Tetrasykliinit ovat etuna samanaikaisesti tehokkaita aktiivinen te ovat vastaan de bakteerit van "ei spesifiset virtsatieinfektiot", minkä vuoksi se ehkäisy post-virtsatieinfektiot vähenee vähentynyt. Annostus annostus sille tämä akuutti infektiot on 100 mg per päivä. Hoito terapia tulee olla jatkettu jatkettu kestää 1 jopa 3 päivää, sen jälkeen kun luonteenomaiset oireet tai kuume ovat kadonneet.

Potilailla potilaat joilla on heikentynyt munuaistoiminta on annosta muutettava . Potilaat joilla on. munuaistoiminta kanssa yksi vakava heikentynyt maksatoiminta saavat, vain jos se ei muuten voi, minosykliini määrätä saada.

Antotapa alkaen annostelu

De tabletit täytyy met paljon vettä ottaa olla om ärsytys van de ruokatorvi te välttää. Na de otto et saa ei välittömästi mennä maata. De tabletit saa aterioiden de aikana ja tarvittaessa myös met maidon ottaa ,jos de nauttiminen mahaoireita aiheuttaa aiheuttaa.

Annostuksen säätäminen

Kun tasapaino-ongelmia tai vaikeuksia kun näkö näkökyky on annostus annostus tulisi olla säädetty.

Mitä tapahtuu jos kun er yhtäkkiä lopetettu tulee käytön käyttö lääkkeen lääke

Jos teidän teidän lääkäri määräämä kuuri ei lopeta, voi se olla että de infektiot ei täysin kadonnut on ja taas palaa.

Onko te liian paljon tätä tätä lääkettä ottanut?

Jos sinä epäilet vakavaa yliannostusta ,tulee sinun lopettaa käyttö Minosykliini Aurobindo ottaa yhteyttä lääkäriisi. ota yhteyttä tee ottaa kanssa sinun lääkäri

Oireet alkaen yliannostuksesta kuolema voivat esiintyä rinta ovat: maksavaurio kanssa oireina kuten oksentelu, kuume, keltaisuus, mustelmat, veri sisältävä pikimusta uloste ja nestehukka. Hoito yliannostuksen hoito yliannostuksen koostuu : veden antaminen juotavaksi: vettä jättää oksentamisenaiheuttaminen oksentaa indusoida, mahalaukun huuhtelu (suurten määriä),laksatiivi .. aineet antaa vähentämään imeytymistä vähentää . Oletko.

tämän unohtaa tämä lääke sisään ottaa ottaa?

Ota annos silti sisään kun huomaatte että olette unohtanut unohtaa ottaa tämän sisään tee ottaa, ellei olet juuri huomannut kun se on aika ottaa seuraava annos sinun seuraavaannos . Tässä viimeisessä tapauksessa sinun täytyy unohtaa annos ei extra ottaa, mutta yksinkertaisesti sinun aikataulu jatkaa seurata. On tärkeää ottaa tabletit aikataulun mukaan ottaa .. Kysy sisään tapauksessa alkaen epäily lääkäriisi lääkäri

Jos lopetat käytön kanssa ottamisen alkaen tätä lääkettä

Lääkäri on ilmoittanut ilmoitettu täytyy käyttää käyttöä. Lopeta hoitoa ei ennenaikaisesti ilman kanssa lääkäriisi lääkärin kanssa keskustelematta.

Onko sinulla vielä muita kysymyksiä käytöstä käyttö tästä tästä lääke? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.

4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke sivuvaikutuksia aiheuttaa. Ei kaikki saa siten tehdä kanssa.

Lopeta välittömästi lääkkeen ottaminen tablettien kanssa ja hakeudu heti lääketieteelliseen apuun, jos sinulla on saa alkaen seuraavaa:

allergisia reaktioita (anafylaksia, yliherkkyys): pistevuotoja, mustelmia ja ihon värimuutoksia (purppura), sokki, täplikäs täplikäs iho (kuoriva dermatiitti), lisääntyminen of the määrä valkoisia verisoluja ja yksi tai useampi seuraavista oireista oireet: keuhkokuume maksasta (hepatiitti), keuhkokuume joka aiheutuu aiheuttaa infektion kautta (pneumoniitti), tulehdus munuaisten , tulehdussydänlihaksen (myokardiitti) tai sydänpussin (perikardiitti), kuume , turvotus kuume, turvonnut imusolmukkeet lupusmainen oireyhtymä: de läsnäolo van antinukleaariset vasta-aineet in het veri, nivelkipu (artralgia), jäykkyys tai turvotus nivelten alueella en yksi of enemmän seuraavista seuraavat oireet: kuume, lihaskipu (myalgia), maksatulehdus (hepatiitti), ihottuma, tulehdus seuraavista verisuonet seerumitauti-tyyppinen oireyhtymä: kuume, kutiseva ihottuma, ihottuma, nivelsärky (artralgia), niveltulehdus (niveltulehdus), jäykkyys of turvotus van de niveliä, lisääntynyt määrä valkosoluja veressä veri kohonnut kallonpaine kallon sisäinen paine: ,ongelmia näkökyvyn kanssa näkökyky, kuten sumea näkö, "sokeat" täplät, kaksois näkö, pysyvä näön menetys . Lapsillakallon voi pullistua de kallo pullistua kasvu alkaen bakteerien jotka ovat immuuneja ovat tetrasykliinille tetrasykliini: tulehdus suoliston ,tulehdus kielen ja suun , tulehdussuun tulehdus of the naispuoliset sukuelimet (aiheuttaa kutinaa), kipu virtsatessa se ärsytyspakaroissa , ärtynyt se vatsakehitys tai vatsa kehitys of paheneminen alkaen systeeminen lupus erythematosus (SLE), oireet sisältävät laajoja alueita punaisia läiskiä iholla ,hiustenlähtö ,painonlasku painonpudotuskivulias kivulias niveliä ja kuume oireet alkaen maksavaurio: väsymys, heikkous, menetys alkaen ruokahalu, painonlasku, vatsakipu, kuume muuttunut väri ei ole mitään käännettävää iho, kynnet, hampaat, limakalvot ei käännettävää sisältöä suu, luut, kilpirauhanen, silmät, äidinmaito, kyyneleet tai hiki (hyperpigmentaatio).

Kysy lääkäriltäsi lääkäri jos seuraavat haittavaikutukset ilmenevät ::

jotka joskus ilmenevät esiintyä (kohdalla 1 jopa 10 tuhannesta potilaasta)

muutoksia veressä määrässä ja tyypeissä verisoluja ihottuma joka voi kutista joko ilman kalpeaa tai punaisia kyhmyt ihossa iho, turvotus kasvojen kasvot, huulet, kieli tai kurkku kuume.

Haittavaikutukset jotka harvoin esiintyvät (yhellä 1 jopa 10 per 10 000 potilasta)

enemmän sinisiä mustelmia, nenäverenvuotoja, kurkkutulehdus, infektoita, äärimmäinen väsymys, hengenahdistus rasituksen yhteydessä tai epätavallinen kalpeus ihon iho. Lääkärisi voi pyytää sinua tekemään verikoe yksi verikoe tehdä huimaus

huimauspäänsärky pahoinvointi
pahoinvointi, ripuli, oksentelu, menetys alkaen ruokahalu, kehityshäiriö ei hammaskiille,
tulehdus ei käännettävää sisältöä ruokatorvi
sieni-infektio päällä sinun pakarat, sukupuolielimet tai suu, tulehdus miehen
sukupuolielimet kohonneet
urea-arvot veressä hiustenlähtö ,
ihoreaktiot mukaan lukien punaiset läiskät (erythema multiforme), vakava (erythema
multiforme), vakava ihoreaktiot kanssa punoitus, kuume, rakkulat tai haavaumat
(Stevens-Johnsonin oireyhtymä), vakava ihottuma kanssa punoitus, hilseily ja turvotus
ihon iho, joka näyttää kuin palovamma (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), punaiset
kyhmyt jaloissa (erythema nodosum), herkkyys auringonvalolle tai keinotekoiselle
aurionvalolle keinotekoinen valo (esimerkiksi solarium)
nivelkipu (artralgia), niveltulehdus (niveltulehdus), jäykät tai turvonneet nivelet,
lihaskipu (myalgia), systeeminen lupus erythematosus (SLE); jos sinulla on jo SLE , niin
voi Minocycline Aurobindo sitä pahentaa
tulehdus maksassa (hepatiitti) tai munuaisissa.

Haittavaikutukset jotka hyvin harvoin esiintyä (alle 1:stä 10 000:sta potilaasta)
tulehdus kielessä, suussa tai suolistossa, vaikeuksia niellä ,häiriintynyt ruoansulatus
ruoansulatus of vetinen ripuli, kuume ja kouristukset (pseudomembranoottinen koliitti)
akuutti munuaisten vajaatoiminta
muuttunut kilpirauhasen toiminta. Kerro sinun lääkärille milloin sinä huomaa että sinulla
on vaivaa saat aiheuttama yksi turvotus kohdalla kilpirauhanen tai jos sinulla kipu
niskassa tai kurkussa tunnet maksavaurio
,keltaisuus ((keltainen tulla ihon tai silmänvalkuaisen),tulehdus haiman
(haimatulehdus), poikkeavat maksakokeet . Muut.

Muut haittavaikutukset

ilmenivät sivuvaikutukset kaupallinen nimi päällä kanssa yksi hyvin pieni määrä potilaita, tarkka
esiintymistiheys on ei tiedossa:

alentuneet pitoisuudet alkaen vitamiini B, askorbiinihappo ja foolihappo
harhaluulot (hallusinaatio), kihelmöinti tai pistely käsissä ja jaloissa ,tunne huimauksesta
ja pyöräytyksestä (vertigo), heikentynyt (huimaus), vähentynyt makuaisti, kohtaukset,
uneliaisuus
verisuonitulehdus
heikentynyt kuulo, soiminen korvassa korva
maksatulehdus, koska immuunijärjestelmä hyökkää itseään vastaan maksa maksa
suuntaa (auto-immuuni hepatiitti)
luukipu, hauraus tai heikkous luissa luut
kivuliaat, sinipunaiset kyhmyt iholla (erythema nodosum). Ilmoittaminen

raportointi ilmoittaa alkaen haittavaikutuksia

Saatteko haittavaikutuksia, haittavaikutuksiaottakaa yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkiin.

Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkauselosteessa

pakkauseloste seistä. U voit sivuvaikutukset myös ilmoittaa kautta Alankomaiden

Sivuvaikutukset Keskus Lareb, verkkosivusto www.lareb.nl. Ilmoittamalla sivuvaikutukset

ilmoittaa ,autat sinä meitä saamaan lisää tietoa tiedot te saada yli turvallisuus tästä tämä lääke.

5. Kuinka säilytät sinä tämä lääke?

Tälle tämä lääke on on ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Pidettävä näkyvyyden ja ulottumattomissa alkaen lasten ulottumattomissa.

Älä käytä tätä lääkettä enää viimeisen käyttöpäivän de jälkeen viimeinen käyttöpäivä. Se on löydettävissä pakkauksesta merkinnän jälkeen "Exp.". Siinä on kuukausi ja vuosi . Viimeinen päivä kyseisestääkuukaudesta on viimeinen käyttöpäivä kyseisen kuukauden aikana viimeinen viimeinen käyttöpäivä. Kysy jos epäilet säilyvyydestä säilyvyys sinun apteekkari.

Älä huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin tai WC:hen ja heitä pois ne ei in de roskakori. Kysy sinun apteekkariltasi mitä sinun pitää tehdä lääkkeillä jotka ovat ei enää tarpeellisia ovat . Jos sinulla onlääkkeitä oikeassa paikassa säilytetty tapa poistaa tulla ne yksi oikea tapa hävitetty ja päätyvät ne ei ympäristöön ..

6. pakkauksen pakkauksen ja ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät tähän lääkkeeseen ?Vaikuttava

aine tässä lääkkeessä on minosykliinihydrokloridi. Minocycline Aurobindo 50 ja 100 mg, päällystetyt tabletit 100 mg, kunnioitus tabletit sisältävät per tabletti vastaavasti 50 ja 100 mg minosykliinipohjaa.

Muut aineet tässä lääkkeessä ovat : polyvidoni: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinenselluloosa, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, metyyliiselluloosa, makrogoli 6000, keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171).

Miltä näyttää Minocycline Aurobindo ja mitä se sisältää mitä se sisältää yksi pakkaus?

Minocycline Aurobindo 50 mg: pyöreät vaaleankeltaiset, kuperat tabletit.

Minocycline Aurobindo 100 mg: pitkänomaiset vaaleankeltaiset, kuperat tabletit.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 päällystettyä tablettia 3 läpipainopakkaukset (PVC/PVDC/Al) à 10 kappaletta.

Minosykliini Aurobindo 100 mg: 30 päällystettyä tablettia 3 läpipainopakkauksessa (PVC/PVDC/Al) à 10 kappaletta.

Haltija luvan myöntämiseen varten in de kauppa tuoda markkinoille ja valmistaja Luvan haltija

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Valmistaja

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minosykliini Aurobindo 50 mg, päällystetyt tabletit on rekisterissä rekisteröity alla RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, päällystetty tabletit on rekisterissä rekisteröity alla RVG 22099.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty syyskuussa 2024 Lisää syyskuu 2024

Lisää tietoa yli tästä lääkkeestä voit u löytää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen arvioinnista alkaen lääkkeistä, www.cbg-meb.nl.

Transtoyou