

## NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

### Minocycline Aurobindo 50 et 100 mg, enrobées comprimés minocycline chlorhydrate

Lisez attentivement toute la notice avant que vous preniez ce médicament, car il contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Peut-être aurez-vous besoin de lui plus tard à nouveau .. encore des questions ? Contactez alors votre pharmacien.

Ne donnez ce médicament pas à d'autres, car il est seulement à vous prescrit. Il peut être nocif pour être pour d'autres, aussi déjà ont-ils les mêmes symptômes que vous.

Avez-vous beaucoup de gêne due à un des effets secondaires mentionnés dans la section 4 figurent? Ou avez-vous un effet secondaire qui n'est pas cette notice mentionné? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

#### Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Minocycline Aurobindo et pourquoi est ce médicament utilisé?
2. Quand ne devez-vous pas ce médicament utiliser ou devez-vous faire particulièrement attention avec sont?
3. Comment utilisez-vous ce médicament?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez-vous ce médicament?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Minocycline Aurobindo et à quoi sert ce médicament ? La minocycline est

un semi-synthétique tétracycline dérivé. C'est un oral efficace antibiotique qui est utilisé pour le traitement des infections, maladies sexuellement transmissibles et actinomycose (infection par un certain type de champignon).

La minocycline est destinée au traitement des infections des voies respiratoires, le tractus gastro-intestinal, les voies urinaires, la peau, ainsi que gorge, nez - dans les otites, causées par des micro-organismes sensibles à la minocycline. La minocycline peut également être utilisée dans le traitement de maladies sexuellement transmissibles, infections fongiques ou charbon chez les patients qui sont allergiques à la pénicilline.

#### 2. Quand ne devez-vous pas ce médicament utiliser? Devez-vous être particulièrement prudent avec être?

Quand ne devez-vous pas ce médicament utiliser?

La minocycline ne doit pas être appliquée chez:

patients qui sont allergiques à la minocycline ou à un des composants de ce médicament. Ces composants pouvez-vous trouver dans la rubrique 6 en cas d'une aggravation sévère de la fonction hépatique pendant la grossesse et l'allaitement de nourrisson chez les enfants de moins de 8 ans.

#### Quand devez-vous faire attention avec ce médicament?

Minocycline comprimés enrobés doivent uniquement sous surveillance médicale surveillance à être administré aux les groupes de patients suivants : patients avec insuffisance hépatique et rénale patients avec troubles de la coagulation sanguine patients qui souffrent de à le syndrome de Ménière.

Il est possible que il pendant l' utilisation de la minocycline une infection se produise, qui est causée par organismes qui ne sensibles sont à la minocycline.

En cas de traitement prolongé , il est conseillé de faire régulièrement des contrôles de l'hémogramme, de la fonction hépatique et rénale de à effectuer, notamment chez les patients avec une mauvaise fonction hépatique ou rénale.

En cas de infections causées par des organismes qui ne sont pas sensibles sont pour minocycline et problèmes de peau (se manifeste se comme coup de soleil), doit la administration être arrêtée ..

apparition de de vertiges peut le souhaitable être la posologie à ajuster ,en cas de le apparition de troubles de l'équilibre troubles de l'équilibre en cas de symptômes symptômes, comme diplopie, hallucinations et taches sombres dans le champ visuel, le traitement par minocycline doit être interrompu .. est offert, surtout chez les patients souffrant de le syndrome de Ménière (certain trouble de le organe de l'équilibre).

En cas de apparition de sévère diarrhée accompagnée en cours avec fièvre pendant le traitement doit le traitement être interrompu ..

peuvent la coagulation affecter influencer. In rapport avec cela doit l'application de tétracyclines, chez les patients avec trouble de la coagulation sanguine, prudemment être effectuée. Si on hypersensible est pour minocycline, semble on cela souvent aussi être être pour composés apparentés (par ex. doxycycline).

Administration de isotrétinoïne doit à être évités avant, pendant et après traitement avec minocycline.

Une prudence est requise en cas de lupus systémique érythémateux (LES, (Lupus érythémateux disséminé, un certain auto-immunité) ou lorsque cela se développe; cela est caractérisé par éruption cutanée (surtout au visage), perte de cheveux, fièvre, un sentiment de malaise être et maladie et douleur articulaire. La prise de minocycline peut un déficit en vitamine B, acide ascorbique et acide folique provoquer et peut tests de laboratoire influencer.

Minocycline peut la fonctionnement de la thyroïde modifier; ceci est caractérisé par un gonflement au niveau de la thyroïde ou douleur dans le cou ou la gorge.

Consultez votre médecin si un des avertissements ci-dessus pour vous de application est ou que dans le passé a été été.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez vous en plus de Minocycline Aurobindo encore autres médicaments, avez vous cela récemment fait ou existe la possibilité que vous dans le proche avenir autres médicaments allez prendre utiliser? Dites le alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux médicaments pour lesquels vous n'avez pas d'ordonnance pour besoin.

Un interaction peut se produire lors de l'utilisation simultanée de minocycline et un certain autres médicaments ,tels que ::

pénicillines médicaments  
pénicillines

antiacides médicaments pour l'estomac, ceux-ci réduisent l'absorption de la minocycline  
préparations de fer, ceux-ci réduisent l'absorption de la minocycline  
charbon actif en échangeurs d'ions, ces réduisent l'absorption de la minocycline  
isotrétinoïne.

#### Grossesse, allaitement et fertilité

Êtes-vous enceinte, pensez-vous que vous enceinte à être, voulez-vous enceinte devenir ou donnez vous allaitement? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant de médicaments utiliser.

#### Grossesse

Minocycline ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

#### Allaitement

Lors de l'utilisation de la minocycline il ne faut pas donner l'allaitement ..

#### Aptitude à la conduite en le usage de machines

Étant donné les possibles troubles de l'équilibre et problèmes avec la vision, que la minocycline peut provoquer, la prudence est recommandée chez le conduite de véhicules ou la manipulation de machines.

#### Minocycline Aurobindo contient lactose

Si votre médecin vous a informé que vous certains sucres ne tolère, contactez votre médecin avant de ce médicament prendre.

#### Minocycline Aurobindo contient sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, qui veut dire que il en essence "sans sodium" est.

### 3. Comment utilisez vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme votre médecin ou pharmacien vous que a dit raconté. Hésitez -vous sur le bon emploi? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Votre médecin va un personnalisé, à vos symptômes adaptée, dosage prescrire.

#### Dosage

Commencer et thérapie d'entretien: 50 mg toutes les 12 heures.

La thérapie doit être continué pendant 4-6 4-6 ..

#### infections graves Adultes

: 200 mg comme dose initiale dose initiale suivi par 100 mg toutes les 12 heures . En. Dans de nombreux cas peut une posologie de 200 mg le premier jour, suivie de une dose quotidienne de 100 mg, être suffisante .. : Chez les enfants enfants de 9 à 12 ans est la dose initiale habituelle 100 à 200 mg, suivie par une dose de 50 à 100 mg, toutes les 12 heures. Cette posologie correspond à 2 à 4 mg/kg par jour. La minocycline ne doit pas être prescrite aux enfants de moins de 8 ans.

### Infections aux les voies urinaires

Lors du traitement des infections aux les voies urinaires chez l'homme la dose initiale est de 200 mg, suivie de 100 mg toutes les 12 heures ,, pendant minimum 4 jours et suivi par un contrôle semaine 2-3 jours après le traitement. Une dose unique de 200 à 300 mg s'est avéré pôle dans plus de 90% des cas efficace à être. Pour des raisons de commodité ou en cas de difficultés de contrôle peut donc cette thérapie par dose unique être appliquée.

Pour adultes femmes avec des infections urinaires est parfois un plus prolongé traitement nécessaire (10 jours).

Les tétracyclines ont l' avantage simultanément efficace à être contre le bactéries de «non spécifiques infections urinaires» réduisant la prévalence des post-infections urinaires est réduite. La posologie pour ces aiguës infections est 100 mg par jour. La thérapie doit être poursuivie pendant 1 1 3 3 ,après le de caractéristiques symptômes ou la fièvre sont disparus. Chez les patients avec une fonction rénale réduite doit la dose être ajustée .. Patients avec un grave réduite fonction hépatique peuvent, seulement si cela ne peut pas, minocycline prescrite recevoir.

### Mode d' administration

Les comprimés doivent avec beaucoup d'eau être pris pour éviter l'irritation de l' œsophage pour éviter. Après la prise vous ne devez pas immédiatement vous allonger être allongé. Le comprimés peuvent pendant le repas et éventuellement aussi avec lait être pris ,si la prise provoque des maux d'estomac cause.

### Ajustements de dosage

Bij problèmes d'équilibre ou difficultés de la vision la posologie doit être ajustée ..

se passe-t-il s'il y a des er soudainement arrêté est avec l' utilisation du médicament

Si vous la par votre médecin prescrite cure ne terminez pas, peut être être que l' infection n'est pas complètement disparue et revient ..

### Avez -vous pris trop de ce médicament ??

Si vous soupçonnez un surdosage grave, vous devez arrêter l'utilisation de Minocycline Aurobindo et contacter votre médecin. à prendre avec votre médecin.

Symptômes de surdosage qui peuvent se produire sont: lésions hépatiques avec symptômes tels que vomissements, fièvre, jaunisse, ecchymoses, sang contenant noir de jais selles et perte de liquide.

Le traitement d'un surdosage consiste en : faireboire ,provoquer le vomissement induire, lavage gastrique (en cas de grandes quantités), laxatif. Administrer des antiacides pour réduire l' absorption réduire.

### oublié ceci ce médicament dans prendre prendre?

Prenez la dose quand même lorsque vous découvrez que vous oublié avez de le prendre à prendre, sauf si vous venez de le découvrir quand il est temps de prendre votre prochaine dose. Dans ce dernier cas vous devez prendre la dose oubliée ne pas extra prendre, mais simplement votre schéma continuer suivre. Il est important de comprimés selon schéma en à prendre. Consultez en cas de doute votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre ce médicament Votre médecin

a indiqué combien de temps vous devez utiliser la minocycline devez utiliser minocycline utiliser. Arrêtez le traitement pas prématurément sans avec votre médecin consulter ..

-vous d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament ? ce médicament? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

#### 4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut aussi ce médicament avoir des effets indésirables. Pas tout le monde reçoit avec cela à faire.

Arrêtez immédiatement de prendre les comprimés et cherchez immédiatement une aide médicale ,si vous ressentez un problème reçoit de la suivant:

allergiques réactions (anaphylaxie, hypersensibilité): pétéchies, ecchymoses et décoloration de la peau (purpura), choc, tachetée peau (exfoliative dermatite), augmentation du nombre globules blancs et un ou plusieurs des symptômes  
symptômes: du foie (hépatite), pneumonie pneumonie qui est causée par une infection (pneumonite), inflammation des reins ,inflammation du myocarde (myocardite) ou du péricarde (péricardite), fièvre ,gonflement gonflé ganglions lymphatiques  
lupus-like syndrome: le présence de anticorps antinucléaires anticorps dans le sang, douleurs articulaires (arthralgie), raideur ou gonflement des articulations en un de plusieurs des suivants symptômes: fièvre, douleurs musculaires (myalgie), hépatite (hépatite), éruption cutanée, inflammation du vaisseaux sanguins  
semblable à la maladie sérique syndrome: fièvre, démangeaisons éruption cutanée, éruption cutanée, douleur articulaire (arthralgie), inflammation articulaire (arthrite), raideur de gonflement des articulations, augmentation nombre globules blancs dans le sang  
pression intracrânienne élevée pression intracrânienne: ,problèmes de la vision vision, comme flou voir, «taches» aveugles, double vision, perte permanente de vue. Chez les enfants , le crâne peut se bomber  
croissance de bactéries qui insensibles sont à la tétracycline : inflammation des intestins, inflammation de la langue et de la bouche, inflammation de la féminins organes génitaux (provoque démangeaisons), douleur lors de la miction, irritation au siège ,estomac ballonné développement  
ou de aggravation de lupus systémique érythémateux (SLE), symptômes incluent grandes zones avec des taches sur la peau, perte de cheveux, perte de poids, douloureux articulations et fièvre  
symptômes de lésions hépatiques: fatigue, faiblesse, perte d' appétit, perte de poids, douleur abdominale, fièvre  
changé couleur de la peau, ongles, dents, muqueuses de la bouche, os, thyroïde, yeux, lait maternel, larmes ou sueur (hyperpigmentation).

Consultez votre médecin si les suivants effets secondaires se produisent:

Effets secondaires qui parfois se produisent (chez 1 à 10 sur 1000 patients)

changements dans le nombre et types de cellules sanguines  
éruption cutanée qui peut démanger avec ou sans pâle ou rouge nodules dans la peau,  
gonflement du visage, lèvres, langue ou gorge  
fièvre.

Effets secondaires qui rarement surviennent (chez 1 jusqu'à 10 sur 10.000 patients)  
plus bleus plaies, saignements de nez, angine, infections, fatigue extrême,  
essoufflement à l'effort ou inhabituel pâleur de la peau. Votre médecin peut vous  
demander de faire un test sanguin pour faire  
vertiges, maux de tête  
nausées, diarrhée, vomissements, perte de l'appétit, sous-développement de l' émail  
dentaire, inflammation de l' œsophage  
infection fongique sur votre fessier, organes génitaux ou de la bouche, inflammation  
des masculins organes génitaux  
augmentation des taux d'urée dans le sang  
perte de cheveux, réactions cutanées y compris taches rouges (érythème polymorphe),  
graves grave réactions cutanées avec rougeur, fièvre, ampoules ou ulcères (syndrome  
de Stevens-Johnson ), éruption cutanée sévère avec rougeur , desquamation et  
gonflement en gonflement de la peau, qui ressemble à une brûlure (nécrolyse  
épidermique toxique), des boutons sur les jambes (érythème noueux), sensibilité à la  
lumière du soleil ou artificielle lumière (par exemple solarium)  
douleur articulaire (arthralgie), inflammation articulaire (arthrite), raide ou gonflés  
articulations, douleur musculaire (myalgie), systémique lupus érythémateux (SLE); si  
vous souffrez déjà avez de SLE, alors peut Minocycline Aurobindo cela aggraver  
inflammation du foie (hépatite) ou des reins.

Effets secondaires qui très rarement survenir (chez moins de 1 sur 10 000 patients)  
inflammation de la langue, bouche ou intestins, difficulté à avaler, digestion perturbée  
de aqueuse diarrhée, fièvre et crampes (pseudomembraneuse colite)  
aiguë insuffisance rénale  
fonction thyroïdienne altérée fonction thyroïdienne. votre médecin lorsque vous vous  
remarque que vous souffrez d'une d'un gonflement de la thyroïde ou si vous ressentez  
douleur dans le cou ou la gorge sentez  
insuffisance hépatique, jaunisse (jaune devenir de la peau ou le blanc de l'œil),  
inflammation du pancréas (pancréatite), anomalies des tests de la fonction hépatique.

#### Autres effets secondaires

Autres effets secondaires sont survenus sur chez un très petit nombre de patients, le  
fréquence précise est inconnue ::

réduits de vitamine B, acide ascorbique et en acide folique  
délires (hallucination), picotements ou douleurs aiguës dans les mains et pieds,  
sensation de vertiges et étourdissements (vertige), réduit sens du goût, convulsions,  
sommolence  
inflammation des vaisseaux sanguins  
diminution audition, bourdonnement dans l' oreille  
inflammation du foie, en raison du système immunitaire se contre le foie dirige (auto-  
immun hépatite)  
douleur osseuse, fragilité ou faiblesse des os  
douloureux, nodules bleu-rouge dans la peau (érythème noueux). Le

signalement signaler de effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires , contactez alors votre médecin ou pharmacien .

Cela s'applique également pour d'éventuels effets secondaires qui ne sont pas dans cette  
notice se trouvent. Vous pouvez effets secondaires également signaler via le Néerlandais

Effets secondaires signalant les effets secondaires, vous aidez à nous à obtenir plus d'informations. Informations te obtenir sur la sécurité de ce médicament.

#### 5. Comment conservez-vous ce médicament?

Pour ce médicament il y a ou aucune spéciales conditions de conservation.

Hors de la vue et portée des enfants garder.

N'utilisez ce médicament plus après la date limite date de péremption. Elle est à trouver sur l'emballage après « Exp. : ». Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est le ultime date de péremption. Consultez en cas de doute sur la péremption votre pharmacien.

Ne jetez médicaments pas dans l'évier ou les toilettes et jetez les ne dans le poubelle. Demandez votre pharmacien ce que vous devez faire avec médicaments devez faire qui ne plus nécessaires sont. Si vous médicaments de la bonne manière évacue être elles sur un correcte manière détruites et n'entrent elles pas dans l'environnement finalement.

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles substances contiennent ce médicament ? La

substance active dans ce médicament est le minocycline chlorhydrate. Minocycline Aurobindo 50 et 100 mg, comprimés enrobés. Minocycline comprimés contenir par comprimé respectivement 50 et 100 mg de base de minocycline.

Les autres substances dans ce médicament sont: povidone, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, colloïdal silice, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 6000, jaune oxyde de fer (E172), dioxyde de titane (E171).

Comment se présente Minocycline Aurobindo et que contient que contient-il un emballage?

Minocycline Aurobindo 50 mg : rond jaune clair, biconvexe comprimés.

Minocycline Aurobindo 100 mg : oblongs jaune clair, biconvexe comprimés.

Minocycline Aurobindo 50 mg : 30 comprimés enrobés dans 3 dans 3 plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Al) à 10 pièces.

Minocycline Aurobindo 100 mg : 30 comprimés enrobés comprimés en 3 plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Al) à 10 pièces.

Titulaire de l'autorisation de dans le commercialisation mettre et fabricant Titulaire de l'autorisation

Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1  
3741 LN Baarn

Fabricant

Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1  
3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, comprimés enrobés est inscrit au registre enregistré sous RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, enrobées comprimés est inscrit au registre enregistré sous RVG 22099.

Cette notice a été pour la dernière approuvée en septembre 2024

Plus information sur ce médicament pouvez vous trouver sur le site web du Collège pour l'évaluation des médicaments, [www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl).

Transtoyou