

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Minocycline Aurobindo 50 ir 100 mg, dengtos tabletės minociklino hidrochloridas

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą pradėsite vartoti, nes jame yra svarbi informacija in jums .

Laikykite šį pakuotės lapelį. Galbūt jums jo vėliau vėl prireiks.

Jei turite klausimų ? Tada susisiekite susavo jūsų meno vaistininkas.

Duokite šio vaisto ne kitiems žmonėms , nes jis yra tik jums paskirtas . Jis galibūti kenksmingas būti kitiems yra už kitiems, taip pat jau turi jie tuos pačius simptomus kaip jūs.

Jei jūs daug kenčiate nuo vieno iš šalutinių poveikių kurie yra skyriuje 4 nurodyta? Ar gaunate jūsų šalutinį poveikį kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekite susavo gydytoju arba vaistininku ..

šio lapelio ši pakuotės lapelis

1. Kas yra Minocycline Aurobindo ir kam yra šis vaistas naudojamas?
2. Kada jums šio vaisto negalima vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo yra?
3. Kaip naudojate jūs šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikote jūs šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir sudėtis kita informacija

1. Kas yra Minocycline Aurobindo ir kam šis vaistas naudojamas ?Minociklinas yra

pusiau sintetinis tetraciklinoderivatas . Tai yra geriamasvaistas oralinis vaistas veiksmingas antibiotikas kuris naudojamas yra gydymui de gydymas nuo infekcijų, lytiškai plintančių ligų ir aktinomikozės (infekcija su tam tikra rūšimi tipas grybelis).

Minociklinas yra skirtas už de gydymui nuo infekcijų kvėpavimo takų, virškinimo trakto, šlapimo takų, odos, taip pat gerklės, nosies- ausų infekcijos, sukeltos per minociklinui jautrių mikro-organizmų. Minociklinas gali taip pat būti naudojamas taikomas gydymui de gydymas nuo lytiškai plintančios ligos, grybelinės infekcijos arba juodligė pas pacientus kurie alergiški yra penicilinui penicilinas.

2. negalite šio vaisto vartoti ne naudoti iš turite jūs papildomai atsargus su būti?

Kada galite šį vaistą ne vartoti?

Minociklinas neturi būti taikomas būti taikomas prie:

pacientams kurie alergiški yra minociklinui arba minociklinui arba kurie kurie iš medžiagų šiame šiame vaistiniame preparate. Šios medžiagos galite jūs rasti j skirsnis 6
prie vienas rimtas pablogėjimas kepenų funkcijos
prie nėštumas ir žindymas duoti nuo žindymas
prie vaikai iki de 8 metai.

Kada turite būti papildomai atsargūs būti su šiuo vaistu?

Minociklinas dengtos tabletės turi tik griežtai prižiūrint medicinos priežiūra j būti skiriama j de šioms pacientų grupėms:

- pacientai su kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimais
- pacientai su sutrikimais kraujo krešėjime
- pacientai kurie kenčia prie sindromo Ménière. Tai yra

galima kad per vartojimą minociklino infekcija atsiranda , kuri sukelia organizmai pasireiškia, kurie yra sukelia per organizmai kurie nėra jautrūs yra minociklinui. Ilgesnės trukmės terapijos metu rekomenduojama reguliariai tikrinti kraujo vaizdą, kepenų ir inkstų funkciją. ir inkstų funkcija iš vykdyti , ypač pas pacientus su prasta kepenų ar inkstų funkcija . Esant.

sukeltoms organizmų kurie nėra jautrūs mirti ne jautrus yra dėl minociklinas ir odos problemos (pasireiškia kaip saulės nudegimas),turi būti vartojimas nutrauktas . Atsiradus.

Kai veikimas nuo galvos svaigimas gali tas būtina būti de dozę prie pakeisti ,kai prie pasireiškia pasireiškimas pusiausvyros sutrikimai pusiausvyros sutrikimai kai simptomai simptomai, kaip dvejinimasis akyse, haliucinacijos ir tamsios dėmės regėjimo lauke, reikia nutraukti gydymą minociklinu turi būti nutrauktas. Atsargumas yra nurodyta, ypač pas pacientus sergančius nuo tas Meniere'o sindromo (tam tikrassutrikimas vidinės ausies tai pusiausvyrosorgano). Atsiradus nuo sunkiai viduriavimas lydymas vykstantis su karščiavimu gydymo metu de terapija reikia de terapiją nutraukti turi būti nutraukta.

Tetraciklinai gali de kraujo krešėjimą paveikti. In ryšys su tuo turi taikymas tetraciklinų, pas pacientus su sutrikimu kraujo krešėjime, atsargiai būti vykdomas. Jei asmuo padidėjęs jautrumas yra skirta minociklinas, pasirodo žmonės tai dažnai taip pat būti yra skirta susijusiems junginiams (pvz. doksiciklinas).

Vartojimas izotretinoino turi ingredientas te turi būti vengiama prieš, per ir po gydymo su minociklinu.

Papildomas atsargumas yra reikalingas esant esamai sisteminei lupus eritematozei (SLE, viena tam tikra auto-imuninė liga) arba kai tai išsivysto ;tai būdingas odos bėrimas (ypač veide),ypač j veidas), plaukų slinkimas, karščiavimas, jausmas pojūtis nuo negerai būti ir liga ir sąnarių skausmas. Vartojimas minociklino gali sukelti trūkumą vitaminų vitaminas B, askorbo rūgštis ir folio rūgštis sukelti ir gali laboratorinius tyrimus paveikti.

Minociklinas gali de poveikį skydliaukės funkcijai pakeisti; tai yra būdingas dėl patinimas prie skydliaukės arba skausmas kakle ar gerklėje. Kreipkitės kakle arba gerklėje.

gydytoją jei vienas iš aukščiau paminėtų įspėjimų dėl už jūs nuo taikymas yra arba kad praeityje buvo yra buvęs.

Vartojate jūs dar kitus vaistus?

Vartojate jūs be Minocycline Aurobindo dar kiti vaistai, ar jūs tai neseniai padarėte ar yra galimybė kad jūs artimoje ateityje kitus vaistus vartosite kiti vaistai naudoti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojui arba vaistininkui. Tai taikoma taip pat vaistams kuriems jūs neturite recepto reikia už reikalingas turi.

Vienas sąveika gali pasireikšti vartojant vienu metu naudojimą minociklino ir kai kurių kitų vaistų ,tokių kaip ::

- penicilinai vaistai
- penicilinai
- rūgštis surišančios priemonės skrandžiui de skrandis, šios sumažina de absorbciją minociklino
- geležies preparatai, šios sumažina de absorbciją minociklino

aktyvinta anglis en jonų mainikliai, šis mažina de absorbciją minociklino izotretinoino.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Ar esate nėščia, manote jūs nėščia būti yra, norite nėščia tapti ar maitinate jūs krūtimi? Tada susisiekite su savo gydytoju ar vaistininku prieš jūs vaistus vartojate.

Nėštumas

Minociklinas neturi būti naudojamas nėštumo metu . Žindymas.

minocikliną

neturėtų būti žindoma . Vairavimo gebėjimas gali būti.

Vairavimo gebėjimas It tai naudojimas mašinų

Atsižvelgiant į galimus pusiausvyros sutrikimus ir problemas su regėjimu, kurias minociklinas gali sukelti, yra atsargumas rekomenduojamas prie vairuojant transporto priemones arba valdyti mašinas. Minocycline Aurobindo turi

laktozės Jei jūs

gydytojas jums pranešė kad jūs turite tam tikrus cukrus tam tikras cukrūs ne toleruoja, susisiekite su jūsų gydytoju prieš jūs šį vaistą vartojate.

Minocycline Aurobindo turi natrio

Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje tabletėje, tai reiškia sakyti kad tai iš esmės „be natrio“ yra.

3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jūs kad pasakė jums. Abejokite jūs dėl teisingo naudojimo? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Jūsų gydytojas pasakys vienas asmeninis, prie jūsų skundų pritaikytas, dozavimas išrašyti.

Dozavimas

Pradžią ir palaikomoji terapija: 50 mg kas 12 valandų.

Terapija terapija turi būti tęsiamas per 4-6 4-6 ..

sunkioms infekcijoms Suaugusieji

: 200 mgkaip pradinė dozė pradinė dozėpo to 100 mg kas 12 valandų kas 100 mg kas 12 Esant. In daugeliu atvejų gali viena dozė 200 mg pirmąją dieną ,po kurios skiriama dienos dozė 100 mg, pakankama būti .. : Vaikamsvaikams vaikai nuo 9 iki 12 metų sudaro de įprastinė pradinė dozė 100 iki 200 mg, po kurios per skiriama dozė nuo 50 iki 100 mg, kas 12 valandų. Ši dozė atitinka 2 iki 4 mg/kg per dieną . Minociklinas neturi būtiskiriamas vaikams iki paskirtas metų . Infekcijos 8 metai.

Infekcijos prie šlapimo takų

Gydant infekcijas šlapimo takų prie šlapimo takų vyrams dozė yra pradinė 200 mg, po kurios 100 mg kas 12 valandų ,, per minimum 4 dienų ir po per kontrolė savaitę 2-3 dienos po de

gydymo. Vienkartinė dozė dozavimas 200 iki 300 mg pasirodė in daugiau nei 90% atvejų veiksmingas būti yra. Patogumui arba esant kontrolės sunkumams gali todėl ši vienkartinė dozė terapija būti taikoma.

Dėl suaugusieji moterys su ūminėmis šlapimo takų infekcijomis yra kartais reikalinga daugiau ilgalaikė terapija reikalinga (10 dienų).

Tetraciklinai turi pranašumą vienu metu veiksmingi veiksmingas te yra prieš de bakterijas „ne specifinių šlapimo takų infekcijų“, dėl ko tas pasireiškimas po-šlapimo takų infekcijų yra sumažintas. Dozavimas skirtas šių ūminės infekcijos sudaro 100 mg per dieną. Gydymas terapija turi būti tęsiamas trukmę 1 iki 3 dienas, po kai charakteristika simptomai arba karščiavimas yra išnykę.

Pacientams pacientams su sumažėjusia inkstų funkcija reikia dozę dozė pritaikyti būtina. Pacientai su vienu sunkiai sumažėjusia kepenų funkcija gali, tik jei tai ne kitaip gali, minociklinas paskirtas gauti.

Vartojimo būdas paskyrimas

De tabletės turi su daug vandens būti vartojamos kad išvengti dirginimo stemplės stemplės kad išvengti. Po vartojimo negalima nedelsiant eiti eiti gulėti. De tabletės gali valgio de metu ir jei reikia taip pat su pienu būti vartojamos, jei de vartojimas skrandžio sukelia.

Dozavimo koregavimai

Esant pusiausvyros sutrikimams arba sunkumams su regėjimu reikia dozę koreguoti . Kas atsitinka jei.

Kas atsitinka yra kaip yra staiga nutrauktas tampa su vartojimu vaisto vaistas

Jei jūs gydytojo jūsų gydytojas išrašytą kursą nebaigiate ,gali tai būti yra kad infekcija ne visiškai išnyko yra ir vėl sugrįžta ..

jūs per daug šio vaisto išgėrėte ? išgertas?

Jei jūs įtariate sunkų perdozavimą ,turite nutraukti Minocycline Aurobindo vartojimą

Minocycline Aurobindo susisiekti su savo gydytoju. te vartoti su jūsų menas.

Simptomai nuo perdozavimo kurie gali pasireikšti yra :: su simptomais tokiais kaip vėmimas ,karščiavimo priepuoliai karščiavimo priepuoliaigelta ,kraujosruvos kraujosruvos, kraujas turintis juodai išmatos ir skysčių netekimas.

Gydymas perdozavimo yra iš vandens gėrimo :sukelti vėmimą, sukelti vėmimą, skrandžio plovimas (esant didelėms kiekiais), vidurių laisvinimas. Rūgštį neutralizuojančios priemonės skirti siekiant absorbciją sumažinti sumažinti.

pamiršote tai šis vaistas į išgerti vartoti?

Išgerkite dozę vis tiek į kai jūs pastebite kad jūs pamiršote sulenktas šį į išgerti vartoti, nebent jūs tik atradote kai tai laikas yra kitai jūsų dozei . Jeitai paskutinis atvejis turite jūs pamirštą dozę dozė ne papildomai vartoti, bet tiesiog jūsų grafiką toliau laikytis. Svarbu svarbu tabletes tabletes pagal grafiką vartoti vartoti. Pasitarkite su atvejis iš abejonės jūsų gydytojas.

Jei jūs nustojate vartoti šį vaistą Jūsų gydytojas

nurodė kiek laiko jums minocikliną reikia vartoti kiek laiko minocikliną turi naudoti. Nustokite gydymą ne per anksti be su jūsų gydytoju pasitarti ..

jūs dar kitų klausimų apie vartojimą šio vaisto ? vaistas? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinį poveikį turėti. Ne kiekvienas gauna su tuo susidurti ..

nutraukite vartojimą tablečių ir kreipkitės nedelsiant medicininės pagalbos , jei jums pasireiškia simptomai u paskutinį gauna iš sekantis:

alerginės reakcijos (anafilaksija, padidėjęs jautrumas): petechijos, mėlynės ir odos spalvos pokyčiai (purpura), šokas, dėmėtas dėmėtas oda (eksfoliacinis dermatitas), padidėjimas iš skaičiaus baltųjų kraujo kūnelių ir vienas arba daugiau iš šių reiškinų: kepenų uždegimas (hepatitas), plaučių uždegimas plaučių uždegimas kuri sukelia sukeltas dėl infekcijos infekcija (pneumonitas), uždegimas inkstų inkstai, uždegimas širdies raumens širdies raumuo (miokarditas) arba širdiplėvės (perikarditas), karščiavimas, patinę limfmazgiai

vilkligės tipo sindromas: de buvimas van antinuklearinių antikūnų kraujyje kraujyje, sąnarių skausmas (artralgija), sustingimas arba patinimas sąnarių sąnarių en vienas iš daugiau iš šiuos simptomus: karščiavimas, raumenų skausmas (mialgija), kepenų uždegimas (hepatitas), odos bėrimas, uždegimas iš kraujagyslės

seruminės ligos tipo sindromas: karščiavimas, niežtintis odos bėrimas, odos bėrimas, sąnarių skausmas (artralgija), sąnarių uždegimas (artritas), sustingimas iš patinimas iš sąnarių, padidėjęs skaičius baltųjų kraujo ląstelių kraujyje kraujas padidėjęs kaukolės spaudimas: galvos skausmas, problemų su regėjimu, kaip neryškus matymas, "aklos" dėmės, dvigubas matymas, nuolatinis regėjimo praradimas .

Vaikams gali kaukolė išsipūsti de kaukolė išsipūsti

augimas iš bakterijų kurios nejautrios yra tetraciklinui tetraciklinas: uždegimas žarnyno ,uždegimas liežuvio ir burnos , uždegimas burnos uždegimas iš moterų lytinių organų (sukelia niežulį), skausmas šlapinantis , dirginimas sėdmenų , sėdmenų , skrandžiosukilimas arba vystymasis

arba iš paūmėjimas nuo sisteminės raudonosios vilkligės (SRV), simptomai apima didelės sritys su raudonomis dėmėmis ant odos, plaukų slinkimas, svorio netekimas, skausmingi sąnariai ir karščiavimas

simptomai nuo kepenų pažeidimas: nuovargis, silpnumas, apetito praradimas nuo ,svorio netekimas svorio netekimas pilvo skausmas ,karščiavimas karščiavimas pakitusi spalva odos odos, nagai, dantys, gleivinės burnos burnos, kaulai, skydliaukė, akys, motinos pienas, ašaros of prakaitas (hiperpigmentacija).

Pasitarkite su savo gydytoju jei pasireiškia šios nepageidaujamos reakcijos ::

kurios kartais pasireiškia pasireiškimas (prie 1 iki 10 iš 1000 pacientų)

pokyčiai kraujo ląstelių skaičiuje ir tipuose
odos bėrimas kuris gali niežėti su arba be blyškios ar raudonos gumbeliai odoje oda, patinimas veido veidas, lūpos, liežuvis ar gerklė
karščiavimas.

Šalutinis poveikis kuris retai pasireiškia (pas 1 iki 10 iš 10.000 pacientų)

daugiau mėlynės ,nosies kraujavimas nosies kraujavimas gerklės uždegimas gerklės uždegimas infekcijos , ekstremalus nuovargis nuovargis dusulys fizinio krūvio metu arba

nejprastas blyškumas odos oda. Jūsų gydytojas gali jums paprašyti atlikti kraujo tyrimą
atlikti galvos svaigimas
galvos svaigimas galvos skausmas pykinimas
pykinimas, viduriavimas, vėmimas, apetito praradimas, nepakankamas vystymasis dantų
emalio dantų emalis stemplės uždegimas grybelinė infekcija ant
jūsų sėdmenų, sėdimoji dalis, lytiniai organai arba burna, uždegimas vyrų lytinių organų
padidėjęs šlapalo kiekis kraujyje kraujas
plaukų slinkimas, odos reakcijos įskaitant raudonas dėmes (daugiaformė eritema),
sunkus odos reakcijos su paraudimu, karščiavimu, pūslelėmis arba opomis (Stevens-
Johnsonso sindromas), sunkus odos bėrimas su paraudimu, pleiskanojimu ir patinimu iš
odos, kuri atrodo kaip nudegimas (toksinė epiderminė nekrolizė), raudoni gumbeliai ant
kojų (erythema nodosum), jautrumas saulės šviesai arba dirbtinei šviesai (pavyzdžiui
soliariumas)
sąnarių skausmas (artralgija), sąnarių uždegimas (artritas), sustingę arba patinę sąnariai,
raumenų skausmas (mialgija), sisteminė vilkligė eritematozė (SLE); jei jaučiate turite
SLE, tuomet gali Minocycline Aurobindo tai pabloginti
uždegimas kepenų (hepatitas) arba inkstų.

Šalutinis poveikis kuris labai retai pasireiškia (kai mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų)
liežuvio uždegimas, burnos ar žarnyno, sunku nuryti, sutrikęs virškinimas virškinimas iš
vandeningas viduriavimas, karščiavimas ir spazmai (pseudomembraninis kolitas)
ūmus inkstų nepakankamumas
pakitusi skydliaukės funkcija. Pasakykite savo gydytojui kai jūs pastebi kad jūs kenčiate
gaunate nuo patinimo prie skydliaukės arba jei jūs skausmą kakle ar gerklėje jaučiate
kepenų nepakankamumas,
gelta (gelta (geltona tapti odos arba akių baltymo), uždegimas kasos (pankreatitas),
nenormalūs kepenų funkcijos tyrimai. Kitos.

Kitos nepageidaujamos reakcijos
pasireiškė šalutinis poveikis prekyba ant prie labai mažo skaičiaus pacientų, tikslus dažnis nėra
žinomas: sumažėjęs:

B lygis, askorbo rūgštis ir ir folio rūgštis
kliesiai (haliucinacija), dilgčiojimas arba skausmo dūriai rankose ir pėdose, jausmas
jausmas galvos svaigimas ir sukimasis (vertigo), sumažėjęs sumažėjęs tastzin, traukuliai,
mieguistumas
kraujagyslių uždegimas
sumažėjęs klausos, spengimas ausyse
kepenų uždegimas, dėl to, kad imuninė sistema sukyla prieš kepenis kepenys nukreipia
(auto-imuninė hepatitas)
kaulų skausmas, trapumas arba silpnumas kaulų kaulų
skausmingi, mėlynai raudoni mazgeliai odoje (erythema nodosum). Pranešimas

apie pranešimą iš šalutinių poveikių

Ar jus vargina šalutiniai poveikiai, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip
pat ir galimiems šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame šiame pakuotės lapelyje stovėti. Jūs
galite šalutinis poveikis taip pat pranešti per Nyderlandų Šalutinio poveikio Centras Lareb,
svetainė www.lareb.nl. Pranešdami šalutinį poveikį pranešti, padedate jūs mums gauti daugiau
informacijos informacija te gauti apie saugumą šio šio vaisto.

5. Kaip laikote jūs šį vaistą?

Šiam šiam vaistui yra yra nėra specialių laikymo sąlygų.

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje ..

šio vaisto po pasibaigus galiojimo datai ant pakuotės galiojimo data. Ji yra rasti ant pakuotės po „Exp.:“. Ten nurodytas mėnuo ir metai . Paskutinė diena tomėnesio yra galiojimo pabaigos data . galiojimo data. Pasitarkite jei abejojate dėl galiojimo savo vaistininko.

Neleiskite vaistų ne per kriauklę ar WC ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurie ne daugiau reikalingi yra. Jei jūs vaistai tinkamoje vietoje būdas pašalina tampa jie ant vienas teisingas būdas sunaikinti ir ateina jie ne į aplinką patenka.

6. Turinys pakuotės pakuotės ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate vaistas yra minociklino hidrochloridas. Minociklinas Aurobindo 50 100 mg, dengtos tabletės tabletės sudėtyje yra per tabletę atitinkamai 50 ir 100 mg minociklino bazės.

Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra : polividonas: laktozės monohidratas, mikrokristalinė celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska, koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, metilhidroksipropilceliuliozė, makrogolis 6000, geltonas geležies oksidas (E172), titano dioksidas (E171).

Kaip atrodo Minocycline Aurobindo ir kas yra sudėtyje kas yra sudėtyje vienas pakuotė?

Minocycline Aurobindo 50 mg: apvalios šviesiai geltonos, iškilios tabletės.

Minocycline Aurobindo 100 mg: pailgos šviesiai geltonos, iškilios tabletės.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 dengtos tabletės 3 lizdinės plokštelės (PVC/PVDC/Al) po 10 vienetų.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 dengtos tabletės 3 lizdinės plokštelės (PVC/PVDC/Al) po 10 vienetų.

Laikytojas leidimo leidimo turėtojas į prekybą tiekti ir gamintojas Leidimo turėtojas

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Gamintojas

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minociklinas Aurobindo 50 mg, dengtos tabletės yra registre įrašytas po RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, dengtas tabletės yra registre įregistruotas po RVG 22099.

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas paskutinis rugsėjį į 2024 Daugiau

Daugiau informacija apie šį vaistą galite rasti svetainėje Nyderlandų vaistų vertinimo tarybos Vertinimas vaistų vaistų, www.cbg-meb.nl.

Transtoyou