

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Minocycline Aurobindo 50 og 100 mg, drasjerte tabletter minocycline hydrochloride

Les nøye hele pakningsvedlegget før du dette legemidlet skal bruke, for det inneholder viktig informasjon i for deg.

Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje trenger du det senere igjen ..
du flere spørsmål ? Ta da kontakt med din arts of apotek.

Gi dette legemidlet ikke videre til andre, fordi det er kun til deg foreskrevet. Det kan
være skadelig for for andre, også allerede har de samme plager som deg.

Får du mye ubehag fra en av de bivirkningene som i avsnitt 4 står? Eller får du en
bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget står? Ta da kontakt med din lege eller
apotek.

Innhold av dette pakningsvedlegg

1. Hva er Minocycline Aurobindo og hva brukes denne medisinen til?
2. Når kan du ikke bruke denne medisinen eller må du være ekstra forsiktig med er?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innhold av pakken og andre informasjon

1. Hva er Minocycline Aurobindo og hva brukes dette legemidlet til?

Minocycline er et halv-syntetisk tetracyklin- derivat. Det er et oralt virksom antibiotikum som
brukes for behandling av infeksjoner , kjønnssykdommer og aktinomykose (infeksjon med en
bestemt type soppl).

Minocycline er beregnet for den behandling av infeksjoner i luftveiene, mage-tarmkanalen,
urinveiene, huden, samt hals-, nese- en øreinfeksjoner, forårsaket av for minocycline sensitive
mikro-organismer. Minocycline kan også bli brukt ved behandling av fra kjønnssykdommer,
soppinfeksjoner eller miltbrann hos pasienter som er allergiske mot penicillin penicillin.

2. kan du dette legemidlet ikke bruke av må du være ekstra forsiktig med være?

Når kan du ikke dette legemidlet ikke bruke?

Minocycline skal ikke bli brukt anvendt ved:

- pasienter som allergisk er for minocycline eller for en av de stoffene i denne medisinen.
- Disse stoffene kan du finne i rubrikk 6
- ved en alvorlig forverring av leverfunksjon
- ved graviditet og det gi av amming
- ved barn under de 8 år.

Når må du være ekstra forsiktig med dette legemidlet ?Minocycline

drasjerte tabletter skal utelukkende under nøye medisinsk tilsyn tilsyn til bli administrert til de
følgende pasientgrupper:

- pasienter med lever- og nyrefunksjonsforstyrrelser

pasienter med forstyrrelser i blodkoagulasjon
pasienter som lider til det syndromet til Ménière.

Det er mulig at det i løpet av bruken av minocycline en infeksjon oppstår , som blir forårsaket av organismer organismer de ikke følsomme er for minocycline.

Ved lengre behandlingsvarighet er det anbefalt å anbefale regelmessige kontroller av blodbildet, lever- og nyrefunksjon ut å utføre, spesielt hos pasienter med en dårlig lever- eller nyrefunksjon.

Ved infeksjoner forårsaket av organismer som ikke følsomme er for minocycline og hudproblemer (manifesterer seg som solbrenthet), må administrasjonen avsluttes . Ved av oppstå fra svimmelhet kan det ønskelig være doseringen justere for å tilpasse, ved forekomst av balanseforstyrrelser balanseforstyrrelser ved symptomer symptomer, slik som dobbeltsyn, hallusinasjoner og mørke flekker i synsfeltet, bør behandlingen med minocyklin avsluttes . Forsiktighet er. Forsiktighet er påbudt, særlig hos pasienter som lider av det syndromet Ménières (visse forstyrrelser i det balanseorganet).

Ved forekomst av alvorlige diaré ledsaget gående med feber under behandlingen behandling bør behandlingen behandling å bli avbrutt.

Tetracykliner kan påvirke blodkoagulasjonen påvirke. I forbindelse med dette bør bruk av tetracykliner, hos pasienter med forstyrrelse i blodkoagulasjon, forsiktig å gjøres. Hvis man overfølsom er for minocycline, viser man dette ofte også å være for beslektede forbindelser (f.eks. doxycycline).

Administrasjon av isotretinoin bør til bli unngås før, under og etter behandling med minocyklin. Ekstra forsiktighet er nødvendig ved eksisterende systemisk lupus erythematosus (SLE, en bestemt auto-immunsykdom) eller når dette utvikler seg ;dette kjennetegnes av hudutslett (spesielt iansiktet), ansikt), hårtap, feber, en følelse av uvel være og sykdom og leddsmerter. Det inntak av minocycline kan en mangel på vitamin B, askorbinsyre og folsyre forårsake og kan laboratorietester påvirke.

Minocycline kan påvirke funksjonen av skjoldbruskkjertelen endre; dette blir kjennetegnet av en hevelse på skjoldbruskkjertelen eller smerte i nakken eller halsen. Kontakt

din lege hvis en av de ovennevnte advarslene for for du av anvendelse er av det i fortiden er vært.

Bruker du fortsatt andre medisiner?

Bruker du i tillegg til Minocycline Aurobindo fortsatt andre medisiner, har du det kort siden gjort eller finnes muligheten at du i nær fremtid andre medisiner vil ta går bruke? Fortell det da din lege eller apotek. Det gjelder også for medisiner hvor du ikke resept for trenger har.

En interaksjon kan oppstå ved samtidig bruk av minocycline og et antall andre legemidler, slik som:

- blodfortynnende midler
- penicilliner
- syrenøytraliserende midler for de mage, disse reduserer opptaket av minocycline
- jernpreparater
- jernpreparaterdisse reduserer opptaket av minocycline aktivt kull
- aktiv kull en ionebyttere, disse reduserer opptaket av minocyklin isotretinoin
- isotretinoin.

Svangerskapamming og fruktbarhet Er du

gravid ,tror du du gravid å være, ønsker du gravid bli eller gir du amming? Ta da kontakt med din lege eller apotek før du medisiner bruker.

Graviditet

Minocycline bør ikke bli brukt under graviditet graviditet.

Ved

bruk av minocycline skal ikke amming forekomme . Kjøreevne.

Kjøreevne en det bruk av maskiner

Gitt de mulige balanseforstyrrelser og problemer med synet, som minocycline kan forårsake, er forsiktighet anbefalt ved styring av kjøretøy eller betjening av maskiner. Minocycline Aurobindo

inneholder laktose Hvis

legen din har informert deg om at du visse ikke tåler, ta kontakt med din lege før du dette legemidlet tar.

Minocycline Aurobindo inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, som vil si at det i vesen "natriumfri" er.

3. Hvordan bruker du dette legemidlet?

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig som din lege eller apotek du det har fortalt. Er du i tvil om riktig bruk ? Ta kontakt med din lege eller apotek ..

lege vil skal en personlig, til dine plager tilpasset, dosering foreskrive.

Dosering

Start og vedlikeholdsbehandling: 50 mg hver 12. time.

Behandlingen terapi bør å bli fortsatt i løpet av 4-6 uker.

Ved alvorlige infeksjoner

Voksne: 200 mg som startdose, etterfulgt av 100 mg hver 12. time. Ved mange tilfeller kan en dosering av 200 mg på den første dag, etterfulgt av en daglig dose på 100 mg, være tilstrekkelig .. : Hos barn fra 9 til 12 år er den vanlige initielle dose 100 til 200 mg, etterfulgt av en dose på 50 til 100 mg, hver 12. time. Disse dosering kommer overens med 2 til 4 mg/kg per dag. Minocycline må ikke bli foreskrevet til barn under 8 år.

Infeksjoner til de urinveiene

Ved behandling av infeksjoner til de urinveiene hos mannen er startdosen 200 mg, etterfulgt av 100 mg hver 12. time ,, i løpet av minimum 4 dager og fulgt av en kontroll uke 2-3 dager etter behandlingen . Enengangsdose på 200 til 300 mg viste seg 300 mg blek i mer enn 90% av tilfellene effektiv å være. For enkelhets skyld eller ved kontrollvansker kan derfor denne engangsdoseterapien bli brukt.

For voksne kvinner med akutte urinveisinfeksjoner er noen ganger en mer langvarig terapi nødvendig (10 dager).

Tetracykliner har fordelen samtidig effektiv virksom til er mot de bakteriene av "ikke spesifikke urinveisinfeksjoner", hvorved det forekomsten av post-urinveisinfeksjoner blir redusert. Doseringen for disse akutte infeksjoner utgjør 100 mg per dag. Behandlingen terapi bør å bli fortsatt i løpet av 1 til 3 dager, etter den karakteristiske symptomer eller feber er forsvunnet.

Hos pasienter med en nedsatt nyrefunksjon må dosen justeres . Pasienter. Pasienter med en alvorlig nedsatt leverfunksjon kan, bare hvis det ikke annet kan, minocycline foreskrives få.

Måte å administrere

De tablettene må med mye vann tas for å unngå irritasjon av spiserøret å unngå. Etter inntaket må du ikke umiddelbart gå ligge. De tablettene kan under måltidene tas og eventuelt også med melk tas ,hvis inntaket forårsaker mageproblemer forårsaker forårsaker.

Doseringsjusteringer

Ved balanseproblemer eller vanskeligheter med å se bør doseringen justeres å bli justert.

Hva skjer hvis det er plutselig stoppet blir med bruk av medisinen

Hvis du den av din lege foreskrevne kur ikke fullfører, kan det være at de infeksjonen ikke helt forsvunnet er og igjen kommer tilbake.

Har du for mye av dette legemidlet tatt?

Hvis du en alvorlig overdosering mistenker, bør du bruken av Minocycline Aurobindo å stoppe og kontakte å ta med din lege.

Symptomer av overdosering som kan forekomme er :: med symptomer som oppkast ,feberanfall feberanfallgulsott ,blåmerker blodutredelser, blod inneholdende bekmørk avføring og væsketap.

Behandlingen av en overdosering består av : få til å drikkevann ,fremkalle oppkast indukere, mageskylling (ved store mengder), avføringsmiddel. Syrenøytraliserende midler administrere for å redusere opptaket redusere.

glemt dette dette medisin i å ta?

Ta dosen dosen likevel når når du oppdager at du glemt har denne å ta ta, med mindre du nettopp har oppdaget når det er tid for din neste dose . Idet siste tilfellet må du den glemt dosen dose ikke ekstra ta, men bare din plan fortsette følge. Det er viktig å tablettene i henhold til plan i å ta. Rådfør deg i tilfelle av tvil din lege.

Hvis du stopper med å ta dette legemidlet medisin

Din lege har angitt hvor lenge du skal bruke minocycline må bruke. Stopp behandlingen ikke for tidlig uten med legen din å konsultere ..

du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet ? medisin? Ta kontakt med din lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som enhver medisin kan også denne medisinen bivirkninger ha. Ikke alle får dermed å gjøre.

Stopp umiddelbart med å ta tablettene og søk straks medisinsk hjelp ,hvis du har ubehag får av følgende:

allergiske reaksjoner (anafylaksi, overfølsomhet): petekkier, blåmerker og misfarging av huden (purpura), sjokk, flekkete flekkete hud (eksfoliativ dermatitt), økning av antall hvite blodceller og en eller flere av de følgende symptomer: betennelse i leveren (hepatitt), lungebetennelse som blir forårsaket av en infeksjon (pneumonitt), betennelse i nyrene, betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller hjerteposen (perikarditt), feber, hovne lymfeknuter

lupuslignende syndrom: de tilstedeværelse av antinukleære antistoffer i blodet, leddsmerter (artragi), stivhet eller hevelse i leddene en én av mer av de følgende symptomer: feber, muskelsmerter (myalgi), leverbetennelse (hepatitt), hudutslett, betennelse av de blodårer

serumsyke-lignende syndrom: feber, kløende hudutslett, hudutslett, leddsmerter (artragi), leddbetennelse (artritt), stivhet av hevelse av ledd, økt antall hvite blodceller i blodet

økt intrakranielt trykk: hodepine, problemer med synet, som uklart syn, "blinde" flekker, dobbelt syn, permanent tap av syn. Hos barn kan hodeskallen bule ut oppblåst vekst av bakterier som ufølsomme er for tetracyklin: betennelse i tarmene, betennelse i tungen og i munnen, betennelse i kvinnelige kjønnsorganer (forårsaker kløe), smerte ved vannlating ,irritasjon på setet , oppblussendemage utvikling eller utvikling av forverring av systemisk lupus erythematosus (SLE), symptomer inkluderer store områder med røde flekker på huden, hårtap, vekttap, smertefulle ledd og feber symptomer av leverskade: tretthet, svakhet, tap av appetitt, vekttap, magesmerter, feber

endret farge av huden, negler, tenner, slimhinne i munnen, bein, skjoldbruskkjertel, øyne, morsmelk, tårer eller svette (hyperpigmentering).

Rådfør deg med din lege hvis de følgende bivirkninger oppstår:

Bivirkninger som noen ganger oppstår (ved 1 til 10 av 1000 pasienter)

endringer i antall og typer blodceller

hudutslett som kan klø med eller uten bleke eller røde knuter i huden, hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals

feber.

Bivirkninger som sjelden oppstår (hos 1 til 10 av 10.000 pasienter)

mer blå merker, neseblod, halsbetennelse, infeksjoner, ekstrem tretthet, kortpustethet ved anstrengelse eller uvanlig blekhet av huden hud. Din lege kan deg spørre om en blodprøve å ta

svimmelhet, hodepine

kvalme, diaré, oppkast, tap av appetitt, underutvikling av tannemalje, betennelse i spiserøret

soppinfeksjon på din bakdel, kjønnsorganer eller munn, betennelse av de mannlige kjønnsorganer

forhøyede ureaverdier i blodet

hårtap, hudreaksjoner inkludert røde flekker (erythema multiforme), alvorlige hudreaksjoner med rødhet, feber, blemmer eller sår (Stevens-Johnson syndrom), alvorlig hudutslett med rødhet, flassing og hevelse av hud, som ligner på forbrenning (toksisk epidermal nekrolyse), røde kuler på ben (erythema nodosum), følsomhet for sollys eller kunstig lys (for eksempel solarium)

leddsmerter (artralgi), leddbetennelse (artritt), stive eller hovne ledd, muskelsmerter (myalgi), systemisk lupus erythematosus (SLE); hvis du allerede har av SLE, så kan Minocycline Aurobindo det forverre betennelse i leveren (hepatitt) eller nyrene.

Bivirkninger som svært sjelden oppstå (hos mindre enn 1 av 10.000 pasienter)
betennelse av tungen, munn eller tarm, vanskeligheter med å svelge, forstyrret fordøyelse av vannaktig diaré, feber og kramper (pseudomembranøs kolitt)
akutt nyresvikt
endret skjoldbruskkjertelen. Fortell din lege når du merker at du har ubehag får av en hevelse på skjoldbruskkjertelen eller hvis du smerte i nakken eller halsen føler leversvikt ,gulsoth (gul bli av hud eller det hvite i øyet), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), unormale leverfunksjonstester.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger oppstod ved ved en svært liten antall pasienter, de presise frekvensen er ikke kjent:

reduserte nivåer av vitamin B, askorbinsyre og folsyre
vrangforestillinger (hallusinasjon), prikking eller stikkende smerter i hendene og føttene, følelse av svimmelhet og ørhet (vertigo), nedsatt berøringssans, anfall, dødsighet
blodårebetennelse
nedsatt hørsel, ringing i øret
betennelse i leveren, fordi immunsystemet angriper leveren mot leveren rettet (auto-immun hepatitt)
beinsmerter, skjørhet eller svakhet i beinene
smertefulle, blåårde knuter i huden (erythema nodosum).

Det rapportere av bivirkninger

Får du plager av bivirkninger, ta kontakt med din lege eller apotek. Dette gjelder også for mulige bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget stå. Du kan bivirkninger også rapportere via Nederlandsk Bivirkninger Senter Lareb, nettsted www.lareb.nl. Ved å bivirkninger rapportere ,hjelper du oss med mer informasjon informasjon te få over de sikkerheten av dette legemidlet.

5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

For dette legemidlet er det ingen spesielle lagringsbetingelser.

Utenfor syn og rekkevidde av barn holdes.

Bruk denne medisinen ikke mer etter den siste holdbarhetsdato. Den er å finne på emballasjen etter "Exp.". Der står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er den ytterste holdbarhetsdato. Rådfør ved tvil om holdbarhet din apotek.

Skyll medisiner ikke i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med medisiner må gjøre som ikke lenger nødvendig er. Hvis du medisiner på den riktige måte fjerner bli de på en riktig måte destruert og kommer de ikke i miljøet inn.

6. Innhold av emballasjen og andre informasjon

Hvilke stoffer finnes det i denne medisinen?

Det virkestoffet i denne medisinen er minocyclinhydroklorid. Minocycline Aurobindo 50 100 mg, drasjerte tablett inneholder per tablett henholdsvis 50 og 100 mg minocyclinbase.

De andre stoffene i denne medisinen er: polyvidon, laktosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloidal silisiumdioksid, magnesiumstearat, metylhydroksypropylcellulose, makrogol 6000, gul jernoksid (E172), titandioksid (E171).

Hvordan ser Minocycline Aurobindo ut og hva inneholder en emballasje?

Minocycline Aurobindo 50 mg: runde lysegule, konvekse tablett.

Minocycline Aurobindo 100 mg: avlange lysegule, konvekse tablett.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 drasjerte tablett i 3 blisterpakninger (PVC/PVDC/Al) à 10 stykker.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 drasjerte tablett i 3 blisterpakninger (PVC/PVDC/Al) à 10 stykker.

Innehaver av tillatelsen for i handel bringe og produsent Innehaver av markedsføringstillatelse

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Produsent

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, drasjerte tablett er i registeret registrert under RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, overtrukne tablett er i registeret registrert under RVG 22099.

Denne pakningsvedlegget er for den sist godkjent i september 2024

Mer informasjon om dette legemidlet kan du finne på nettsiden til Legemiddelverket

Vurdering av legemidler, www.cbg-meb.nl.