

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Minocycline Aurobindo 50 i 100 mg, powlekane tabletki  
minocyklina chlorowodorek

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę zanim użyjesz tego leku, ponieważ zawierają ważne informacje dla Ciebie i Twojej rodziny.

Przechowuj tę ulotkę. Może Ci być potrzebna później.

Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z Twoim lekarzem lub farmaceutą.

Podaj tego leku nie do innych, ponieważ jest tylko dla Ciebie przepisany. Może być szkodliwy dla innych. Inni też już mają oni te same dolegliwości co ty.

Czy masz dużo problemów z jednym z działań niepożądanych wymienionych w sekcji 4 znajduje się? Lub otrzymujesz Pan/Pani efekt uboczny który nie w tej ulotce znajduje się? Skontaktuj się wtedy z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość tej ulotki

1. Co to jest Minocycline Aurobindo i do czego jest ten lek stosowany?
2. Kiedy nie wolno tego leku używać lub należy zachować szczególną ostrożność przy nim są?
3. Jak stosować Pan/Pani ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowuje Pan/Pani ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Minocycline Aurobindo i do czego jest ten lek stosowany?

Minocyklina jest pół-syntetycznym tetracyklinowym pochodnym. Jest to doustny lek stosowany skuteczny antybiotyk który używany jest do leczenia infekcji zakażeń, chorób przenoszonych drogą płciową i aktynomycyzy (zakażenie z pewnym rodzajem gatunku grzyb).

Minocyklina jest przeznaczona do leczenia zakażeń z dróg oddechowych z przewodu pokarmowego, układu moczowego, skóry, a także, gardła, nosa nos- w zakażenia ucha, spowodowane przez dla minocyklina wrażliwe mikro-organizmy. Minocyklina może również być stosowana w leczeniu choroby przenoszone drogą płciową, infekcje grzybicze lub wąglik u pacjentów którzy są uczuleni na penicylinę penicylina.

2. Kiedy nie wolno tego leku używać lub należy zachować szczególną ostrożność przy nim są?

Kiedy nie wolno Ci tego leku używać?

Minocyklina nie powinna być stosowana przy:

pacjentach którzy są uczuleni są na minocyklinę lub na jeden z substancji w tym leku.

Te substancje możesz znaleźć w rubryka 6

przy jednym poważnym pogorszeniu funkcji wątroby

przy ciąży i karmieniu piersią u dzieci

poniżej lat 18 de 8 lat.

Kiedy musisz być szczególnie ostrożny z tym lekiem? Minocyklina

powlekane tabletki powinny wyłącznie pod ścisłym nadzorem medycznym nadzór do być podawany dla pacjentów następujących grup pacjentów:

- pacjenci z zaburzeniami wątroby i niewydolnością nerek
- pacjenci z zaburzeniami w krzepnięciu krwi
- pacjenci którzy cierpią na zespół Ménière'a. Jest

możliwe, że podczas stosowania minocykliny wystąpi infekcja, która jest spowodowana przez organizmy jest powoduje przez organizmy które nie wrażliwe są na minocyklinę. Przy dłuższym czasie trwania terapii zaleca się przeprowadzać regularne badania krwi, funkcji wątroby i nerek, wątroba- w funkcja nerek z do przeprowadzenia, w szczególności u pacjentów z słabą wątrobą lub niewydolnością nerek funkcja nerek.

infekcji spowodowanych przez organizmy które nie są wrażliwe wrażliwy są dla minocyklina i problemy skórne (objawia się się jak oparzenie słoneczne), należy przerwać podawanie. W przypadku.

Podczas wystąpić z zawroty głowy może to być pożądane być dawkę dawkowanie dostosować do zmienić, przy wystąpieniu wystąpieniu zaburzeń równowagi zaburzenia równowagi przy objawach objawach, jak podwójne widzenie, halucynacje i ciemne plamy w polu widzenia, należy przerwać leczenie minocykliną powinno zostać przerwane. Ostrożność jest wskazane, szczególnie u pacjentów cierpiących na zespół Ménière'a zespół Ménière'a pewne zaburzenie w narządzie równowagi).

W przypadku wystąpienia ciężkich objawów biegunka w towarzystwie występująca z gorączką podczas terapii terapii należy przerwać terapię zostać przerwana .. mogą wpływać na krzepnięcie krwi wpływać wpływać. W związku z tym należy stosowanie tetracyklin, u pacjentów z zaburzeniem w krzepnięciu krwi, ostrożnie przeprowadzać .. ktoś nadwrażliwy nadwrażliwy jest dla minocyklina, okazuje się się to często również być dla pokrewnych związków związku npnp.Podawanie

Podawanie izotretynoina powinno składnik unikać należy przed ,w trakcie i po leczeniu minocykliną. Szczególna

ostrożność jest wymagana przy istniejącym układowym toczniu rumieniowatym (SLE, (Toczeń rumieniowaty układowy, jeden określona auto-choroba autoimmunologiczna) lub kiedy to się rozwija; to charakteryzuje się wysypką skórą wysypka skórna zwłaszcza twarzy ),), wypadanie włosów, gorączka, uczucie dyskomfortu i złe samopoczucie oraz bóle stawów. Przyjmowanie minocykliny może powodować niedobór witamin i minerałów. witamina B, kwas askorbinowy i kwas foliowy powodują i może testy laboratoryjne wpływać. Minocyklina może wpływać na działanie tarczycy zmieniać ;to to jest charakteryzowany przez obrzęk tarczycy lub ból w szyi lub gardle. Skonsultuj się ze swoim lekarzem

jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy Ciebie lub występuje u Ciebie u z zastosowanie jest z że w przeszłości było było.

Używasz ty jeszcze inne leki?

Używasz ty oprócz Minocycline Aurobindo jeszcze inne leki, czy Pan/Pani to niedawno zrobił/a lub istnieje możliwość że możliwość najbliższej przyszłości inne leki będzie Pan/Pani przyjmować używać? Powiedz to wtedy swojemu lekarzowi lub farmaceucie. To dotyczy również leków na które nie potrzebujesz recepty na potrzebne masz.

Een interakcja może wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu minocykliny i niektórych innych leków ,takich jak ::

- penicyliny środki
- penicyliny

zobojętniające środki dla de żołądka, te zmniejszają de wchłanianie minocykliny  
preparaty żelaza, te zmniejszają de wchłanianie minocykliny  
aktywowany węgiel en wymiennicze jonowe, te zmniejszają wchłanianie minocykliny  
izotretynoina  
izotretynoina.

Ciążakarmienie piersią karmienie piersią płodność Czy jesteś  
w ciąży ,myślisz że u w ciąży być są, chcesz w ciąży zajść lub karmisz piersią ? Skontaktuj się  
z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim zażyjesz leki . Ciąży.

Ciąży

Minocyklina nie powinna być stosowana podczas ciąży ciąży.

Podczas

stosowania minocykliny nie należy karmić piersią . dane.

Zdolność do prowadzenia pojazdów pl to użycie maszyn

Biorąc pod uwagę możliwe zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi problemy ze  
wzrokiem wzrokkóre minocyklina może powodować , zaleca sięostrożność ostrożność  
zalecany przy prowadzeniu pojazdów lub maszyn lub obsłudze urządzeń maszyn.

Minocycline Aurobindo zawiera laktozę

Jeżeli twój lekarz ci powiedział że masz pewne cukry cukry nie toleruje, skontaktuj się z swoim  
lekarzem zanim weźmiesz ten lek ..

zawiera sól Ten

lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na  
tabletkę, oznacza chce mówić że to w istocie  
„bez sodu” jest.

3. Jak stosować Pan/Pani ten lek?

Stosować ten lek zawsze dokładnie tak jak twój lekarz lub farmaceuta cię że powiedział .. w  
prawidłowe użycie ? Skontaktuj się ztwoim lekarzem lub farmaceutą ..

lekarz będzie będzie jeden osobiste, do twoich dolegliwości dostosowana, dawkowanie  
przepisać.

Dawkowanie

Rozpoczęcie i terapia podtrzymująca: 50 mg co 12 godzin.

Terapia terapia należy być kontynuowane przez 4-6 4-6 ..

ciężkich infekcji Dorośli

: 200 mgjako dawka początkowa dawka początkowanastępnie 100 mg co 12 godzin . W. W  
wiele przypadków może dawka 200 mg pierwszego dnia ,następnie dzienna dawka 100 mg,  
wystarczająca być . Dzieci. dzieci: Przy dzieci od 9 do 12 lat wynosi dawka zwykle początkowa  
dawka 100 do 200 mg, następnie dawka dawka dawka od 50 do 100 mg, co 12 godzin. Te  
dawkowanie odpowiada 2 do 4 mg/kg na dzień . Minocyklina nie powinna być przepisywana  
dzieciom poniżej przepisany lat . Zakażenia 8 rok.

### Infekcje dróg moczowych

W leczeniu zakażeń dróg moczowych u mężczyzn wynosi dawka początkowa 200 mg, następnie 100 mg co 12 godzin, przez 100 mg co 12 godzin, przez minimum 4 dni i następnie przez kontrolę w tygodniu 2-3 dni po leczeniu. Jednorazowa dawka 200 do 300 mg okazała się 300 mg błędnie w więcej niż 90% przypadków skuteczny być jest. Dla wygody lub przy trudnościach kontrolnych może zatem ta terapia jednorazową dawką być zastosowana. Dla dorosłej kobiety z ostrymi zakażeniami dróg moczowych jest czasami potrzebna bardziej długotrwała terapia konieczna (10 dni).

Tetracykliny mają zaletę jednocześnie skuteczne przeciw bakteriami van "nie specyficzne zakażenia dróg moczowych", co może zapobiegać po-zakażeniom dróg moczowych zostaje zmniejszone. Dawkowanie dla ostrej infekcji wynosi 100 mg na dobę. Terapia powinna być kontynuowana przez 11-13 dni, po tym, jak charakterystyczne objawy lub gorączka są zniknęły.

U pacjentów z osłabioną czynnością nerek należy dostosować dawkę dostosowana zostać. Pacjenci z jedną ciężką upośledzoną funkcją wątroby mogą, tylko jeśli to nie może być inaczej, minocyklina przepisana otrzymać.

### Sposób podania

Tabletki muszą z dużą ilością wody przyjmowane być aby podrażnienia przełyku uniknąć. Po przyjęciu nie wolno natychmiast się położyć. Tabletki mogą podczas posiłków i ewentualnie także z mlekiem być przyjmowane, jeśli przyjmowanie dolegliwości żołądkowe powoduje.

### Dostosowanie dawki

Przy problemach z równowagą lub trudnościach z widzeniem należy dostosować dawkę leku. Co się

jeśli zdarza się er jako er nagle przestanie zostanie z używaniem leku

Jeżeli przepisane przez twojego lekarza przepisanej kuracji nie ukończysz, może to być że infekcja nie całkowicie zniknęła jest i ponownie powraca ..

Pan/Pani za dużo tego leku zażył(a) ? przyjęty?

Jeśli pan/pani podejrzewa poważne przedawkowanie, należy przerwać stosowanie

Minocycline Aurobindo Minocyklina Aurobindo skontaktować się z lekarzem. kontakt z herbata brać z twój lekarz

Objawy przedawkowania mogą wystąpić z objawami: wymioty, napady gorączki, napady gorączki, krwotoki, siniaki, krew zawierające smółkowate stolec i utrata płynów.

Leczenie przedawkowania polega na: podawaniu wody do picia, wywoływaniu wymiotów, prowokowaniu wymiotów, płukanie żołądka (przy dużych ilościach), przeczyszczać. Podawanie środków zobojętniających w celu zmniejszenia wchłaniania. Czy zapomniałeś.

tego zapomnieć to lek w wziąć przyjmując?

Weź dawkę nadal w kiedy Pan/Pani odkryje że Pan/Pani zapomniał jest tę w wziąć przyjmując, chyba że dopiero co odkryłeś kiedy to czas na następną twoją dawkę. W tym ostatnim przypadku musisz pominąć zapomnianą dawkę, dawka nie extra przyjmować, ale po prostu

swój schemat dalej przestrzegać. Ważne jest ważne aby tabletki zgodnie z schematem przyjmować .. w w przypadku z wątpliwości twój lekarz.

Jeśli przestaniesz przyjmować ten lek ten lek Twój lekarz wskazał jak długo powinienes minocyklinę musisz używać musi używać. Stop de leczenia nie przedwcześnie bez z Twoim lekarzem się skonsultować.

Czy masz jeszcze inne pytania dotyczące stosowania tego leku lek? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

#### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy otrzymuje z tym do czynienia.

Przestań natychmiast z przyjmowaniem tabletek i szukaj od razu pomocy medycznej ,jeśli masz problem otrzymuje z następujące:

alergiczne reakcje (anafilaksja, nadwrażliwość): wybroczyny, siniaki i odbarwienie skóry (plamica), wstrząs, plamisty plamiste skóra (złuszczające zapalenie skóry), zwiększenie liczby białych krwinek komórki krwi jedno lub więcej z następujących objawów objawy: wątroby (zapalenie wątroby), zapalenie płuc zapalenie płuc die jest spowodowana przez infekcję (pneumonitis), zapalenie nerek , zapaleniemięśnia sercowego (myocarditis) lub osierdzia (pericarditis), gorączka , obrzęk gorączka, spuchnięty węzły chłonne

toczeń zespół: obecność obecność z przeciwciał we krwi, ból stawów (artralgia), sztywność lub obrzęk stawów stawów en jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, bóle mięśni (mialgia), zapalenie wątroby (hepatitis), wysypka, zapalenie z naczynia krwionośne

podobny do choroby posurowiczej zespół: gorączka, swędząca wysypka skórna, wysypka skórna, ból stawów (artralgia), zapalenie stawów (zapalenie stawów), sztywność z obrzęk stawów stawów, zwiększona liczba białych krwinek we krwi zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe: ból głowy, problemy ze wzrokiem, jak niewyraźne widzenie, "ślepe" plamki, podwójne widzenie, trwała utrata wzroku . Udzieli może czaszka się uwypuklać puchnięcie

wzrost z bakterii które są niewrażliwe są na tetracyklinę: zapalenie jelit ,zapalenie języka języka jamy ustnej ,zapalenie zapalenie z żeńskie narządy płciowe (powoduje swędzenie), ból przy oddawaniu moczu, podrażnienie na pośladkach ,nawracająca żołądek rozwój

lub z zaostrzenie z układowego tocznia rumieniowatego (SLE), objawy obejmują duże obszary z czerwonymi plamami na skórze, wypadanie włosów, utrata masy ciała, bolesne stawy i gorączka

objawy z uszkodzenia wątroby: zmęczenie, osłabienie, utrata apetytu ,utrata masy ciała utrata masy ciała ból brzucha ,gorączka gorączka

zmieniony kolor skóry ciała, paznokci, zębów, błon śluzowych jamy ustnej ,kości ,tarczycy tarczycy ,mleka matki mleko matki, łzy of pot (hiperpigmentacja).

Skonsultuj się ze swoim lekarzem jeśli wystąpią następujące działania niepożądane ::

które czasami występują wystąpić (przy 1 do 10 na 1000 pacjentów)

zmiany w liczbie i rodzajach komórek krwi

wysypka która może swędzieć z lub bez białych lub czerwone guzki w skórze, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła gorączka

..

które rzadko występują (u 1 do 10 na 10.000 pacjentów)

więcej niebieskie plamy, krwawienia z nosa, zapalenie gardła, infekcje, ekstremalne zmęczenie, duszność przy wysiłku lub niezwykła bledność skóry. Twój lekarz może cię poprosić o badanie krwi wykonać zawroty głowy

zawroty głowy ból głowy nudności

nudności, biegunka, wymioty, utrata apetytu, niedorozwój szkliwa zębów,

zapalenie przełyku infekcja grzybicza na twoim

pośladku, twój powierzchnia siedzenia, narządy płciowe lub usta, zapalenie męskich narządów płciowych

podwyższone poziomy mocznika we krwi

wypadanie włosów, reakcje skórne w tym czerwone plamy (rumień wielopostaciowy),

ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, gorączką, pęcherzami lub wrzodami (zespół Stevens-Johnson), ciężka wysypka skórna wysypka skórna

zaczerwienieniem, łuszczeniem łuszczenie obrzękiem obrzęk skóry, która

przypomina oparzenie oparzenie (toksyczna epidermalna martwica), czerwone guzki na nogach (rumień guzowaty), wrażliwość na światło słoneczne lub sztuczne światło (na przykład solarium)

ból stawów (artralgia), zapalenie stawów (artretyzm), sztywne lub spuchnięte stawy,

ból mięśni (mialgia), systemowy toczень rumieniowaty (SLE); jeśli masz już problemy z

SLE, to może Minocycline Aurobindo to pogorszyć

zapalenie wątroby (zapalenie wątroby) lub nerek.

Działania niepożądane które bardzo rzadko wystąpić (u mniej niż 1 na 10.000 pacjentów)

zapalenie języka, ust lub jelit, trudności z przełykaniem, niestrawność trawienie of

wodnista biegunka, gorączka i skurcze (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

ostre niewydolność nerek

zmieniona funkcja tarczycy. Powiedz swojemu lekarzowi kiedy ty zauważa że masz

dolegliwości dostajesz z obrzęk w tarczycy lub jeśli masz ból w szyi lub gardle czujesz

niewydolność wątroby,

żółtaczka (żółtaczka (żółty stać się skóry lub białkówki oka), zapalenie trzustki

(zapalenie trzustki), nieprawidłowe testy czynności wątroby. Inne.

Inne działania niepożądane

wystąpiły działania niepożądane handlować na przy bardzo małej liczbie pacjentów, dokładna częstotliwość jest nieznana: obniżone:

witaminy B, kwasu askorbinowego i kwasu askorbinowego kwas foliowy

urojenia (halucynacje), mrowienie lub klucie w rękach i stopach, uczucie zawrotów

głowy zawroty głowy wirowania (vertigo), zmniejszona zmniejszona zmysł smaku,

napady, senność

zapalenie naczyń krwionośnych

zmniejszony słuch, dzwonięcie w uchu

zapalenie wątroby, ponieważ układ odpornościowy zwraca się przeciwko wątrobie

kieruje (auto-immunologiczne zapalenie wątroby)

ból kości, kruchość lub osłabienie kości kości

bolesne, sinoczerwone guzki na skórze (rumień guzowaty).

Zgłaszanie zgłaszanie van działania niepożądane

Czy masz problemy z działaniami niepożądanymi, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. To dotyczy również dla możliwych działań niepożądanych które nie są w tej ulotce stać. U możesz działania niepożądane również zgłosić przez Niderlandzki Działania niepożądane działania niepożądane pomagasz nam uzyskać więcej informacji u nas om więcej informacja te otrzymać o bezpieczeństwo tego tego leku.

5. Jak przechowujesz Pan/Pani ten lek?

Dla tego leku są er brak specjalne warunki przechowywania.

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać ..

tego leku po upływie daty ważności na opakowaniu data ważności. Jest do znalezienia na opakowaniu po „Exp.:”. Tam znajduje się miesiąc i rok . Ostatni dzień tego miesiąca to jest miesiąc jest ostateczny data ważności. Skonsultuj się w przypadku wątpliwości co do ważności swojego farmaceuty.

Nie spłukuj leków nie przez zlew lub WC i wyrzuć je nie w koszu na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami musisz zrobić które nie są już potrzebne .Jeśli masz leki w odpowiedni sposób odprowadza zostaną one na jeden właściwy sposób zniszczone i trafią one nie do środowiska naturalnego.

6. Zawartość opakowania opakowania i pozostałe informacje

Jakie substancje są w tym leku?

Substancja czynna w tym leku lekarstwo jest chlorowodorek minocykliny. Minocycline Aurobindo 50 100 mg, powlekane tabletki tabletki zawierają na tabletkę odpowiednio 50 i 100 mg minocykliny w postaci zasady.

Pozostałe składniki w tym leku to :: ,laktoza jednowodna laktoza jednowodnamikrokryształiczna celuloza, celuloza, kroskarmeloza sodowa, koloidalny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, metyloceluloza hydroksypropylowa, makrogol 6000, żółty tlenek żelaza (E172), dwutlenek tytanu (E171).

Jak wygląda Minocycline Aurobindo i co zawiera co zawiera jeden opakowanie?

Minocycline Aurobindo 50 mg: okrągłe jasnożółte, wypukłe tabletki.

Minocycline Aurobindo 100 mg: podłużne jasnożółte, wypukłe tabletki.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 powlekane tabletki w 3 opakowania blistrowe (PVC/PVDC/Al) à 10 sztuk.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 powlekane tabletki w 3 opakowania blistrowe (PVC/PVDC/Al) à 10 sztuk.

Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu w handel wprowadzenie i producent

Posiadacz pozwolenia

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Producent  
Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1  
3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, powlekane tabletki jest zarejestrowany wpisany pod RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, powlekane tabletki jest zarejestrowany wpisany pod RVG 22099.

Ten ulotka została ostatnio zatwierdzona we wrześniu 2024 Więcej 2024

Więcej informacje o tym leku można znaleźć znaleźć Rejestracji Produktów Leczniczych , [www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl).Minocycline Aurobindo 50

Transtoyou