

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Minocycline Aurobindo 50 e 100 mg, revestidos comprimidos
minociclina hidrócloridrato

Leia cuidadosamente todo o folheto informativo antes de utilizar este medicamento, pois contém informações importantes sobre o seu uso.

Guarde este folheto. Talvez você precise dele mais tarde novamente ..

Se você tiver mais perguntas? Entre em contato com seu farmacêutico.

Dê este medicamento não para outros, pois é apenas para você prescrito. Pode ser prejudicial para outras pessoas. Outros, também já tenham eles os mesmos sintomas que você.

Se sentir você muito incômodo com um dos efeitos colaterais mencionados na seção 4 constar? Ou tem você um efeito colateral que não neste este folheto informativo consta? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Conteúdo deste folheto informativo

1. O que é Minocycline Aurobindo e para que é este medicamento usado?
2. Quando não deve este medicamento ser usado ou deve ter cuidado especial com ele são?
3. Como usa você este medicamento?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazena você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Minocycline Aurobindo e para que é este medicamento usado?

Minociclina é um semi-sintético derivado de tetraciclina derivado. É um oral eficaz antibiótico que usado é para o tratamento de infecções, doenças sexualmente transmissíveis e actinomicose (infecção com um determinado tipo schimmel).

Minociclina é destinado para o tratamento de infecções das vias respiratórias, o trato gastrointestinal, as vias urinárias, a pele, bem como garganta, nariz- em infecções de ouvido, causadas por para minociclina sensíveis micro-organismos. Minociclina pode também ser utilizada na tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, infecções fúngicas ou antraz em pacientes que são alérgicos a penicilina penicilina.

2. não deve este medicamento não usar de deve você deve ter extra cuidado com ser?

Quando você não deve este medicamento não usar?

Minociclina não deve ser aplicada em:

pacientes que alérgicos são a minociclina ou a um dos componentes neste medicamento .. substâncias pode você encontrar em seção 6 em um grave deterioração da função hepática durante gravidez e a administração de amamentação em crianças abaixo de 8 anos.

Quando deve ter cuidado especial com este medicamento?

Minociclina revestidos comprimidos devem exclusivamente sob cuidadosa médica supervisão a ser administrado a o seguinte grupos de pacientes:

- pacientes com função hepática e insuficiência renal
- pacientes com distúrbios na coagulação sanguínea
- pacientes que sofrem a o síndrome de Ménière.

É possível que haja durante o uso de minociclina uma infecção ocorra, que é causada por organismos que não sensíveis são a minociclina.

Em tratamentos prolongados é aconselhável realizar regularmente exames de hemograma , função hepática e função renal de realizar , especialmente em pacientes com uma função hepática ou renal comprometida.

Em infecções causadas por organismos que não são sensíveis são para minociclina e problemas de pele (manifesta se como queimadura solar), deve a administração ser interrompida ..

ocorrência de de tontura pode o desejável ser a dosagem ajustar para ajustar, em o ocorrência de distúrbios de equilíbrio e em sintomas, como diplopia, alucinações e manchas escuras no campo visual, deve o tratamento com minociclina ser interrompido .. Cautela é oferecido, especialmente em pacientes sofrendo de o síndrome de Ménière (certa disfunção do o aparelho vestibular).

No aparecimento de grave diarreia acompanhada em curso com febre durante a terapia deve a terapia ser interrompida ..

podem a coagulação sanguínea influenciar influenciar. In relação a isso deve aplicação de tetraciclina, em pacientes com distúrbio na coagulação sanguínea, cautelosamente ser realizada. Caso se hipersensível é para minociclina, parece se isto frequentemente também ser ser para compostos relacionados (ex. doxiciclina).

Administração de isotretinoína deve te ser evitado antes, durante e após tratamento com minociclina.

Cuidado extra é necessário em casos de lúpus sistêmico eritematoso (LES, um certa auto-imunidade) ou quando isso se desenvolve; isso é caracterizado por erupção cutânea (principalmente no rosto), queda de cabelo, febre, uma sensação de mal-estar estar e doença e dor nas articulações. A ingestão de minociclina pode uma deficiência de vitamina B, ácido ascórbico e ácido fólico causar e pode testes laboratoriais influenciar.

Minociclina pode a função da glândula tireoide alterar; isto é caracterizado por um inchaço na glândula tireoide ou dor no pescoço ou na garganta. Consulte

seu médico se um dos acima avisos para para o de aplicação é de que no passado foi esteve.

Usa você ainda outros medicamentos?

Usa você além de Minocycline Aurobindo ainda outros medicamentos, fez você isso recentemente fez ou existe a possibilidade de você no futuro próximo outros medicamentos vai vai usar? Informe isso então seu médico ou farmacêutico. Isso aplica-se também a medicamentos para os quais não é necessário receita para obter.

Um interação pode ocorrer com uso simultâneo de minociclina e um número de outros medicamentos, tais como:

- anticoagulantes penicilinas
- penicilinas
- antiácidos medicamentos para o estômago, estes reduzem a absorção de minociclina
- preparações de ferro, estes reduzem a absorção de minociclina
- carvão ativo em trocadores de íons, estes reduzem a absorção de minociclina

isotretinoína.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Está grávida, acha que grávida para estar, deseja grávida ficar ou dá você amamentação?
Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de você medicamentos usar.

Gravidez

Minociclina não deve ser usada durante a gravidez.

Amamentação

Ao usar minociclina não deve amamentar . Condução.

veículos en o uso de máquinas

Dado o possível distúrbios de equilíbrio e problemas com a visão, que minociclina pode causar, é aconselhada cautela ao o conduzir de veículos ou operar máquinas.

Minocycline Aurobindo contém lactose

Se seu médico lhe disse que você certos açúcares açúcares não tolera, entre em contato com seu médico antes de você este medicamento tomar.

Minocycline Aurobindo contém sódio

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, o que quer dizer que ele em essência "isento de sódio" é.

3. Como usa você este medicamento?

Use este medicamento sempre exatamente como seu médico ou farmacêutico você que disse informou. Tem dúvidas sobre o correto uso? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Seu médico irá um pessoal, para suas sintomas ajustada, dosagem prescrever.

Dosagem

Início e terapia de manutenção: 50 mg a cada 12 horas.

A terapia deve ser continuado durante 4-6 4-6 ..

infecções graves Adultos

: 200 mg como dose inicial dose inicial seguido por 100 mg a cada 12 horas . Em. Em muitos casos pode uma dosagem de 200 mg no primeiro dia, seguido por uma dose diária de 100 mg, ser suficiente .. : Em crianças crianças de 9 a 12 anos é a habitual inicial dose 100 a 200 mg, seguida por uma dose de 50 a 100 mg, a cada 12 horas. Esta dosagem corresponde a com 2 a 4 mg/kg por dia. Minociclina não deve ser prescrita prescrito crianças abaixo de 8 anos.

Infecções aos os tratos urinários

Na tratamento de infecções aos os tratos urinários no homem é a dose inicial 200 mg, seguido por 100 mg a cada 12 horas, durante mínimo 4 dias e seguido por uma avaliação semana 2-3 dias após o tratamento. Uma dose única de 200 a 300 mg mostrou-se pálido em

mais de 90% dos casos eficaz para ser. Para conveniência ou em dificuldades de controle pode portanto esta terapia de dose única ser aplicada. Para adultos mulheres com infecções do trato urinário é às vezes um mais prolongada terapia necessária (10 dias).

Tetraciclinas têm a vantagem simultaneamente eficaz te são contra o bactérias de “não específicas infecções urinárias”, reduzindo a ocorrência de pós-infecções urinárias é reduzida. A dosagem para esta aguda infecções é 100 mg por dia. A terapia deve ser continuada durante 11 3 3 ,após o de característica sintomas ou a febre estão desaparecidos. Em pacientes com uma função renal reduzida deve a dose ajustada ser. Pacientes com um grave função hepática reduzida função hepática podem, somente se não não de outra forma puder, minociclina prescrita receber.

Modo de administração

De comprimidos devem com muita água ser tomados para evitar irritação do esôfago para evitar. Após a ingestão você não deve imediatamente ir deitar deitar. O comprimidos podem durante a refeições e eventualmente também com leite ser tomados, se a ingestão problemas gástricos causar.

Ajustes de dosagem

Em problemas de equilíbrio ou dificuldades ao ver deve a dosagem ser ajustada . O que.

se houver er ? er de repente parado é com o uso do medicamento

Se você a pelo seu médico prescrita terapia não completa, pode ser que que a infecção não completamente desapareceu está e novamente retorna.

Tomou você demais de deste este medicamento ingerido?

Se você suspeitar de uma superdosagem grave, deve interromper o uso de Minocycline Aurobindo e parar e entrar em contato com seu médico. médico.

Sintomas de superdosagem que podem ocorrer são :: com sintomas como vômito ,febre crises febrisictérica ,hematomas hematomas, sangue contendo alcatrão fezes e perda de fluidos.

O tratamento de uma superdosagem consiste em: fazer beber água, induzir vômito, lavagem gástrica (em caso de grandes quantidades), laxar. Administrar antiácidos para reduzir a absorção . Esqueceu-se de.

este esquecido este medicamento em tomar tomar?

Tome a dose ainda em quando você descobrir que você esqueceu de este em tomar tomar, a menos que você tenha acabado de descobrir quando é hora de tomar sua próxima dose. Em tal caso você deve tomar a dose esquecida dose não extra tomar, mas simplesmente seu esquema continuar seguir. É importante os comprimidos conforme esquema em tomar .. em em caso de dúvida seu médico.

Se você parar de tomar este medicamento Seu médico

indicou quanto tempo você deve usar minociclina deve usar quanto tempo você minociclina deve usar. Pare a tratamento não prematuramente sem com seu médico para consultar.

Tem você ainda outras perguntas sobre o uso de este medicamento? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter. Não todos recebe com isso a ver.

Pare imediatamente com o consumo dos comprimidos e procure imediatamente ajuda médica, se você sentir recebe do seguinte:

alérgicas reações (anafilaxia, hipersensibilidade): petéquias, hematomas e descoloração da pele (púrpura), choque, manchado pele (exfoliativa dermatite), aumento do número de glóbulos brancos e um ou mais dos seguintes sintomas: inflamação do fígado (hepatite), pneumonia que é causada por uma infecção (pneumonite), inflamação dos rins, inflamação do miocárdio (miocardite) ou do pericárdio (pericardite), febre, inchado gânglios linfáticos

semelhante ao lúpus síndrome: de presença de anticorpos antinucleares no sangue, dor nas articulações (artralgia), rigidez ou inchaço das articulações em um de mais do seguinte sintomas: febre, dor muscular (mialgia), hepatite (hepatite), erupção cutânea, inflamação do vasos sanguíneos

semelhante a doença do soro síndrome: febre, coceira erupção cutânea, erupção cutânea, dor nas articulações (artralgia), inflamação das articulações (artrite), rigidez de inchaço dos articulações, aumento número glóbulos brancos no sangue aumento pressão intracraniana pressão intracraniana: ,problemas com a visão visão, como embaçado visão, "pontos" cegos, visão dupla, perda permanente de visão. Em crianças pode ocorrer inchaço craniano

crescimento de bactérias que são resistentes a tetraciclina: inflamação dos intestinos ,inflamação da língua da língua da boca ,inflamação da do femininos órgãos genitais (causa coceira), dor ao urinar ,irritação nas nádegas , aziaestômago desenvolvimento ou

desenvolvimento de agravamento de lúpus sistêmico eritematoso (LES), sintomas incluem grandes áreas com manchas vermelhas na pele, queda de cabelo, perda de peso, doloroso articulações e febre

sintomas de lesão hepática: fadiga, fraqueza, perda de apetite, perda de peso, dor abdominal, febre

alterada cor da pele, unhas, dentes, mucosas da boca, ossos, tireoide, olhos, leite materno, lágrimas de suor (hiperpigmentação).

Consulte seu médico se os seguintes efeitos colaterais ocorrerem:

Efeitos colaterais que às vezes ocorrem (em 1 a 10 em 1000 pacientes)

alterações no número e tipos de células sanguíneas
erupção cutânea que pode coçar com ou sem pálida ou vermelhas nódulos na pele, inchaço do rosto, lábios, língua ou garganta
febre.

Efeitos colaterais que raramente ocorrem (em 1 até 10 em 10.000 pacientes)

mais azul manchas, sangramentos nasais, faringite, infecções, extrema fadiga, falta de ar ao esforço ou incomum palidez da pele. Seu médico pode lhe pedir para um exame de sangue fazer tontura
tonturador de cabeça náusea

náusea, diarreia, vômito, perda de apetite, subdesenvolvimento do esmalte dentário, inflamação do esôfago
infecção fúngica no seu glúteo, órgãos genitais ou a boca, inflamação dos masculinos
órgãos genitais
aumentados níveis de ureia no sangue
queda de cabelo, reações cutâneas incluindo manchas vermelhas (eritema multiforme),
grave reações cutâneas com vermelhidão, febre, bolhas ou úlceras (síndrome de
Stevens-Johnson),grave erupção cutânea com vermelhidão ,descamação descamação
inchaço inchaço da pele, que parece com queimadura (tóxica epidérmica necrólise),
vermelhas protuberâncias nas pernas (eritema nodoso), sensibilidade à luz solar ou
artificial luz (por exemplo solário)
dor nas articulações (artralgia), inflamação das articulações (artrite), rígidas ou
inchadas articulações, dor muscular (mialgia), sistêmica lúpus eritematoso (LES); se
você já tem problemas com LES, então pode Minocycline Aurobindo isso agravar
inflamação do fígado (hepatite) ou dos rins.

Efeitos colaterais que muito raramente ocorrer (em menos de 1 em 10.000 pacientes)
inflamação da língua, boca ou intestinos, dificuldade em engolir, indigestão digestão de
aquosa diarreia, febre e cólicas (pseudomembranosa colite)
aguda insuficiência renal
função tireoidiana alterada função da tireoide. seu médico quando você u percebe que
você tem problemas com um inchaço na glândula tireóide ou se você dor no pescoço
ou na garganta sente
insuficiência hepática, icterícia (amarelo ficar da pele ou a esclerótica), inflamação do
pâncreas (pancreatite), testes de função hepática anormais.

Outros efeitos colaterais

Outros efeitos colaterais ocorreram em em um muito pequeno número de pacientes, o
preciso frequência é não conhecido:

níveis reduzidos de vitamina B, ácido ascórbico e ácido fólico
delírios (alucinação), formigamento ou pontadas nas mãos e pés, sensação de tontura e
vertigem (vertigem), reduzida paladar, convulsões, sonolência
vasculite
reduzida audição, zumbido no ouvido
inflamação do fígado, devido a o sistema imunológico se contra o fígado direciona
(auto-imune hepatite)
dor óssea, fragilidade ou fraqueza dos ossos
dolorosos, nódulos azul-avermelhados na pele (eritema nodoso).

O relato de efeitos colaterais

Sente algum desconforto devido a efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou
farmacêutico. Isto aplica-se também a possíveis efeitos colaterais que não estão neste
folheto ficar. U pode efeitos colaterais também relatar via o Holandês Efeitos colaterais
efeitos colaterais relatar , ajudavocê nos a mais informação mais informação te obter sobre a
segurança do este medicamento.

5. Como armazenar você este medicamento?

Para este medicamento há ou nenhum especial condições de armazenamento.

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Use este medicamento não mais após a data de validade data de validade. Ela está a encontrar na embalagem após "Exp.". Lá está um mês e um ano. O último dia desse mês é o última data de validade. Consulte em caso de dúvida sobre a validade seu farmacêutico.

Não descarte medicamentos no ralo ou no vaso sanitário e jogue fora eles não na lixeira. Pergunte ao seu farmacêutico o que fazer com medicamentos deve fazer que não mais necessários são. Se você medicamentos no certo maneira descarta ser elas em uma correta maneira destruídas e não elas não no meio ambiente acabam.

6. Conteúdo da embalagem e outros informação

Quais substâncias estão em este medicamento?

A substância ativa neste medicamento medicamento é cloridrato de minociclina. Minociclina Aurobindo 50 100 mg, comprimidos revestidos comprimidos contêm por comprimido respectivamente 50 e 100 mg de base de minociclina.

Os outros componentes neste medicamento são :: ,lactose monoidratada lactose monoidratadocelulose microcristalina, celulose, croscarmelose sódica, coloidal dióxido de silício, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose, macrogol 6000, amarelo óxido de ferro (E172), dióxido de titânio (E171).

Como é Minocycline Aurobindo e o que contém o que está dentro um embalagem?

Minocycline Aurobindo 50 mg: redondo amarelo claro, arredondado comprimidos.

Minocycline Aurobindo 100 mg: oblongo amarelo claro, arredondado comprimidos.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 comprimidos revestidos em 3 em 3 blisteres (PVC/PVDC/Al) à 10 unidades.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 comprimidos revestidos em 3 blisteres (PVC/PVDC/ Al) à10 10 ..

da autorização de comercialização no comercialização colocar e fabricante Titular da Autorização
Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Fabricante
Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Minociclina Aurobindo 50 mg, revestidos comprimidos está no registro inscrito sob RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, revestidos comprimidos está registrado inscrito sob RVG 22099.

Este folheto informativo é para o última aprovado em setembro 2024

Mais informação sobre este medicamento pode encontrar no site do College ter Avaliação de medicamentos , www.cbg-meb.nl. Minocycline Aurobindo 50

Transtoyou