

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Minocycline Aurobindo 50 și 100 mg, comprimate filmate  
minociclină clorhidrat

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante în ceea ce privește utilizarea și siguranța dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou.

Întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă aveți întrebări.

Administrați acest medicament numai așa cum este prescris, deoarece este destinat numai pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, de asemenea, dacă au ei aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți dumneavoastră multe probleme cu unul dintre efectele secundare care sunt în secțiunea 4? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu este în acest prospect? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Conținutul acestui prospect

1. Ce este Minocycline Aurobindo și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți precaut cu el?
3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și al alte informații

1. Ce este Minocycline Aurobindo și pentru ce se utilizează acest medicament?

Minociclina este un semi-sintetic tetraciclină derivat. Este un oral eficient antibiotic care este utilizat pentru tratamentul infecțiilor bolilor cu transmitere sexuală și actinomicozelor (infecție cu un anumit tip de bacterie) și a unei anumite tip de ciupercă).

Minociclina este destinată pentru tratamentul al infecțiilor ale căilor respiratorii, tractul gastrointestinal, tractul urinar, pielea, precum și gâtului, nasului și urechii, în infecții ale urechii, cauzate de bacterii minociclină sensibile micro-organismelor. Minociclina poate de asemenea fi utilizată în tratamentul bolilor cu transmitere sexuală, infecții fungice sau antrax la pacienți care sunt alergici la penicilină.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți extra precaut cu el?

Când nu aveți voie să utilizați acest medicament?

Minociclina nu trebuie să fie aplicată la:

pacienți care sunt alergici la minociclină sau la unul dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți găsi în rubrică 6

la un agravare gravă a funcției hepatice  
în sarcină și al administrarea de alăptare  
la copii sub de 8 ani.

Când trebuie să fiți extra precaut să utilizați acest medicament?

Minociclină acoperite comprimate trebuie exclusiv sub atentă supraveghere medicală supraveghere a fi administrat la de următoarele grupuri de pacienți:

- pacienți cu insuficiență hepatică și insuficiență renală
- pacienți cu tulburări ale coagulării sângelui
- pacienți care suferă la al sindromul Ménière.

Este posibil că er în timpul al utilizării de minociclină o infecție apare, care este cauzată de organisme care nu sensibile sunt la minociclină.

În cazul unei durate mai lungi de terapie este recomandat să se efectueze regulat controale ale hemogramei, funcției hepatice și funcției renale din a efectua, în special la pacienți cu o funcție hepatică sau renală.

În cazul infecțiilor cauzate de organisme care nu sensibile sunt pentru minociclină și probleme ale pielii (se manifestă ca arsură solară), trebuie administrarea administrarea întreruptă fie .. apariția de de amețeală poate al fi dorit să de doza ajusta să potrivită la apariția apariție tulburărilor de echilibru tulburări de echilibru la simptome simptome, cum vedere dublă, halucinații și pete întunecate în câmpul vizual câmp vizual trebuie să tratamentul cu minociclină fie întrerupt. Prudență. Precauție este indicat, în special la pacienți care suferă de it sindromul Ménière (o anumită tulburare a al aparatului vestibular).

La apariția de la severă diaree însoțită de cu febră în timpul terapiei terapie trebuie să terapie fie întreruptă ..

pot afecta coagularea sângelui influența influența. În legătură cu aceasta trebuie utilizarea de tetraciline, la pacienți cu tulburare a coagulării sângelui, cu precauție să se efectueze. Dacă se hipersensibil este pentru minociclină, se pare se acest adesea de asemenea a fi pentru compuși înrudiți (de ex. doxiciclină).

Administrarea de izotretinoină trebuie a evita evitat înainte, în timpul și după tratament cu minociclină.

Precauție suplimentară este necesară în cazul lupusului sistemic eritematos (LES, un anume auto-boală autoimună) sau când acest lucru se dezvoltă; acest lucru este caracterizat de erupție cutanată (mai ales pe față), căderea părului, febră, un senzație de rău a fi și boală și dureri articulare. Administrarea de minociclină poate un deficit de vitamine B, acid ascorbic și acid folic cauzează și poate testele de laborator afecta.

Minociclina poate afecta funcționarea glandei tiroide; acest acest este caracterizat de o umflare la glanda tiroidă sau durere în gât sau în zona gâtului.

Consultați medicul dumneavoastră dacă una dintre avertismentele de mai sus pentru u de aplicare este de că în trecut a fost a fost.

Utilizați dumneavoastră încă alte medicamente?

Utilizați dumneavoastră pe lângă Minocycline Aurobindo încă alte medicamente, ați dumneavoastră asta recent ați făcut sau există posibilitatea ca dumneavoastră în viitorul apropiat alte medicamente să luați merge utilizați? Spuneți asta atunci medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest lucru se aplică de asemenea pentru medicamentele pentru care nu aveți prescripție pentru nevoie are.

Un interacțiune poate apărea la utilizarea simultană a minociclinei și unui număr de alte medicamente, :

- anticoagulantă anticoagulante
- peniciline
- antiacide medicamente pentru de stomac, acestea reduc absorbția de minociclină
- preparate de fier

preparate de fieracestea reduc absorbția de minociclină cărbune activ  
kool activ en schimbători de ioni, acestea reduc absorbția de minociclină izotretinoină  
izotretinoină.

Sarcinăalăptare și fertilitate Sunteți

însărcinată ,credeți că tu însărcinată să fiți, doriți să însărcinată deveniți sau alăptați  
dumneavoastră alăptare? Contactați-vă dumneavoastră medicul sau farmacistul înainte de să  
medicamente utilizați.

Sarcină

Minocycline nu trebuie să fie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptare

La utilizarea minociclinei nu trebuie să se alăpteze.

Aptitudinea de a conduce en het utilizarea de mașini

Având în vedere posibilitatea de tulburări de echilibru și probleme cu vederea, pe care  
minociclina poate cauza, este recomandată prudență la conducerea vehiculelor sau mașinilor  
sau operarea utilajelor. Minocycline Aurobindo

conține lactoză Dacă

medicul dumneavoastră v-a informat că aveți anumite zaharuri anumite zaharuri nu tolerează,  
contactați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament . Minocycline  
Aurobindo.

sodiu Acest medicament

conține medicament ceea ce înseamnă că doriți spune că în esență  
„fără sodiu” este.

3. Cum utilizați acest medicament ?Utilizați

acest medicament întotdeauna exact așa cum ca dumneavoastră medicul sau farmacistul vă  
că a spus v-a spus. Aveți îndoieli cu privire la corecta utilizare? Contactați dumneavoastră  
medicul sau farmacistul.

Dumneavoastră medicul va un personalizată, la simptomele dumneavoastră adaptată ,dozaj  
prescrie prescrie.

Începeți

și terapie de întreținere : 50 mg la fiecare 12ore ..  
terapie terapie trebuie să fie continuat timp de 4-6 săptămâni.

În cazul infecțiilor severe

Adulți: 200 mg ca doză inițială, urmată de 100 mg la fiecare 12 ore. În multe cazuri poate o  
doză de 200 mg în prima zi ,urmată de o administrare zilnică de 100 mg, suficientă fi. Copii: La  
copii de 9 până la 12 ani este doza uzuală inițială de 100 până la 200 mg, urmată de o doză de  
50 până la 100 mg, la fiecare 12 ore. Acest dozaj corespunde cu 2 până la 4 mg/kg pe zi.  
Minociclina nu trebuie să fie prescrisă la copii sub 8 ani ..

## Infecții la de tractul urinar

În tratamentul infecțiilor la de tractul urinar la bărbat doza inițială este 200 mg, urmată de 100 mg la fiecare 12 ore prin 100 mg la fiecare 12 oră, pe parcursul minimum 4 zile și urmat de un control săptămâna 2-3 zile după tratamentului . Odoză unică de 200 până la 300 mg s-a dovedit 300 mg palid în mai de 90% din cazuri eficient a fi. Pentru comoditate sau în cazul dificultăților de control poate prin urmare această terapie cu doză unică fi aplicată. Pentru adulți femei cu infecții acute ale tractului urinar este uneori un mai de lungă durată terapie necesară (10 zile).

Tetraciclinele au avantajul de a fi eficiente simultan te sunt împotriva de bacteriilor de „nu specifice infecții urinare” prin care se prevenirea infecțiilor post-urinare este redusă. Doza pentru pentru aceste acute infecții este 100 mg pe zi. Terapia trebuie să fie continuată timp de 1 1 3 3 ,după ce după ce de caracteristice simptome sau febră sunt dispărute. La pacienți cu o funcție renală redusă trebuie să doza fie ajustată .. Pacienți cu o sever funcție hepatică redusă funcție hepatică pot, doar dacă nu nu altfel se poate, minociclină prescriși primi.

## Mod de administrare

De tablete trebuie cu multă apă administrate să fie pentru a evita iritarea esofagului să evitați. După administrare nu trebuie să imediat mergeți stați. De tabletele pot în timpul de meselor și eventual de asemenea cu lapte fi luate, dacă de administrare probleme gastrice cauzează.

## Ajustări ale dozei

La probleme de echilibru sau dificultăți la vedere vedere trebuie să doza fie ajustată ..

se întâmplă dacă se întâmplă er brusc oprit devine cu utilizarea medicamentului medicament Dacă ați prescriși de dumneavoastră medicul prescriși cură nu terminați, poate să fie că infecția nu a dispărut complet și revine din nou . Ați.

prea mult din acest medicament ? medicament ingestie?

Dacă dumneavoastră aveți o supradoză gravă suspecți, trebuie să opriți utilizarea Minocycline Aurobindo și să contactați medicul dumneavoastră pentru a obține sfaturi. Simptome de supradoză care pot apărea sunt :: cu simptome precum vărsături ,acces de febră atacuri de febrăicter ,hematoame echimoze, sânge conținând negru ca tăciunele scaun și pierdere de lichide.

Tratamentul supradozajului constă în a bea apă ,a provoca vărsături, a induce vărsături, lavaj gastric (în caz de cantități mari), laxativ. Administrarea de antiacide pentru a reduce absorbția . Ați.

să luați acest medicament medicament în a lua?

Luați doza totuși când descoperiți că ați uitat să luați aceasta în a lua lua, cu excepția cazului în care l-ați descoperit doar descoperit când este timpul este pentru doza următoare doză. În acel ultim caz trebuie să uitați doza nu extra luați, dar pur și simplu dumneavoastră programul continuați să urmați. Este important să comprimatele conform programului în a lua. Consultați în caz de îndoială medicul dumneavoastră. Dacă

dumneavoastră opriți administrarea acestui medicament Medicul dumneavoastră a indicat cât timp trebuie să utilizați minociclină să utilizați minociclină a indicat cât timp trebuie să utilizați minociclină să utilizați. Stop de tratamentul nu prematur fără cu medicul dumneavoastră să consultați.

Aveți dumneavoastră încă alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

#### 4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea. Nu toată lumea primește cu asta a face ..

Opriti imediat cu administrarea a tabletelor și căutați imediat ajutor medical, dacă aveți probleme primește de la următorul:

alergice reacții (anafilaxie, hipersensibilitate): peteșii, vânătăi și decolorare a pielii (purpură), șoc, pătată pătată piele (exfoliativă dermatită), creștere a numărului de globule albe și un sau mai multe dintre următoarele: : inflamație a ficatului (hepatită), die este cauzată de o infecție (pneumonită), inflamație a rinichilor, inflamație a miocardului (miocardită) sau a pericardului (pericardită), febră, umflarea ganglionilor limfatici

asemănător lupusului sindrom: de prezența van anticorpi antinucleari în sânge, dureri articulare (artralgie), rigiditate sau umflare a articulațiilor en unul sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, dureri musculare (mialgie), hepatită (hepatită), erupție cutanată, inflamație a vase de sânge

asemănător bolii serice sindrom: febră, mâncărime erupție cutanată, erupție cutanată, dureri articulare (artralgie), inflamație articulară (artrită), rigiditate de umflare a articulațiilor, număr crescut de globule albe în sânge presiune intracraniană crescută : dureri de cap: problemecu vederea , vedere, ca neclar vedere, „pete” oarbe, vedere dublă , permanent pierderea vederii . La copii poate craniul să se bombeze umflați creșterea a bacteriilor care sunt rezistente la tetraciclină: inflamație a intestinelor ,inflamație a limbii și a gurii ,inflamație a de la feminine organe genitale (cauzează mâncărime), durere la urinare ,iritație la fese , stomac balonat dezvoltare sau dezvoltare de agravare a sistemică lupus eritematos (LES), simptomele includ zone mari cu pete roșii pe piele, căderea părului, pierderea în greutate, dureroase articulații și febră

simptome de afectare hepatică: oboseală, slăbiciune, pierderea apetitului ,scădere în greutate pierdere în greutate durere abdominală ,febră febră schimbare culoare a pielii, unghiilor, dinților, mucoaselor a gurii, oasele, tiroida, ochii, laptele matern, lacrimi de transpirație (hiperpigmentare).

Consultați medicul dumneavoastră dacă apar următoarele efecte secundare ::

care uneori apar apariție (la 1 până la 10 din 1000 pacienți)  
modificări în numărul și tipurile celulelor sanguine  
erupție cutanată care poate mânca cu sau fără pale sau roșii noduli în piele, umflătură a feței, buze, limbă sau gât  
febră.

Reacții adverse care apar rar ( la 1 până la 10 din 10.000 pacienți)  
mai multe vânătăi ,sângerări nazale epistaxis faringită faringită infecții , extremă oboseală oboseală dificultăți de respirație la efort sau de neobișnuită paloare a pielii. Medicul dumneavoastră poate să vă ceară să faceți un test de sânge pentru a face

amețeală, durere de cap  
greață, diaree, vărsături, pierdere a apetitului, subdezvoltare a smalțului dentar, inflamație a esofagului  
infecție fungică pe fesele dumneavoastră, organele genitale sau gura, inflamație a masculin organele genitale  
valori crescute ale ureei în sânge  
căderea părului, reacții cutanate inclusiv pete roșii (eritem multiform), severe gravă reacții cutanate cu roșeață, febră, bășici sau ulcerații (sindromul Stevens-Johnson), erupție cutanată severă cu roșeață, descumareși umflare în umflare de piele, care pare a arsură (toxic epidermal necroliză), umflături roșii pe picioare (eritem nodos), sensibilitate la lumina soarelui sau artificială artificial ușoară (de exemplu solar)  
dureri articulare (artralgie), inflamație articulară (artrită), rigide sau umflate articulații, dureri musculare (mialgie), sistemică lupus eritematos (LES); dacă aveți deja probleme cu LES, atunci poate Minocycline Aurobindo să agraveze inflamația ficatului (hepatită) sau a rinichilor.

Reacții adverse care foarte rar apare (la mai puțin de 1 din 10.000 pacienți)  
inflamație a limbii, gură sau intestine, dificultate la înghițire, indigestie digestie de apoasă diaree, febră și crampe (pseudomembranoasă colită)  
acut insuficiență renală  
funcție tiroidiană modificată funcția tiroidiană. medicului dumneavoastră când vă tu observați că aveți disconfort primiți de la o umflare la tiroidă sau dacă aveți durere în gât sau în zona gâtului simțiți insuficiență hepatică  
, icter ( galben a deveni de la piele sau albul ochiului), inflamație a pancreasului (pancreatită), teste anormale ale funcției hepatice.

#### Alte efecte secundare

Alte efecte secundare au apărut pe la un foarte mic număr de pacienți, frecvența exactă este necunoscută ::

scăzute de vitamina B, acid ascorbic și în acid folic  
iluzii (halucinație), furnicături sau înțepături în mâini și picioare, senzație de amețeală și vertij (vertij), scăzută simțul gustului, convulsii, somnolență  
vasculită  
scăzut auz, zgomot în ureche  
inflamație a ficatului, din cauza că sistemul imunitar se împotriva ficatului direcționează (auto-imun hepatită)  
durere osoasă, fragilitate sau slăbiciune a oaselor  
dureoase, noduli albastru-roșii în piele (eritem nodos). Raportarea

#### efectelor adverse de efecte secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru posibile efecte secundare care nu sunt în acest prospect stau. Puteți raporta efecte secundare de asemenea raportați prin Olanda Centrul de Efecte Secundare Lareb, site-ul [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Raportând efecte secundare a raporta, ajutați ne să obținem mai multe informații te obține despre siguranța a acest medicament.

#### 5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

Pentru acest medicament sunt există niciun speciale condiții de păstrare.

A se păstra vederea și accesul al copiilor ferit.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare extremă data de expirare. Aceasta este de găsit pe ambalaj după „Exp.:”. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data ultimă data de expirare. Consultați în caz de îndoială cu privire la durata de valabilitate dumneavoastră farmacist.

Nu aruncați medicamentele nu în chiuvetă sau în toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați pe farmacistul ce să faceți cu medicamentele trebuie să faceți care nu mai sunt necesare. Dacă aveți medicamente în modul corect mod elimină sunt ele pe un corectă mod distruse și ajung ele nu în mediu ajung.

## 6. Conținutul ambalajului și ambalajului alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

Substanța activă în acest medicament este minociclină clorhidrat.

Minocycline Aurobindo 50 100 mg, comprimate filmate comprimate conțin per tabletă respectiv 50 și 100 mg bază de minociclină.

Cele alte substanțe în acest medicament sunt: polividonă, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, coloidal dioxid de siliciu, stearat de magneziu, hidroxipropilmetilceluloză, macrogol 6000, galben oxid de fier (E172), dioxid de titan (E171).

Cum arată Minocycline Aurobindo și ce conține ce conține un ambalaj?

Minocycline Aurobindo 50 mg: rotunde galben deschis, biconvexe comprimate.

Minocycline Aurobindo 100 mg: alungite galben deschis, biconvexe comprimate.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 comprimate filmate în 3 în 3 ambalaje blister (PVC/PVDC/Al) à 10 bucăți.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 acoperite comprimate în 3 ambalaje blister (PVC/PVDC/Al) à 10 bucăți.

Deținător al autorizației pentru în comercializare introducere și producător Deținătorul autorizației

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Producător

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, comprimate filmate este înregistrat în registrul înregistrat sub RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, acoperite comprimate este în registrul înregistrat sub RVG 22099.

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în septembrie 2024

Mai informații despre acest medicament puteți găsi găsii Evaluarea Medicamentelor ,  
[www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl). Minocycline Aurobindo 50și

Transtoyou