

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Minocycline Aurobindo 50 och 100 mg, dragerade tabletter minocyklin hydroklorid

Läs noga hela bipacksedeln innan du tar denna medicin, eftersom det finns viktig information i den för dig.

Spara denna bipacksedel. Kanske har du den senare igen behöver.

Har du fler frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Ge detta läkemedel inte till andra, eftersom det är endast till dig förskrivet. Det kan vara skadligt för andra, också redan har de samma besvär som du.

Får du mycket besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Minocycline Aurobindo och vad används denna medicin för?
2. När får du denna medicin inte använda eller måste du vara extra försiktig med den?
3. Hur använder du denna medicin?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du denna medicin?
6. Innehåll av förpackningen och övriga information

1. Vad är Minocycline Aurobindo och vad används denna medicin för?

Minocycline är en halv-syntetisk tetracyklin-derivat. Det är en oral verksamt antibiotikum som används för behandling av infektioner, könssjukdomar och aktinomykos (infektion med en viss typ av bakterie svamp).

Minocyklin är avsett för den behandling av infektioner i luftvägarna, mag- tarmkanalen, urinvägarna, huden, samt hals-, näsa- i öroninfektioner, orsakade av för minocyklin känsliga mikro-organismer. Minocyklin kan också användas vid behandling av behandling av könssjukdomar, svampinfektioner eller mjältbrand hos patienter som är allergiska mot penicillin penicillin.

2. Får du denna medicin inte använda eller måste du vara extra försiktig med den?

När får du denna medicin inte använda?

Minocyklin bör inte användas eller appliceras vid:

patienter som allergiska är mot minocyklin eller mot en av de ämnen i denna medicin.

Dessa ämnen kan du vända i rubrik 6

vid en allvarig försämring av leverfunktionen

vid graviditet och amning av bröstmjölks

vid barn under de 8 år.

När måste du vara extra försiktig med denna medicin?

Minocyklin dragerade tabletter bör endast under noggrann medicinsk övervakning att bli administrerad till de följande patientgrupper:

patienter med lever- och njurfunktionsstörningar

patienter med störningar i blodkoagulationen
patienter som lider till det Ménières sjukdom av Ménière.

Det är möjligt att det under användning av minocyklin en infektion uppstår, som orsakas av organismer organismer som inte känsliga är för minocyklin.

Vid längre terapivåraktighet är det att rekommendera regelbundet kontroller av blodbild , lever-och njurfunktion njurfunktion ut att utföra, särskilt hos patienter med en dålig lever- eller njurfunktion.

Vid infektioner orsakade av organismer som inte känsliga är för minocyklin och hudproblem (manifesterar sig som solbränna), måste administreringen avbrytas bli ..

uppträdande av från yrsel kan det önskvärt vara dosen justera till att anpassa, vid det uppträdande av balansstörningar och vid symtom symtom, såsom dubbelseende, hallucinationer och mörka fläckar i synfältet, bör behandlingen med minocyklin avbrytas .

Försiktighet är. Försiktighet är erbjuds, särskilt hos patienter som lider av det Ménières sjukdom Ménières sjukdom (vissa störningar i det balansorganet).

Vid uppträdande av allvarliga diarré åtföljd med feber under de terapin bör de terapin avbrytas bli ..

kan kan blodkoagulationen påverka påverka. I samband med detta bör användning av tetracykliner, hos patienter med störning i blodkoagulationen, försiktigt ske .. man överkänslig överkänslig är för minocyklin, visar sig man detta ofta också att vara för besläktade föreningar (t.ex. doxycyklin).

Administrering av isotretinoin bör att bli undvikas före, under och efter behandling med minocyklin.

Extra försiktighet är nödvändig vid befintlig systemisk lupus erythematosus (SLE, en viss auto-immunsjukdom) eller när detta utvecklas ;detta kännetecknas av hudutslag (särskilt iansiktet), ansikte), håravfall, feber, en känsla av illamående och sjukdom och ledvärk . Attta minocyklin kan en brist på till vitamin B, askorbinsyra och folsyra orsaka och kan laboratorietester påverka.

Minocyklin kan påverka funktionen av sköldkörteln förändra; detta blir kännetecknas av en svullnad vid sköldkörteln eller smärta i nacken eller halsen. Rådgör

med din läkare om en av de ovanstående varningar för du av tillämpning är eller att i det förflutna har varit.

Använder du fortfarande andra läkemedel?

Använder du förutom Minocycline Aurobindo fortfarande andra läkemedel, har du det nyligen gjort eller finns det möjlighet att du i den nära framtiden andra läkemedel kommer att använda? Berätta det då din läkare eller apotekare. Det gäller också för läkemedel där du inte recept för behöver har.

En interaktion kan uppstå vid samtidig användning av minocyklin och ett antal andra läkemedel, såsom:

blodförtunnande medel

penicilliner

syreneutraliserande medel för de magen, dessa minskar upptaget av minocyklin

järnpreparat

järnpreparatdessa minskar upptaget av minocyklin aktivt kol

aktiv kol en jonbytare, dessa minskar upptaget av minocyklin isotretinoin

isotretinoin.

Graviditetamning och fertilitet Är du

gravid ,tror du du gravid att vara, vill du gravid bli eller ger du amning? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du läkemedel använder.

Graviditet

Minocyklin bör inte användas under graviditet . Amning.

användning

av minocyklin bör ingen amning ske amning Körförmåga givet.

Körförmåga en het användning av maskiner

Med tanke på de möjliga balansstörningar och problem med synen, vilka minocyklin kan orsaka, är försiktighet rekommenderad vid körning av fordon eller användning av maskiner.

Minocycline Aurobindo

innehåller laktos Om

din läkare har informerat dig att du inte tål vissa sockerarter inte tål, kontakta då din läkare innan du denna medicin tar.

Minocycline Aurobindo innehåller natrium

Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, som vill säga att det i verkligheten "natriumfri" är.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd denna medicin alltid exakt som din läkare eller apotekare du att har berättat. Tvivlar du på den rätta användningen? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Din läkare kommer en personlig, till dina besvär anpassad, dosering förskriva.

Dosering

Börja och underhållsbehandling: 50 mg var 12:e timme.

Behandlingen terapi bör att fortsättas under 4-6 4-6 ..

allvarliga infektioner Vuxna

: 200 mgsom startdos startdoseringföljt av 100 mg var 12:e timme . Vid. I många fall kan en dosering av 200 mg på den första dagen, följt av en daglig dos av 100 mg, tillräcklig vara.

Barn: Hos barn från 9 till 12 år är den vanliga initiala dosen 100 till 200 mg, följt av en dos på 50 till 100 mg, var 12:e timme. Denna dosering motsvarar 2 till 4 mg/kg per dag . Minocyklin får inte ordineras till barn under 8 år . Infektioner.

Infektioner till urinvägarna urinvägarna

Vid behandling av infektioner till urinvägarna urinvägarna hos mannen är startdosen 200 mg, följt av 100 mg var 12:e timme ,, under minimum 4 dagar och följt av en kontroll vecka 2-3 dagar efter behandlingen . Enengångsdos dosering av 200 till 300 mg visade sig blek i mer än 90% av fallen effektiv att vara. För enkelhetens skull eller vid kontrollsvårigheter kan därför denna engångsdosterapi användas ..

För vuxna kvinnor med akut urinvägsinfektioner är ibland en mer långvarig terapi nödvändig (10 dagar).

Tetracykliner har fördelen samtidigt effektiva verksamt till är mot de bakterierna av "inte specifika urinvägsinfektioner", vilket det förekomst av post-urinvägsinfektioner blir minskad. Den dosering för dessa akut infektioner är 100 mg per dag. Behandlingen terapi bör att bli fortsatt under 1 till 3 dagar, efter den karakteristiska symptom eller feber är försvunna. Hos patienter med nedsatt njurfunktion måste dosen justeras . Patienter bli. Patienter med en allvarligt nedsatt leverfunktion får, endast om det inte annars går, minocyklin förskrivs ..

av administrering administrering

De tabletter måste med mycket vatten tas för att undvika irritation av matstrupen att undvika. Efter intag får du inte omedelbart gå ligga. De tabletter får under de måltiderna och eventuellt också med mjölk tas ,om de intag magsmärtor orsakar orsakar.

Dosjusteringar

Vid balansproblem eller svårigheter med synen bör doseringen justeras . Vad händer om.

Vad sker det som är plötsligt stoppad blir med användning av medicinen

Om du av din läkare föreskrivna kur inte avslutar, kan det vara att de infektionen inte helt försvunnit är och åter kommer tillbaka.

Har du för mycket av denna medicin tagit?

Om du misstänker en allvarlig överdosering ,bör du sluta använda Minocycline Aurobindo och kontakta din läkare. kontakt på till ta med din läkare.

Symtom av överdosering som kan uppstå är :: med symtom som kräkningar ,feberattacker feberanfallgulsot ,blåmärken blåmärken, blod innehållande kolsvart avföring och vätskeförlust. Behandlingen av en överdos består av : låta drickavatten ,framkalla kräkning framkalla, magpumpning (vid stora mängder), laxera. Syrabindande medel administrera för att absorptionen minska minska.

glömt detta detta medicin i att ta?

Ta dosen dosen ändå i när du upptäcker att du glömt har denna i att ta, om inte du just har upptäckt när det är dags för din nästa dos . Idet senaste fallet måste du den glömda dosen inte extra ta, men bara din schema fortsätta följa. Det är viktigt att tabletter enligt schema att ta. Rådfråga i fall av tvivel din läkare.

Om du slutar med att ta detta läkemedel Din

läkare har angett hur länge du ska använda minocyklin måste använda använda. Stoppa inte behandlingen inte i förtid utan med din läkare att rådgöra.

Har du ytterligare frågor om användningen av denna detta medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Som varje medicin kan också denna medicin biverkningar ha. Inte alla får därmed att göra.

Sluta omedelbart med att ta tablettorna och sök direkt medicinsk hjälp ,om du har besvär får av följande:

allergiska reaktioner (anafylaxi, överkänslighet): petechier, blåmärken och missfärgning av huden (purpura), chock, fläckig fläckiga hud (exfoliativ dermatit), ökning av antalet vita blodkroppar och en eller flera av de följande symtomen: inflammation i levern (hepatit), lunginflammation die blir orsakad av en infektion (pneumonit), inflammation av njurarna, inflammation av hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit), feber, svullna lymfkörtlar

lupusliknande syndrom: de närvaro av antinukleära antikroppar i blodet, ledvärk (artragi), stelhet eller svullnad av lederna en ett av flera av de följande symtom: feber, muskelvärk (myalgi), leverinflammation (hepatit), hudutslag, inflammation av de blodkärl

serumsjuka-liknande syndrom: feber, klåda hudutslag, hudutslag, ledvärk (artragi), ledinflammation (artrit), stelhet av svullnad av leder, förhöjt antal vita blodkroppar i blodet

förhöjt intrakraniellt tryck: huvudvärk, problem med synen, såsom suddig syn, "blinda" fläckar, dubbelseende , permanentförlust av syn . Hos barn kan skallen bula ut skalle svullna

tillväxt av bakterier som okänsliga är för tetracyklin: inflammation av tarmarna, inflammation av tungan och munnen ,inflammation av av kvinnliga könsorgan (orsakar klåda), smärta vid urinering ,irritation på skinkorna , uppblossandemage utveckling eller utveckling av försämring av systemisk lupus erythematosus (SLE), symtom omfattar stora områden med röda fläckar på huden, håravfall, viktnedgång, smärtsamma leder och feber

symtom av leverskada: trötthet, svaghet, förlust av aptit, viktnedgång, buksmärta, feber förändrad färg av huden, naglar, tänder, slemhinnor i munnen, ben, sköldkörtel, ögon, bröstmjölk, tårar eller svett (hyperpigmentering).

Rådfråga din läkare om de följande biverkningar uppstår:

Biverkningar som ibland uppstår (vid 1 till 10 av 1000 patienter)

förändringar i antalet och typer blodceller
hudutslag som kan klia med eller utan bleka eller röda knölar i huden, svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals
feber.

Biverkningar som sällan uppträder (hos 1 till 10 av 10.000 patienter)

mer blå märken, näsblod, halsont, infektioner, extrem trötthet, andfåddhet vid ansträngning eller ovanlig blekhet av huden huden. Din läkare kan dig be om ett blodprov att göra
yrsel, huvudvärk
illamående, diarré, kräkningar, förlust av aptit, underutveckling av tandemalj,
inflammation av matstrupe
svampinfektion på din sittplats, könsorgan eller mun, inflammation av de manliga könsorgan
förhöjda ureavärden i blodet
håravfall, hudreaktioner inklusive röda fläckar (erythema multiforme), allvarliga hudreaktioner med rodnad, feber, blåsor eller sår (Stevens-Johnsons syndrom), allvarligt hudutslag med rodnad, fjällning och svullnad av huden, som liknar en

brännskada (toxisk epidermal nekrolys), röda knölar på benen (erythema nodosum), känslighet för solljus eller konstgjort ljus (till exempel solarium) ledvärk (artralgi), ledinflammation (artrit), stela eller svullna leder, muskelvärk (myalgi), systemisk lupus erythematosus (SLE); om du redan har problem med SLE, då kan Minocycline Aurobindo det förvärra inflammation i levern (hepatit) eller njurarna.

Biverkningar som mycket sällan uppträda (hos färre än 1 av 10.000 patienter) inflammation av tungan, mun eller tarmar, svårigheter med att svälja, störd matsmältning av vattnig diarré, feber och kramper (pseudomembranös kolit) akut njursvikt förändrad sköldkörtelfunktion. Berätta din läkare när du märker att du har besvär får av en svullnad på sköldkörteln eller om du smärta i nacken eller halsen känner leversvikt ,gulshot (gul bli av huden eller ögonvitan), inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), avvikande leverfunktionstester.

Övriga biverkningar

Övriga biverkningar uppstod vid vid en mycket liten antal patienter, de exakta frekvensen är inte känd:

sänkta nivåer av vitamin B, askorbinsyra och folsyra
vanföreställningar (hallucination), stickningar eller smärtsamma stick i händerna och fötterna, känsla av yrsel och svindel (vertigo), minskad känsel, anfall, sömnighet
vaskulit
nedsatt hörsel, ringning i örat
inflammation i levern, på grund av att immunsystemet vänder sig mot levern rikt (autoimmun hepatit)
bensmärta, skörhet eller svaghet i benen
smärtsamma, blåroda knölar i huden (erythema nodosum).

Att rapportera av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller också för möjliga biverkningar som inte i denna bipacksedel stå. Du kan biverkningar också rapportera via Nederländska Biverknings Centrum Lareb, webbplats www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, hjälper du oss att mer information te få över säkerheten av detta läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

För detta läkemedel finns det inga speciella förvaringsanvisningar.

Förvara utom synhåll och räckhåll för barn ..

denna medicin inte efter utgångsdatumet na de yttersta utgångsdatum. Den finns att hitta på förpackningen efter "Exp.:". Där står en månad och ett år. Den sista dagen i den månaden är yttersta hållbarhetsdatum. Rådfråga vid tvivel om hållbarheten din apotekare.

Spola mediciner inte genom avloppet eller toaletten och släng dem inte i soptunnan. Fråga din apotekare vad du ska göra med mediciner som inte längre behövs . Om du mediciner på rätt sätt . är nödvändiga sätt bortskaffas bli de på en korrekt sätt förstörda och kommer de inte i miljön hamnar.

6. Innehåll av förpackningen och övriga information

Vilka ämnen finns det i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är minocyklin-hydroklorid. Minocycline Aurobindo 50 och 100 mg, filmdragerade tabletter innehåller per tablett respektive 50 och 100 mg minocyklinbas.

De andra ämnen i denna medicin är: polyvidon, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, metylhydroxipropylcellulosa, makrogol 6000, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Hur ser Minocycline Aurobindo ut och vad innehåller en förpackning?

Minocycline Aurobindo 50 mg: runda ljusgula, konvexa tabletter.

Minocycline Aurobindo 100 mg: avlånga ljusgula, konvexa tabletter.

Minocycline Aurobindo 50 mg: 30 filmdragerade tabletter i 3 blisterförpackningar (PVC/PVDC/Al) à 10 stycken.

Minocycline Aurobindo 100 mg: 30 överdragna tabletter i 3 blisterförpackningar (PVC/PVDC/Al) à 10 stycken.

Innehavare av tillståndet för i handel sätta och tillverkare Tillståndshavare

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Tillverkare

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Minocycline Aurobindo 50 mg, överdragna tabletter är registrerad i registret under RVG 22098.

Minocycline Aurobindo 100 mg, överdragna tabletter är registrerad i registret under RVG 22099.

Denna bipacksedel är senast godkänd i september 2024 Mer 2024

Mer information om detta läkemedel kan du hitta på webbplatsen för Läkemedelsverket Bedömning av läkemedel, www.cbg-meb.nl.