

Beipackzettel: Information für den Anwender

Minoxidil Linn 50 mg/ml Lösung zur kutanen Anwendung

Minoxidil

Lesen Sie den gesamten Beipackzettel bevor Sie dieses Arzneimittel geht verwenden denn es steht wichtige Informationen in für Sie.

Verwenden dieses Arzneimittel immer genau wie beschrieben in diesem Beipackzettel oder wie Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen das gesagt hat.

- Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht brauchen Sie ihn später wieder benötigen.
- Haben u noch Fragen? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Apotheker.
- Bekommen Sie Beschwerden von einer der Nebenwirkungen die in Abschnitt 4 stehen? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Arzt oder Apotheker ..
- Ihre Beschwerde nach 6 6 Monate nicht weniger, oder wird er sogar schlimmer? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt.

Inhalt von dieser Packungsbeilage

1. Was ist Minoxidil Linn und wofür wird dieses Mittel verwendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?
3. Wie verwenden Sie dieses Mittel?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Arzneimittel?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minoxidil Linn und wofür wird dies Mittel verwendet?

Minoxidil Linn ist ein Arzneimittel das Haarwuchs anregt und das erhältlich ist als Lösung zur kutanen Anwendung von Minoxidil (wirksame Substanz), dosiert auf 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn ist angezeigt für die Behandlung von der 'normalen' bei Männern auftretenden Kahlheit (Alopecia androgenetica).

Minoxidil Linn ist vorgesehen für äußerliche Anwendung und soll ausschließlich aufgetragen werden auf der Kopfhaut.

Ist Ihr Haarwuchs nach sechs Monaten noch nicht verbessert? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt.

2. Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?

Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?

- Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe in diesem Arzneimittel. Diese Inhaltsstoffe können u finden in Rubrik 6.

Wann müssen Sie extra vorsichtig sein mit diesem Mittel?
Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses Mittel verwendet.

Minoxidil Linn ist nicht bestimmt für Verwendung bei einer familiären Anamnese von Haarausfall, wenn Haarausfall plötzlich und/oder unregelmäßig auftritt, wenn Haarausfall das Ergebnis ist von Schwangerschaft oder Geburt (dies gilt nur für Frauen), oder bei unerklärtem Haarausfall. Auch in Fällen wobei Haarausfall die Folge ist von bestimmten Behandlungen, wie Chemotherapie bei Krebs, oder bei bestimmten Krankheiten wie Eisenmangel, Schilddrüsenerkrankungen, Probleme mit der Abwehr oder bestimmte Form von Syphilis, sowie bei schwerer Unterernährung und bei bestimmten Gewohnheiten in der äußeren Pflege (z.B.. einweben oder strenge Pferdeschwänze) darf Minoxidil nicht werden verwendet.

Sie müssen Ihre Kopfhaut lassen Untersuchungen bevor Sie beginnen mit der Behandlung mit Minoxidil Linn. Ihre Kopfhaut muss gesund sein, normal und intakt, denn falls eine Entzündung oder Verletzung (Abschürfung, Psoriasis, Sonnenbrand oder schwere Abschälung) der Haut hat, kann die Absorption des Arzneimittels durch die Haut erhöht sind, was ein erhöhtes Risiko für systemische Nebenwirkungen mit sich bringt.

Wenn Sie leiden an Herzproblemen (Blutmangel durch ein verengt oder verstopft Blutgefäß (Ischämie), Störung im Herzrhythmus (Arrhythmie), kongestive Herzinsuffizienz oder Herzklappenerkrankung), konsultieren dann Ihr Arzt bevor Sie mit der Behandlung von Minoxidil Linn beginnen. Sie müssen Ihren Arzt zu informieren über Ihre medizinische Vorgeschichte (frühere Krankheiten, aktuelle Krankheiten und Medikation, Allergien, usw.), damit Ihr Arzt Ihre Zustand beurteilen kann und/oder Sie beraten über ob die über oder die Behandlung mit Minoxidil Linn geeignet ist. Wenn Sie mit der Behandlung dürfen beginnen, müssen Sie regelmäßig überwacht werden durch den Arzt und müssen Sie wissen Tee wissen wie Sie die Auftreten von einigen Nebenwirkungen erkennen ,wie ::

- Hautreaktionen beschleunigter
- Herzschlag (Tachykardie/Tachykardieplötzliche
- und unerklärliche unerklärliche Gewichtszunahme
- Schwierigkeiten mit Atmen (insbesondere in Ruhe)
- niedriger Blutdruck, im Allgemeinen und/oder in Ruhe
- die Entwicklung oder die Verschlechterung von einem beengenden, drückenden, schmerzhaft Gefühl auf der Brust (Angina pectoris)
- Schwellung des Gesichts, Hände, Knöchel oder Bauch.

Wenn Sie eines der oben genannten Nebenwirkungen bemerken oder wenn Sie irgendeine Nebenwirkung bemerken die nicht in dieser Packungsbeilage steht, beenden Sie sofort die Behandlung und konsultieren Ihr Arzt.

Wenn Sie gleichzeitig blutdrucksenkende Medikamente verwenden, dürfen Sie Minoxidil Linn nur verwenden unter ärztlicher Aufsicht.

Es gibt Fälle von übermäßigem Haarwuchs gemeldet auf der Körper von Säuglingen nach Hautkontakt mit den Stellen wo Minoxidil aufgetragen bei Patienten (Betreuer) die lokal aufgetragenes Minoxidil verwendeten. Die Haarwuchs wurde innerhalb weniger Monate wieder normal als die Kinder nicht länger ausgesetzt waren an Minoxidil. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in Kontakt kommen mit Körperteilen wo Sie Minoxidil örtlich aufgetragen haben.

Konsultieren einen Arzt wenn Sie übermäßigen Haarwuchs auf der Körper von Ihrem Kind bemerkt während der Periode dass Sie örtlich anzuwenden bringen Produkte mit Minoxidil verwendet ..

Minoxidil Linn darf

Minoxidil Linn mag nicht werden verwendet durch Patienten älter als 65 Jahre, weil die Sicherheit nicht festgestellt ist für diese Gruppe.

Kinder en Jugendliche bis 18 Jahre

Minoxidil Linn darf nicht werden verwendet von Patienten jünger als 18 Jahre, weil die Sicherheit nicht festgestellt ist für diese Gruppe.

Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?

Verwenden Sie neben Minoxidil Linn noch andere Arzneimittel, haben Sie dass kurz vor getan oder besteht die Möglichkeit dass Sie in der nahen Zukunft andere Arzneimittel einnehmen werden? Sagen Sie dann Ihr Arzt oder Apotheker.

Informieren Sie Ihren Arzt wenn Sie ein der folgenden Medikamente auf die Haut auftragen bevor Sie Minoxidil Linn verwenden:

- Arzneimittel die Tretinoin oder andere Retinoide enthalten
- Arzneimittel zur Anwendung auf der Haut die Kortikosteroide enthalten oder hautabdeckende Salben, Cremes oder andere fetthaltige Substanzen (z.B.. Vaseline).

Setzen Sie die behandelte Haut nicht aus intensivem Sonnenlicht ,da Hautreaktionen Hautreaktionen (z.B.. Erythem) oder Sonnenbrand können auftreten und bis eine erhöhte Absorption von Minoxidil durch die Haut führen ..

und Stillzeit Stillen

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie IhrArzt, bevor Sie bevor Sie dieses Arzneimittel verwendet.

Da es keine adäquaten und kontrollierten Studien mit Minoxidil Linn gibt durchgeführt während Schwangerschaft und Stillzeit, wird dieses Arzneimittel nicht empfohlen während dieser Zeiträume.

Fahrtüchtigkeit und der Gebrauch von Maschinen

Minoxidil Linn hat keinen Einfluss auf das Vermögen zu Fahrzeuge zu steuern und Maschinen zu verwenden.

Minoxidil Linn enthält Propylenglykol. Es kann Hautirritationen verursachen.

Minoxidil Linn enthält Ethanol (Alkohol). Es kann Irritationen, brennend Gefühl und trockene Haut verursachen. Falls es versehentlich in Kontakt kommt mit empfindlichen Teilen (Augen,Schleimhäute Schleimhäute, abgeschürfte Haut), muss das betroffene Gebiet sorgfältig werden gewaschen mit einer reichlichen Menge fließendem Leitungswasser. Konsultieren Ihren Arzt falls das brennende Gefühl undder Reizung anhält.

3. Wie verwenden Sie dieses Arzneimittel?

Verwenden dieses Arzneimittel immer genau wie beschrieben in diesem Beipackzettel oder wie Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen das gesagt hat. Zweifeln Sie an der richtigen Anwendung? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Minoxidil Linn ist ausschließlich vorgesehen für äußerliche Anwendung auf der Kopfhaut.

Die empfohlene Dosierung beträgt 1 ml Minoxidil Linn zweimal täglich, alle 12 Stunden. Entfernen den Deckel von der Flasche. Tragen 1 ml Minoxidil Linn Lösung auf, indem Sie den Zerstäuber 6 Mal in drücken ,zweimal zweimal pro Tag, alle 12 Stunden. Tragen die Lösung auf in die Mitte der betroffenen Stelle und verteilen Sie es mit Ihren Fingerspitzen um sicher zu sein zu sind dass das Arzneimittel gleichmäßig ist verteilt. Verwenden für eine genauere Anwendung den Applikator, der in der Verpackung ist mitgeliefert. Entfernen das obere Teil des Sprühkopfes und setzen den Applikator auf. Drücken Sie den Applikator dann 6 Mal ein, wie oben beschrieben.

Waschen Ihre Hände gründlich nach jedem Anbringung.

Reinigung von dem Zerstäuber und Applikator

Entfernen nach jedem Gebrauch den oberen Teil von dem Sprühkopf oder Applikator und spülen mit Alkohol, um die Rückstände des Produkts zu entfernen und um Verstopfung zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen für Gebrauch

Verwenden nicht mehr als 1 ml der Lösung, unabhängig der Größe des betroffenen Bereichs, und tragen nicht mehr als 2 ml der Lösung pro Tag auf.

Vermeiden das Einatmen des Produkts und vermeiden Kontakt mit den Augen, Schleimhäuten und Haut betroffen durch Abschürfung, Entzündung oder Hautschäden. Falls dies dennoch geschieht, muss das betroffene Gebiet sorgfältig werden gewaschen mit einer reichlichen Menge fließendem Leitungswasser. Konsultieren Ihren Arzt wenn das brennende Gefühl und/oder die Reizung anhält.

Dauer der Behandlung

Die bisher durchgeführten Studien zeigen dass 4 oder mehr Monate Behandlung mit Minoxidil Linn erforderlich sind sind für sichtbares Haarwachstum. Unterbrechung der Behandlung kann innerhalb 3 bis 4 Monaten Rückkehr zum Anfangszustand zur Folge haben haben.

Hat Sie zu viel von diesem Mittel verwendet?

Es sind keine Fälle gemeldet von einer Überdosierung Minoxidil als Folge von kutaner Verabreichung von diesem Mittel. Es kann jedoch übermäßiger und unerwünschter Haarwuchs auftreten (Gesicht, Nacken, Rücken, Brust, Bauch, Beine) wenn es höhere Dosen als empfohlen sind verwendet oder wenn das Arzneimittel häufiger ist aufgetragen als empfohlen, oder auf anderen Stellen als die Kopfhaut (insbesondere auf großen Teilen des Körpers). In diesem Fall muss die Behandlung unterbrochen werden bis die normale Haarwuchs ist wiederhergestellt (hierfür sind einige Monate notwendig). Erhöhte systemische Absorption von Minoxidil (eine klinisch ernstere Situation) kann auch auftreten, was ein erhöhtes Risiko auf systemische Nebenwirkungen mit sich bringt.

Versehentliches Einnehmen von Minoxidil Linn von Minoxidil Linn kann ernste Nebenwirkungen am ganzen Körper verursachen im Zusammenhang mit der pharmakologischen Wirkung von Minoxidil (z.B. eine erhöhte Herzfrequenz,

Wasseransammlung in Gewebe (Ödem), niedriger Blutdruck, usw.). Gehen bei Verdacht auf Überdosierung oder Vergiftung mit diesem Arzneimittel, sofort zu einem Krankenhaus, zur symptomatischen Behandlung.

Haben Sie vergessen dieses Mittel zu verwenden?

Haben Sie vergessen das Arzneimittel an zu bringen, tun Sie es dann so schnell Sie es sich erinnern, es sei denn es schon fast Zeit ist für die nächste Anwendung. In diesem Fall, warten Sie bis zur nächsten Anwendung und tragen die übliche Dosis auf, zur gleichen Zeit, und setzen die normale Behandlungsschema.

Gebrauch kein doppelte Dosis um eine vergessene Dosis in zu holen.

Denken Sie jedoch daran dass der Erfolg der von der Behandlung hängt von der auf regelmäßiger Basis Anwendung dieses Medikaments Arzneimittel.

Sie noch andere Fragen zur Anwendung dieses Medikaments dieses Arzneimittel?

Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, auch bekommt nicht jeder damit zu machen.

Nehmen sofort Kontakt auf mit einem Arzt wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken; möglicherweise haben u dringend medizinische Behandlung nötig:
Schwellung des Gesichts, der Lippen oder des Halses, was Schlucken oder Atmen erschwert . Dies kann ein Zeichen sind von ein schwere allergische Reaktion (Häufigkeit nicht bekannt, kann mit den verfügbaren Daten nicht bestimmt werden).

Sehr häufig auftretende Nebenwirkungen (bei mehr als 1 von 10 Anwendern): Kopfschmerzen.

Häufig auftretende Nebenwirkungen (bei 1 bis 10 von 100 Benutzer):

Atemnot (Dyspnoe),

Juckreiz (Pruritus), übermäßiger Haarwuchs (Hypertrichose), (Haut)Ausschlag, Rötung (Rash), Akne-ähnlich Hautreaktion, Hautentzündung (Dermatitis).

Muskelschmerzen.

Flüssigkeitsansammlung in den Gliedmaßen.

Manchmal auftretende Nebenwirkung (bei weniger als 1 von 100 Anwendern): Niedriger Blutdruck (Hypotonie).

Selten auftretende Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 1000 Anwendern): Erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie), Herzklopfen.

Nebenwirkungen mit Häufigkeit 'Nicht bekannt' (auf Basis der bekannten Daten kann die Häufigkeit nicht bestimmt werden):

Überempfindlichkeit, plötzliche Schwellung der Haut und Schleimhäute) (z.B.. von Lippe, Zunge, Mund, Rachen oder Gesicht), mit als Folge Atembeschwerden und oder Juckreiz und Hautausschlag, oft als allergische Reaktion (Angio-ödem), Entzündung der Haut nach Kontakt mit diesem Mittel.

Niedergeschlagene Stimmung.

Schwindel.

Augenreizung.

Niedriger Blutdruck (Hypotonie).

Übelkeit, Erbrechen.

Haarausfall (dies stoppt nach einigen Wochen der Anwendung von Minoxidil und kann auftreten durch Ausfall von alten und Wachstum von neuen Haaren), Haarfarbenveränderung, Abweichung in der Haartextur, Reaktion an der Stelle von auftragen: Juckreiz, Reizung, Schmerzen, (Haut)Ausschlag, Schwellung, trockene Haut, Rötung, Schuppung der Haut (Exfoliation), Hautentzündung, Blasenbildung, Blutung und Geschwülbildung. Schmerzen im Brustkorb.

Das Melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Beschwerden von Nebenwirkungen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage stehen. U können Nebenwirkungen auch direkt melden über das Niederländische Nebenwirkungen Zentrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Durch Nebenwirkungen zu melden, können Sie uns helfen mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit von diesem Arzneimittel.

5. Wie bewahren Sie dieses Mittel?

Aufbewahren unter 25°C. Nicht in dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank aufbewahren.

Halten Sie die Flasche gut verschlossen.

Haltbarkeit nach Öffnen: 50 Tage.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern fernhalten.

Verwenden dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum . Es ist zu finden auf der auf der Schachtel oder die Flasche nach „Exp.“. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum.

Spülen Arzneimittel nicht durch den Abfluss oder die Toilette und werfen sie nicht in den Mülleimer. Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Arzneimitteln machen sollen die Sie nicht mehr verwenden. Sie werden dann auf eine verantwortungsvolle Weise vernichtet und gelangen nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

Welche Stoffe sind in diesem Mittel?

- Der Wirkstoff in diesem Mittel ist Minoxidil. Jeder Milliliter des von der Lösung enthält 50 mg Minoxidil.
- Die anderen Stoffe in diesem Mittel sind Propylenglykol und Ethanol (96%).

Wie sieht Minoxidil Linn aus und wieviel ist enthalten ein Verpackung?

Klare, farblose bis hellrosa, homogene Lösung.

Minoxidil Linn 50 mg/ml ist erhältlich in Karton Schachtel mit einem oder drei transparente, rote Flaschen von 100 ml, mit einem Sprühkopf und einem farblosen Verschluss. Ein Applikator wird lose beigelegt in der Umverpackung.

Inhaber der Zulassung für den in der Handel bringen und Hersteller
Zulassungsinhaber
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Niederlande

Hersteller
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Niederlande

Medinfar Manufacturing, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

Dieses Arzneimittel ist zugelassen unter RVG 122548.

Dieser Beipackzettel ist zuletzt am zuletzt genehmigt in September 2024.