

## Prospecto: información para el usuario

### Minoxidil Linn 50 mg/ml solución para uso cutáneo

#### Minoxidil

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento va usar porque hay está importante información en para usted.

Use este medicamento siempre exactamente como descrito en este prospecto o como su médico o farmacéutico le ha dicho ..

- este prospecto .. lo necesite más tarde de nuevo ..
- Tiene u todavía preguntas? Póngase en contacto con su farmacéutico.
- ¿Tiene efectos secundarios de uno de los efectos secundarios que se mencionan en la sección 4 indicados? O ¿tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto figura? Entonces contacte con su su médico o farmacéutico.
- ¿Se su síntoma después de 6 meses no menos, o se él incluso peor? Entonces contacte a su médico.

#### Contenido de este prospecto

1. Qué es Minoxidil Linn y para qué se este medicamento usado?
2. Cuándo puede este medicamento no usar o debe tener cuidado con ello?
3. Cómo usa este medicamento medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido del empaque y otra información

#### 1. Qué es Minoxidil Linn y para qué se utiliza este medicamento utilizado?

Minoxidil Linn es un medicamento que estimula el crecimiento del cabello y que disponible es como solución para uso cutáneo de minoxidil (activo sustancia), dosificado al 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn está indicado para el tratamiento de la 'calvicie' en hombres común calvicie (alopecia androgenética).

Minoxidil Linn es destinado para uso externo y debe aplicarse únicamente en el cuero cabelludo ..

su crecimiento del cabello después de seis meses meses todavía no mejorado? Póngase en contacto con su médico.

#### 2. Cuándo no debe este medicamento no usar o debe tener especial cuidado con ser?

Cuándo puede este medicamento no usar?

- Usted es alérgico a un de los componentes en este medicamento. Estos componentes puede u encontrar en sección 6.

Cuándo debe tener cuidado con este medicamento ?Consulte con su médico o farmacéutico antes de que u este medicamento utilizado.

Minoxidil Linn es no destinado para uso en un historial familiar de pérdida de cabello, si pérdida de cabello repentina y/o irregular ocurre, si pérdida de cabello el resultado es de embarazo o parto (esto aplica solo para mujeres), o en pérdida de cabello inexplicable. Ook in casos donde pérdida de cabello el resultado es de ciertos tratamientos, como quimioterapia en cáncer, o en ciertas enfermedades como deficiencia de hierro, enfermedades de la tiroides, problemas con el sistema inmunológico o cierta forma de sífilis, así como en desnutrición grave y en ciertos hábitos en el exterior cuidado (p. ej.. trenzar o colas de caballo apretadas) no se debe usar minoxidil no debe usarse.

Usted debe su cuero cabelludo dejar investigaciones antes de usted comience con el tratamiento con Minoxidil Linn. Su cuero cabelludo debe estar sano estar, normal y intacto, porque si una inflamación o lesión (abrasión, psoriasis, quemadura solar o grave desprendimiento) de la piel tiene, puede la absorción del medicamento a través de la piel aumentada son, qué un aumentado riesgo de sistémicas efectos secundarios con ello conlleva.

Si usted sufre de problemas cardíacos (falta de sangre por un estrechado o bloqueado vaso sanguíneo (isquemia), trastorno en el ritmo cardíaco (arritmia), congestiva insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular cardíaca), consulte entonces su médico antes de que comience con el tratamiento de Minoxidil Linn. Usted debe su médico a informar sobre su historial médico (enfermedades previas, actuales enfermedades y medicación, alergias, etc.), para que su médico su condición pueda evaluar y si usted pueda aconsejar sobre si el tratamiento con Minoxidil Linn adecuado es. Si usted con el tratamiento puede comenzar, debe usted regularmente controlado ser por el médico por el médico debe usted saber té saber cómo reconocer la aparición de algunos efectos secundarios puede reconocer, como:

- reacciones cutáneas graves frecuencia cardíaca acelerada
- ( taquicardia )repentinay
- inexplicable en inexplicable aumento de peso
- dificultad con respirar (especialmente en reposo)
- presión arterial baja, en general y/o en reposo
- el desarrollo o el empeoramiento de un opresivo, apretado, doloroso sensación en el pecho (angina de pecho)
- hinchazón de la cara, manos, tobillos o abdomen.

Si usted uno de los mencionados anteriormente efectos secundarios nota o si usted algún efecto secundario nota que no en este prospecto aparece, deje inmediatamente el tratamiento y consulte su médico.

Si usted simultáneamente antihipertensivos medicamentos usa, puede usar Minoxidil Linn solo usar bajo supervisión médica.

Hay casos de crecimiento excesivo de cabello reportado en el cuerpo de lactantes después de contacto con la piel con los lugares donde minoxidil fue aplicado en pacientes (cuidadores) que aplicaron minoxidil tópicamente usaron. La crecimiento del cabello fue dentro de algunos meses de nuevo normal cuando los niños ya no fueron expuestos expuesto minoxidil. Asegúrese de que ese niños no en contacto entren con partes del cuerpo donde usted minoxidil tópicamente ha aplicado.

Consulte a un médico si usted crecimiento excesivo de vello en el en el cuerpo de su niño observa durante el período que usted tópico aplicar a usar productos con minoxidil utiliza.

## Ancianos

Minoxidil Linn puede no ser utilizado por pacientes mayores de 65 años, porque la seguridad no establecida está para este grupo.

## Niños en jóvenes hasta 18 años

Minoxidil Linn no debe no ser utilizado por pacientes menores de 18 años, porque la seguridad no ha sido establecida es para este grupo.

## Usa usted otros medicamentos medicamentosUsa

usted además de Minoxidil Linn otros medicamentos , tieneusted tiene usted que corto atrás hecho o existe la posibilidad que usted en el cercano futuro otros medicamentos va a usar? Diga eso entonces su médico o farmacéutico.

Informe a su médico si usted alguno de los siguientes medicamentos en la piel aplica antes de usar Minoxidil Linn utiliza:

- medicamentos que tretinoína o otros retinoides contienen
- medicamentos para uso en la piel que corticosteroides contienen o pomadas que cubren la piel, cremas o otros grasosas sustancias (p. ej.. vaselina).

No esponga la piel tratada a la luz solar intensa , ya que reacciones cutáneas( dado que reacciones cutáneas (p. ej.. eritema) o quemadura solar pueden ocurrir y hasta un aumento absorción de minoxidil a través de la piel pueden conducir.

## Embarazo y lactancia

¿Está embarazada, piensa que está embarazada o estar, desea embarazarse o da usted lactancia ? Entonces, póngase en contacto con? Entonces póngase en contacto con médico, antes de que usted este medicamento utilizado.

Dado que hay ningún adecuado y controlado estudios con Minoxidil Linn se han realizado durante embarazo y lactancia, se este medicamento no recomendado durante estos períodos.

## Capacidad para conducir y el uso de máquinas

Minoxidil Linn no tiene ningún efecto sobre la capacidad para vehículos te conducir y máquinas para usar.

Minoxidil Linn contiene propilenglicol. Puede causar irritación de la piel causar.

Minoxidil Linn contiene etanol (alcohol). Puede causar irritación, ardor sensación y piel seca causar. Si por accidente entra en contacto con partes sensibles ( ojos,mucosas mucosas, raspada piel), debe el área afectada zona cuidadosamente ser lavada con una abundante cantidad de agua corriente del grifo. Consulte a su médico si el ardor sensación y/o la irritación persiste.

## 3. Cómo usar usted este medicamento?

Use este medicamento siempre precisamente como descrito en este prospecto o como su médico o farmacéutico le ha dicho .. dudas sobre el uso correcto ?? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Minoxidil Linn es exclusivamente destinado para uso externo en el cuero cabelludo ..

dosis recomendada es 1 ml de Minoxidil Linn dos veces al día, cada 12 horas.

Retire la tapa de la botella. Aplique 1 ml de Minoxidil Linn solución en, usando el atomizador 6 veces al presionar ,dos veces dos veces por día, cada 12 horas. Aplique la solución en el centro de la zona afectada y extienda con sus yemas de los dedos para asegurarse de te son que el medicamento uniformemente está distribuido. Use para una aplicación más precisa el aplicador que está en el empaque está incluido. Retire el superior parte del pulverizador y coloque el aplicador. Presione el aplicador luego 6 veces , como arriba descrito.

Lave sus manos cuidadosamente después de cada aplicación.

Limpieza de la nebulizador y aplicador

Retire después de cada uso la parte superior del pulverizador o aplicador de aplicador enjuague con alcohol para el con alcohol para la residuos del producto para eliminar y para obstrucción para prevenir.

Precauciones para uso

No utilizar más de 1 ml de la solución, independientemente de tamaño del área afectada ,y aplique no más de 2 ml de la solución por día aplicado ..

inhalar el producto del producto en evite contacto con los ojos, mucosas y piel afectada por desolladura, inflamación o lesiones cutáneas. Si esto sucede ,, debe el afectada área cuidadosamente ser lavada con una abundante cantidad de agua corriente. Consulte su médico si la sensación de ardor sensación yo la irritación persiste.

Duración del tratamiento

Los estudios realizados hasta ahora muestran que 4 o más meses de tratamiento con Minoxidil Linn son necesarios necesario son para visible crecimiento del cabello. Interrupción del tratamiento puede dentro de 3 a 4 meses regreso a la condición inicial con resultado tener.

Tiene usted demasiado de este medicamento usado ?No

hay casos reportados de una sobredosis de minoxidil minoxidil como resultado de cutánea administración de este medicamento. Puede sin embargo excesivo excesiva indeseado crecimiento de vello ocurrir ( cara, cuello, espalda,pecho pecho, abdomen, piernas) si hay dosis más altas que recomendado se han utilizado o si el medicamento más frecuentemente se ha aplicado que recomendado, o en otros lugares que no sean el cuero cabelludo (especialmente en grandes partes del cuerpo). En este caso debe interrumpirse el tratamiento debe ser suspendido hasta que de normal crecimiento del cabello es restaurado (para esto se necesitan algunos meses ).Aumento sistémica absorción de minoxidil ( unaclínicamente más grave situación situación) puede también ocurrir, lo cual un aumentado riesgo de sistémicos efectos secundarios con ello conlleva.

Por accidente ingestión de Minoxidil Linn puede graves efectos secundarios en el cuerpo entero causar relacionados con la acción farmacológica de minoxidil (p. ej. un aumento de la frecuencia cardíaca, retención de líquidos en tejido (edema), presión arterial baja ,etc .).

Acudaen caso de sospecha de sobredosis o intoxicación con este medicamento medicamento, inmediatamente a un hospital, para tratamiento sintomático.

¿Olvidó usar este medicamento ? ¿Olvidó usar el medicamento ? medicamento a aplicar traer, hágalo así rápido usted lo se recuerda, a menos que ya casi hora sea para la siguiente aplicación. En eso caso, espere hasta la siguiente aplicación y aplique la dosis habitual ,a la misma hora ,y reanude el normal normal esquema de tratamiento.

Uso no doble dosis para una olvidada dosis en recuperar .. sin embargo que el éxito de la de la tratamiento depende de la regular base aplicación de este medicamento.

Tiene usted otras preguntas sobre el uso de este medicamento medicamento? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento tener efectos secundarios, aunque no todos todos con eso a hacer.

Tome inmediatamente contacto con un médico si usted uno de los siguientes síntomas nota; posiblemente tiene u urgente médica tratamiento necesario: hinchazón de la cara, los labios o la garganta, lo cual tragar o respirar difícil hace. Esto puede uno signo ser de uno grave alérgica reacción (frecuencia no conocida, puede con los disponibles datos no ser determinada).

Muy frecuentes efectos secundarios (en más de 1 de cada 10 usuarios): Dolor de cabeza.

Frecuentes efectos secundarios (en 1 a 10 de cada 100 usuarios):

Dificultad para respirar (disnea),

Picazón (prurito), hirsutismo (hipertrichosis), (piel)erupción, enrojecimiento (erupción), acné-similar reacción cutánea, inflamación de la piel (dermatitis).

Dolor muscular.

Acumulación de líquido en las extremidades.

A veces frecuente efecto secundario (en menos de 1 de cada 100 usuarios): Presión arterial baja (hipotensión).

Raramente ocurrentes efectos secundarios (en menos de 1 de cada 1000 usuarios): Aumento de frecuencia cardíaca (taquicardia), palpitaciones.

Efectos secundarios con frecuencia 'No conocido' (basado en los conocidos datos puede el frecuencia no ser determinada):

Hipersensibilidad, hinchazón repentina de la piel y mucosas) (p. ej.. de labio, lengua, boca, garganta o cara), con como resultado dificultades respiratorias y/o picazón y erupción cutánea, a menudo como alérgico reacción (angio-edema), inflamación de la piel tras contacto con este agente.

Estado de ánimo deprimido. Mareo

Mareo.

Irritación ocular.

presión arterial presión arterial (hipotensión).

Náuseas, vómitos.

Calvicie (esto se detiene después de algunas semanas de uso de minoxidil y puede aparecer por pérdida de viejo y crecimiento de nuevo cabello), cambio de color de cabello, anomalía en la textura del cabello, reacción en el sitio de aplicar: picazón, irritación, dolor, (piel)erupción, hinchazón, piel seca ,enrojecimiento ,descamación descamación de la piel (exfoliación), dermatitis, formación de ampollas, sangrado y formación de úlceras. Dolor en el tórax.

El informe de efectos secundarios

Si tiene molestias por efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no están en este prospecto indicados. U puede efectos secundarios también directamente informar a través del Centro de Efectos Secundarios Lareb, sitio web: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Al informar los efectos secundarios, puede ayudarnos a ayudar más información a obtener sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Cómo almacena usted este medicamento?

Conservar por debajo 25°C. No en el refrigerador o el congelador guardar.

Mantenga la botella bien cerrada.

Caducidad después de abrir: 50 días.

Fuera del vista y alcance de niños mantener.

Use este medicamento no más después de la fecha de caducidad. Esta se puede encontrar en el caja o la botella después de "Exp.". Allí aparece un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.

Enjuague medicamentos no por el fregadero o el inodoro y tire los no en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que usted no más utiliza. Se destruyen luego de una manera responsable destruidos y no en el medio ambiente terminan ..

## 6. de la de la empaque y otra información

¿Qué sustancias contiene este medicamento ?El

- principio activo de este medicamento es minoxidil. Cada mililitro de la de la solución contiene 50 mg de minoxidil.
- El otros componentes en este medicamento son propilenglicol y etanol (96%).

Cómo se ve Minoxidil Linn y cuánto hay en está en uno empaque?

Clara, incolora a rosado claro, solución homogénea.

Minoxidil Linn 50 mg/ml está disponible en caja de cartón con uno o tres transparente, roja botellas de 100 ml, con un pulverizador y un incoloro tapón. Un aplicador se proporciona por separado en la caja.

Titular de la licencia para el en el comercialización de y fabricante

Titular de la autorización

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch  
Países Bajos

Fabricante  
MAE Holding BV  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Países Bajos

Medinfar Manufacturing, S.A.  
Parque Industrial Armando Martins Tavares  
Rua Outeiro da Armada, 5  
Condeixa-a-Nova  
3150-194 Sebal  
Portugal

Este medicamento está registrado bajo RVG 122548.

Este prospecto es para la última vez aprobado en septiembre 2024.