

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja

Minoxidil Linn 50 mg/ml lahus naha kasutamiseks Minoxidil

Lugege

hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui te seda ravimit läheb kasutama sest seal seisab oluline teave sees teie jaoks.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu kirjeldatud selles selles infolehes või nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud ..

- seda infolehte .. on teil seda hiljem jälle vaja ..
- Kas u veel küsimused? Võtke ühendust teie apteekriga.
- Kas teil on probleeme ühe nendest kõrvaltoimetest mis on jaotises 4 loetletud? Või kas teil ühe kõrvaltoime mis ei selles selles infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma oma arstiga või apteekriga ..
- teie kaebus pärast 6 6 kuud mitte vähem või saab ta isegi halvem? Võtke siis ühendust oma arstiga.

Sisu sellest sellest pakendi infoleht

1. Mis on Minoxidil Linn ja milleks kasutatakse see ravim kasutatud?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema ?
Kuidas
3. kasutate te seda ravimit ravim?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Pakendi sisu ja muu teave 1.

1. Mis on Minoxidil Linn milleks kasutatakse saab see ravim kasutatakse?

Minoxidil Linn on üks ravim mis juuksekasvu stimuleerib ja mis saadaval on nagu lahus nahale kasutamiseks minoksidiiliga (minoksidiili kohtatoimeaine aine), doositud 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn on näidustatud meestel tavalise raviks 'tavaline' juures meestel esineva kiilaspäisuse (alopecia androgenetica).

Minoxidil Linn on mõeldud väliseks kasutamiseks ja peab ainult pealekandmiseks olema peanahale . Kas teie.

pärast kuut kuud ei kuus kuud veel mitte paranenud? Võtke ühendust oma arstiga.

2. Millal ei tohi te seda ravimit mitte kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Millal tohib seda ravimit mitte kasutada?

- Te olete allergiline mõne koostisosa suhtes, mis on selle ravimi koostises ravim.
koostisosad võivad võib u leidma sisse rubriik 6.

Millal peate te lisaks ettevaatlik olema selle ravimiga ?Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne te te see ravim kasutatakse.

Minoxidil Linn ei ole mõeldud kasutamiseks juures kasutamine kui on perekondlik ajalugu juuste väljalangemine ,kui juuste väljalangemine äkki ja jaof ebaregulaarne esineb, kui juuste väljalangemine see tulemus on rasedus või sünnitus (see kehtib ainult naistele), või juures seletamatu juuste väljalangemine juuste väljalangemine. Ka ka juhtudel kus juuste väljalangemine on tagajärg on teatud ravi, nagu keemiaravi vähi korral, või teatud haiguste nagu rauapuudus rauapuudus, kilpnäärmehaigused, probleemid immuunsüsteemiga või teatud vorm süüfilisest , samutiraske alatoitumus ja teatud harjumused ja juures teatud harjumused in välise hoolduse (nt. patside punumine või tihedad hobusesabad) ei tohi minoksidiili mitte kasutada ..

peate oma peanahka laskma laskma uuringud enne te alustate raviga Minoxidil Linn'iga. Teie peanahk peab olema terve ,normaalne ja puutumatu, sest kui on põletik või of vigastus (kriimustus, psoriaas, päikesepõletus või raske naha koorumine) naha on ,võib ravimi imendumine läbi naha suurenenud läbi nahk kõrgenenud on, mis üks suurenenud risk süsteemsete kõrvaltoimete kaasnemisega endaga toob ..

on südameprobleemid (verepuudus tõttuüks ukse kaudu üks kitsenenud või ummistunud veresoon (isheemia), häire südamerütmis (arütmia),kongestiivne südamepuudulikkus või südameklapihaigus),konsulterige siis siis teie arst enne kui alustate raviga Minoxidil Linn. Te peate teie arst teavitama teavitama oma meditsiinilisest ajaloost ajalugu varasemadhaigused ,praegused praegune haigused ja ravimid, allergiad, jne.), nii et teie arst teie seisundit saab hinnata javõi teid saab nõustada kas ravi Minoxidil Linn'iga sobiv on. Kui te ravi võite alustada, peate teid regulaarselt kontrollima te arst poolt ja peate teid tee teadma kuidas tekkimist alates mõningaid kõrvaltoimeid ära tunda, nagu:

- tõsised nahareaktsioonid
- kiirenenud südametegevus (tahhükardia)
- äkiline ja seletamatu kaalutõus
- raskused koos hingamine (eriti puhkeolekus)
- alandatud vererõhk, üldiselt üldiselt ja/või puhkeolekus
- areng arendamine või halvenemine alates üks ahistav, suruv, valulik tunne rinnal rind (stenokardia)
- turse näo nägu, käed, pahklud või kõht.

Kui teil on üks ülalmainitud eespool nimetatud kõrvaltoimed täheldate või kui te mõni kõrvaltoime täheldate mis ei selles selles infolehes seisab, lõpetage siis kohe ravi raviga ja konsulterige teie arst.

Kui te samaaegselt vererõhku alandavaid ravimeid kasutate, tohib Minoxidil Linni ainult kasutada arsti järelevalve all..

juhtumeid liigsest karvakasvust alates liigne juuksekasv teatatud kehal keha imikutel imikud pärast nahakontakti kohtadega kohad kus minoksidiil oli kantud patsientidel patsiendid (hooldajad) kes paiksel kantud minoksidiil kasutasid. De juuksekasv muutus mõne kuu jooksul jälle normaalseks kui de lapsed enam ei puutunud kokku minoksidiiliga. Veenduge et seda et lapsed mitte kokkupuutes tulema koos kehaosadega kus te minoksidiili paiksel oled kasutanud.

Konsulterige arstiga kui te liigset karvakasvu kehal kell keha alates teie lapse täheldate ajal de periood mil te kohalikult peale kandma tooteid minoksidiiliga kasutate ..

Minoxidil Linn ei tohi

Minoksidiil Linn mag mitte kasutatud kasutada poolt patsientide vanemad kui 65 aastat, kuna ohutus ei ole kindlaks tehtud on selle rühma jaoks ..

Lapsed en noorukid kuni 18 aastat

Minoxidil Linn ei tohi mitte kasutada kasutada poolt patsiendid nooremad kui 18 aastat, sest ohutus ohutus ei ole kindlaks tehtud on jaoks selle rühma.

Kasutate te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Minoxidil Linn veel teisi ravimeid, kas te et lühike aeg tagasi tehtud või eksisteerib see võimalus et te lähedal tulevikus teised ravimid hakkate kasutama? Rääkige et siis teie arst või apteeker.

Rääkige sellest teie arstile kui te mõnda järgmistest ravimitest nahale kannate enne kui te Minoxidil Linn'i kasutate u Minoksidiil Linn kasutatud:

- ravimid mis tretinoiini või muud retinoidid sisaldavad
- ravimid kasutamiseks nahal mis kortikosteroide sisaldavad või nahka katvad salvid , kreemid või kreemid, salvid või muud rasvased ained (nt. vaseliin).

Ärge jätke töödeldud nahka mitte päikese kätte intensiivse päikesevalguse, kuna nahareaktsioonid (nt. erüteem) of päikese põletus võivad esinevad ja kuni üks suurenenud imendumine minoksidiili poolt nahk võivad põhjustada.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate te rase olevat , sooviterase jääda või toidate te rinnaga ? Võtke siis ühendust oma arstiga, enne kui te te see ravim kasutatakse.

Kuna ei ole ühtegi piisavat ja kontrollitud uuringut Minoxidil Linn'iga läbi viidud raseduse jaoks raseduse ja imetamise, ei soovitata seda ravim mitte soovitatav ajal nende perioodide.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine puhul

Minoxidil Linn ei mõjuta võimet juhtida sõidukeid või masinaid kasutada juhtida ja masinad kasutada kasutada.

Minoxidil Linn sisaldab propüleenglükooli. See võib nahka ärritada põhjustada.

Minoxidil Linn sisaldab etanooli (alkohol). See võib ärritust, põletav tunne ja kuiv nahk põhjustada. Kui see kogemata satub kokku tundlike osadega (silmad ,limaskestad, limaskestad, kriimustatud nahk), peab kahjustatud piirkond hoolikalt olema pestud koos ühe rohkema koguse voolava kraaniveega kraanivesi. oma teie arst kui see põletav tunne ja/või ärritus jätkub.

3. Kuidas kasutate te seda ravimit?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu kirjeldatud sisse selles infolehes või nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud. Kahtlete te õige kasutamise osas? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Minoxidil Linn on ainult mõeldud väliseks kasutamiseks peanahal . Soovitatav.

on 1 ml Minoxidil Linn kaks korda päevas on 1 ml Minoksidiil Linn kaks korda päevas, iga 12 tunni järel.

Eemaldage pudeli kork. Kandke 1 ml Minoxidil Linn lahust peale, pihusti 6 6 alla vajutades , kaks korda, kaks korda päevas päev, iga 12 tund. Kandke lahus peale kahjustatud koha keskele ja levitage seda oma sõrmeotstega kindlalt veendumaks, et see on te on et see ravim ühtlaselt on jaotatud. Kasutage jaoks üks täpsem pealekandmine aplikaator, mis on pakendis kaasas kaasas. Eemaldage ülemine osa pihusti peal ja asetage koht korda , nagu eespool kirjeldatud .. oma käed hoolikalt pärast iga iga pealekandmine.

Puhastamine pihusti ja aplikaatori Eemaldage pärast iga kasutamist ülemine osa pihustipeast või aplikaatorist ja loputage alkoholiga, et eemaldada mustus ja bakterid jäägid tootest et eemaldada ja ummistuse vältimiseks . Ettevaatusabinõud.

Ärge kasutage rohkem

kui 1 ml lahust , olenemata lahus, sõltumata de suurus piirkonna kahjustatud ala, ja ära rohkem kui 2 ml lahust lahus päevas päev kann ..

sissehingamist tootest ja ja vältida kokkupuudet silmadega, limaskestadega ja nahaga mõjutatud poolt nahaärritus, põletik või nahakahjustused. Kui see ikkagi juhtub, peab see kahjustatud piirkond hoolikalt olema pestud koos ühe rohkema koguse voolava kraaniveega. Konsulteerige oma arstiga kui see põletav tunne ja/või ärritus püsib.

Ravi kestus ravi

Siiani läbiviidud uuringud näitavad et 4 või rohkem kuud ravi Minoxidil Linn'iga vajalik vajalik on jaoks nähtav juuksekasv. Katkestamine ravi ravi võib 3 3 kuni 4 kuud tagasi algseisundisse viia algseisundisse viia tagajärg on.

Kas te liiga palju sellest ravimist kasutanud ?Ei

ole teateid üleannustamise juhtudest registreeritud alates üleannustamine minoksidiiliga minoksidiil kui tagajärg nahale manustamisel nahale manustamine selle selle ravimi. Siiski võib liigne ja soovimatu karvakasv esineb (nägu, kael, selg,rind rind, kõht, jalad) kui on suuremad annused kui soovitatud on kasutatud või kui ravim on sagedamini on peale kantud kui soovitatav, või muud kohad kui peanahk (eriti suured osad kehast).Sellisel juhul tuleb ravi katkestada kuni saama katkestatud kuni de normaalne juuksekasv on taastatud (selleks on mõned kuud vajalikud). Suurenenud süsteemne imendumine minoksidiil (üks kliiniliselt tõsisem olukord) võib ka esineda, mis suurendab riski risk süsteemsete kõrvaltoimete kõrvaltoimed kaasa tuua ..

allaneelamine õnnetus Minoxidil Linn'i Minoksidiil Linna võib tõsiseid kõrvaltoimeid kogu kehale põhjustada seotud koos minoksidiili farmakoloogilise toimega (nt.. südamegevus , vedelikupeetus, vedelikupeetus sisse kude (turse), alandatud vererõhk, jne.). Minge kahtluse korral üledoos või mürgistus selle ravimiga , seeravim koheselt kuni haigla ,sümptomaatiliseks raviks sümptomaatiline Kas te.

seda ravimit kasutada ? Kas te unustasiteselle

ravimi kasutamise ? ravim peale kanda , tee seda siis niikiiresti kui mäletad , välja arvatud kui see on juba peaaegu aeg on järgmise pealekandmise jaoks . Sellisel juhul. In et juhtum, oota

kuni järgmise pealekandmiseni ja kanna tavaline annus peale , samalajal , jäätka tavalise rutiiniga see normaalne raviskeem.

Kasutamine mitte kahekordne annus et unustatud annust järele jõuda . Pea meeles. et see õnnestumine ravi õnnestumine on ravi sõltub sellest, et regulaarselt alusel pealekandmine selle ravimi peale.

Kas teil veel muid küsimusi selle kasutamise kohta selle ravimi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuigi ei pruugi saada kõik sellega teha tegema.

Võtke kohe ühendust arsti ga kui te mõnda järgmistest sümptomitest tähele panete; võimalik on u kiireloomuline meditsiiniline ravi vajalik:

turse näo , huultevõli kurgu , mis neelamise või hingamise raskeks teeb . Seevõib võib üks märk on alates üks raske allergiline reaktsioon (sagedus pole teada, ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata kindlaks teha).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1 10-st kasutajast):Peavalu ..

esinevad kõrvaltoimed kõrvaltoimed 1kuni 1 kuni 10 100-st kasutajad):

Hingeldus (düsnoe),

Sügelus (pruuritus), liigkarvasus (hüpertrichoos), (nahk)lööve, punetus (lööve), akne-sarnane nahareaktsioon, nahapõletik (dermatiit).

Lihavalu.

Vedelikukogunemine jäsemetes ..

esinev kõrvaltoime (vähem kui 1-l 100-stkasutajast vähem kui 1 100-st Alanenudvererõhk (vererõhk (hüpotensioon).

Harva esinevad kõrvaltoimed (juures vähem kui 1 1000-st kasutajast): Suurenenud südame löögisagedus (tahhükardia), südamepekslemine.

Kõrvaltoimed sagedusega esinemissagedus 'Mitte teada' (teabe alusel, teadaolevad andmed ei saa sagedust määrata): Ülitundlikkus,

äkilineturse nahal ja alates nahk ja limaskestad) (nt. huule, keele, suu, kurgu või näo), koos nagu tagajärg hingamisraskused ja/või sügelus ja nahalööve, sageli nagu allergiline reaktsioon (angio-ödeem), põletik naha pärast kokkupuudet selle ainega ..

meeleolu. Peapööritus

Peapööritus.

Silmaärritus.

vererõhk vererõhk (hüpotensioon).

liveldus, oksendamine.

Kiilaspäisus (see lõpeb pärast mõnda nädalat kasutamist minoksidiili ja võib tulla tulema poolt väljalangemine van vana ja kasv van uued juuksed), juuksevärvi muutus, kõrvalekalle juuste tekstuuris, reaktsioon kohas asukoht van pealekandmine: sügelus, ärritus, valu, (nahk)lööve,

turse, kuiv nahk, punetus, ketendus naha nahk (koorimine), nahapõletik, villide teke, veritsus ja haavandite teke. Valu rindkeres ..

teatamine teatama alates kõrvaltoimed

Kas teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles infolehes mainitud seisma. U võite kõrvaltoimed ka otse teatada kaudu Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Teatades kõrvaltoimetest tee teatama, võite te meid aitama rohkem teave saada selle ohutuse kohta selle ravimi ravim.

5. säilitate seda ravimit ? Säilitadaalla

selle ravimi 25°C. Mitte külmikus hoida ega sügavkülmas säilitada.
Hoidke pudel hästi suletud.
Kõlblikkusaeg pärast avamist: 50 päeva.

Hoida eemal nägemine ja käeulatus alates laste hoida.

Kasutage seda ravimit mitte pärast ei aegumiskuupäeva . See on leitud. See on leida pakendil peal karp või pudel pärast "Exp.". Seal on üks kuu ja üks aasta. Viimane päev sellest kuust on aegumiskuupäev . aegumiskuupäev.

Loputa ravimeid mitte läbi kraanikausi või WC ja viska neid mitte prügikasti .. oma apteekrilt mida teha ravimitega ravimid peab tegema mida te ei enam kasuta. Need hävitatakse siis vastutustundlikul viisil ja ei sattu keskkonda . 6. Sisu.

6. 6. Sisu pakend ja muu teave

Millised ained sisaldab see ravim ?Toimeaine

- selles ravimis on see ravim on minoksidiil. Iga milliliiter sellest alates lahus sisaldab 50 mg minoksidiili.
- See muud ained selles ravimis on propüleenglükool ja etanool (96%). Kuidas

näeb Minoxidil Linn välja ja kui palju on sees üks pakend?
Selge, värvitu kuni heleroosa, homogeen lahus.

Minoxidil Linn 50 mg/ml on saadaval sisse pappkarbis ümbris koos ühe või kolm läbipaistev, punane pudelid 100 ml, koos üks pihusti ja üks värvitu kork. Üks aplikaator on eraldi kaasas karbis ..

loa jaoks luba jaoks turule viimine tootmine ja tootja

Litsentsiomanik
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Holland

Tootja

MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Holland

Medinfar Manufacturing, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

See ravim on registreeritud numbriga RVG 122548.

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud viimati heaks kiidetud sisse september 2024.