

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjä

Minoxidil Linn 50 mg/ml liuos ihon käyttöön Minoxidil

Lue

huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä menee käyttää sillä lukee tärkeää tietoa tässä sinulle. Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten kuvattu tässä tässä pakkausselosteessa tai tai kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinulle sen kertonut ..

- tämä pakkausseloste .. tarvitset sitä myöhemmin uudelleen . Onko.
- sitä u vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä teidän apteekkiin.
- Saatteko haittavaikutuksia yksi näistä sivuvaikutuksista jotka kohdassa 4 mainitaan? Tai saatteko te yksi sivuvaikutus joka ei tässä tässä pakkausselosteessa ole? Ota sitten yhteyttä omaan omaan lääkäriin tai apteekariin ..
- oma vaiva 6 6 6 kuukautta ei vähemmän, tai tulee hän jopa pahempi? Ota yhteyttä teidän lääkäriin.

Sisältö tästä tämä pakkausseloste

1. Mikä on Minoxidil Linn ja mihin käytetään tämä lääke käytetty?
2. Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä lääke?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muut tiedot 1.

1. Mikä on Minoxidil Linn mihin sitä käytetään tämä aine käytetään?

Minoxidil Linn on yksi lääke joka hiustenkasvua stimuloi ja joka saatavilla on liuksena ihon käyttöön minoksidilin käyttöön minoksidilista (vaikuttava aine), annosteltu 5 % (50 mg/ml).

Minoxidil Linn on tarkoitettu varten de hoitoon 'tavallisen' miehillä esiintyvän kaljuuntumisen (alopecia androgenetica).).

Minoxidil Linn on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön ja sitä tulee levittää ainoastaan päänahkaan . Onko hiustenkasvusi.

kuukauden jälkeen parantunut ? kuusi kuukautta vielä ei parantunut? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi. lääkäri

2. Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa olla?

Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää?

- Olet allerginen jollekin yhdelle aineista aineista tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit u löytää sisään kohta 6.

Milloin täytyy sinun erityisesti varovainen olla tämän lääkkeen ?Ota yhteyttä

sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin sinä tätä lääkettä käytetään.

Minoxidil Linn ei ole tarkoitettu käyttöön henkilöille, joilla on perinnöllinen hiustenlähtö perheessä historia hiustenlähtö , joshiustenlähtö tapahtuu äkillisesti ja jaof epäsäännöllinen esiintyy, jos hiustenlähtö se seuraus on raskaudesta tai synnytyksestä (tämä koskee vain naisia), taikun selittämätön hiustenlähtö hiustenlähtö. Myös tapauksissa joissa hiustenlähtö on seuraus tiettyjen hoitojen vuoksi, kuten kemoterapia syövän yhteydessä, tai tiettyjen sairauksien kuten raudanpuute raudanpuute, kilpirauhassairaudet, ongelmat immuunijärjestelmän kanssa tai tietyt muoto kuppa ,sekä vakava aliravitsemus ja tietyt tavat kohdalla tietty tavat in de ulkoiseen hoitoon (esim. letitys tai tiukat poninhännät) minoksididiiliä ei saa käyttää ..

täytyy antaa päänahkanne levätä antaa tutkimukset ennen kuin aloitat hoidon hoito Minoxidil Linn:llä. Sinun päänahkasi täytyy olla terve olla, normaali ja ehjä, koska jos jokin tulehdus tai vamma (hankauma, psoriasis, auringonpolttama tai vakava ihon kuoriutuminen) ihon on ,voi lääkkeen imeytyminen ihon kautta lisääntyä ihon kautta lisääntyä ovat, mikä yksi lisääntynyt riski systeemisille systeemisille sivuvaikutuksille tuo mukanaan ..

kärsit sydänongelmista (verenpuute johtuenyksi kautta yksi ahtautunut tai tukkeutunut verisuoni (iskemia), häiriö sydämen rytmisissä (rytmihäiriö), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta tai sydänlappäsairaus), kysy sitten sinun lääkäri ennen kuin aloitat hoidon Minoxidil Linn. Sinun täytyy sinun lääkäri kertoa tietoa yli sinun lääketieteellinen historia (aikaisemmat sairaudet, nykyiset sairaudet ja lääkitys, allergiat, jne.), jotta teidän lääkäri teidän tilanne voi arvioida jaai teitä voi neuvoa siitä, onko hoito Minoxidil Linn -valmisteella sopiva on. Jos aloitat hoidon voit aloittaa, sinun tulee sinä säännöllisesti tarkastaa tee lääkärin toimesta ja sinun tulee u tietää tietää kuinka esiintyminen joidenkin sivuvaikutusten tunnistaa , kuten: vakavat:

- nopea syke
- (takykardia)äkillinenja
- selittämätön ja selittämätön painonnousu
- vaikeus kanssa hengittää (erityisesti levossa)
- alentunut verenpaine, yleisesti yleisesti jatai levossa
- kehittää kehittäminen tai pahaneminen alkaen yksi ahdistava, painava, kivulias tunne rintakehässä (angina pectoris) turvotus
- kasvoissa , käsissä, nilkoissatai vatsassa . Jos sinulla on.

edellä mainituista yksi alkaen yllämainittu sivuvaikutukset huomaat tai jos sinä jokin sivuvaikutus huomaat joka ei tässä tässä pakkausselosteessa mainita, lopeta heti välittömästi hoito hoito ja ota yhteyttä teidän lääkäri.

Jos te samanaikaisesti verenpainelääkkeitä lääkkeitä käytätte, saatte käyttää Minoxidil Linn vain käyttää lääkärin valvonnassa ..

tapauksia liiallisesta karvankasvusta alkaen liiallinen hiusten kasvu raportoitu päällä keho alkaen imeväiset jälkeen ihokosketus met de paikat missä minoksididiili oli levitetty potilailla potilaat (hoitajat) jotka paikallisesti levitetty minoksididiili käyttivät. De hiusten kasvu tuli muutaman kuukauden kuluessa taas normaaliksi kun de lapset eivät enää altistuneet minoksididiilille. Varmista että minoksididiilille. Varmista että että lapset ei kosketuksiin joutua kanssa kehon osia missä käytät minoksididiiliä paikallisesti olet levittänyt.

Kysy lääkäriltä jos sinulla on liiallinen karvankasvu iholla keho alkaen teidän lapsi huomaa aikana de jakso että te paikallisesti käyttää tuoda levittää tuotteita minoksidisiin kanssa käyttää.

lääkkäät

Minoxidil Linn saa ei käytetä käytettäväksi kautta potilailla vanhempia kuin 65 vuotta, koska turvallisuus ei ole vahvistettu määritetty tälle ryhmälle . Lapset.

Lapset en nuoret alle 18 vuotta

Minoxidil Linnia ei saa ei saa käyttää kautta potilaat alle kuin 18 vuotta, koska de turvallisuutta ei ole vahvistettu on varten tämä ryhmä.

Käytättekö te muita muita lääkkeitä?

Käytättekö te lisäksi Minoxidil Linn muita muita lääkkeitä, onko teillä että lyhyt sitten tehty tai on se mahdollisuus että te lähitulevaisuudessa tulevaisuudessa muita lääkkeitä aiotte käyttää? Kerro se sitten sinun lääkäri tai apteekkari.

Kerro se sinun lääkärille jos käytät yhtä seuraavista seuraavista lääkkeitä iholle levität ennen kuin käytät Minoxidil Linn käyttäaksesi käytetty:

- lääkkeet jotka tretinoiinia tai muut retinoidit sisältävät
- lääkkeet käyttöön iholle jotka kortikosteroideja sisältävät tai ihoa peittävät voiteet , voiteet tai voiteet, voiteet tai muita rasvaisia aineita (esim. vaseliini).

Älä altista käsiteltyä ihoa ei altista voimakkaalle auringonvalolle ,koska ihoreaktiot ihoreaktiot (esim. eryteema) tai auringonpolttama voivat esiintyä ja jopa yksi lisääntynyt imeytyminen minoksidisiin ihoon iho voi johtaa.

Raskaus ja imetys

Oletteko raskaana, ajatteletteko olevanne raskaana tai olettekotulossa raskaaksi tai imetättekö te imetystä ? Ota yhteyttä lääkäriinne , ennen kuin te sinä tämä lääke käytetään.

Koska ei ole riittäviä ja kontrolloituja tutkimuksia Minoxidil Linnillä ole suoritettu raskauden aikana ja imetys, suositellaan tätä lääke ei suositella kestää näinä aikoina.

Ajokyky ja koneiden käyttö Minoxidil Linn

ei vaikuta kykyyn käyttää ajoneuvoja kyky klo ajoneuvot te ohjata ja koneita te käyttää.

Minoxidil Linn sisältää propyleeniglykolia. Se voi aiheuttaa ihoärsytystä aiheuttaa. Minoxidil Linn sisältää etanolia (alkoholia). Se voi ärsyttää, polttava tunne ja kuiva iho aiheuttaa. Jos se vahingossa joutuu kosketuksiin kanssa herkkien alueiden (silmät, limakalvot, hankaantunut iho), täytyy alue käsitelty alue huolellisesti pestä vedellä runsaasti vettä juoksevaa määrä vesijohtovettä vesijohtovesi. sinun sinä lääkäri jos se polttava tunne jatai ärsytys jatkuu.

3. Kuinka käytätte te tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkasti kuten kuvattu sisään tässä pakkausselosteessa tai kuten teidän lääkäri tai apteekkari teille sen on kertonut. Epäiletkö oikeasta käytöstä käyttö? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.

Minoxidil Linn on ainoastaan tarkoitettu ulkoiseen käyttöön päänahassa . Suositeltu.

on 1 ml Minoxidil Linn kahdesti päivässä on 1 ml Minoxidil Linn kaksi kertaa päivässä, joka 12 tunti.

Poista korkki pullosta. Levitä 1 ml Minoxidil Linn liuosta päälläsuihkuttimella 6 6 maali painamalla , kahdesti, kahdesti per päivä, 12 tunnin. Levitä liuos keskelle vaurioitunutta kohtaa ja levitä se sormenpäilläsi varmistaaksesi, että se leviää tasaisesti . te ovat että se lääke tasaisesti on jakautunut. Käytä ennen yhtä tarkempaa levitystä applikaattoria, joka on pakkauksessa mukana toimitettu. Poista ylä- osa osa suihkupään suihkupään ja aseta applikaattori. Paina applikaattoria sitten 6 kertaa , kuten yllä kuvattu. Pese kätesi huolellisesti jokaisen jälkeen kerran levitys.

Puhdistus ei voida sumutin ja applikaattori

Poista jokaisen käytön jälkeen yläosa ylä- osasta ei voida kääntää ilman kontekstia suihkupää tai applikaattori ja huuhtelee alkoholilla puhdistaaaksesi jäämät tuotteesta poistaa poistaminen ja estääksesi tukos estää ehkäistä.

Varotoimenpiteet käyttöä varten käyttö

Älä käytä enempää kuin 1 ml liuosta ,riippumatta riippumatta de koko alueen vaurioitunut alue, ja älä käytä enempää kuin 2 ml liuosta per päivä . Vältä.

tuotetta ja tuotteesta ja vältä kosketusta silmien, limakalvojen ja ihon koskettamista kautta ihon kuoriutumisen, tulehdus tai ihovauriot. Jos tämä kuitenkin tapahtuu, täytyy alue vaikuttanut alue huolellisesti tulla pesty vedellä yksi runsas määrä juoksevaa vesijohtovettä. Kysy sinun lääkäri jos se polttava tunne jaai ärsytys jatkuu.

Hoidon kesto hoito

Tähän mennessä suoritettut tutkimukset osoittavat että 4 tai useampi kuukausi hoitoa Minoxidil Linnillä tarvitaan tarvitaan ovat sille näkyvä hiusten kasvu. Keskeytys hoidosta voi tapahtua 3 3 kanssa 4 kuukauden paluu alkutilaan voi johtaa alkuperäiseen tilaan on.

Onko te liikaa käyttänyt tästä lääkkeestä ? Eiole

raportoitu tapauksia yliannostuksesta minoksidili ilmoitettu alkaen yksi yliannostus minoksidili kuten seuraus alkaen ihon antaminen alkaen tämä aine. On kuitenkin liiallinen ja ei-toivottu karvankasvu esiintyä (kasvot, kaula, selkä,rinta rinta, vatsa, jalat) jos on suurempia annoksia kuin suositeltu on käytetty tai jos lääke lääke useammin on levitetty kuin suositeltu, tai muilla alueilla kuin päänahka (erityisesti suurilla alueilla kehosta).Tässä tapauksessa on hoito keskeytettävä kunnes tulla keskeytetty kunnes de normaali hiustenkasvu on palautunut (tähän tarvitaan muutama kuukausi).Lisääntynyt systeeminen imeytyminen minoksidiliin (yksikliinisesti vakavampi tilanne) voi myös esiintyä, mikä lisääntyneen riskin riski systeemisille sivuvaikutuksille sivuvaikutukset mukanaan tuo ..

tapahtuva nauttiminen Minoxidil Linnin Minoksidili Linn voi vakavia sivuvaikutuksia koko kehoon aiheuttaa liittyen koko kehoon farmakologiseen vaikutukseen minoksidiliin (esim.. syke , nesteturvotus, nesteen kertyminen in kudot (edeema), alentunut verenpaine, jne.). Mene epäily yliannostuksesta tai myrkytyksestä tämän lääkkeen kanssa tämä lääke, välittömästi sairaalaan yksi sairaala, hoitoa varten oireenmukaista hoito.

Oletko unohtanut tämän lääkkeen käyttä? Oletko

unohtanut tämän lääkkeen lääkeaineaan te brengen, tee se sitten niin nopeasti kuin muistat sen, ellei se ole jo melkein aika on seuraavaa varten annostelua. Josse että tapauksessa, odota kunnes seuraava levitys ja levitä tavanomainen annos, samaanaikaan, jatkata normaalia käyttöä se normaali hoito-ohjelma.

Käyttö ei kaksois annosta korvaamaan yksi unohtunut annos sisään kiinni saada.

Muista kuitenkin että hoidon onnistuminen of the hoito riippuu siitä, että säännöllisesti käytetään soveltaminen tätä tätä lääkettä.

Onko sinulla vielä muita kysymyksiä käytöstä käyttö tätä tätä lääkettä? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten mikä tahansa lääke voi myös tämä lääke haittavaikutuksia olla, vaikka ei saa kaikki sen kanssa tehdä valmistaa.

Ota välittömästi yhteyttä yhteen lääkäriin jos te yhden seuraavista oireista huomaatte ;mahdollisesti on on u kiireellistä lääketieteellistä hoitoa tarvitaan: turvotus kasvojen alueella, huulten tai kurkun, mikä vaikeuttaa nielemistä tai hengittämistä vaikeaksi. Tämä voi yksi merkki ovat alkaen yksi vakava allerginen reaktio (yleisyys ei tunnettu, ei voida käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida määrittää).

Erittäin yleinen esiintyvä haittavaikutus (yli 1 10:stä käyttäjästä): Päänsärky.

Yleinen esiintyvä haittavaikutus (1 1 ja 10 op de 100 käyttäjästä):

Hengenahdistus (dyspnea),

Kutina (pruritus), liikakarvoitus (hypertrichoosi), (iho)ihottuma, punoitus (ihottuma), aknetyyppinen ihoreaktio, ihotulehdus (dermatiitti).

Lihaskipu.

Nesteen kertyminen raajoihin ..

esiintyvä haittavaikutus (alle yhdellä 100:sta käyttäjästä):Alentunut verenpaine (hypotensio).

Harvoin esiintyvät haittavaikutukset (alle yhdellä 1000:sta käyttäjästä): Lisääntynyt syke (takykardia), sydämentykytys.

Haittavaikutukset joiden yleisyys 'Ei tunnettu' (perustuen tunnettuihin tietoihin ei voida esiintymistiheyttä määrittää): Yliherkkyys, äkillinenturvotus ihon ja limakalvojen iho ja limakalvot) (esim. huulen, kielen, suu, kurkun tai kasvot), joka seurauksena hengitysvaikeuksia ja/tai kutina ja ihottuma, usein joka allerginen reaktio (angio-edeema), tulehdus ihon jälkeen kosketuksen tämän aineen kanssa.. mieliala. Huimaus.

Silmä-ärsytys..

verenpaine.

Alhainen verenpaine (hypotensio).

Pahoinvointi, oksentelu.

Kaljuuntuminen (tämä loppuu muutaman viikon kuluttua minoksidiilin käytöstä ja voi palata tulevat kautta menetys vanhojen vanhojen ja kasvu uusien uusien hiusten),hiusvärin muutos hiusvärimuutospoikkeama hiustekstuurissa , reaktiopaikassa paikassa paikassa paikassa alkaen

levittää: kutina, ärsytys, kipu, (iho)ihottuma, turvotus, kuiva iho, punoitus, hilseily de iho (kuorinta), ihotulehdus, rakkuloiden muodostuminen, verenvuoto ja haavaumien muodostuminen. Kipu rintakehässä ..

ilmoittaminen de alkaen sivuvaikutukset

Jos sinulla on sivuvaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia sivuvaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa mainittuja seistä. U kunt haittavaikutukset myös suoraan ilmoittaa kautta Alankomaiden Haittavaikutukset Keskus Lareb, verkkosivusto: www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutukset voit ilmoittaa, voit sinä meille auttaa lisää tietoa saada tietoa lääkkeen turvallisuudesta tästä tästä lääkkeestä.

5. Kuinka säilytätte tämän lääkkeen ?Säilytä

alle alhaalla 25°C. Ei jääkaapissa tai pakastimessa säilytettävä .. pullo hyvin suljettuna .. avaamisen jälkeen : 50päivää ..

Ulkopuolella näkö ja ulottuvilla alkaen lasten pidä.

Käytä tätä lääkettä ei enää jälkeen de viimeinen käyttöpäivä. Se on löydettävissä löytää pakkauksessa laatikko tai pullo jälkeen "Exp.". Siinä on kuukausi ja vuosi . Viimeinenpäivä siitä kuukaudesta on viimeinen käyttöpäivä . viimeinen käyttöpäivä.

Huuhtelee lääkkeitä ei läpi viemärin tai WC:hen ja heitä niitä ei roskakoriin .. apteekkariltasi mitä sinun tulee tehdä lääkkeiden kanssa lääkkeet täytyy tehdä jotka te ei enää käytetä. Ne hävitetään sitten vastuullisella tavalla ja eivät päädy ympäristöön . 6. Sisältö.

6. Sisältö ei käännettävää sisältöä pakkaus ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät tähän valmisteeseen ?Vaikuttava

- aine tässä valmisteessa on minoksididiili. Jokainen millilitra tästä valmisteesta ei ole liuos sisältää 50 mg minoksididiilia.
- Valmiste muut aineet tässä lääkkeessä ovat propyleeniglykoli ja etanoli (96%). Miltä

näyttää Minoxidil Linn ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa sisältääkö se yksi pakkaus? Kirkas, väritön - vaaleanpunainen, homogeeninen liuos.

Minoxidil Linn 50 mg/ml on saatavilla sisään pahvilaatikossa ulkopakkaus yksi tai of kolme läpinäkyvä, punainen pullo 100 ml, joissa on yksi suihkupää ja yksi väritön korkki. Sovitin toimitetaan erikseen mukana laatikossa ..

luvan haltija lupa ennen markkinoille tuomista tuoda ja valmistaja

Luvan haltija

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Alankomaat

Valmistaja
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Alankomaat

Medinfar Manufacturing, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

Tämä lääke on rekisteröity numerolla RVG 122548.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty viimeinen hyväksytty in syyskuu 2024.

Transtoyou