

Notice: information pour l' utilisateur

Minoxidil Linn 50 mg/ml solution pour usage cutané

Minoxidil

Lisez attentivement toute la notice avant d' utiliser ce va utiliser car il contient des informations importantes pour vous .

Utilisez ce médicament toujours exactement comme décrit dans cette notice ou comme votre médecin ou pharmacien vous l'a dit ..

- cette notice .. en aurez vous besoin plus tard à nouveau.
- Avez u encore questions? Contactez alors votre pharmacien.
- Ressentez -vous des effets secondaires un des effets indésirables mentionnés dans la rubrique 4 figurent? Ou ressentez -vous un effet secondaire qui ne dans cette notice figure? Contactez votre médecin ou votre médecin ou pharmacien ..
- votre symptôme après 6 6 mois non moins, ou est il même pire? Contactez alors votre médecin.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Minoxidil Linn et pourquoi est ce médicament utilisé?
2. Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser ou devez vous faire particulièrement prudent avec être?
3. Comment utilisez -vous ce médicament?
4. Possibles effets secondaires
5. Comment conservez -vous ce médicament?
6. Contenu de l' emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Minoxidil Linn et à quoi sert ce médicament utilisé?

Minoxidil Linn est un médicament qui stimule la croissance des cheveux et qui disponible est comme solution pour usage cutané de minoxidil (actif substance), dosé à 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn est indiqué pour le traitement de la 'classique' chez les hommes courante calvitie (alopécie androgénétique).

Minoxidil Linn est destiné à un usage externe et doit uniquement être appliqué sur le cuir chevelu ..

pousse de cheveux après six mois six mois encore pas amélioré? Contactez alors votre médecin.

2. Quand ne devez-vous ce médicament pas utiliser ou devez -vous faire preuve de prudence avec être?

Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser?

- Vous êtes allergique à un des composants de ce médicament. Ces composants peuvent u trouver dans rubrique 6.

Quand devez vous faire attention avec ce médicament ? Contactez votre médecin ou pharmacien avant de vous ce médicament utilisé.

Minoxidil Linn est pas destiné à l'utilisation chez un antécédents familiaux de perte de cheveux, si la perte de cheveux soudaine etof irrégulier se produit, si perte de cheveux le résultat est de grossesse ou accouchement (cela s'applique seulement pour les femmes), ou en cas de perte de cheveux inexplicquée. Ook in cas où la perte de cheveux le résultat est de certains traitements, comme la chimiothérapie pour le cancer, ou pour certaines maladies comme la carence en fer, affections de la thyroïde, problèmes avec le système immunitaire ou certaines forme de syphilis, ainsi que en cas de malnutrition sévère et en cas de certaines habitudes dans le soin extérieur (par ex. tresser ou queues de cheval serrées) le minoxidil ne doit pas être utilisé.

Vous devez votre cuir chevelu laisser examens avant vous commencez le traitement avec Minoxidil Linn. Votre cuir chevelu doit être sain ,normal et intact, car si une inflammation ou de lésion (abrasion, psoriasis, coup de soleil ou grave desquamation) de la peau a, peut l'absorption du médicament par la peau augmentée sont, ce qui un risque accru de risque systémiques effets secondaires avec soi entraîne.

Si vous souffrez de problèmes cardiaques (manque de sang par un rétréci ou obstrué vaisseau sanguin (ischémie), trouble du rythme cardiaque (arythmie), congestive insuffisance cardiaque ou valvulopathie),consultez alors puis votre médecin avant de commencer le traitement de Minoxidil Linn. Vous devez votre médecin à informer de votre antécédents médicaux (maladies précédentes, actuelles maladies et médicaments, allergies, etc.), afin que votre médecin votre état puisse évaluer etou vous puisse conseiller sur si le traitement avec Minoxidil Linn approprié est. Si vous commencez le traitement vous pouvez commencer, devez vous régulièrement contrôlé être par le médecin et devez vous être informé comment vous pouvez reconnaître de certaines effets secondaires reconnaître ,comme ::

- accélération du rythme cardiaque
- (tachycardie)soudainet
- inexplicqué en inexplicqué prise de poids
- difficulté avec respirer (surtout au repos)
- baisse pression artérielle, en général etou au repos
- le développement ou l' aggravation d' un oppressant, pressant, douloureux sensation sur la poitrine (angine de poitrine)
- gonflement du visage, mains, chevilles ou abdomen.

Si vous un des susmentionnés effets secondaires remarquez ou si vous un effet secondaire remarquez qui n'est pas dans cette notice mentionné, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin votre médecin.

Si vous simultanément antihypertenseurs médicaments utilisez, vous ne devez utiliser Minoxidil Linn seulement utiliser sous surveillance médicale.

Il y a des cas de pilosité excessive signalé sur le corps des nourrissons après contact cutané avec les endroits où le minoxidil a été appliqué chez les patients (soignants) qui appliqué localement le minoxidil minoxidil utilisaient. Le pousse des cheveux est redevenue en quelques mois à nouveau normale lorsque les enfants n'étaient plus exposés au minoxidil. Assurez- vous que cela enfants ne en contact entrer avec parties du corps où vous avez appliqué du minoxidil localement avez appliqué.

Consultez un médecin si vous remarquez une croissance excessive des poils sur le corps de votre enfant pendant la période que vous appliquez localement des produits avec minoxidil.

Personnes âgées

Minoxidil Linn ne doit pas être utilisé par les patients âgés de plus de 65 ans, car la sécurité n'est pas établie pour ce groupe ..

Enfants en jeunes jusqu'à 18 ans

Minoxidil Linn ne doit pas être utilisé par les patients plus jeunes que 18 ans, car la sécurité n'est pas établie pour ce groupe.

Utilisez-vous encore d'autres médicaments?

Utilisez-vous en plus de Minoxidil Linn encore d'autres médicaments, avez-vous que court il y a fait ou existe la possibilité que vous dans le proche avenir autres médicaments allez utiliser? Dites-le alors à votre médecin ou pharmacien.

Informez votre médecin si vous utilisez un des suivants médicaments sur la peau avant d'utiliser Minoxidil Linn:

- médicaments qui contiennent de la trétoïne ou d'autres rétinoïdes
- médicaments pour utilisation sur la peau qui contiennent des corticostéroïdes ou onguents couvrant la peau, crèmes ou autres substances grasses (par ex. vaseline).

N'exposez pas la peau traitée à la lumière directe du soleil, car des réactions cutanées peuvent survenir (par ex. érythème). Les coups de soleil peuvent survenir et à une augmentation de l'absorption de minoxidil par la peau.

Grossesse et allaitement

Êtes-vous enceinte, pensez-vous que vous êtes enceinte ou voulez-vous devenir enceinte ou allaitez-vous? Contactez votre médecin, avant de commencer à utiliser ce médicament.

Étant donné qu'il n'y a aucune étude adéquate et contrôlée avec Minoxidil Linn pendant la grossesse et l'allaitement, ce médicament n'est pas recommandé pendant ces périodes.

Aptitude à conduire et la utilisation de machines

Minoxidil Linn n'a aucune influence sur la capacité à conduire et à utiliser des machines.

Minoxidil Linn contient du propylène glycol. Il peut provoquer une irritation cutanée.

Minoxidil Linn contient de l'éthanol (alcool). Il peut provoquer une irritation, sensation de brûlure et une peau sèche. Si par accident vous entrez en contact avec des parties sensibles (yeux, muqueuses, écorchée peau), la zone affectée doit être soigneusement lavée avec une abondante quantité d'eau courante. Consultez votre médecin si la sensation de brûlure ou l'irritation persiste.

3. Comment utiliser ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours précisément comme décrit dans cette notice ou comme votre médecin ou pharmacien vous l'a dit .. sur l'utilisation correcte du produit? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Minoxidil Linn est uniquement destiné à un usage externe sur le cuir chevelu ..

posologie recommandée est de 1 ml de Minoxidil Linn deux fois par jour quotidiennement, toutes les 12 heures.

Retirez le bouchon de la bouteille. Appliquez 1 ml de solution Minoxidil Linn solution sur, en appuyant sur le pulvérisateur 6 fois pour appuyer ,deux fois deux fois par jour, toutes les 12 heures. Appliquez la solution au centre de la zone affectée et étalez avec vos doigts pour vous assurer que de à être que le médicament uniformément est réparti. Utilisez pour une application plus précise l'applicateur fourni dans l' emballage est inclus. Retirez le supérieur partie de la tête de pulvérisation et placez l'applicateur. Appuyez ensuite sur l'applicateur 6 fois , comme décrit ci-dessus ..

vos mains soigneusement après chaque chaque application.

Nettoyage de la pulvérisateur et applicateur

Retirez après chaque utilisation le partie supérieure de la tête de pulvérisation ou applicateur et rincez avec de l'alcool pour le avec de l'alcool pour le résidus du produit à éliminer et pour obstruction à prévenir.

Précautions pour l'utilisation

N'utilisez pas plus de 1 ml de la solution, quel que soit de taille de la zone affectée ,et appliquez pas plus de 2 ml de la solution par jour appliquer ..

l'inhalation du produit et en évitez contact avec les yeux, muqueuses et peau affectée par abrasion, inflammation ou lésions cutanées. Si cela se produit ,, doit le zone affectée être soigneusement lavée avec une quantité abondante d'eau courante du robinet. Consultez votre médecin si la sensation de brûlure sensation et/ou si l' irritation persiste.

Durée du traitement

Les études réalisées jusqu'à présent montrent que 4 ou plus mois de traitement avec Minoxidil Linn sont nécessaires nécessaire sont pour visible croissance des cheveux. Interruption du traitement peut dans 3 à 4 mois retour à l' état initial avec conséquence avoir.

Avez -vous trop de ce médicament utilisé ?

n'y a aucun cas signalé de surdosage de minoxidil comme conséquence de cutanée administration de ce médicament. Il peut toutefois croissance excessive et indésirable des poils se produire (visage, cou, dos, poitrine, abdomen, jambes) si il y a plus élevé recommandé sont utilisées ou si le médicament plus souvent est appliqué que puis recommandé, ou sur autres endroits que le cuir chevelu (notamment sur grandes parties du corps). Dans ce cas il faut interrompre le traitement être interrompu jusqu'à ce que de normale croissance des cheveux est rétablie (pour cela sont quelques mois nécessaires). Absorption systémique accrue de minoxidil (unclinique plus grave situation situation) peut également survenir, ce qui un risque accru de sur systémiques effets secondaires avec lui entraîne.

Par accident ingestion de Minoxidil Linn peut graves effets secondaires sur le corps entier provoquer liés à l' pharmacologique action de minoxidil (par ex. une augmentation du rythme cardiaque, rétention d'eau dans tissu (œdème), baisse pression artérielle, etc.). Allez en cas de

suspicion de surdosage ou intoxication avec ce médicament, immédiatement à un hôpital, pour un traitement symptomatique.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ? Avez-vous oublié de prendre le médicament à appliquer, faites-le aussi rapidement que vous le souvenez, sauf si c'est déjà presque l'heure pour la prochaine application. En ce cas, attendez jusqu'à la prochaine application et appliquez la dose habituelle, à la même heure, et reprenez le normal schéma thérapeutique. Utilisation aucune double dose pour une dose oubliée pour rattraper. Cependant, que le succès de la thérapie traitement dépend de l'application régulière base appliquer de ce médicament.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut également ce médicament avoir des effets indésirables, même si vous ne recevez pas tout le monde avec cela à faire.

Prenez immédiatement contact avec un médecin si vous un des symptômes suivants remarquez; peut-être avez u urgent médicale traitement nécessaire: gonflement du visage, les lèvres ou la gorge, ce qui avaler ou respirer difficile rend. Cela peut un signe sont de un grave allergique réaction (fréquence non connue, peut avec les disponibles données ne être déterminée).

Très souvent fréquents effets secondaires (chez plus de 1 sur 10 utilisateurs): Maux de tête.

Souvent fréquents effets secondaires (chez 1 à 10 sur 100 utilisateurs):

Essoufflement (dyspnée),

Démangeaison (prurit), pilosité excessive (hypertrichose), (peau)éruption, rougeur (éruption cutanée), acné-iforme réaction cutanée, inflammation de la peau (dermatite).

Douleur musculaire.

Rétention d'eau dans les membres.

Parfois fréquent effet secondaire (chez moins de 1 sur 100 utilisateurs): Pression artérielle basse (hypotension).

Rarement survenant effets secondaires (chez moins de 1 sur 1000 utilisateurs): Augmentation du rythme cardiaque (tachycardie), palpitations.

Effets secondaires avec fréquence 'Non connu' (sur la base des données disponibles il n'est pas possible de déterminer):

Hypersensibilité, gonflement soudain de la peau et muqueuses) (par ex.. de lèvre, langue, bouche, gorge ou visage), avec comme conséquence difficultés respiratoires et/ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme allergique réaction (angio-œdème), inflammation de la peau après contact avec ce produit.

Humeur dépressive.

Vertiges.

Irritation oculaire.

Hypotension artérielle (hypotension).

Nausée, vomissements.

Calvitie (cela cesse après quelques semaines d'utilisation de minoxidil et peut revenir par chute de vieux et croissance de nouveaux cheveux), changement de couleur des cheveux, changement de couleur des cheveux, anomalie dans la texture des cheveux, texture des cheveux, réaction au site de de application: démangeaison, irritation, douleur, (peau) éruption cutanée, gonflement, peau sèche, rougeur, desquamation, desquamation de peau (exfoliation), dermatite, formation de cloques, saignement et ulcération. Douleur dans la poitrine.

Le signalement de effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires, effets secondaires contactez alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux éventuels effets secondaires qui ne figurent pas dans cette notice. U pouvez effets secondaires également directement signaler via le Néerlandais Centre des Effets Indésirables Lareb, site web : www.lareb.nl www.lareb.nl. signalant les effets secondaires, vous pouvez nous aider à aider plus d'informations à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conservez -vous ce médicament?

Conserver en dessous de 25°C. Ne pas dans le réfrigérateur ou le congélateur conserver.

Garder la bouteille bien fermée.

Durée de conservation après ouverture: 50 jours.

À l'extérieur du vue et portée de enfants garder.

Utilisez ce médicament pas après la date de péremption. Elle est date de péremption trouver sur le trouver sur la boîte ou la bouteille après « Exp. ». Là se trouve un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date limite de péremption.

Rincez médicaments ne par le lavabo ou les toilettes et jetez les ne dans la poubelle.

Demandez votre pharmacien ce que vous devez faire avec médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Elles sont alors de une manière responsable détruites et ne se retrouvent pas dans l'environnement finalement.

6. Contenu de l' emballage et autres informations

Quelles substances contiennent ce médicament ? La

- substance active dans ce médicament est le minoxidil. Chaque millilitre de la de la solution contient 50 mg minoxidil.
- Le autres substances dans ce médicament sont propylène glycol et éthanol (96%).

À quoi ressemble Minoxidil Linn et combien y a-t-il dans est inclus dans un emballage?

Clair, incolore à rose clair, solution homogène.

Minoxidil Linn 50 mg/ml est disponible dans boîte en carton avec un ou trois transparentes, rouges flacons de 100 ml, avec un pulvérisateur et un bouchon incolore. Un applicateur est fourni séparément dans la boîte.

Titulaire de l' autorisation pour la mise sur le marché mettre et fabricant

Titulaire de l'autorisation
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Pays-Bas

Fabricant
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Pays-Bas

Medinfar Manufacturing, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

Ce médicament est enregistré sous RVG 122548.

Cette notice a été pour la dernière approuvée en septembre 2024.