

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui

Minoxidil Linn 50 mg/ml tirpalas vietiniam naudojimui Minoxidil

Perskaitykite

atydžiai visą pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą vaistas eis naudoti nes yra svarbi informacija joje jums. Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba šiame lapelyje kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas jums tai pasakė ..

- šį pakuotės lapelį .. prireiks jums jo vėliau vėl . Ar.
- ? u dar klausimai? Tada susisiekite su jūsų vaistininku.
- Ar jums pasireiškia viena iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Arba pasireiškia jums vienas šalutinis poveikis kuris nėra šiame šiame pakuotės lapelyje nurodytas? Susisiekite su savo savo gydytoju arba vaistininku ..
- jūsų skundas po 6 6 mėnesiai ne mažiau, arba tampa jis netgi blogiau? Tada kreipkitės į savo gydytoją.

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Minoxidil Linn ir kam vartojamas šis vaistas naudojamas?
2. Kada negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo ? Kaipnaudojate
3. jūs šį vaistą šis vaistas?
4. Galimos nepageidaujamos reakcijos
5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 1.

1. Kas yra Minoxidil Linn kam naudojamas yra šis vaistas naudojamas?

Minoxidil Linn yra vaistas vaistas kuris plaukų augimą skatina ir kuris prieinamas yra kaip tirpalas odos naudojimui minoksidilio (minoksidilio (veiklioji medžiaga), dozuota 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn yra nurodytas skirtas de gydymui 'įprastos' vyrams pasitaikančios plikimo (alopecija androgeninė).).

Minoxidil Linn yra skirtas išoriniam naudojimui ir turi būti tik tepamas ant galvos odos ..

jūsų plaukų augimas po šešių mėnesių mėnesiai dar ne pagerėjo? Tada susisiekite su jūsų gydytoju.

2. Kada negalite šio vaisto ne vartoti ar turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Kada galite šį vaistą ne vartoti?

- Jūs esate alergiškas vienai iš sudedamųjų medžiagų šiame vaistiniame preparate. Šias medžiagas galite u rasti į skyrių 6.

Kada turite būti papildomai atsargūs su šiuo vaistu ?Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku prieš jūs u šis vaistas naudojamas.

Minoxidil Linn yra nėra skirtas naudoti esant šeimos istorijai plaukų slinkimo nuo plaukų slinkimo, jei plaukų slinkimas staiga irof nereguliarus atsiranda, jei plaukų slinkimas yra pasekmė nėštumo ar gimdymo (taitaikoma tik moterims), arba esant nepaaiškinamam plaukų slinkimui nepaaiškintas plaukų slinkimas. Taip pat atvejais kai plaukų slinkimas yra pasekmė tam tikrų gydymų gydymastokių kaip chemoterapija nuo vėžio , arbanuo tam tikrų ligų tokių kaip geležies trūkumas geležies trūkumas, skydliaukės ligos, problemų su imunitetu ar tam tikra forma sifilio ,taip pat esant sunkiai nepakankamai mitybai ir esant tam tikriems įpročiams įpročiai in išorinė priežiūra (pvz. įpinti arba įtemptos arklio uodegos) minoksidilio negalima būti naudoti.

Jūs turite savo galvos odą leisti tyrimai prieš jūs pradedate gydymą gydymas su Minoxidil Linn. Jūsų galvos oda turi būti sveika yra, normali ir nepažeista, nes jei yra uždegimas arba žaizda (nubrozdinimas, psoriazė, saulės nudegimas arba sunkus nudegimas) odos turi ,gali vaisto absorbcija per vaistą per odą padidėti padidėjęs yra, kas padidėjusi rizika sisteminėms šalutinėms reakcijoms su savimi atsineša ..

kenčiate nuo širdies problemų širdies problemos kraujo trūkumas dėl vieno vienas susiaurėjęs arba užsikimšęs kraujagyslė (išemija), sutrikimas širdies ritme (aritmija), stazinis širdies nepakankamumas arba širdies vožtuvų liga), pasitarkite tada jūsų gydytojas prieš pradedant gydymą Minoxidil Linn. Jūs turite jūsų gydytoją apie informuoti apie jūsų medicininę istoriją (ankstesnes ligas, dabartines ligas ir medikamentai, alergijos, ir kt.), kad jūsų gydytojas jūsų būklę gali įvertinti ir/arba jus gali patarti ar gydymas su Minoxidil Linn tinkamas yra. Jei jūs su gydymu galite pradėti, turite jūs reguliariai tikrinamas būti gydytojo ir turite jūs žinoti būti turite kaip jūs atsiradimas nuo kai kurių šalutinių poveikių galite atpažinti, tokius kaip:

- sunkios odos reakcijos
- pagreitėjęs širdies ritmas (tachikardija)
- staigus ir nepaaiškinamas svorio padidėjimas
- sunkumas su kvėpavimu (ypač ramybės būsenoje)
- sumažėjęs kraujospūdis, apskritai bendras ir/arba ramybės būsenoje
- vystymasis vystymasis arba paūmėjimas iš vienas spaudžiantis, spaudžiantis, skausmingas pojūtis ant krūtinės (krūtinės angina)
- patinimas veido ,rankų ,čiurnų ar pilvo ..

vieną iš aukščiau paminėtų aukščiau minėtas šalutinis poveikis pastebite arba jei jūs bet kokį šalutinį poveikį pastebite kuris nėra šiame šiame pakuotės lapelyje nurodytas, nedelsdami nutraukite gydymą ir kreipkitės pasitarkite jūsų gydytojas.

Jei jūs tuo pačiu metu kraujospūdį mažinančius vaistus vartojate, galite Minoxidil Linn tik naudoti prižiūrint medicinos specialistui..

atvejų kai pernelyg plaukų augimas atsiranda pranešta ant kūno kūdikių po odos kontakto su vietomis kur minoksidilas buvo užteptas pas pacientus (globėjus) kurie vietinai užteptas minoksidilas minoksidilas naudojo. De plaukų augimas tapo per kelis mėnesius vėl normalus kai de vaikai nebuvo veikiami minoksidilo. Užtikrinkite kad minoksidilui. Užtikrinkite kad kad vaikai ne su kontaktu ateiti su kūno dalimis kur jūs minoksidilį vietinai turite užteptą. Pasitarkite su gydytoju jei jūs perteklinis plaukų augimas ant kūnas iš jūsų vaiko pastebite per tą laikotarpį kai jūs vietinai naudoti tepti produktus su minoksidiliu naudojate ..

Minoksidilio Linn negalima

Minoksidilas Linn mag ne būti naudojamas per pacientams vyresniems nei 65 metų, nes saugumas nebuvo nustatytas nustatyta šiai grupei . Vaikai.

Vaikai en jaunimas iki 18 metų

Minoxidil Linn negalima ne būti naudojamas pacientams pacientams jaunesniems nei 18 metų, nes saugumas saugumas nenustatytas nenustatytas yra už šios grupės.

Vartojate jūs kitus vaistus vaistaiVartojate

jūs be Minoxidil Linn kitus vaistus , turitejūs turi u kad trumpai atgal padaryta arba egzistuoja galimybė kad jūs artimoje ateityje kitus vaistus pradėsite vartoti ?Pasakykite tai tada tada jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Pasakykite tai jūsų gydytojui jei jūs vieną iš šiuos vaistus ant odos tepate prieš jūs Minoxidil Linn naudojate:

- vaistai kurie tretinoinas arba kiti retinoidai turi
- vaistai skirti naudoti ant odos kurie kortikosteroidai turi arba odos dengiančios tepalai, kremai ar kitos riebi medžiagos (pvz. vazelinai).

Neleiskite gydomai odai būti veikiamai intensyvios saulės šviesos ,kadangi odos reakcijos odos reakcijos (pvz. eritema) iš saulės nudegimas gali pasireikšti ir iki padidėjusios absorbcijos minoksidilio per odą gali sukelti ..

ir žindymas žindymas

Ar esate nėščia, manote esate nėščia ar būsite, norite pastoti ar žindote kūdikį ? Susisiekite su savogydytoju, prieš jūs prieš u šis vaistas naudojamas.

Kadangi nėra nėra tinkamų ir kontroliuojamų tyrimų su Minoxidil Linn atlikta nėštumo metu nėštumo ir žindymo, rekomenduojama šis vaistas ne rekomenduojama per šiuos laikotarpiais.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų naudojimas Minoksidilas Linn

neturi įtakos gebėjimui vairuoti transporto priemonės galia apie transporto priemonės valdyti ir naudoti mašinas valdyti naudoti.

Minoxidil Linn turi propilenglikolio. Jis gali sukelti odos dirginimą sukelti.

turi etanolio (alkoholio). Jis gali sukelti dirginimą, deginantis pojūtis ir sausa oda sukelti. Jei netyčia patenka į kontaktą su jautriomis vietomis (akys,gleivinės gleivinės, nubrozdzinta oda), turi būti pažeista sritis atsargiai turi būti nuplauta su gausiu kiekiu tekantis vandentiekio vanduo geriamasis vanduo. Į savo jūsų gydytojas jei jis deginantis jausmas ir/arba dirginimas tęsiasi.

3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip aprašyta in šiame pakuotės lapelyje arba kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas jums tai pasakė .. dėl teisingo vartojimo naudojimas? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Minoxidil Linn yra tik skirtas tik išoriniam naudojimui ant galvos odos.

Rekomenduojama dozė yra 1 ml Minoxidil Linn yra 1 ml Minoxidil Linn kartus per dieną, kas 12 valandų.

Nuimkite dangtelį nuo butelio. Užtepkite 1 ml Minoxidil Linn tirpalo priepurkštuvą 6 6 rūgštis paspausdami te ,du kartus du kartus per dieną, kas 12 valandų. Užtepkite tirpalą ant vidurio pažeistos vietos ir paskirstykite jį savo pirštų galiukais kad būtumėte tikri dėl iš te yra kad tas vaistas tolygiai yra paskirstytas. Naudokite dėl tikslesnio panaudojimo aplikatorių, kuris yra pakuotėje yra pridėtas pridėtas. Pašalinti viršutinę dalį purkštuko dalies ir uždėkite vieta kartus , kaip aukščiau aprašyta ..

savo rankas atsargiai po kiekvieno kiekvienas užtepimas.

Valymas iš purkštuvo ir aplikatoriaus

Pašalinkite po kiekvieno naudojimo viršutinę dalį iš purškimo galvutės ar aplikatoriaus ir skalaukite su alkoholiu, kad su alkoholiu, kad likučiai iš produkto pašalinti pašalinti ir kad užsikimšimo išvengti išvengti.

Atsargumo priemonės prieš naudojimą

Naudokite ne daugiau nei 1 ml tirpalo, nepaisant de dydis paveikto ploto ,ir tepkite ne daugiau nei 2 ml tirpalo per dieną . Venkite įkvėpti.

ir dusulys produkto ir venkite kontakto su akimis, gleivinėmis ir oda pažeista dėl nudegimo, uždegimo ar odos pažeidimų. Jei tai vis dėlto atsitinka, turi vieta pažeista sritis atsargiai turi būti nuplauta su kiekvieną gausią kiekį tekančio vandentiekio vandens. Pasitarkite su savo gydytoju jei vieta deginantis jausmas ir/ar dirginimas tęsiasi.

Gydymo trukmė

Iki šiol atlikti tyrimai rodo kad 4 ar daugiau mėnesių gydymas su Minoxidil Linn reikalingas reikalingas yra dėl matomas plaukų augimas. Nutraukimas gydymo gali per 3 3 4 4 sugrįžimas į pradinę būklę iki rezultatas pasekmė turėti.

Ar jūs per daug šio vaisto naudojote ?Nėra

pranešta apie jokių atvejus perdozavimo minoksidilio vienas perdozavimas minoksidilis kaip pasekmė nuo odos vartojimo šio vaisto . Galitačiau pernelyg ir nepageidaujamas plaukų augimas pasireikšti (veidas , kaklas, nugarą,krūtinėkaklas, nugarą, krūtinė, pilvas, kojos) jei yra didesnės dozės nei rekomenduojama buvo naudojamos arba jei vaistas dažniau buvo tepamas nei tada rekomenduojama, arba ant kitose vietose nei galvos oda (ypač ant didelėse kūno dalyse).Tokių atveju reikia gydymą nutraukti kol bus nutrauktas kol de normali plaukų augimą yra atstatytas (tam reikia kelių mėnesių).Padidėjusi sisteminė absorbcija minoksidilio (vienakliniškai rimtesnė situacija situacija) gali taip pat pasireikšti, kas padidina riziką sisteminių šalutinių poveikių su savimi neša ..

nurijimas Minoxidil Linn vartoti Minoksidilio Linn gali sunkus šalutinis poveikis visam kūnui sukelti susijęs su farmakologiniu minoksidilio veikimu (pvz.. širdies ritmas ,skysčių kaupimasis skysčių kaupimasis in audinys (edema), sumažėjęs kraujospūdis, ir kt.). Kreipkitės esant įtarimui dėl perdozavimo ar apsinuodijimo šiuo vaistu vaistas, nedelsiant į ligoninę ,dėl simptominio gydymo gydymas.

pavartoti šį vaistą ? Ar pamiršote pavartotivaistą

? Ar pamiršote vaistą vaistas prie taikyti atnešti, darykite tai taip greitai jūs save prisiminsite, nebent jau beveik laikas yra prieš kitą taikymą taikymasTokių atveju tas atvejis, palaukite kol

kitas panaudojimas ir panaudokite įprastą dozę, tuo pačiu laiku, ir tęskite įprastą vartojimą normalią normalus gydymo schema.

Naudojimas ne dviguba dozė kad pamirštą dozę atkurti. Atminkite tačiau.

sėkmė gydymo priklauso nuo teisingo naudojimo gydymas priklauso nuo to, kaip reguliariai pagrindu taikote šį vaistą vaistas.

turite dar kitų klausimų apie vartojimą šio vaisto šis vaistas? Tada susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali ir šis vaistas šalutinį poveikį turėti, nors nepatiria ne kiekvienas su tuo daryti padaryti.

Paimkite nedelsiant susisiekite su gydytoju gydytoju jei jūs vieną iš šių simptomus pastebite; galbūt turite u skubiai medicininės gydymo reikia:

patinimas veido veido, lūpų ar gerklės, kas rijimą ar kvėpavimą apsunkina. Tai galibūti gali vienas ženklas yra iš vienas sunkios alerginės reakcijos (dažnis nežinomas, negali su turimais turimais duomenimis nustatyti negalima būti nustatytas).

Labai dažnai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (daugiau nei 1 iš 10 vartotojų): Galvos skausmas.

Dažnai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (nuo 1 iki 10 iš 100 vartotojų):

Dusulys (dusulys),

Niežulys (niežėjimas), perteklinis plaukuotumas (hipertrichozė), (oda)bėrimas, paraudimas (bėrimas), spuogų-panašus odos reakcija, odos uždegimas (dermatitas).

Raumenų skausmas.

Skysčių kaupimasis galūnėse ..

pasireiškiantis šalutinis poveikis (mažiau nei 1 iš 100 vartotojų mažiau nei 1 iš 100

Sumažėjęs kraujospūdis (kraujospūdis (hipotenzija).

Retai pasitaikančios šalutinės reakcijos (tarp mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų): Padidėjęs širdies ritmas (tachikardija), širdies plakimas.

Šalutinės reakcijos su dažniu 'Ne žinoma' (remiantis žinomais duomenimis negalima nustatyti dažnio negalima būti nustatytas):

Padidėjęs jautrumas, staigus patinimas odos ir ir gleivinės) (pvz. lūpų, liežuvio, burnos, gerklės ar veido), su kaip pasekmė kvėpavimo sunkumai ir/arba niežulys ir odos bėrimas, dažnai kaip alerginė reakcija (angio-edema), uždegimas odos po kontakto su šia medžiaga ..

nuotaika. Galvos svaigimas

Galvos svaigimas.

Akių dirginimas.

kraujospūdis kraujospūdis (hipotenzija).

Pykinimas, vėmimas.

Plikimas (tai sustoja po kelių savaičių vartojimo minoksidilio ir gali atsirasti ateiti per netekimas senų ir augimas naujų plaukų), plaukų spalvos pokytis, nukrypimas plaukų tekstūroje, reakcijavietoje reakcija taikymo vieta nuo užtepti: niežulys, dirginimas, skausmas,

(oda)bėrimas, patinimas, sausa oda, paraudimas, pleiskanojimas iš oda (eksfoliacija), odos uždegimas, pūšlių susidarymas, kraujavimas ir opų susidarymas. Skausmas krūtinės ląstoje ..

apie pranešimas apie šalutinis poveikis

Jei jums pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir galimiems šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame lapelyje paminėti stovėti. U gali šalutinius poveikius taip pat tiesiogiai pranešti per Nyderlandų Šalutinių poveikių Centras Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami šalutinius poveikius te pranešti, gali jūs mus padėti daugiau informacijos gauti apie šio saugumą vaisto šis vaistas.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti žemiau 25°C. Ne laikyti šaldytuve ar šaldiklyje laikyti.

Laikykite butelį gerai uždarytą.

Galiojimo laikas po atidarymo: 50 dienų.

Laikyti ne regėjimo ir pasiekiamumo vaikų laikyti ..

šį vaistą ne ilgiau nei galiojimo terminas . Jis vyrarasti ant pakuotės antibiotikas amoksicilinas 500 mg kapsulės, vartojamos tris kartus per dieną, gali sukelti šalutinį poveikį, pvz., pykinimą, viduriavimą ir alergines reakcijas. dėžutė arba butelis po „Exp.“. Ten nurodyta mėnuo ir metai . Paskutinė dieno mėnesio yra galiojimo pabaigos data . galiojimo data.

Išskalaukite vaistus ne per kriauklę ar WC ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais reikia daryti kurio jūs ne daugiau naudojate. Jie yra tada atsakingu būdu sunaikinami ir nepatenka į aplinką . 6. Turinys.

6. . 6. pakuotė ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?Veiklioji

- medžiaga šiame vaistiniame preparate yra minoksidilas. Kiekviename mililitre šio vaistinio tirpalas sudėtyje yra 50 mg minoksidilio.
- Šio kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra propilenglikolis ir etanolis (96%).

Kaip atrodo Minoksidilas Linn ir kiek yra pakuotėje vienas pakuotė?

Skaidrus, bespalvis iki šviesiai rožinis, vienalytis tirpalas.

Minoxidil Linn 50 mg/ml yra prieinamas į kartoninėje dėžutėje su vienu arba trys skaidrus, raudonas buteliai po 100 ml, su vienas purkštuku ir vienas bespalvis dangteliu. Vienas aplikatorius yra atskirai pridėdamas į dėžutę.

Laikytojas leidimo turėtojas už į prekybą pateikimas ir gamintojas

Leidimo turėtojas

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Nyderlandai

Gamintojas
MAE Holding BV
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Nyderlandai

Medinfar Manufacturing, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares
Rua Outeiro da Armada, 5
Condeixa-a-Nova
3150-194 Sebal
Portugal

Šis vaistas yra įregistruotas su RVG 122548.

Ši pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas paskutinis patvirtintas in rugsėjis 2024.

Transtoyou