

## Ulotka: informacja dla użytkownika użytkownika

### Minoxidil Linn 50 mg/ml roztwór do stosowania na skórę

#### Minoxidil

Przeczytaj uważnie całą ulotkę zanim użyjesz tego leku i gdzie używać ponieważ jest to ważne informacje dla Ciebie.

Używaj tego leku zawsze dokładnie jak opisano w tej ulotce lub jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział ..

- tę ulotkę .. będziesz jej potrzebować później ponownie . Czy.
- Ma u jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim farmaceutą.
- Czy masz problemy z jednym z działań niepożądanych wymienionych w sekcji 4 znajdują się? Lub czy masz jedno działanie niepożądane które nie w tej ulotce jest? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą ..
- twoja dolegliwość po 6 6 miesięcy nie mniej, lub jest on nawet gorzej? Skontaktuj się z swoim lekarzem.

Zawartość tej ulotki Co to jest Minoxidil Linn

1. Co to jest Minoxidil Linn do czego jest ten lek środek używać?
2. Kiedy nie wolno tego leku nie stosować lub musisz być szczególnie ostrożny z nim?
3. Jak używać tego leku środek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowujesz ten lek ?Zawartość
6. opakowania i pozostałe informacje 1. Co to jest Minoxidil Linn

1. w jakim celu jest stosowany jest ten lek używany?

Minoxidil Linn jest lekiem który wzrost włosów stymuluje i który dostępny jest jako roztwór do stosowania zewnętrznego minoksydylu (czynna substancja), dawkowany na 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn jest wskazany do leczenia łysienia typowego u mężczyzn występującego łysienia (alopecia androgenetica).

Minoxidil Linn jest przeznaczony do zewnętrznego użytku i powinien być wyłącznie nakładany na skórę głowy ..

twój wzrost włosów po sześciu miesiącach jeszcze nie poprawiony? Skontaktuj się z swoim lekarzem.

2. Kiedy nie wolno tego leku nie stosować lub musisz być szczególnie ostrożny z nim być?

Kiedy możesz tego leku nie używać?

- Jesteś uczulony na jeden z substancji w tym leku. Te substancje możesz znaleźć w rubryce 6.

Kiedy musisz być dodatkowo ostrożny z tym lekiem ?Skontaktuj się z

swoim lekarzem lub farmaceutą zanim ty u ten środek używany.

Minoxidil Linn jest nie przeznaczony do użytku przy rodzinnej historii wypadania włosów z wypadania włosów, jeśli wypadanie włosów nagłe iof nieregularny występuje, jeśli wypadanie włosów to skutek jest ciąży lub porodu (to dotyczy tylko kobiet ), lub przy niewyjaśnionym wypadaniu włosów wypadanie włosów. Ook in przypadkach w których wypadanie włosów jest wynikiem pewnych leceń leceń takich jak chemioterapia przy raku , lub przy pewnych chorobach takich jak niedobór żelaza niedobór żelaza, choroby tarczycy, problemy z odpornością lub określona forma kiły ,jak również przy ciężkim niedożywieniu niedożywienie przy określonych nawykach nawyki w zewnętrznej pielęgnacji (np. wplatanie lub ciasne kucyki) minoksydyl nie może być używany.

Należy swoją skórę głowy pozostawić pozwolić badania zanim Pan/i zaczniesz leczenie leczeniem Minoxidil Linn. Pańska skóra głowy musi zdrowa być, normalna i nienaruszona, ponieważ jeśli jest zapalenie lub uraz (otarcie, łuszczyca, oparzenie słoneczne lub poważne odparzenie) skóry ma ,może to wchłanianie leku przez skórę zwiększyć skóra podwyższony są, co jeden zwiększone ryzyko na ogólnoustrojowe działania niepożądane z sobą niesie.

Jeśli cierpisz na problemy z sercem problemy z sercem niedobór krwiz powodu jednego jeden zwężony lub zablokowany naczynie krwionośne (niedokrwienie), zaburzenie rytmu serca (arytmia), zastoinowa niewydolność serca lub choroba zastawkowa serca), skonsultuj się z twój lekarz zanim rozpoczniesz leczenie Minoxidil Linn. Powinieneś poinformować swojego lekarza o swojej historii medycznej ( wcześniejsze choroby, obecne choroby bieżące choroby i leki, alergie, itp.), aby Twój lekarz Twoją kondycję może ocenić i2Fczy może doradzić czy leczenie z Minoxidil Linn odpowiedni jest. Jeśli z leczeniem można rozpocząć, powinien Pan/Pani regularnie kontrolowany być przez lekarza przez lekarza powinien Pan/Pani wiedzieć o tym jak wystąpienie z niektórymi działaniami niepożądanymi można rozpoznać, takich jak:

- ciężkie reakcje skórne
- przyspieszone tętno (tachykardia)
- nagłe i niewyjaśnione przyrost masy ciała
- trudności z oddychaniem (zwłaszcza w spoczynku)
- obniżone ciśnienie krwi, ogólnie ogólnie i/ lub w spoczynku
- rozwój rozwój lub pogorszenie z jednego uciskającego, naciskającego, bolesny uczucie na klatce piersiowej (dławica piersiowa)
- obrzęk twarzy ,rąk ,kostek lub brzucha ..

jeden z wymienionych powyżej wspomniany powyżej działania niepożądane zauważa lub jeśli Pan/Pani jakiegokolwiek działanie niepożądane zauważa które nie w tej ulotce występuje, przerwij natychmiast leczenie i skonsultuj się z lekarzem twój lekarz.

Jeśli jednocześnie leki obniżające ciśnienie krwi leki stosujesz, możesz stosować Minoxidil Linn tylko stosować pod nadzorem lekarskim.

Są przypadki nadmiernego nadmiernego wzrostu włosów zgłoszono na ciało niemowląt po kontakcie skórnym kontakt skórnym miejscami gdzie minoksydyl był nałożony nałożony pacjentów ( opiekunów) którzy miejscowo nałożony minoksydyl minoksydyl używali. De wzrost włosów stał się w ciągu kilku miesięcy ponownie normalny gdy de dzieci nie dłużej były narażone na minoksydyl. Upewnij się że dzieci nie w kontakcie wchodzić z częściami ciała gdzie stosujesz minoksydyl miejscowo zastosowałeś nałożony.

Skonsultuj się z lekarzem jeśli masz nadmierny porost włosów na ciało z twojego dziecka zauważa podczas okresu kiedy używasz miejscowo do stosowania produkty z minoksydylem używasz z minoksydylem Seniorzy.

#### Osoby starsze

Minoksydyl Linn mag nie być używane przez pacjentów starszych niż 65 lat, ponieważ bezpieczeństwo nie ustalone jest dla tej grupy ..

#### Dzieci en młodzież do 18 lat

Minoxidil Linn nie może być stosowany przez pacjentów młodszych niż 18 lat ,ponieważ bezpieczeństwo nie zostało ustalone ustalony jest dla tej grupy.

#### Używasz Pan/i jeszcze inne leki?

Używasz Pan/i oprócz Minoxidil Linn jeszcze inne leki, czy Pan/i że krótko temu zrobione lub istnieje możliwość że w najbliższej przyszłości inne leki będziesz używać ?Powiedz to wtedy następnie twój lekarz lub farmaceuta.

Powiedz to twój lekarz jeśli ty jeden z następujących leków na skórę stosujesz zanim użyjesz Minoxidil Linn używasz:

- leki które tretinoina lub inne retinoidy zawierają
- leki do stosowania na skórę które kortykosteroidy zawierają lub maści ochronne maści, kremy lub, kremy lub inne tłuste substancje (np. wazelina).

Nie wystawiaj leczonej skóry na działanie intensywnego światła słonecznego ,ponieważ reakcje skórne reakcje skórne (np.. rumień) lub oparzenie słoneczne mogą wystąpić i do zwiększonej absorpcji minoksydylu przez skórę mogą prowadzić ..

#### Ciąża karmienie piersią karmienie piersią

Czy jesteś w ciąży, myślisz że jesteś w ciąży lub chcesz zacząć w ciążę lub karmisz piersią ? Skontaktuj się z swoim lekarzem,zanim zrobisz lekarz, zanim u ten lek używany.

Ponieważ nie ma odpowiednich i kontrolowanych badań z Minoxidil Linn zostały przeprowadzone podczas ciąży i karmienia piersią, jest ten lek nie zalecane podczas tych okresów.

#### Zdolność prowadzenia pojazdów i prowadzenie maszyn Minoxidil Linn

nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów pojazdy do prowadzić i maszyny do używać.

Minoxidil Linn zawiera glikol propylenowy. Może powodować podrażnienie skóry powodować. zawiera etanol (alkohol). Może powodować podrażnienie podrażnienie, pieczenie uczucie i sucha skóra powodować. Jeśli przypadkowo wejdzie w kontakt z wrażliwymi obszarami ( oczy,błony śluzowe błony śluzowe, otarcie skóry), należy obszar dotknięty miejsce starannie zostać umyte pod dużą ilością bieżącej wody z kranu. Skonsultuj się z swoim lekarz jeśli to pieczenie uczucie i2F lub podrażnienie utrzymuje się.

### 3. Jak stosować Pan ten lek?

Stosuj ten lek zawsze dokładnie jak opisano w tej ulotce lub jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział .. co do prawidłowego stosowania użycie? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Minoxidil Linn jest wyłącznie przeznaczony do zewnętrznego stosowania na skórę głowy.

Zalecana dawka to 1 ml Minoxidil Linn dwa razy dziennie, co 12 godzin.

Usuń nakrętkę z butelki. Nałóż 1 ml Minoxidil Linn roztworu na, naciskając rozpylacz 6 razy w celu rozpylenia, dwa razy dziennie na dzień, co 12 godzin. Nałóż roztwór na środek zmienionego miejsca i rozprowadź go opuszkami palców aby upewnić się że te są że to lek równomiernie jest rozprowadzony. Użyj do bardziej dokładnego nakładania aplikator dołączony do opakowania jest dołączony. Usuń górną część spray'u z głowicą i umieść aplikator. Następnie naciśnij aplikator 6 razy , jak powyżej opisano.

Umyj swoje ręce dokładnie po każdym aplikacja.

Czyszczenie z rozpylacza i aplikatora

Usuń po każdym użyciu górną część z główki sprayu lub aplikatora aplikatora płucz alkoholem, aby z alkoholem, aby resztki produktu aby usunąć i aby zator zapobiec ..

przed użyciem Nie używaj

więcej niż 1 ml roztworu następnie 1 ml roztworu niezależnie, niezależnie de wielkość obszaru dotkniętego obszaru, i nie więcej niż 2 ml roztworu roztworu na dzień stosować ..

wdychania produktu produktu w unikaj kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą dotkniętą przez otarcia, zapalenie lub uszkodzenia skóry. Jeśli to się zdarzy, musi to dotknięty obszar starannie zostać umyte z dużą ilością bieżącej wody z kranu. Skonsultuj się z lekarzem jeśli to pieczenie uczucie i/lub podrażnienie utrzymuje się.

Czas trwania leczenia

Dotychczas przeprowadzone badania wskazują że 4 lub więcej miesięcy leczenia z Minoxidil Linn potrzebne potrzebny są dla widoczny wzrost włosów. Przerwanie leczenia może w ciągu 3 3 4 4 powrót do stanu początkowego do skutek do skutek mieć.

Czy Pan/Pani za dużo tego leku użył ?Nie

ma żadnych przypadków zgłoszonych przedawkowania minoksydylu jeden przedawkowanie minoksydyl jako skutek podania skórno tego leku . Może jednak wystąpić nadmierny i niepożądany wzrost włosów ( twarz , szyja, plecy,klatka piersiowa, szyja, plecy, pierś, brzuch, nogi) jeśli jest wyższe dawki niż zalecane są stosowane lub jeśli lek lek częściej jest stosowany niż zalecane, lub na inne miejsca niż skóra głowy (zwłaszcza na duże obszary ciała ). Wtym przypadku należy przerwać leczenie do czasu aż aż de normalny wzrost włosów jest przywrócony (do tego potrzebne są kilka miesięcy ).Zwiększona systemowa absorpcja minoksydylu ( sytuacjaklinicznie poważniejsza sytuacja sytuacja) może również wystąpić, co zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych działania niepożądane sobą niesie ..

spożycie Minoxidil Linn przyjmować z Minoksydyl Linn może poważne działania niepożądane na całe ciało powodować związane z działaniem farmakologicznym minoksydylu ( np.. częstotliwość akcji serca ,zatrzymanie płynów zatrzymanie płynów w tkance (obrzęk), obniżone ciśnienie krwi, itp.). Skontaktuj się przy podejrzeniu przedawkowania lub zatrucia tym lekiem , lekarstwo, natychmiast do szpitala ,w celu leczenia objawowego leczenia.

użyć tego leku ? Czy zapomniałeś użyć leku

? Czy zapomniałeś użyć leku na nałożyć przynieść, zrób to tak szybko jak sobie przypomnisz, chyba że już prawie czas jest na następną aplikację . W tym że przypadek, poczekaj aż do następnego zastosowania i zastosuj zwykłą dawkę , o tej samej porze , i wznów normalny schemat stosowania . schemat leczenia.

Użycie żadnej podwójnej dawki aby pominąć zapomnianą dawkę w nadrobić ..

Jednak że sukces leczenia zależy od regularnego stosowania na nakładanie tego leku lekarstwo.

masz jeszcze inne pytania dotyczące użycia tego leku to lekarstwo? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

#### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć, choć nie występują każdy z tym do zrobić.

Skontaktuj się natychmiast skontaktuj się z lekarzem jeśli zauważysz jeden z następujących objawów ;możliwe masz ma u pilne medyczne leczenie potrzebne: obrzęk twarzy ,warg lub gardła, co połykanie lub oddychanie utrudnia . To może być jeden znak są z jeden poważna alergiczna reakcja (częstotliwość nie znana, może z dostępne dane nie może określona).

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 użytkowników): Ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 użytkowników):

Duszność (duszność),

Świąd (świąd), nadmierne owłosienie (hipertrichoza), (skóra)wysypka, zaczerwienienie (wysypka), trądzikowo-podobne reakcja skórna, zapalenie skóry (dermatitis).

Ból mięśni.

Zatrzymanie płynów w kończynach.

Czasami występujący skutek uboczny (u mniej niż 1 na 100 użytkowników): Obniżone ciśnienie krwi (hipotensja).

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 użytkowników):

Zwiększona częstotliwość akcji serca (tachykardia), kołatanie serca.

Działania niepożądane o częstotliwości 'Nie znany' (na podstawie znanych danych nie można ustalić częstotliwości nie może być ustalona):

Nadwrażliwość, nagły obrzęk skóry i w błony śluzowe) (np.. warg, języka, ust, gardła lub twarzy), z w wyniku trudności w oddychaniu trudności w oddychaniu lub swędzenie i wysypka skórna wysypka skórnaczęsto w wyniku alergicznej reakcja (angio-obrzęk), zapalenie skóry po kontakcie z tym środkiem ..

Przygnębiony Zawroty głowy

Zawroty głowy.

Podrażnienie oka.

ciśnienie krwi ciśnienie krwi (hipotensja).

Nudności, wymioty.

Łysienie (to ustaje po kilku tygodniach stosowania minoksydylu z minoksydylem może pojawić się przyjsć przez wypadanie włosów starych i wzrost nowych włosów ),zmiana koloru włosów zmiana koloru włosównieprawidłowość w strukturze włosów tekstura włosówreakcja w miejscu aplikacji leku z nałożyć: swędzenie, podrażnienie, ból, (skóra)wysypka, obrzęk, sucha skóra, zaczerwienienie, łuszczenie się z skóry (złuszczenie), zapalenie skóry, pęcherze, krwawienie i owrzodzenie. Ból w klatce piersiowej.

Zgłaszanie przypadków z działania niepożądane

Czy masz problemy z działaniami niepożądanymi, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. To dotyczy również dla możliwych działań niepożądanych które nie w tej ulotce są wymienione. U możesz działania niepożądane również bezpośrednio zgłosić przez Niderlandzki Działania niepożądane [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl) [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). działania niepożądane działania niepożądane to zgłosić, możesz nam pomóc pomóc więcej informacji aby uzyskać na temat bezpieczeństwa tego tego leku.

## 5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?

Przechowywać poniżej 25°C. Nie w lodówce ani w zamrażarce przechowywać.

Trzymaj butelkę dobrze zamkniętą.

Trwałość po otwarciu: 50 dni.

Poza wzrok i zasięg od dzieci trzymać.

Używaj tego leku nie dłużej niż data ważności . Jest onado znalezienia na na pudełko lub butelka po „Exp.". Tam znajduje się miesiąc i rok . Ostatnidzień tego miesiąca to ostateczna data ważności . data ważności.

Płucz leki nie przez zlew lub toaletę i wyrzucaj je nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami należy zrobić które nie więcej używasz. Są zostaną wtedy w odpowiedzialny sposób zniszczone i nie trafią do środowiska naturalnego.

## 6. Zawartość opakowania opakowanie i inne informacje

Jakie substancje są w tym leku ?Substancja

- czynna w tym leku to minoksydyl. Każdy mililitr tego leku zawiera roztwór zawiera 50 mg minoksydylu.
- De inne substancje w tym leku to glikol propylenowy i etanol (96%).

Jak wygląda Minoxidil Linn i ile jest w jest w jeden opakowanie?

Przezroczysty, bezbarwny do jasnoróżowy, jednorodny roztwór.

Minoxidil Linn 50 mg/ml jest dostępny w kartonowym pudełku z jednym lub trzy przezroczyste, czerwone butelki o pojemności 100 ml, z jednym rozpylaczem i jedną bezbarwną nakrętką. Aplikator jest dostarczany osobno w kartonie.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla w wprowadzenie do obrotu i producent

Posiadacz pozwolenia  
MAE Holding BV  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Holandia

Producent  
MAE Holding BV  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Holandia

Medinfar Manufacturing, S.A.  
Parque Industrial Armando Martins Tavares  
Rua Outeiro da Armada, 5  
Condeixa-a-Nova  
3150-194 Sebal  
Portugal

Ten lek jest zarejestrowany pod RVG 122548.

Ta ulotka jest po raz ostatni zatwierdzona w wrzesień 2024.