

Folheto: informação para o utilizador

Minoxidil Linn 50 mg/ml solução para uso cutâneo

Minoxidil

Leia cuidadosamente todo o folheto antes de este medicamento vai usar pois há está importante informação em para você.

Use este medicamento sempre exatamente como descrito neste este folheto ou como seu médico ou farmacêutico lhe isso disse ..

- este folheto .. você precise dele mais tarde novamente . Tem.
- Tem u ainda perguntas? Entre em contato com seu farmacêutico.
- Sente algum desconforto de um dos efeitos colaterais mencionados na seção 4 listados? Ou sente você um efeito colateral que não neste este folheto informativo está? Entre em contato com seu seu médico ou farmacêutico.
- Sua sua queixa após 6 meses não menos, ou é ele até pior? Entre em contato com seu médico.

Conteúdo deste este folheto

1. O que é Minoxidil Linn e para que é este medicamento usado?
2. Quando pode você este medicamento não usar ou deve você ter extra cuidado com ser?
3. Como usa você este medicamento?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Minoxidil Linn e para que é usado este medicamento usado?

Minoxidil Linn é um medicamento que estimula o crescimento capilar e que disponível disponível como solução para uso tópico de minoxidil (de minoxidilsubstância ativa), dosado a 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn é indicado para o tratamento da 'calvície' em homens comum calvície (alopecia androgenética).

Minoxidil Linn é destinado para uso externo e deve ser aplicado apenas no couro cabeludo ..

o seu crescimento capilar após seis meses meses ainda não melhorado? Entre em contato com seu médico.

2. Quando pode você este medicamento não usar ou deve ter cuidado especial com ser?

Quando pode você este medicamento não usar?

- Você é alérgico a um dos componentes neste medicamento medicamento. substâncias pode pode u encontrar em seção 6.

Quando deve você extra cuidado ser com este medicamento?

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes você este medicamento usado.

Minoxidil Linn é não destinado para uso em um histórico familiar de queda de cabelo, se queda de cabelo repentina e/ou irregular ocorre, se queda de cabelo o resultado é de gravidez ou parto (isso aplica-se apenas para mulheres), ou em queda de cabelo inexplicada. Ook in casos em que queda de cabelo o resultado é de certos tratamentos, como quimioterapia em câncer, ou em certas doenças como deficiência de ferro, doenças da tireoide, problemas com o sistema imunológico ou determinada forma de sífilis, assim como em desnutrição grave e em certos hábitos na externa cuidados (por ex. trançar ou rabo de cavalo apertado) minoxidil não deve ser usado.

Você deve sua couro cabeludo deixar investigar antes você começar com o tratamento com Minoxidil Linn. Seu couro cabeludo deve estar saudável ser, normal e intacto, pois se uma inflamação ou lesão (escoriação, psoríase, queimadura solar ou grave descamação) da pele tem, pode a absorção do medicamento pela pele aumentada são, o que um aumentado risco de sistêmicas efeitos colaterais com si acarretar.

Se você sofre de problemas cardíacos (falta de sangue devido a um estreitado ou bloqueado vaso sanguíneo (isquemia), distúrbio no ritmo cardíaco (arritmia), congestiva insuficiência cardíaca ou doença valvular cardíaca), consulte então seu médico antes de iniciar o tratamento com Minoxidil Linn. Você deve seu médico para informar sobre sua história médica (doenças anteriores, atuais doenças e medicação, alergias, etc.), para que seu médico sua condição possa avaliar e/ou possa aconselhá-lo sobre se o pode tratamento com Minoxidil Linn adequado é. Se você com o tratamento pode começar, deve você regularmente controlado ser pelo médico pelo médico deve você saber chá saber como você pode ocorrência de alguns efeitos colaterais pode reconhecer, como:

- reações cutâneas graves frequência cardíaca acelerada
- (taquicardia) súbitae
- inexplicável em inexplicável ganho de peso
- dificuldade com respirar (especialmente em repouso)
- pressão arterial baixa , em geral e /ou em repouso/em repouso
- desenvolvimento ou o agravamento de um apertado ,opressivo opressivo, doloroso sensação no peito (angina pectoris)
- inchaço do rosto, mãos, tornozelos ou abdômen.

Se você um dos acima mencionados efeitos colaterais notar ou se você qualquer efeito colateral notar que não neste folheto informativo está, pare imediatamente com o tratamento tratamento consulte consulte seu médico.

Se você simultaneamente antihipertensivos medicamentos usa, pode usar Minoxidil Linn somente usar sob supervisão médica.

Há casos de crescimento excessivo de cabelo crescimento capilar relatado no corpo de lactentes após contato com a pele com os locais onde minoxidil foi aplicado em pacientes (cuidadores) que aplicaram topicamente minoxidil aplicado minoxidil usaram. De crescimento do cabelo foi dentro de alguns meses novamente normal quando as crianças não mais foram expostas a minoxidil. Certifique-se de que crianças não em contato entrar com partes do corpo onde você aplicou minoxidil tópico aplicou aplicado.

um médico se você crescimento excessivo de cabelo no corpo no corpo de seu filho observa durante o período que você tópico aplicar para aplicar produtos com minoxidil usa.

Idosos

Minoxidil Linn pode não ser usado por pacientes mais velhos que 65 anos, porque a segurança não estabelecida é para este grupo.

Crianças e jovens até 18 anos

Minoxidil Linn não deve ser usado por pacientes menores de 18 anos, porque a segurança não foi estabelecida é para este grupo.

Usa você outros medicamentos

Usa você além de Minoxidil Linn outros medicamentos, tem você tem u que curto atrás feito ou existe a possibilidade que você no próximo futuro outros medicamentos vai usar? Informe isso então seu médico ou farmacêutico.

Informe o seu médico se você um dos seguintes medicamentos na pele aplica antes de usar Minoxidil Linn utilizar:

- medicamentos que tretinoína ou outros retinoides contêm
- medicamentos para uso na pele que corticosteroides contêm ou pomadas coberturas de pele, cremes ou outras gordurosas substâncias (por ex. vaselina).

Não exponha a pele tratada à luz solar intensa, pois reações cutâneas (uma vez que reações cutâneas (por exemplo. eritema) de queimadura solar podem ocorrer e até um aumentada absorção de minoxidil pela pele podem levar.

Gravidez e amamentação

Está grávida, acha que está grávida de estar, quer engravidar ou amamenta você amamentação? Entre em contato com seu médico, antes de você este medicamento usado.

Como há nenhum adequado e controlado estudos com Minoxidil Linn foram realizados durante gravidez e amamentação, é este medicamento não recomendado durante estes períodos.

Aptidão para conduzir e a utilização de máquinas

Minoxidil Linn não tem nenhuma influência sobre a capacidade de veículos te controlar e máquinas usar usar.

Minoxidil Linn contém propilenoglicol. Pode causar irritação na pele causar.

Minoxidil Linn contém etanol (álcool). Pode causar irritação, ardência sensação e pele seca causar. Se acidentalmente entrar em contato com partes sensíveis (olhos, mucosas mucosas, esfolada pele), deve a área afetada ser cuidadosamente lavada com uma abundante quantidade de água corrente. Consulte. médico seu médico se o ardente sensação e/ou a irritação persistir.

3. Como usa você este medicamento?

Use este medicamento sempre precisamente como descrito em este folheto ou como seu médico ou farmacêutico lhe isso disse .. dúvidas sobre o uso correto ?? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Minoxidil Linn é exclusivamente destinado para uso externo no couro cabeludo ..

dosagem recomendada é 1 ml de Minoxidil Linn duas vezes ao dia diariamente, a cada 12 horas.

Remova a tampa do frasco. Aplique 1 ml de Minoxidil Linn solução em, pressionando o borrifador 6 vezes para baixo ,duas vezes duas vezes por dia, a cada 12 horas. Aplique a solução no centro da área afetada e espalhe com as pontas dos dedos para ter certeza te são que o medicamento uniformemente está distribuído. Use para uma aplicação mais precisa o aplicador que está na embalagem está incluído. Remova o superior parte do bico do spray e coloque o aplicador. Pressione o aplicador então 6 vezes , como acima descrito. Lave suas mãos cuidadosamente após cada aplicação.

Limpeza da nebulizador e aplicador

Remova após cada uso a parte superior da cabeça do spray ou aplicador do aplicador enxágue com álcool para com álcool para o resíduos do produto para remover e para obstrução para prevenir.

Precauções para uso

Não use mais de 1 ml da solução, independentemente de tamanho da área afetada ,e aplique não mais que 2 ml da solução por dia aplicar ..

inalação do produto do produto em evite contato com os olhos, mucosas e pele afetada por escoriação, inflamação ou lesões cutâneas. Se isso acontecer ,, deve o afetada área cuidadosamente ser lavada com uma abundante quantidade de água corrente água da torneira. seu médico se o ardor ardente sensação e/ou a irritação persiste.

Duração do tratamento

Os estudos realizados até agora demonstram que mostram que 4 ou mais meses de tratamento com Minoxidil Linn são necessários necessário são para visível crescimento capilar. Interrupção do tratamento pode dentro 3 a 4 meses retorno ao estado inicial como resultado ter.

Tem você demasiado de este medicamento usado ?Não

há casos relatados de uma overdose de minoxidil minoxidil como resultado de cutânea administração deste medicamento . Podehaver no entanto crescimento excessivo e indesejado de pelos ocorrer (rosto, pescoço, costas, peito, abdômen, pernas) se houver doses mais altas do que recomendado foram usadas ou se o medicamento mais frequentemente foi aplicado do que recomendado, ou em outros locais além do couro cabeludo (especialmente em grandes áreas do corpo). Em este caso deve o tratamento ser interrompido até que de normal crescimento capilar é restaurado (para isso são alguns meses necessários). Aumentada absorção sistêmica de minoxidil (uma clinicamente mais grave situação) pode também ocorrer, o que um aumentado risco de sistêmicos efeitos colaterais com isso acarreta.

Por acidente ingerir de Minoxidil Linn pode graves efeitos colaterais no corpo inteiro causar relacionados a o farmacológico efeito de minoxidil (por exemplo. um aumento da frequência cardíaca, retenção de líquidos em tecido (edema), pressão arterial baixa ,etc .). Váem caso de suspeita de overdose ou intoxicação com este medicamento medicamento, imediatamente para um hospital, para tratamento sintomático.

Esqueceu-se de usar este medicamento ? Esqueceu-se de usar o medicamento o medicamento aplicar para trazer, faça-o assim rápido você o se lembra, a menos que já esteja quase hora é para a próxima aplicação. Em isso caso, espere até a próxima aplicação e aplique a dose usual , no mesmo horário , e retome o normal normal esquema de tratamento.

Use nenhuma dose dupla para uma dose esquecida em compensar .. no entanto que o sucesso do tratamento depende do regular base aplicação deste este medicamento.

Tem você ainda outras perguntas sobre o uso deste este medicamento? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter, embora não receba todos com isso a fazer.

Tome imediatamente entre em contato com um médico se você um dos seguintes sintomas notar; possivelmente tem um urgente médica tratamento necessário: inchaço do rosto, os lábios ou a garganta, o que engolir ou respirar difícil torna. Isto pode um sinal ser de um grave alérgica reação (frequência não conhecida, pode com os disponíveis dados não ser determinada).

Muito frequentemente ocorrentes efeitos colaterais (em mais de 1 em cada 10 usuários): Dor de cabeça.

Frequentemente ocorrentes efeitos colaterais (em 1 a 10 op de 100 usuários):

Falta de ar (dispneia),

Coceira (prurido), excesso de pelos (hipertricose), (pele)erupção, vermelhidão (erupção), acne-semelhante reação cutânea, inflamação da pele (dermatite).

Dor muscular.

Acúmulo de líquido nos membros.

Às vezes ocorrente efeito colateral (em menos de 1 em 100 usuários): Pressão arterial reduzida (hipotensão).

Raramente ocorrentes efeitos colaterais (em menos de 1 em 1000 usuários): Aumento da frequência cardíaca (taquicardia), palpitações.

Efeitos colaterais com frequência 'Não conhecido' (com base nos dados conhecidos pode a frequência não ser determinada):

Hipersensibilidade, inchaço repentino da pele e mucosas) (por ex.. de lábio, língua, boca, garganta ou rosto), com como resultado dificuldades respiratórias e/ou coceira e erupção cutânea, frequentemente como alérgica reação (angio-edema), inflamação da pele após contato com este agente.

Humor depressivo.

Tontura.

Irritação ocular.

Pressão arterial baixa (hipotensão).

Náusea, vômito.

Calvície (isso para após algumas semanas de uso de minoxidil e pode voltar por queda de velhos e crescimento de novos cabelos) mudança de cor do cabelo mudança de cor do cabelo anormalidade na textura do cabelo textura do cabelo reação no local de aplicação: coceira, irritação, dor, (pele) erupção cutânea, inchaço, pele seca, vermelhidão, descamação descamação da pele (esfoliação), dermatite, formação de bolhas, sangramento e formação de úlceras. Dor no tórax.

O relato de efeitos colaterais

Tem efeitos colaterais efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isso também se aplica também a possíveis efeitos colaterais que não estão neste folheto incluídos. U pode efeitos colaterais também diretamente relatar via o Holandês Centro de Efeitos Colaterais Lareb, site: www.lareb.nl. Ao relatar efeitos colaterais chá relatar, pode nos ajudar ajudar mais informação a obter sobre a segurança do este medicamento.

5. Como armazenar você este medicamento?

Armazenar abaixo 25°C. Não no frigorífico ou no congelador guardar.

Mantenha a garrafa bem fechada.

Validade após abertura: 50 dias.

Fora do visão e alcance de crianças manter.

Use este medicamento não mais após a data de validade. Esta está encontrar na embalagem caixa ou a garrafa após "Exp.". Lá está um mês e um ano. O último dia desse mês é a data de validade data de validade.

Enxágue medicamentos não pela pia ou o vaso sanitário e jogue os não no lixo. Pergunte seu farmacêutico o que fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usa. Elas são então de uma forma responsável destruídas e não entram no meio ambiente acabam no meio ambiente 6..

6. Conteúdo do embalagem e outras informações

Quais substâncias estão neste medicamento ?A

- substância ativa no medicamento é minoxidil. Cada mililitro do medicamento é minoxidil. Cada mililitro solução contém 50 mg de minoxidil.
- O outros componentes neste medicamento são propilenoglicol propilenoglicol etanol (96%). Como

parece Minoxidil Linn Minoxidil Linn quanto contém quanto está em um embalagem?

Clara, incolor a rosa claro, solução homogênea.

Minoxidil Linn 50 mg/ml é disponível em caixa de papelão com uma ou de três transparente, vermelhas garrafas de 100 ml, com um bico spray e uma tampa incolor. Um aplicador é fornecido separadamente na caixa.

Titular da autorização para o no comércio colocar e fabricante

Titular da Autorização

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Países Baixos

Fabricante

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Países Baixos

Medinfar Manufacturing, S.A.

Parque Industrial Armando Martins Tavares

Rua Outeiro da Armada, 5

Condeixa-a-Nova

3150-194 Sebal

Portugal

Este medicamento está registrado sob RVG 122548.

Este folheto informativo foi pela última vez aprovado em setembro 2024.