

## Prospect: informații pentru utilizator Minoxidil Linn 50 mg/ml

### soluție pentru utilizare cutanată Minoxidil

#### Citiți

cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament medicament merge utilizați pentru că există scrie importantă informație în pentru dumneavoastră.

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum descris în acest prospect sau precum dumneavoastră medicul sau farmacistul v-a spus a spus v-a spus.

- Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.
- Aveți dumneavoastră încă întrebări? Contactați farmacistul dumneavoastră.
- Aveți probleme cu una dintre efectele secundare menționate în secțiunea 4 ?Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect este menționat? Luați atunci legătura cu medicul dumneavoastră sau farmacistul ..
- simptomele dumneavoastră după 6 6 luni nu mai puțin, sau este el chiar mai rău? Contactați dumneavoastră medicul.

Conținutul acestui prospect Ce este Minoxidil Linn

1. Ce este Minoxidil Linn pentru ce este acest medicament medicament utilizat?
2. Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu fiți?
3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații 1.

1. Ce este Minoxidil Linn pentru ce se utilizează este acest medicament utilizat?

Minoxidil Linn este un medicament care stimulează creșterea părului și care este disponibil ca soluție pentru uz cutanat de minoxidil ( de minoxidilactiv substanță), dozat la 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn este indicat pentru tratamentul căderii părului la 'normală' la bărbați apărută chelie (alopecia androgenetică).

Minoxidil Linn este destinat pentru uz extern și trebuie aplicat exclusiv pe scalp . Este creșterea părului.

șase luni creșterea părului nu șase luni încă nu îmbunătățit? Contactați medicul dumneavoastră. medic.

2. Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu el?

Când puteți acest medicament nu utiliza?

- Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți u găsiți în rubrica 6.

Când trebuie să fiți extra precaut cu acest medicament ?Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de să u acest medicament utilizat.

Minoxidil Linn este nu destinat pentru utilizare la o istoric familial de căderea părului ,dacă căderea părului bruscă și înof neregulat apare, dacă căderea părului este rezultatul este de sarcină sau naștere (acest lucru se aplică doar pentru femei), sau în caz de cădere inexplicabilă a părului căderea părului. Ook in cazuri în care căderea părului este rezultatul al anumite tratamente, cum ar fi chimioterapia în cazul cancerului, sau în anumite boli cum ar fi deficiența de fier, afecțiuni ale glandei tiroide, probleme cu imunitatea sau anumite formă de sifilis, precum și în cazul unei malnutriții severe și în anumite obiceiuri în exterior îngrijire (de ex.. împletituri sau cozi strânse ) nu trebuie minoxidilnu fi utilizat ..

să vă scalpul lăsați permiteți investigații înainte de dumneavoastră începeți cu tratamentul cu Minoxidil Linn. Scalpul trebuie să fie sănătos ,normal și intact, deoarece dacă o inflamație sau de leziune (abraziune, psoriazis, arsură solară sau descuamare severă ) apiellii are ,poate absorbtia medicamentului prin piele crește prin piele crescut sunt, ce un crescut risc de sistemice efecte secundare cu sine aduce.

Dacă suferiți de probleme cardiace probleme cardiace lipsă de sângedin cauza unui unul îngustat sau blocată vas de sânge (ischemie), tulburare în ritmul cardiac (aritmie), insuficiență cardiacă congestivă sau afecțiune a valvei cardiace ),consultați atunci și dumneavoastră medic înainte de să începeți tratamentul cu Minoxidil Linn. Trebuie să informați dumneavoastră medic să informați despre dumneavoastră medicală istoric (boli anterioare, actuale boli și medicație, alergii, etc.), astfel încât medicul dumneavoastră să evalueze starea dumneavoastră și/sau să vă poată sfătui dacă tratament cu Minoxidil Linn potrivit este. Dacă începeți tratament puteți începe, trebuie să regulat verificat să fiți de către medic și trebuie să știți știi cum să recunoașteți apariția unor anumite efecte secundare puteți recunoaște, cum ar fi:

- reacții cutanate severe ritm cardiac accelerat
- ( tahicardie )apariția bruscăși
- inexplicabilă în inexplicabil creștere în greutate
- dificultate cu respirația (în special în repaus)
- tensiune arterială scăzută , în general și /sau în repausdezvoltarea
- sau agravarea a unei senzații de apăsare , presiune, apăsător, durere senzație pe piept (angina pectoris)
- umflare a feței, mâinilor, gleznelor sau abdomenului.

Dacă aveți unul dintre cele menționate mai sus efecte secundare observați sau dacă dumneavoastră orice efect secundar observați care nu în acest prospect este menționat, opriți imediat tratamentul și consultați consultați dumneavoastră medicul.

Dacă simultan antihipertensive medicamente utilizați, trebuie să utilizați Minoxidil Linn doar sub supraveghere medicală ..

cazuri de creștere excesivă a părului creșterea părului raportat pe corp al sugari după contact cutanat cu locurile unde minoxidil a fost aplicat la pacienți (îngrijitori) care local aplicat minoxidil utilizau. De creșterea părului a devenit în câteva luni din nou normală când copiii nu mai erau expusi la minoxidil. Asigurați-vă că nu se copii nu în contact vină cu părți ale corpului unde ați aplicat minoxidil local ați aplicat.

Consultați un medic dacă aveți creștere excesivă a părului pe pe corp de dumneavoastră copil observați în timpul perioadei când utilizați local a aplica produse cu minoxidil folosiți . Vârstnici Minoxidil Linn poate.

### Vârstnici

Minoxidil Linn mag nu a fi utilizat de pacienți mai în vârstă de 65 ani, deoarece siguranța nu a fost stabilită pentru acest grup . Copii.

### Copii en tinerii până la 18 ani

Minoxidil Linn nu trebuie nu să fie utilizat de pacienții mai tineri de 18 ani, deoarece siguranța nu este stabilită este este pentru acest grup.

Folosiți dumneavoastră alte medicamente medicamenteFolosiți  
dumneavoastră pe lângă Minoxidil Linn alte medicamente , avețidumneavoastră are u că scurt  
timp în urmă făcut sau există posibilitatea ca să utilizați în apropiatul viitor alte medicamente  
veți folosi? Spuneți asta atunci dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Spuneți acest lucru dumneavoastră medicului dacă utilizați unul dintre următoarele  
medicamente pe piele aplicați înainte de să utilizați Minoxidil Linn folosiți:

- medicamente care tretinoină sau alte retinoizi conțin
- medicamente pentru utilizare pe piele care corticosteroizi conțin sau unguente acoperitoare, creme sau alte grase substanțe (de ex.. vaselină).

Nu expuneți pielea tratată la lumina intensă a soarelui , deoarecereacțiile cutanate ( reacții  
cutanate (de exemplu. eritem) sau arsură solară pot apărea și până la o absorbție crescută de  
minoxidil prin piele pot duce.

### Sarcină și alăptare

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată să fiți, doriți să rămâneți însărcinată sau  
alăptați ? Luați legătura cu medicul dumneavoastră alăptareînainte de să utilizați înainte de u  
acest medicament utilizat.

Deoarece nu există adecvate și controlate studii cu Minoxidil Linn au fost efectuate în timpul  
sarcinii și alăptării, se acest medicament nu recomandat în timpul aceste perioade.

### Aptitudinea de a conduce și utilizarea mașinilor de la mașini

Minoxidil Linn nu are niciun efect asupra capacității de a conduce te conduce și mașini să  
utilizeze.

Minoxidil Linn conține propilenglicol. Poate provoca iritarea pielii cauza.  
conține etanol (alcool). Poate provoca iritație iritație, senzație de arsură senzație și uscată  
piele cauza. Dacă accidental intră în contact cu părți sensibile ( ochi,mucoase mucoase, jupuit  
piele), trebuie să zona afectată fie spălată cu atenție cu o cantitate abundentă de apă curentă  
de la robinet. Consultați medicul dumneavoastră medic dacă al senzație de arsură senzație  
și/sau iritația persistă.

### 3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact cum descris în acest prospect sau cum medicul  
dumneavoastră sau farmacistul v-a spus a v-a. . Aveți îndoieli cu privire la utilizarea?  
Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Minoxidil Linn este exclusiv destinat pentru uz extern pe scalpul.

Doza recomandată este 1 ml Minoxidil Linn de două ori pe zi zilnic, la fiecare 12 ore. Îndepărtați capacul de pe sticlă. Aplicați 1 ml Minoxidil Linn soluție pe, prin pulverizator 6 ori în a apăsa, de două ori pe zi, la fiecare 12 ore. Aplicați soluția pe în mijlocul zonei afectate și răspândiți cu degetele pentru a fi sigur de pentru a exista sigur de la te sunt că al medicamentul uniform este distribuit. Utilizați pentru o aplicare mai precisă aplicatorul care este inclus în ambalaj este inclus. Îndepărtați partea superioară a pulverizatorului și montați locație aplicatorul. Apoi apăsați aplicatorul de 6 , așa cum este descris mai sus .. mâinile cu atenție după fiecare na fiecare aplicare.

Curățarea a pulverizatorului și aplicatorului

Îndepărtați după fiecare utilizare partea superioară a capului de pulverizare sau aplicatorului și clătiți cu alcool pentru a curăța reziduuri ale produsului a îndepărta și pentru a blocaj a preveni.

Precauții pentru utilizare

Nu utilizați mai mult de 1 ml din soluție ,indiferent de indiferent de de dimensiunea zonei afectate ,și aplicați nu mai mult de 2 ml din soluție pe zi aplicați ..

inhalarea produsului și în evitați contactul cu ochii, mucoasele și pielea afectată de excoriație, inflamație sau leziuni ale pielii. Dacă acest lucru totuși se întâmplă, trebuie zona afectată să fie cu atenție fie spălată cu o cantitate abundentă de apă. de la robinet. Consultați medicul dumneavoastră dacă senzația de arsură senzație și/sau iritația persistă.

Durata tratamentului

Studiile efectuate până acum arată că 4 sau mai multe luni de tratament cu Minoxidil Linn sunt necesare necesar sunt pentru vizibilă creșterea părului. Întreruperea a tratamentului poate în 3 la 4 luni revenirea la starea inițială ca rezultat aveți.

Aveți dumneavoastră prea mult din acest medicament utilizat?

Nu sunt cazuri raportate de de o supradoză minoxidil ca urmare a cutanat administrare a acest medicament. Poate totuși apăsarea creștere excesivă și nedorită de păr (față, gât, spate, piept, abdomen, picioare) dacă există doze mai mari decât recomandat sunt utilizate sau dacă medicamentul este aplicat mai des decât recomandat și recomandat, sau pe alte locuri decât pe scalpul (în special pe zone mari ale corpului). În acest caz trebuie tratamentul să fie întrerupt până când de normală creșterea părului este restabilită (pentru aceasta sunt necesare câteva luni). Absorbție sistemică crescută de minoxidil (o situație clinică mai gravă) poate de asemenea apăsarea, ceea ce un risc crescut de efecte secundare sistemice implică cu sine.

Accidental ingestia de Minoxidil Linn poate grave efecte secundare asupra întregului corp cauza legate de de acțiunea farmacologică a minoxidilului (de ex. o frecvență cardiacă crescută ,retenție de lichide retenție de lichide în țesut (edem), tensiune arterială scăzută ,etc .). Contactați în caz de suspiciune de supradozaj sau intoxicație cu acest medicament medicament, imediat la un spital, pentru tratament simptomatic.

Ați uitat să utilizați acest medicament ? Ați uitatsă utilizați

medicamentul ? Ați uitat medicamentul a aplica , aplică-l astfel repede cum îți amintești ,cu excepția că este deja aproape timpul pentru următoarea aplicare . În acel caz, lasă-l caz, așteptați până la următoarea aplicare și aplicați doza obișnuită doză , la același moment ,și reluați tratamentul normal normal schema de tratament.

Utilizare nu dublă doză pentru a o uitată doză pentru a recupera ..

totuși că succesul tratamentului depinde de tratament depinde de aplicarea regulată bază a aplica acest medicament medicament.

dumneavoastră alte întrebări despre utilizarea acestui medicament de la acest medicament?  
Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

#### 4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate și acest medicament avea efecte secundare, chiar dacă nu toată lumea toată lumea cu aceasta a face.

Luați imediat contact cu un medic dacă observați unul dintre următoarele simptome ;posibil aveți are u urgent medicală tratament necesar:

umflarea a feței, buzelor sau a gâtului, ceea ce înghițirea sau respirația dificilă face . Acest lucrupoate poate un semn sunt de un severă alergică reacție (frecvența nu cunoscută, poate cu disponibile datele nu fi determinată).

Foarte frecvente efecte secundare efecte secundare lamai mult de 1 din 10 utilizatori ):Durere de cap ..

efecte secundare comun la 1până 1 până la 10 op de 100 utilizatori):

Dificultăți de respirație (dispnee),

Mâncărime (prurit), creșterea excesivă a părului (hipertricoză), (piele)erupție cutanată, roșeață (erupție), acnee-asemănătoare reacție cutanată, inflamație a pielii (dermatită).

Dureri musculare.

Retenție de lichide în membre.

Uneori efect secundar ( lamai puțin de 1 din 100 utilizatori ):Tensiune arterială scăzută ( (hipotensiune).

Rareori apărute efecte secundare (la mai puțin de 1 din 1000 utilizatori): Ritmul cardiac crescut ( tahicardie),palpitații palpitații.

cu frecvență frecvență 'Nu cunoscut' (pe baza datelor cunoscute disponibile se poate determina frecvența nu poate fi stabilită):

Hipersensibilitate, umflare bruscă a pielii și mucoase) (de ex.. de buză, limbă, gură, gât sau față), cu ca rezultat dificultăți de respirație și/sau mâncărime și erupție cutanată, adesea ca alergic reacție (angio-edem), inflamație a pielii după contact cu acest medicament.

Stare depresivă.

Amețeală.

Iritație oculară.

Tensiune arterială scăzută (hipotensiune).

Greață, vărsături.

Căderea părului (acest se oprește după câteva săptămâni de utilizare de minoxidil și poate reveni prin căderea de vechi și creșterea de noi fire de păr), schimbarea culorii părului schimbare a culorii părului anomalie în textura părului textura părului reacție la locul de de la aplicați: mâncărime, iritație, durere, (piele) erupție cutanată, umflare, piele uscată, roșeață, descumare exfoliere de la piele (exfoliere), inflamație a pielii, formare de vezicule, sângerare și formare de ulcere. Durere în cutia toracică.

Raportarea raportarea de efecte secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru posibile efecte secundare care nu sunt în acest prospect menționate. U puteți efecte secundare de asemenea direct raporta prin Olandez Centrul de Efecte Secundare Lareb, site-ul: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl) [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). efecte secundare efecte secundare ce raporta, poți u al nostru ajuta mai mult informații a obține despre siguranța a acestui medicament.

## 5. Cum păstrați dumneavoastră acest produs?

Păstrați sub 25°C. Nu în frigider sau în congelator păstrați.

Păstrați flaconul bine închis.

Valabilitate după deschidere: 50 zile.

A se păstra departe de vedere și acces al copiilor păstrați.

Utilizați acest medicament nu mai după data de expirare . Aceasta este găsit pe ambalaj cutie sau sticlă după „Exp.”. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare data de expirare.

Clătiți medicamentele nu prin chiuvetă sau WC-ul și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele trebuie să faceți pe care le nu mai utilizați. Ele sunt apoi într-un mod responsabil distruse și nu ajung în mediu . 6. Conținutul.

## 6. Conținut de la ambalaj și alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

- Substanța activă în acest medicament este minoxidil. Fiecare mililitru de acest soluție conține 50 mg minoxidil.
- De alte substanțe în acest medicament sunt propilenglicol și etanol (96%).

Cum arată Minoxidil Linn și cât este în este în un ambalaj?

Clar, incolor până la roz deschis, soluție omogenă.

Minoxidil Linn 50 mg/ml este disponibil în cutie de carton cu unul sau de trei transparente, roșii sticle de 100 ml, cu un cap de pulverizare și un capac incolor . Un aplicator este livrat separat în cutia exterioră ..

al autorizației autorizație pentru în comercializare a introduce pe piață și producător

Deținătorul autorizației

MAE Holding BV

Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Olanda

Producător  
MAE Holding BV  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Olanda

Medinfar Manufacturing, S.A.  
Parque Industrial Armando Martins Tavares  
Rua Outeiro da Armada, 5  
Condeixa-a-Nova  
3150-194 Sebal  
Portugalia

Acest medicament este înregistrat sub RVG 122548.

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în septembrie 2024.