

## Bipacksedel: information för den användare

### Minoxidil Linn 50 mg/ml lösning för kutan användning

#### Minoxidil

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel går använda för det står viktig information i för dig.

Använd denna läkemedel alltid exakt som beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekare du det har berättat.

- Förvara denna bipacksedel. Kanske har du den senare igen behöver.
- Har du ännu frågor? Kontakta då din apotekare.
- Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då kontakt med din din läkare eller apotekare.
- Blir din besvär efter 6 månader inte mindre, eller blir han till och med värre? Kontakta då din läkare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Minoxidil Linn och vad används denna medicin används?
2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med det?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Innehåll av förpackningen och övrig information 1.

1. och vad används för detta medel används?

Minoxidil Linn är en läkemedel som hårväxt stimulerar och som tillgänglig är som lösning för kutan användning av minoxidil (aktiv substans), doserad på 5% (50 mg/ml).

Minoxidil Linn är indicerad för behandlingen av den 'vanliga' hos män förekommande skallighet (alopecia androgenetica ).).

Minoxidil Linn är avsedd för utvärtes bruk och ska endast appliceras på hårbotten . hårbotten.

Är din hårväxt efter sex månader ännu inte förbättrad? Kontakta då din läkare.

2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

När får du detta läkemedel inte använda?

- Du är allergisk mot en av de ämnena i detta läkemedel. Dessa ämnen kan u hitta i rubrik 6.

När bör du extra försiktig vara med detta läkemedel?

Kontakta din läkare eller apotekare innan du detta medel används.

Minoxidil Linn är inte avsedd för användning vid en familjär historia av håravfall, om håravfall plötsligt och ofregelbundet uppträder, om håravfall det resultat är av graviditet eller förlossning (detta gäller endast för kvinnor), eller vid oförklarligt håravfall. Också i fall där håravfall det resultat är av vissa behandlingar, såsom kemoterapi vid cancer, eller vid vissa sjukdomar såsom järnbrist, sköldkörtelsjukdomar, problem med immunförsvaret eller vissa former av syfilis, samt vid allvarlig undernäring och vid vissa vanor i yttre vård (t.ex. fläta in eller strama hästsvansar) får minoxidil inte användas ..

måste din hårbotten låta låta undersökningar innan du börjar med behandlingen med Minoxidil Linn. Din hårbotten måste vara frisk vara, normal och intakt, eftersom om en inflammation eller skada (skrapsår, psoriasis, solbränna eller allvarlig avflagnings) av huden har, kan absorptionen av läkemedlet genom huden ökas hudförhöjd är, vad en ökad risk för systemiska biverkningar med sig innebär.

Om du lider av hjärtproblem (blodbrist på grund av en förträngd eller blockerad blodkärl (ischemi), störning i hjärtrytmen (arytmi), kongestiv hjärtsvikt eller hjärtklaffsjukdom), rådgör då din läkare innan du börjar med behandlingen av Minoxidil Linn. Du bör din läkare att informera om din medicinska historia (tidigare sjukdomar, nuvarande sjukdomar och medicinering, allergier, osv.), så att din läkare din tillstånd kan bedöma och eller kan rådgöra om huruvida behandling med Minoxidil Linn lämplig är. Om du med behandling får börja, bör du regelbundet kontrolleras att bli av läkaren och bör du veta veta hur du uppträder av vissa biverkningar kan känna igen, såsom:

- allvarliga hudreaktioner
- snabb hjärtfrekvens (takykardi)
- plötslig och oförklarlig viktökning
- svårighet med andning (särskilt i vila)
- sänkt blodtryck, i allmänhet och/eller i vila
- utvecklingen av försämring av en tryckande, pressande tryckande, smärtsam känsla på bröstet (angina pectoris)
- svullnad i ansiktet, händer, vristar eller buk.

Om du en av ovanstående biverkningar märker eller om du någon biverkning märker som inte i denna bipacksedel står, sluta då omedelbart med behandlingen och kontakta din läkare.

Om du samtidigt blodtryckssänkande läkemedel använder, får du använda Minoxidil Linn endast använda under medicinsk kontroll.

Det finns fall av överdriven hårväxt rapporterats på kroppen av spädbarn efter hudkontakt med platserna där minoxidil hade applicerats hos patienter (vårdare) som lokalt applicerat minoxidil använde. De hårväxt blev inom några månader åter normal när de barnen inte längre blev utsatta för minoxidil. Se till att barn inte i kontakt komma med kroppsdelar där du minoxidil lokalt har applicerat.

Rådfråga en läkare om du överdriven hårväxt på kropp av ditt barn märker under perioden som du lokalt applicera att använda produkter med minoxidil använder ..

Minoxidil Linn får

Minoxidil Linn mag inte användas av av patienter äldre än 65 år, eftersom säkerheten säkerhet inte fastställd är för denna grupp.

Barn en ungdomar till 18 år

Minoxidil Linn får inte användas av patienter yngre än 18 år ,eftersom säkerheten inte fastställts har är för denna grupp.

Använder du andra läkemedel läkemedelAnvänder du förutom Minoxidil Linn andra läkemedel , har du har du att kort sedan gjort eller finns den möjligheten att du i den nära framtiden andra läkemedel kommer använda? Berätta det då din läkare eller apotekare.

Berätta det din läkare om du en av de följande läkemedel på huden applicerar innan du använder Minoxidil Linn används:

- läkemedel som tretinoin eller andra retinoider innehåller
- läkemedel för användning på huden som kortikosteroider innehåller eller hudtäta salvor, krämer eller andra feta substanser (t.ex. vaselin).

Utsätt inte behandlad hud för intensivt solljus , eftersomhudreaktioner ( hudreaktioner (t.ex.. erytem) eller solbränna kan uppstå och till en ökad absorption av minoxidil genom huden kan leda.

#### Graviditet och amning

Är du gravid, tror du gravid att vara, vill du bli gravid eller ger du amning ? Kontakta då din läkare, innan du du detta läkemedel används.

Eftersom det inga adekvata och kontrollerade studier med Minoxidil Linn har utförts under graviditet och amning, rekommenderas detta läkemedel inte rekommenderas under dessa perioder.

#### Körförmåga och användning av maskiner

Minoxidil Linn har ingen påverkan på förmågan att köra att köra och maskiner att använda.

Minoxidil Linn innehåller propylenglykol. Det kan orsaka hudirritation orsaka. innehåller etanol (alkohol). Det kan orsaka irritation, brännande känsla och torr hud orsaka. Om det av misstag kommer i kontakt med känsliga delar ( ögon,slemhinnor slemhinnor, skrapad hud), måste det drabbade området noggrant tvättas med en riklig mängd rinnande kranvatten dricksvatten. din din läkare om det brännande känsla ocheller irritationen kvarstår.

### 3. Hur använder du denna medicin?

Använd denna läkemedel alltid precis som beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekare har det sagt .. du om rätt användning användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Minoxidil Linn är endast avsett för utvärtes bruk på hårbotten.

Den rekommenderade dosen är 1 ml Minoxidil Linn två gånger dagligen, om de 12 timme. Ta bort locket från flaskan. Applicera 1 ml Minoxidil Linn lösning till, genom att trycka sprayen 6 gånger i ner ,två gånger två gånger per dag, om de 12 timme. Applicera lösningen på i mitten av det drabbade området och sprid det med dina fingertoppar för att vara säker på att är att läkemedlet läkemedel jämnt är fördelat. Använd för en noggrannare applicering applikatorn

som finns i förpackningen är bifogad. Ta bort den övre delen av sprayhuvudet och placera applikatoren. Tryck sedan applikatoren 6 gånger, som ovan beskrivet. Tvätta dina händer noggrant efter varje applicering.

#### Rengöring av förstoftare och applikator

Ta bort efter varje användning den övre delen av sprayhuvudet eller applikator och skölj med alkohol för att rensa av rester av produkten och för att blockering ska förhindras.

#### Försiktighetsåtgärder för användning

Använd inte mer än 1 ml av lösningen, oavsett storleken av det påverkade området, och applicera inte mer än 2 ml av lösningen per dag ..

inandning av produkten och undvik kontakt med ögonen, slemhinnor och hud påverkad av skavsår, inflammation eller hudskador. Om detta ändå händer, måste det drabbade området noggrant bli tvättat med en riklig mängd rinnande kranvatten. Rådfråga din läkare om det brännande känsla och/eller den irritation fortsätter.

#### Varaktighet av behandlingen

De hittills utförda studier visar att 4 eller fler månader behandling med Minoxidil Linn behövs nödvändig är för synlig hårväxt. Avbrott av behandlingen kan inom 3 till 4 månader återgång till det ursprungliga tillståndet med följd ha.

#### Har du för mycket av detta läkemedel använt?

Det finns inga fall rapporterade av en överdos minoxidil som följd av kutan administrering av detta läkemedel. Det kan dock överdriven och oönskad hårväxt förekomma (ansikte, nacke, rygg, bröst, buk, ben) om det högre doser än rekommenderas är använt eller om läkemedlet oftare är applicerat än rekommenderas, eller på andra ställen än hårbotten (särskilt på stora områden av kroppen). I detta fall måste behandlingen avbrytas tills behandling bli avbruten tills de normala hårväxt är återställd (detta tar några månader). Ökad systemisk absorption av minoxidil (en kliniskt allvarigare situation) kan också uppträda, vilket en ökad risk för systemiska biverkningar med sig medför.

Av misstag intag av Minoxidil Linn kan allvarliga biverkningar på hela kroppen orsaka relaterade till den farmakologiska verkan av minoxidil (t.ex. t.ex. ökad hjärtfrekvens, vätskeretention, vätskeansamling i vävnad (ödem), sänkt blodtryck, etc.). Vid misstanke om överdos eller förgiftning med denna medicin läkemedel, omedelbart till ett sjukhus, för symptomatisk behandling.

#### Har du glömt att använda detta läkemedel? Har du

glömt att läkemedlet applicera, gör det då så snabbt du kommer ihåg, om inte det redan är nästan dags för nästa applicering. Om det i det fall, vänta tills nästa applicering och applicera den vanliga dosen, på samma tid, och återuppta den normala behandlingschema.

Använd ingen dubbel dos för att en glömd dos att komma ikapp.

Kom ihåg dock att framgången med behandlingen beror på det regelbundna användandet av detta läkemedel.

du ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel? Kontakta då din läkare eller apotekare.

#### 4. Möjliga biverkningar

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, även om får inte alla med det att göra.

Kontakta omedelbart en läkare om du märker något av de följande symtomen ;du kanske har har u akut medicinsk behandling behövs:

svullnad av ansiktet, läpparna eller halsen, vilket gör det svårt att svälja eller andas svårt .

Detta kan en tecken är av en allvarlig allergisk reaktion (frekvens inte känd, kan med de tillgängliga uppgifterna inte fastställas bestämmas).

Mycket vanliga biverkningar biverkningar hos fler än 1 av 10 användare ):Huvudvärk ..

biverkningar vanliga hos 1 till 10 av 100 användare):

Andnöd (dyspné),

Klåda (pruritus), överdriven hårväxt (hypertrikos), (hud)utslag, rodnad (utslag), akne-liknande hudreaktion, hudinfektion (dermatit).

Muskelvärk.

Vätskeansamling i extremiteterna.

Ibland förekommande biverkning (hos färre än 1 av 100 användare): Sänkt blodtryck (hypotoni).

Sällan förekommande biverkningar (hos mindre än 1 av 1000 användare): Ökad hjärtfrekvens (takykardi), hjärtklappning.

Biverkningar med frekvens 'Inte känd' (baserat på de kända uppgifterna kan frekvensen inte fastställas ): Överkänslighet, plötsligsvullnad av huden och hud och slemhinnor (t.ex.. av läpp, tunga, mun, hals eller ansikte), med som följd andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, ofta som allergisk reaktion (angio-ödem), inflammation av huden efter kontakt med detta medel ..

Nedstämd Yrsel

Yrsel.

Ögonirritation.

blodtryck blodtryck (hypotoni).

Illamående, kräkningar.

Håravfall (detta slutar efter några veckor av användning av minoxidil och kan komma genom bortfall av gamla och tillväxt av nya hår),hårfärgförändring hårfärgsförändringavvikelse i hårtexturen hårtexturreaktion på platsen för från applicera: klåda, irritation, smärta, (hud)utslag, svullnad, torr hud, rodnad, fjällning av hud (exfoliering), hudinflammation, blåsbildning, blödning och sårbildning. Smärta i bröstkorgen.

Att rapportera av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller också för möjliga biverkningar som inte i denna bipacksedel står. U kan biverkningar också direkt rapportera via Nederländska Biverknings Centrum Lareb, webbplats: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Genom att rapportera biverkningar te rapportera, kan du oss hjälpa mer information att få om säkerheten av denna läkemedel.

## 5. Hur förvarar du denna medicin?

Förvara under 25°C. Inte i kylskåpet eller frysen förvara.

Håll flaskan väl stängd.

Hållbarhet efter öppning: 50 dagar.

Utanför syn och räckhåll av barn hålla.

Använd denna medicin inte mer efter det sista hållbarhetsdatum. Det är att hitta på låda eller flaska efter "Exp.". Där står en månad och ett år. Den sista dagen i den månaden är sista användningsdatumet.

Spola läkemedel inte genom handfatet eller toaletten och släng dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel bör göra som du inte längre använder. De blir sedan på ett ansvarsfullt sätt förstörda och kommer inte ut i miljön hamnar.

## 6. Innehåll av förpackning och övrig information

Vilka ämnen finns det i denna medicin?

- Den aktiva substansen i denna medicin är minoxidil. Varje milliliter av lösning innehåller 50 mg minoxidil.
- De andra ämnen i denna medicin är propylenglykol och etanol (96%).

Hur ser Minoxidil Linn ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Klar, färglös till ljusrosa, homogen lösning.

Minoxidil Linn 50 mg/ml är tillgänglig i kartong med en eller av tre transparenta, röda flaskor av 100 ml, med en sprayhuvud och en färglös kork. En applikator levereras separat med i ytterkartongen.

Innehavare av tillståndet för i handel sätta och tillverkare

Tillståndsinnehavare

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Nederländerna

Tillverkare

MAE Holding BV

Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Nederländerna

Medinfar Manufacturing, S.A.

Parque Industrial Armando Martins Tavares

Rua Outeiro da Armada, 5

Condeixa-a-Nova

3150-194 Sebal

Portugal

Det läkemedlet är registrerat under RVG 122548.

Denna bipacksedel är senast godkänd den sist i september 2024.

Transtoyou