

Información de uso: Información para usuarios

Molevac® Grageas

50 mg recubiertas Tabletas Principio activo: Pirvinio
Para niños a partir de 3 años, adolescentes y adultos

Lea el prospecto completo cuidadosamente antes de usar, antes de con el consumo de este medicamento comenzar, porque contiene importante información Información.

este medicamento siempre exactamente como en este este Prospecto descrito o.
exactamente según instrucciones de su médico o farmacéutico uno.

Guarde el prospecto guardado. Quizás quiera usted estas más tarde nuevamente leer.
Preguntas Pregunte a su farmacéutico, si necesita más información o un consejo necesita.

Si experimenta efectos secundarios notar, dirigir a usted a su médico o farmacéutico.
Esto también se aplica a para efectos secundarios, que no están en este prospecto indicados están. Ver Sección 4

Si sus síntomas empeoran empeorar no hay mejoría ,debe consultar a cualquier caso un médico visitar ..

¿Qué hay en este prospecto se indica

1. ¿Qué es Molevac y para qué se utiliza ?¿Qué
2. debería usted antes de tomar de de Molevac tener en cuenta?
3. Cómo es Molevac tomar?
4. Cuáles efectos secundarios son posibles?
5. Cómo es Molevac almacenar?
6. Contenido de Paquete y más información

1. ¿Qué es Molevac y para qué se utiliza ?Molevac

es un medicamento para el tratamiento en infestación por oxiuros (Oxiuriasis). Molevac puede ser utilizado en niños a partir de 3 años, adolescentes Adolescentes adultos Adultos.

Molevac es Pyrvinium Principio activo es es especialmente contra oxiuros (oxiuros) eficaz. La acción antihelmíntica se basa en una alteración del metabolismo de los oxiuros por Molevac Molevac.

2. Qué debería usted antes de la toma de Molevac tener en cuenta?

Molevac no debe ser tomado si,

- cuando usted alérgico a el principio activo Pyrvinium, Metil- o. Propil-4-hidroxibenzoato o alguno de los apartado 6. mencionados otros componentes de este medicamento están.
- en Daño hepático
- en enfermedades inflamatorias
- intestinales Disfunción renal

insuficiencia renal Advertencias Precauciones

precauciones Por favor, hable con su médico o farmacéutico antes de Molevac tomar.

Molevac tiñe las heces de rojo brillante. Esto no tiene ningún valor patológico, sino indica solamente que el principio activo el tracto gastrointestinal Tracto correctamente ha pasado ha pasado.

El principio activo de Molevac, pirvinio, puede por ejemplo a través de vómitos o a través de coloración roja de las heces provocar una decoloración de textiles conducir. Esta decoloración es no lavable.

En una infestación de gusanos son frecuentemente también los miembros de la familia u otras cercanas personas de contacto con afectado. Preguntas Usted su médico o farmacéutico, si en estas personas de contacto también un tratamiento realizado debería ser. Preste atención además en Higiene corporal y una minuciosa limpieza de áreas de vida (vivienda, lugar de trabajo) así como de la ropa.

Niños

Molevac Grageas son para el tratamiento de niños menores de 3 años no adecuado. Para niños a partir de un año de edad está Molevac como suspensión disponible ..

de de Molevac junto con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico, si toma otros medicamentos tomausa, recientemente otros medicamentos tomado/aplicado han o intentan otros medicamentos tomar/aplicar.

Hasta ahora se han no interacciones con otros Medicamentos observado.

Embarazo, Lactancia y Fertilidad-/Capacidad reproductiva

Si usted está embarazada o amamantando ,o si usted sospecha sospechar, embarazada de estar o tiene la intención, embarazada de quedar, consulte a su antes de la toma de este medicamento a su médico o Farmacéutico para consejo.

Embarazo

En el embarazo puede usted Molevac solo tomar, si esto considerando el riesgo para la madre y el niño estrictamente necesario requerido es, p. ej. porque otros principios activos no tomados pueden ser.

Durante el uso de Molevac en el embarazo debe la cantidad de medicamento a la Peso corporal antes del embarazo referido ser (ver también sección 3. "Cómo se Molevac tomar?").

Lactancia

Madres lactantes deben evitar de razones de seguridad durante la aplicación de Molevac la leche extraer y desechar.

Mujeres en edad fértil Edad

Mujeres en edad fértil Edad deberían durante el tratamiento con Molevac un método anticonceptivo seguro, ya que el posible riesgo al usar de Molevac en el embarazo no conocido es.

Capacidad para conducir y habilidad para operar máquinas

No se requieren precauciones especiales requerido.

contiene sacarosa (azúcar) Por favor

Por favor tome usted Molevac solo después de consultar con su médico un, si usted sabe que, usted sufre de una uno Intolerancia a ciertos azúcares sufren.

3. Cómo es Molevac tomar?

Tome este medicamento siempre exactamente como en este prospecto descrito o. exactamente según el con su médico o farmacéutico acuerdo acuerdo uno. Pregunte a su médico o farmacéutico Farmacéutico después, si usted se no seguro está.

Dosificación

Molevac se en la mayoría de una sola vez administrado.

Si del médico no de otra manera prescrito, es la dosis habitual:

Niños a partir de 3 años, Adolescentes y Adultos reciben 1 comprimido recubierto Molevac (correspondiente 50 mg de pirvinio) por 10 kg peso corporal. La dosis máxima es en niños, adolescentes y adultos (también en un peso corporal de más de 80 kg) 8 recubiertas tabletas Molevac (correspondiente 400 mg de pirvinio), ver tabla de dosificación.

En insuficiente eficacia no se debe aumentar la cantidad de medicamento aumentada, sino la Tratamiento repetido ser.

Tabla de dosificación

Edad aprox. (años)	Peso corporal aprox. (kg)	Número Molevac Grageas
Niños o. Adolescentes		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Adultos		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (o más)	8

Aplicación en niños y adolescentes

La dosificación en niños a partir de 3 años y adolescentes puede consultar en la tabla de dosificación .. grageas son para los para la Tratamiento de niños menores de 3 años no apto. Para niños a partir de un año de edad está Molevac como suspensión para tomar disponible Disposición.

uso Aplicación

Tome Molevac grageas por favor sin masticar con suficiente líquido ingiera. Molevac puede tanto con una comida como también en ayunas Estómago tomado ser. Si usted una mayor cantidad grageas tomar debe, distribuir la toma de la mejor en tres porciones: antes, durante y después de la comida.

Embarazadas

Durante la aplicación de Molevac en el embarazo debe la dosificación al peso corporal antes del embarazo obtenido ser. Con respecto a posibles riesgos durante uso de Molevac en el embarazo ver sección 2 bajo "Embarazo, Lactancia y Fertilidad-Capacidad reproductiva".

Pacientes con función renal

reducida Molevac no debe en pacientes con función renal reducida no aplicado ser (ver sección 2 bajo „Molevac no debe tomarse ").Pacientes

con función hepática reducida

Molevac debe en pacientes con daño hepático no utilizarse ser (ver sección 2 bajo „Molevac no debe tomarse ser").

Personas mayores Pacientes (mayores de 65 años)

Siempre que no haya limitación de la función hepática o de la función renal presente, no hay particularidades a tener en cuenta.

Duración de la aplicación

Repita la tratamiento con Molevac después de 2 a 4 semanas de la misma manera.

Si usted una mayor cantidad de Molevac ha tomado ha, como usted debería,

puede una intensificación de los efectos adversos (ver también sección 4: „Cuáles efectos secundarios son posibles"?) de Molevac ocurrir. Si después de la ingestión de Molevac signos de intoxicación aparecen, busque por favor inmediatamente un Médico. Él puede un lavado gástrico o la ingestión de carbón activado ordenar.

Si olvida la ingestión de Molevac olvidado ha,

puede usted la falta cantidad sin más aún el mismo día tomar. En cualquier caso debería usted sin embargo la en este prospecto mencionada Cantidad total Molevac tomar.

Si usted más preguntas sobre la toma de este medicamento tiene, consulte a su médico un su médico o Farmacéutico.

4. Cuáles Efectos secundarios son posibles?

Como todos los medicamentos puede también este medicamento efectos secundarios tener, que sin embargo no en cada ocurrir deben.

En la evaluación de efectos secundarios se utilizan las siguientes frecuencias como base:

Muy frecuente:	más de 1 paciente de 10
Frecuente:	1 a 10 Tratados de 100
Ocasionalmente:	1 a 10 Tratados de 1.000
Raramente:	1 a 10 Tratados de 10.000
Muy raramente:	menos de 1 Tratado de 10.000

Enfermedades del sistema nervioso

Ocasionalmente: Dolores de cabeza

Muy raro: Convulsiones

Enfermedades del oído y del laberinto

Muy raro: Mareo

Enfermedades de las vías respiratorias, del tórax y mediastino

Muy raro: hinchazón interna de la laringe (edema laríngeo)

Enfermedades del tracto gastrointestinal Frecuente

Frecuente: Dolor abdominal, Náuseas, Vómitos

Ocasionalmente: Diarrea

Rara vez: Calambres estomacales, Flatulencias, Estreñimiento

Muy rara vez: Inflamación de la mucosa oral (Estomatitis)

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo

Muy raro: manifestaciones cutáneas con y sin prurito, como p. ej. urticaria con vesículas- y Formación de ronchas (Urticaria), Fotosensibilidad, Erupciones cutáneas (Rash), Hemorragias cutáneas (Púrpura) así como Hinchazón de la piel y mucosa (Angioedema)

Otros posibles efectos secundarios

Metil- y propil-4-hidroxibenzoato pueden reacciones de hipersensibilidad, incluidas reacciones tardías provocar.

Informe de efectos secundarios

Si nota efectos secundarios ,consulte a su sí médico Su Médico o farmacéutico. Esto también se aplica también a efectos secundarios, que no están en este prospecto indicados están. Usted puede efectos secundarios también directamente al Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, Abt. Farmacovigilancia, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, informar. Al usted efectos secundarios informe, puede usted a contribuir, que más Información sobre la seguridad de este medicamento a disposición proporcionada será.

5. Cómo se debe Molevac almacenar?

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños inaccesible .

Usted deben el medicamento después de la blíster y en el cartón después „Fecha de caducidad hasta:” indicado fecha de caducidad no más usar. La fecha de caducidad se refiere a en el último día del indicado mes.

6. Contenido del empaque y más información

Qué Molevac contiene

El principio activo es Pyrvinium.

1 recubierta tableta contiene 75,25 mg Pyrviniumembonat (equivalente a 50 mg de base de pyrvinium).

Los otros componentes son:
manitol (Ph. Eur.), almidón de maíz, talco, povidona K 25, Estearato de magnesio (Ph. Eur.), Polisorbato 80, Carboximetilalmidón-Sodio (Tipo A) (Ph. Eur.), Sacarosa, Gelatina, Goma laca, Carbonato de calcio, Óxidos de hierro e hidróxidos, Benzoato de sodio, Metil-4-hidroxibenzoato (Ph. Eur.), Propil-4-hidroxibenzoato (Ph. Eur.), cera blanqueada.

Cómo Molevac parece y Contenido del empaque

8 recubiertas rojo-marrón comprimidos

Empresa farmacéutica y fabricante

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Este Prospecto fue última revisado en diciembre de 2013.

Más información según § 11 párr. 1 frase 7 AMG:

Estimados pacientes, estimados padres.

En usted o su hijo se detectó una infestación de gusanos detectado y usted tiene Molevac de su médico prescrito recibido o sin receta en la farmacia comprado. Por supuesto se siente preocupado por, cómo usted los parásitos nuevamente eliminar. Por lo tanto, hemos reunido algunas informaciones , que le proporcionarán los antecedentes de esta enfermedad más cercanos y ayudarán a ayudar serán, la tratamiento adecuadamente realizar.

Infección por oxiuros – la más común enfermedad por gusanos

Los oxiuros son parásitos, es decir, organismos, que en un organismo ajeno, el llamados huésped, viven y se en cuyos gastos se alimentan.

Oxiuros son la con diferencia más común tipo de gusano, que afecta a las personas en las templadas zonas climáticas infesta. En muchos países albergan aproximadamente un tercio de todos los niños estos parásitos. La transmisión de persona a persona ocurre muy fácilmente a través de contacto indirecto y Infección por suciedad y es ya por simple apretón de manos posible.

¿Cómo ocurre una infección con oxiuros?

Si usted o su hijo Oxiuros infectadas están, así es esto no necesariamente la consecuencia de falta de higiene personal. Fácilmente puede ocurrir una transmisión dentro de instalaciones comunitarias, como p. ej. jardines de infancia, a través de uso compartido de inodoros, juguetes o prendas de vestir ocurre.

También al jugar en públicos parques infantiles es por contaminada arena una infección posible. Los huevos de oxiuros son muy estables. Ellos pueden en ambiente seco hasta hasta a 3 semanas contagioso ser y con el polvo de la habitación levantado ser. Por lo tanto puede el oxiuros no solo por contacto directo, sino también a través de Inhalación transmitido serán. Una vez en el cuerpo llega, maduran los huevos dentro de 14 días a gusanos adultos , que hastapueden a 11 mm de largo se. Un en colon presente hembra se arrastra por la noche, cuando el paciente afectado duerme, fuera del ano y pone allí en área del ano de una vez hasta a 10000 huevos al. Esto conduce a un fuerte picor y el paciente comienza a rascarse en Sueño parcialmente desapercibido a rascar. En este Camino llegan miles huevos de lombriz bajo las uñas. En particular Niños ponen entonces los dedos en la boca y ya comienza el ciclo de nuevo.

¿Cómo reconozco una infección por oxiuros?

Hay muchas personas que están infectadas por oxiuros son, esto sin embargo no notar. Frecuentemente causa la infestación por gusanos de hecho solo leves o incluso ninguna molestias. Si usted sin embargo nota, que se su niño a menudo en el ano rasca, debería siempre pensar en una infección por gusanos pensar. Otros síntomas pueden ser:

- fatiga y por lo tanto falta de concentración
- trastornos del sueño, durante el día irritabilidad
- falta de apetito
- palidez
- pérdida de peso
- Malestar general

Después de que una hembra sus huevos ha puesto , muere ella pueden entonces eventualmente hasta a 11 mm largos gusanos en pijama o en la ropa de cama con ojo desnudo reconocer.

Cómo se un infección por oxiuros tratado?

Si una infección por oxiuros por el médico confirmada es, debería ser en cada caso con un medicamento contra gusanos, un tan llamado antihelmíntico, tratado ser.

El principio activo Pyrvinium, que tanto en Molevac suspensión como también en Molevac Grageas contenido es, se utiliza desde varias décadas en muchos países para tratamiento de infecciones por gusanos empleado.

Pyrvinium se prácticamente no en el humano torrente sanguíneo absorbido.

Por eso es Molevac generalmente extremadamente bien tolerado. Actúa solo donde , donde actuar debe: En el intestino, donde se los gusanos encuentran.

¿Qué puedo yo más hacer? La

aplicación de Molevac es es concebible simple. Además de la su médico prescrita toma deberían usted sin embargo adicionalmente absolutamente algunas medidas de higiene tener en cuenta.

- Asegúrese de, que se Su niño después de jugar al aire libre así como después de cada visita al baño a fondo las manos lava.
- Mantenga las uñas de su niño lo más breve y limpio.
- Asegúrese de una adecuada higiene en el área anal.
- Lave toda la ropa y ropa de cama, con el Su niño en contacto estuvo (60 °C lavado es suficiente).
- Evite usted posiblemente el remolino de polvo (p. ej. al hacer la cama).

De vez en cuando escuchar nosotros, que incluso con correcta aplicación de Molevac y cuidadosa observación de todas las medidas de higiene la infección por gusanos aparentemente no desaparece. En tales casos es frecuente un miembro de la familia, el cual gusanos alberga, esto sin embargo no se da cuenta, para la reinfestación responsable. Hable con este Caso absolutamente con su médico.

En persistentes cursos puede ser simultáneo tratamiento de todos los miembros.

la familia necesario

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH