

Kasutusjuhend: Teave kasutajale

Molevac® Drageed
50 mg kaetud Tabletid Toimeaine: Pürvinium
Lastele alates 3. eluaastast, noorukitele ja täiskasvanutele

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi, enne kui koos selle võtmise selle ravimi alustate, sest see sisaldab olulist teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nagu selles selles Pakendi infoleht kirjeldatud või. täpselt järgi juhiseid Teie arsti või apteekri järgi.

Hoidke see pakendi infoleht alles Võib-olla soovite Teie need hiljem uuesti lugema. Küsimused küsige oma apteekrilt, kui teil lisateavet või nõu vajate . Kui teil. Kui te Kõrvaltoimed tähele panema, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mis ei oleselles pakendi infolehes märgitud . Vaata. . Jaotis 4 Kui teie kaebused halveneivad või ei parane , peatekindlasti arsti külastama . Juhtum ühe Arst külastama.

Mis on selles pakendi infolehes seisab

1. Mis on Molevac ja milleks kasutatakse seda rakendatakse?
2. Mida peaksite Teie enne võtmist ravimi kohta Molevac tähele panna?
3. Kuidas on Molevac kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas on Molevac säilitada?
6. Sisu der Pakend ja täiendav teave

1. Mis on Molevac ja milleks kasutatakse seda ?Molevac

on ravim raviks vahend raviks raviks juures naaskelsabatõbi (Oxyuriasis). Molevac võib kasutada olla juures lastel alates 3. eluaastast, noorukitel ja täiskasvanutel.

Molevacis sisalduv Molevac sisaldatud toimeaine Pürvinium on spetsiaalselt vastu naaskelsabad (Oxyuren) tõhus. Toime ussitapmise efekt põhineb ainevahetuse häiretel naaskelsabade ainevahetuses Ainevahetus naaskelsabade läbi Molevac Molevac.

2. Mida peaksite Teie enne ravimi võtmist Molevac arvestama ?Molevac

ei tohi võtta , kui Teieolete

- allergiline selle ravimi koostisosade suhtes allergiline vastu toimeainele Pürvinium, metüül- või . Propüül-4-hüdroksübensoaatvõi mõnele nendest, mis on punktis 6. 6. muudele koostisosadele selle ravimi on ..
- juures Maksakahjustus
- juures põletikuliste soolehaiguste
- juures neerufunktsiooni häire

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun rääkige oma arstiga või apteekriga enne kui Molevac'i võtate ..

Molevac värvib väljaheite helepunaseks. See ei oma mingit haiguslikku väärtust, vaid näitab ainult, et et toimeaine toimeaine mao-soole-trakti korralikult läbib on läbinud. Toimeaine Molevac, Pyruvium, võibnäiteks oksendamise või väljaheite punaseks värvumise kaudu tekkinud värvimuutus tekstiilidel põhjustada ühe Värvimuutus alates Tekstiilid juhatama. Need värvimuutused on mitte eemaldatavad.

Kui on ussinakkus on sageli ka pereliikmed või teised lähedased kontaktisikud kaasatud ka mõjutatud. Küsimused Te oma arsti või apteekrit, kas nende kontaktisikute ka ravi läbi viia tuleks. Pöörake tähelepanu lisaks peaks Pöörake tähelepanu lisaks peal kehahügieen ja üks põhjalik puhastus eluruumide Eluvaldkonnad korter, töökoht Töökohtsamuti riiete. Lapsed.

Drageed

Molevac Dražeed on jaoks ravi lastel lastel alla 3 aasta vanustele ei ole sobiv. Lastele alates ühest aastast on saadaval Molevac kui suspensioon kasutamiseks saadaval.

Manustamine alates Molevac koos teiste ravimitega Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate teisi ravimeid Ravim rakendate, hiljuti, hiljuti teised ravimid võtnud/kasutanud on või kavatsevad teised ravimid võtta/kasutada.

Siiani ei ole mingeid koostoimeid koos teistega Ravimid täheldatud.

Rasedus, Imetamine ja Sigimis-/Sünnitusvõime

Kui te rase olete või imetate, või kui te kahtlustate, rase olema olema või kavatsete, rase jääda, küsige oma enne selle ravimi võtmist arstilt Ravimi Teie Arst või Apteekrilt nõu.

Rasedus

Raseduse ajal Rasedus tohib Te Molevac ainult võtta, kui see arvestades riski Ema ja lapse jaoks hädavajalik on vajalik on on, nt. sest teised toimeained ei võeta või tohi.

Kasutamisel kasutamine alates Molevac raseduse ajal peaks ravimi kogus olema Kehakaal enne rasedust arvestada tuleb (vt ka jaotis 3. „Kuidas on Molevac kasutada?“). Imetamine

Imetavad

emad peaksid peaksid välja ohutuse huvides ajal der kasutamise alates Molevac piima välja pumbata ja ära visata.

Naised viljakas eas Vanus

Naised viljakas eas Vanus peaksid ajal ravi ravi koos Molevaciga kasutama ohutut rasestumisvastast meetodit, kunavõimalik risk juures kasutamine koos Molevaciga raseduse ajal ei ole teada tuntud on.

Liiklusohutus ja Võimekus masinate käsitsemiseks masinatest

See ei ole mingeid erilisi ettevaatusabinõusid vajalik.

Molevac sisaldab sahharoosi (suhkur)

Palun võtke Te Molevac alles pärast konsulteerimist oma arstiga arst üks, kui Teile teada on, et Te kannatate ühe Talumatus teatud suhkru suhtes kannatama.

3. Kuidas on Molevac kasutada?

Võtke seda ravimit alati täpselt nagu selles pakendi infolehes kirjeldatud või. täpselt järgi arsti koos Teie arstiga või apteekriga kokkulepitud kokkulepe üks. Küsimused esitage oma arstile või apteekrile Apteeker pärast, kui te ei ole kindel ..

Molevac

antakse tavaliselt ühekordse annusena . Kui Ühekordne annus manustatud.

Kui arstilt mitte teisiti määratud, on tavaline annus ::

noorukid ja täiskasvanud saavad 1 1 tablett Molevac (vastavalt 50 mg pürvinium) 10 kg kohta kehakaalu. Maksimaalne annus on lastel ,noorukitel ja täiskasvanutel Täiskasvanutele kakui kehakaal on rohkem kui rohkem kui 80 kg) 8 kaetud tabletid Molevac (vastavalt 400 mg pürviniumile), vt annustamistabelit.

Kui ebapiisav efektiivsus peaks mitte ravimikogust suurendama, vaid die Ravi korratakse saab.

Annustamistabel

Vanus ca. (aastat)	Kehakaal ca. (kg)	Kogus Molevac Drageed
Lapsed või. Noorukid		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Täiskasvanud		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (või rohkem)	8

Kasutamine juures lastel ja noorukitel

Annustamine lastel alates 3-aastastel ja noorukitel saate annustamistabelist vaadata .. dražeed on mõeldud jaoks Ravi alates lastele alla 3 aasta ei ole sobiv. Lastele alates ühest eluaastast on Molevac kui suspensioonina suukaudseks manustamiseks saadaval ..

viis Kasutamine

Võtke Molevac dražeed palun närimata koos piisava vedelikuga alla. Molevac võib nii koos toidukorraga kui ka tühja kõhuga tühja kõhuga Magu võetud olema. Kui te ühe suurema Kogus dražeed võtma peate, jagage te võtmine kõige parem kolme kolme portsjoni: enne, ajal ja pärast sööki sööki.

Rasedad

Molevac'i kasutamine Molevac'i Molevac raseduse ajal raseduse ajal peab annustamine kehakaalu kehakaalu kehakaalu enne rasedust saadud olema .. võimalike riskidega kasutamisel Molevac'i raseduse ajal vt jaotis 2 all „ Jagu 2 allergia „Rasedus, Imetamine ja Sigimis-/Sünnitusvõime“.

Patsiendid koos piiratud neerufunktsiooniga

Molevac ei tohi patsientidel koos piiratud neerufunktsiooniga Neerufunktsioon mitte kasutatud olema (vt. jaotis 2 all „Molevac ei tohi mitte võtta olema“).

Patsiendid koos piiratud maksafunktsiooniga

Molevac tohib juures patsientidel koos maksakahjustusega mitte kasutada olla (vt. jaotis 2 all „Molevac ei tohi mitte võtta olla“).

Eakad Patsiendid (üle 65 aasta)

Kui pole piirangut maksa- või neerufunktsioonis olemas ,ei ole mingeid eripärasid tähele panna . tähelepanu pöörama.

Kestus kasutamine

Korrake te ravi koos Molevac pärast 2 kuni 4 nädalat samal viisil .

Kui te suurema koguse Molevac võtnud olete on, kui Te peaksid,

võib üks tugevnemine kõrvaltoimete soovimatute mõjude (vt. ka jaotis 4: „Millised kõrvaltoimed on võimalikud“?) von Molevac ilmned. Kui ilmnevad pärast ravimi võtmist ravimi Molevac mürgistuse tunnused , pöördugekohe palun viivitamatult arsti ühe Arstile. Ta võib teha maoloputuse või määrata manustamise meditsiinilise söe võtmise põhjustama.

manustamise ravimi Molevac võtmise unustanud ,võite

saama Te puuduv kogus ilma lisata veel samal päeval võtta .Igal juhul peaksite aga järgima selles pakendi infolehes nimetatud juhiseid Kogusumma Molevac võtma.

Kui teil lisaküsimusi küsimusi seoses võtmise selle ravimi on, pöörduge oma arsti poole oma arst või Apteeker.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuid mitte igapähe esineda ei pea ..

Juures Hindamine kohta Kõrvaltoimed on järgmised Sageduse määrad aluseks võetud:

Väga sageli:	rohkem kui 1 Ravitud 10-st
Sageli:	1 kuni 10 Ravitud 100-st
Aeg-ajalt:	1 kuni 10 Ravitud 1 000-st
Harva:	1 kuni 10 Ravitud 10 000-st
Väga harva:	vähem kui 1 Ravitud 10 000-st

Haigused des Närvisüsteem

Aeg-ajalt: Peavalu

Väga harva: Krambid

Haigused des Kõrv ja labürint

Väga harva: Peapööritus

Haigused der hingamisteede, rindkere ja mediastiinumi

Väga harva: mööduv sisemine kõriturse (larüngeaalödeem)

Seedetrakti haigused Sageli

Sageasti: Kõhuvalu, iiveldus, Oksendamine

Aeg-ajalt: Kõhulahtisus

Harva: Mao krampid, Gaasid, Kõhukinnisus

Väga harva: Põletik suu limaskest (Stomatiit)

Haigused naha ja nahaaluskoe

Väga harva: allergilised nahalööbed koos ja ilma sügeluseta, nagu nt nõgestõbi koos villidega- ja Kublade moodustumine (Urtikaaria), Valgustundlikkus, Nahalööbed (Lööve), Naha verejooksud (Purpur) samuti Turse nahal ja Limaskest (Angioödeem)

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Metüül- ja propüül-4-hüdroksübensoaat võivad ülitundlikkusreaktsioone, ka hilised reaktsioonid põhjustada.

Teatamine kõrvaltoimetest Kõrvaltoimete

märkamise korral kõrvaltoimeid täheldate, pöörduge oma poole kuni arstile Arst või apteeker. See kehtib ka kohta kõrvaltoimed, mida ei ole selles pakendi infolehes mainitud . Tevõite kõrvaltoimeid ka otse otse Föderaalinstituudile ravimite ja meditsiiniseadmete Meditsiiniseadmed, osakond Farmakovigilants, Kurt-Georg Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Veebisait: www.bfarm.de, kuva. Sellega te kõrvaltoimeid teatate, saate te sellest panustada, et rohkem Teave kohta selle ravimi ohutuse saamiseks esitatud peab olema.

5. Kuidas Molevac'i säilitada säilitada Hoidke

sesta ravimit lastele kättesaamatus kohas. Teie

Teie tohib ravimit pärast pakendil blisterpakendil ja karbil karbil pärast „Kõlblik kuni:“ märgitud aegumiskuupäeva mitte enam kasutada. Aegumiskuupäev aegumiskuupäev viitab on seotud määratud viimasele kuu päevale märgitud kuus.

6. Sisu pakendis ja lisainfo Mis Molevac

sisaldab Toimeaine on

Pyrvinium. Toimeaine on Pyrvinium.

1 kaetud tablett sisaldab 75,25 mg pürviniumembonaati (vastab 50 mg pürviniumalusele).

Muud abiaineid on ::

maisitärklis ,talk ,povidoon Povidoon K 25, Magneesiumstearaat (Ph. Eur.), Polüsorbaat 80, Karboksümetüültärklis-Naatrium (Tüüp A) (Ph. Eur.), Sahharoos, Želatiin, Šellak, Kaltsiumkarbonaat, Raudoksiidid ja -hüdroksiidid, Naatriumbensoaat, Metüül-4-hüdroksübensoaat (Ph. Eur.), Propüül-4-hüdroksübensoaat (Ph. Eur.), pleegitatud Vaha.

Kuidas Molevac näeb välja ja Sisu pakendi Pakend

8 kaetud punakas-pruunikad Tabletid

Farmatseutiline ettevõtja ja Tootja

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

See Pakendi infoleht oli viimati üle vaadatud aastal detsember 2013.

Transtoyou

Täiendavad andmed vastavalt § 11 lõige 1 lause 7 AMG:

Kallid patsiendid, kallid vanemad.

Teil või Teie lapsel avastati ussinnakkus kindlaks tehtud ja te olete Molevac oma arstilt saanud välja kirjutatud või retseptita apteegist ostnud. Loomulikult te endale muret, ennast Mured, kuidas te kahjuritest jälle lahti saada. Seetõttu oleme me mõned teabe kokku pannud, mis teile tausta sellest haigusest lähemalt tutvustada peaks ja aitama saada, mis ravi asjatundlikult läbi viia.

naaskelsabatõbi – kõige sagedasem ussitõbi

naaskelsabad on parasiidid, s.t. organismid, mis elavad võõras organismis, peremeesorganismis, mille nimetatud peremeesorganismis, elavad ja end selle kulul toidavad ..

on kõige levinum ussiliik, mis inimesi mõõduka kliimapiirkondades nakatab. In paljudes riikides kannatavad hinnanguliselt kolmandik kõigist lastest nende parasiitide all. Edasikandumine inimeselt inimesele toimub väga kergesti määrdumise ja kontakti kaudu Mustuseinfektsioon ja on juba läbi ainuüksi käepigistuse võimalik.

Kuidas toimub infektsioon naaskelsabadega? Kui teie või teie laps on Teie Laps alates Viirusussid nakatunud on, nii on see mitte tingimata selle tagajärg puuduliku isikliku hügieeni tõttu. Lihtsalt võib toimuda ülekande asutusesiseselt sees ühiskasutusasutustes

Ühiskasutatavad rajatised, nagu nt. lasteaiad, läbi ühise kasutamise alates tualetid, mänguasjad või riidesemed toimuda.

Ka mängides Mängima avalikel avalik Mänguväljakutel on läbi saastunud liiva võimalik infektsioon .. on väga stabiilsed. Nad võivad kuivas keskkonnas kuni kestma kuni 3 nädalat nakkav olla ja koos toatolmuga toatolm õhku paisatud saada. Seetõttu võib naaskelsabauss naaskelsabauss mitte ainult läbi otsese kontakti, vaid ka läbi sissehingamine edastatakse saavad.

Üks kord kehasse jõuab, küpsevad munad munad 14 päeva jooksul 14 päeva jooksul täiskasvanud täiskasvanud ussideks ussideks, mis võivad kuni 11 mm pikk saavad. Üks kõhus jämesool olev emane roomab öösel, kui mõjutatud patsient magab, välja pärakust ja muneb sinna seal päraku piirkonnas des väljalaskeava korruga kuni 10000 muna ladestuma. See põhjustab tugevat sügelust ja patsient hakkab ennast päraku kriimustama mis võib viia Uni osaliselt märkamata kuni kratsima. Peal sellel viisil jõuavad tuhanded ussimunad alla küünthe alla. Eelkõige Eriti Lapsed pistavad siis sõrmed suhu ja juba algab vereringe tsükkel uuesti uuesti.

Kuidas tuvastan ma ümarusside nakkuse?

On palju inimesi, kes on ümarussidega nakatunud on on, see kuid mitte märka. Sageli põhjustab ussinfestatsioon nimelt ainult kergeid või üldse mingeid kaebusi. Kui tekiud tähele panete „ et teie Teie laps tihti päraku piirkonnas kratsib, peaksite alati mõtlema ussnakkusele ussnakkusele mõtlema. Muud tunnused võivad olla:

- väsimus ja seetõttu kontsentratsioonihäired
- unetused, päeval ärrituvus
- isutus
- kahvatus
- kaalukaotus
- üldine halb enesetunne

Pärast üks emane oma munad munenud on, sureb see ära. Ta võivad siis võimalik kuni kuni 11 mm pikkused ussid öösärgis või voodipesus palja silmaga näha . Kuidas on.

tuvastada ? üks naaskelsabatõbi ravitakse?

Kui üks naaskelsabainfektsioon arstilt kinnitatud saab ,tuleks seda igal juhul ravida koos ravimiga ühe ravimiga vastu usside, ühe nii nimetatud anthelmintikum, ravitakse ..

pürvinium, mis nii kui ka Molevac suspensioonis kui ka olemas on in Molevac dražeed sisaldavad on, kasutatakse alates mitu aastakümnet in paljudes riikides raviks raviks ussnakkuste raviks kasutatud.

Pyrvinium ei praktiliselt mitte inimese vereringesse imendu.

Seetõttu on Molevac tavaliselt äärmiselt hästi talutav. See toimib ainult seal, kus see toimima peab: Sooles, kus ussid asuvad . Mida veel.

Molevac kasutamine on muidu veel teha?

Die Kasutamine alates Molevac on mõeldav lihtne. Lisaks Teie arst määratud võtmisele peaksite Te kuid lisaks kindlasti mõned hügieenimeetmed järgima.

- Pöörake tähelepanu sellele, et ennast Teie laps pärast mängimist väljas vabas õhus samuti pärast iga tualetikülastust põhjalikult käed peseb ..
- küüned puhtad Fingernägel Teie lapse võimalikult lühike ja puhtad.
- Hoolitsege piisava hügieeni päraku piirkonnas.
- Peske kõik riided ja voodipesu, koos der Teie laps Kontakt oli (60 °C pesu piisab).
- Vältige võimalusel tolmu üleskeerutamist (nt vooditegemisel). Aeg-ajalt kuulatesiit ja

sealt kuulete kuulma meie, et isegi korrektsel kasutamisel Molevac ja hoolikal tähelepanul kõigile hügieenimeetmete näib ussnakkus mitte kaduvat . Kui näibmitte sellistel juhtudel on sageli üks pereliige, kes usse kannab, kuid ei tea sellest, vastutav uuesti nakatumise eest.

Rääkige oma sellest Juhul kindlasti koos Teie arstiga.

Kui kangekaelsete kulude võib olla samaaegne ravi kõigi pereliikmete vajalik olla.

Head tervenemist soovib

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH