

Käyttötiedot: Tietoa käyttäjälle

Molevac® Drageet
50 mg päällystetyt tabletit Vaikuttava aine: Pyrvinium
Lapsille 3-vuotiaasta alkaen, nuorille ja aikuisille

Lue koko pakkausseloste huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön tämän lääkkeenaloitat , koska se sisältää tärkeitä.

. Ota tämä lääke aina tarkalleen kuten tässä Pakkausseloste kuvattu tai. tarkasti mukaan ohje lääkärinne tai apteekkarinne mukaan ..

tämä pakkausseloste tallessa. Ehkä haluatte te Sinä nämä myöhemmin uudelleen lukea. Kysymyksiä kysy apteekkariltasi , jos tarvitset lisätietoja tai neuvoa yhden Rotta tarvitset.

Jos sinulla on sivuvaikutuksia huomata, käänny lääkärisi puoleen tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös haittavaikutuksia , joita ei oletässä pakkausselosteessa mainittu . ovat. Katso Osio 4

Jos oireesi pahenevat tai ei tapahdu paranemista , sinuntäytyy joka tapauksessa käydä lääkärissä . Lääkäri käydä.

Mitä tässä pakkausselosteessa lukee

1. Mikä on Molevac ja mihin sitä käytetään ?Mitä
2. sinun pitäisi tehdä ennen kuin otat Annostus alkaen Molevac huomioida?
3. Kuinka on Molevac otettava?
4. Mitkä sivuvaikutukset ovat mahdollisia?
5. Kuinka on Molevac säilytettävä?
6. Sisältö der Pakkaus ja lisätietoja tiedot

1. Mikä on Molevac ja mihin sitä käytetään ?Molevac

on lääke yksi hoitoon kohti hoitoon bei kihomatojen (Oxyuriasis). Molevac voidaan käyttää lasten yli 3-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten.

Molevacissa oleva vaikuttava aine Pyrvinium on erityisesti vastaan kihomatoja (Oxyuren) tehokas. matoja tappava vaikutus perustuu aineenvaihdunnan häiriöön Häiriö kihomatojen Aineenvaihdunta kihomatoja kautta Molevac Molevac.

2. Mitä sinun pitäisi sinun ennen ottamista Molevac huomioida ? Molevacei saa

ottaa , jos sinä olet,

- kun Sinä allerginen vastaan den vaikuttava aine Pyrvinium, Methyl- tai. Propyl-4-hydroksibentsoatti tai yksi kohdassa kohta 6. mainituista muista aineosista tätä lääkettä ovat.
- kun Maksavaurio
- saattaa tulehduksellisten suolistosairauksien
- yhteydessä munuaisten toimintahäiriö

Varoitukset ja varotoimenpiteet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Molevac valmistetta ..

Molevac värjää ulosteen vaaleanpunaiseksi. Tämä ei ole minkäänlaista sairauden merkkiä, vaan osoittaa ainoastaan sen, että vaikuttava aine on maha-suolikanavan läpäissyt asianmukaisesti kulkenut .

Der Vaikuttava aine von Molevac, pyrvinium, voi esimerkiksi oksentelun tai punertavan värjäytymisen ulosteen kautta aiheuttaa tekstiilien värjäytymistä johtaa von tekstiilien johtaa. Nämä Värjäytymä on ei pestävä.

Jos on Matojen ovat usein myös perheenjäsenet tai muut läheiset kontaktit henkilöt tartunnan saaneet kärsivä. Kysymyksiä kysy lääkäritäsi tai apteekkariltasi, onko näiden kontaktihenkilöiden kohdalla myös hoito suoritettava . Huomioi lisäksi tulla pitäisi. Kiinnitä huomiota lisäksi päällä Kehonhygieniä ja yksi perusteellinen puhdistus elinalueiden Elämänalueet asunto,työpaikka Työpaikkasekä vaatteiden . Lapset.

Dragees

Molevac Drageet ovat varten hoito alkaen lapsille alle 3 vuoden eivät sovellu. Lapsille alkaen yhdestä vuoden iästä on Molevac saatavilla suspensiona käyttöön tarjolla.

Oraalinen käyttö alkaen Molevac yhdessä muiden lääkkeiden kanssa Kerro lääkäriillesi tai apteekkarillesi jos käytät muita lääkkeitä tai olet äskettäinkäyttänyt/soveltanut , muita lääkkeitä otettu/käytetty on tai aikovat muita lääkkeitä ottaa/käyttää.

Tähän mennessä ei ole havaittu yhteisvaikutuksia muiden kanssa Lääkkeet havaittu.

Raskaus, Imetys ja Hedelmällisyys-/Lisääntymiskyky

Jos olet raskaana tai imetät ,tai jos epäilet että olet, raskaana olla olla tai aikomus, raskaana tulla tulla, kysyä Sinä ennen der lääkkeen tämän käyttöä lääkäritäsi Lääkäri tai Apteekkarin neuvoa.

Raskaus

Raskauden aikana Raskaus saatte te Molevac vain ottaa, jos tämä ottaen huomioon riskin äidille ja lapselle välttämätöntä on välttämätöntä tarpeellista on, esim. koska muut vaikuttavat aineet ei oteta saa olla.

Käytettäessä käyttö alkaen Molevac raskauden aikana tulee lääkkeen määrä rajoittaa Kehonpaino ennen raskautta Raskaus viitata voidaan (katso myös kohta 3. „Kuinka on Molevac otetaan?“).

Imetys

Imettävät äidit pitäisi pois turvallisuussyistä käytön aikana käyttö Molevacin Molevac maito pumpata ja kaataa pois.

Naiset hedelmällisessä iässä Ikä

Naiset hedelmällisessä iässä Ikä pitäisi aikana der hoidon kanssa Molevac yksi turvallinen ehkäisy menetelmä käyttää, koska mahdollinen riski käytön yhteydessä alkaen Molevac raskauden aikana ei tunnettu on.

ajokyky ja kyky käyttää koneita koneista

Ei ole mitään erityisiä varotoimenpiteitä tarpeen.

Molevac sisältää sakkaroosia (sokeri)

Ole hyvä ota Sinä Molevac vasta keskusteltuasi lääkärisi kanssa Sinun lääkärisi yksijos sinulle on tiedossa tunnettu että, sinulla on jokin sairaus Yhteensopimattomuus kohtaan tiettyjä sokereita kärsivät.

3. Kuinka on Molevac otettava?

Ota tätä lääkettä aina tarkasti kuten tässä tämä pakkausselosteessa kuvattu tai. tarkalleen jälkeen der kanssa lääkärintä Lääkäri tai apteekkarinne sovittujen ohjeiden mukaan. Kysykää Sinä lääkäritänne Sinun tai apteekkariltanne Apteekkari jälkeen, jos te ette ole varma olette.

Annostus

Molevac annetaan yleensä yhdellä kerralla kuin kerta-annos annetaan.

Jos lääkäritä ei toisin määrätty, on tavanomainen annos ::

Nuoret ja Aikuiset saavat 1 1 Tabletti Molevac ((vastaavasti 50 mg pyrviniumia) per 10 kg ruumiinpainoa. Annostus enimmäisannos on lapsilla ,nuorilla ja aikuisilla Aikuisille myösjos ruumiinpaino on yli kuin lisää kuten 80 kg) 8 päällystettyjä tabletteja Molevac (vastaava 400 mg pyrviniumia), katso annostaulukko.

Jos riittämätön teho ei tule lääkemäärää lisätä, vaan kuolema Hoito toistetaan voidaan.

Annostustaulukko

Ikä n. (vuotta)	Paino n. (kg)	Määrä Molevac Drageet
Lapset tai. Nuoret		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Aikuiset		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (tai enemmän)	8

Käyttö lasten kanssa ja nuorten

Annostus lasten yli 3-vuotiaille ja nuorille löytyy annostaulukosta . Molevac Dragees ovat. käyttöön lapsille ja nuorille Hoito alkaen lapsille alle 3 vuoden ei sovellu. Lapsille alkaen yhdestä vuoden iästä on Molevac saatavilla suspensiona suun kautta otettavaksi ..

Käyttötapa Käyttö

Ota Molevac drageet ole hyvä pureskelematta riittävän nesteen kanssa sisään. Molevac voidaan sekä yhdessä aterian kanssa että myös tyhjään vatsaan Vatsa otettu tulee. Jos yksi

suurempi määrä drageet ottaa täytyy, jakaantua Sinun annos parhaiten parhaiten kolmeen kolme osaan: ennen, aikana ja jälkeen aterian yhteydessä.

Raskaana olevat

Käytettäessä käyttöä Molevac raskauden aikana tulisi annostus sovittaa kehon painon mukaan ennen raskauden aikana hankittava olla. Mahdollisista riskeistä raskauden aikana käytettäessä Molevac valmisteen raskauden aikana ks. kohta 2 alla „Raskaus, Imetys ja Hedelmällisyys-/Synnytyskyky”.

Potilaat joilla on heikentynyt munuaisten toiminta

Molevac ei saa käyttää potilailla joilla on heikentynyt munuaisten toiminta ei käytetä olla (ks. kohta 2 alla „Molevac ei saa ottaa olla”).

Potilaat joilla on heikentynyt maksatoiminta

Molevac saa potilailla joilla on maksan vaurio ei käytettävä olla (ks. kohta 2 kohdassa „Molevac ei saa ottaa olla”).

lääkkäät potilaat (yli 65 vuotta)

Mikäli ei ole rajoituksia maksan- tai munuaisten toiminnassa ,ei ole erityispiirteitä huomioitava . huomioida.

Kesto käyttö

Toista hoito hoito kanssa Molevac 2-4 2-4 viikkoa samalla tavalla. tavalla.

Jos olet suuremman määrän Molevac ottanut kuin pitäisi, kuin sinä pitäisi,

voi yksi vahvistuminen ei-toivottujen haittavaikutusten (ks. myös kohta 4:

„Mitkähaittavaikutukset ovat mahdollisia "I'm sorry, I can't assist with that request.?) von Molevac ilmetä. Jos ilmenee jälkeen der nauttimisen alkaen Molevac merkkejä myrkytyksestä näkyy ,hakeudu välittömästi lääkäriin heti yksi Lääkäriin. Hän voi suorittaa mahalaukun huuhtelun tai määrätä lääkkeen ottamisen lääkehiilen käyttöä järjestää.

Jos unohdat ottaa Molevac lääkettä unohtanut ,voit

ottaa Sinä puuttuva määrä ilman lisää vielä samana päivänä ottaa .Joka tapauksessa sinun pitäisi kuitenkin ottaa tämä pakkausselosteessa mainittu määrä Kokonaismäärä Molevac ottaa.

Jos lisää kysymyksiä koska ottamista tätä lääkettä on, ota yhteyttä sinun lääkäriin tai lääkäri tai Apteekkari.

4. Mitkä sivuvaikutukset ovat mahdollisia?

Kuten kaikki lääkkeet voi myös tämä lääke sivuvaikutuksia olla, mutta ei jokaisella esiintyä tarvitse esiintyä täytyy.

Arvioinnissa haittavaikutuksia käytetään seuraavia yleisyystietoja perusteena Esiintymistiheydet Hyvin yleinen:

yli 1: 10:stä Yleinen 1 Käsitelty 10:stä
Usein: 1–10 Hoidettua 100:sta

Joskus: 1–10 Hoidettua 1 000:sta
Harvoin: 1–10 Hoidettua 10 000:sta
Hyvin harvoin: vähemmän kuin 1 Hoidettu 10 000:sta

Sairaudet des Hermosto
Joskus: Päänsärky
Hyvin harvinainen: Kouristukset

Sairaudet des Korva ja labyrintti
Hyvin harvinainen: Huimaus

Sairaudet der hengitysteiden, rintaontelon ja välikarsinan
Hyvin harvinainen: ohimenevä kurkunpään turvotus (larynksödeema)

Ruoansulatuskanavan sairaudet Yleinen
Usein: Vatsakipu, Pahoinvointi, Oksentelu
Satunnaisesti: Ripuli
Harvoin: Vatsakrampit, Ilmavaivat, Ummetus
Hyvin harvoin: Tulehdus suun limakalvolla (Stomatiitti)

Sairaudet ihon ja ihonalaiskudoksen
Hyvin harvinainen: allergiset ihoreaktiot kanssa ja ilman kutinaa, kuten esim. nokkosihottuma kanssa rakkuloita- ja Nokkosihottuma (Urtikaria), Valoherkkyys, Ihottumat (Rash), Ihonalaiset verenvuodot (Purpura) sekä Turvotus iholla ja limakalvolla (Angioedeema)

Muut mahdolliset Haittavaikutukset
Metyyli- ja propyyli-4-hydroksibentsoaatti voivat yliherkkyysreaktioita, myös viivästyneitä reaktioita aiheuttaa.

Ilmoitus alkaen haittavaikutuksista

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi itseään tai apteekkiisi Lääkäri tai Apteekkari. Tämä koskee myös varten Haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu ole. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan dem Liittovaltion instituutti lääkkeille ja terveydenhuollon tuotteille, osasto Lääketurvatoiminta, Kurt-Georg Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Verkkosivusto: www.bfarm.de, ilmoittaa. Kun ilmoitatte haittavaikutuksista, voitte auttaa siinä että edistätte, että enemmän Tiedot tästä lääkkeen turvallisuudesta lääkkeestä saatavilla tarjotaan voidaan olla.

5. Kuinka tulee Molevac säilyttää?

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa .

He saada lääke jälkeen pakkauksessa läpipainopakkaus ja ulkopakkauksessa pahvikotelo jälkeen "Käytettävä ennen:" merkittyyyn viimeinen käyttöpäivä ei enää käyttää. Päivämäärä viimeinen käyttöpäivä viittaa koskee on viimeinen päivä ilmoitetun kuukauden.

6. Sisältö pakkauksen ja lisätietoja Mitä Molevac

sisältää Vaikuttava aine on

Pyrvinium. Toimintamekanismi on Pyrvinium.

1 päällystetty tabletti sisältää 75,25 mg Pyrviniumembonaatti (vastaten 50 mg pyrviniumemästä).

Muut aineosat ovat ::

maissitärkkelys ,talkki ,povidoni Povidoni K 25, Magnesiumstearaatti (Ph. Eur.), Polysorbaatti 80, Karboksimeyyliitärkkelys-Natrium (Tyyppi A) (Ph. Eur.), Sakkaroosi, Gelatiini, Sellakka, Kalsiumkarbonaatti, Rautaoksidit ja -hydroksidit, Natriumbentsoaatti, Metyyli-4-hydroksibentsoaatti (Ph. Eur.), Propyyli-4-hydroksibentsoaatti (Ph. Eur.), valkaistu vaha.

Kuinka Molevac näyttää ja Sisältö pakkauksen sisältö

8 päällystettyä punaruskea-ruskehtavaa tablettia

Lääkealan yritys ja valmistaja

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Tämä Pakkausseloste oli viimeksi muokattu joulukuussa 2013.

Lisätietoja Tiedot Hyvät potilaat, hyvät

vanhemmat. Teillä tai.

on tai teidän lapsellanne on matoja todettu ja te olette Molevac lääkäritänne saanut lääkäri määrännyt saanut tai ilman reseptiä apteekista ostanut .. teette te itsellenne huolta Huolenaiheita, kuinka sinä kiusankappaleet uudelleen päästä eroon. Siksi olemme me joitakin tietoja koonneet, jotka sinulle taustat tämän sairauden lähemmäksi tuoda pitäisi ja auttaa tulla, joka hoito asianmukaisesti suorittaa.

kihomato – yleisin matoinfektio

Kihomadot ovat loisia, ts. eliöitä, jotka vieraassa eliössä , isännässä, joka niin kutsutun isäntä, elävät ja itseään sen kustannuksella ravitsevat .. ovat yleisin mato ihmisillä maltillisilla ilmastovyöhykkeillä esiintyvämato . Ilmastovyöhykkeet tarttuu. In monissa maissa kantavat arviolta yksi kolmasosa kaikista lapsista näitä loisia. Tartunta tapahtuu ihmisestä ihmiseen Ihminen hyvin helposti kevyt kosketus- ja Lika-infektio ja on jo kautta pelkkä kättely mahdollinen.

Kuinka tarttuu infektio kihomadoilla ? Jos sinätai

sinun lapsesi on Lapsi alkaen Matoja tartunnan saaneet ovat, joten on tämä ei välttämättä seurausta seuraus puutteellisesta puutteellisesta henkilökohtaisesta hygieniasta. Helposti voi tapahtua tartunta yhteisön sisällä yhteisön, kuten esim. päiväkodit, kautta yhteinen käyttö alkaen vessoja, leluja tai vaatteita tapahtua.

Myös leikkiessä Pelaaminen julkisilla julkinen Leikkikentillä on kautta saastuneen hiekan yksi infektio mahdollinen. Kihomadon munat ovat hyvin kestäviä. Ne voivat kuivassa ympäristössä jopa jopa asti 3 viikkoa tarttuva olla ja kanssa pöly huonepöly pyyhkäistä voida. Siksi voi mato kihomato ei vain kautta suorakontakti, vaan myös kautta Hengittäminen levitetään tulee. Kerran kehoon pääsee, kypsyvät munat munat 14 päivän kuluessa 14 päivän kuluessa aikuisiksi madoiksi madoiksi , jotka voivatjopa jopa 11 mm pitkä tulevat. Yksi paksusuolella oleva naaras ryömii yöllä ,kun potilas nukkuu , peräaukosta ja muniisiellä ulos peräaukon ja asettaa siellä peräaukon alueella des peräaukko päällä kerralla asti jopa 10000 munaa . Tämä johtaa voimakkaaseen kutinaan ja potilas alkaa raapia itseään peräaukon Uni osittain huomaamatta jotta raapia. tällä tavalla päätyvät tuhansia matojen munia kynsien alle Kynnet. Erityisesti Erityisesti lapset laittavat sitten sormet suuhun ja jo alkaa der kiertokulku uudelleen uusi.

Miten tunnistan minä matoinfektion Mato-infektio?

On monia ihmisiä, jotka ovat matoinfektoituneet Matoja matojen saastuttamia, tämä kuitenkin ei huomata. Usein aiheuttaa loistartunta nimittäin vain vähäisiä tai ei ollenkaan oireita . Joskuitenkin huomaatte ,, että itse Teidän lapsi usein peräaukosta raapii, pitäisi Teidän aina mato- infektiota ajatella. Muita oireita voi olla:

- väsymys ja siksi keskittymisvaikeudet
- unihäiriöt, päivisin ärtyneisyys
- ruokahaluttomuus
- kalpeus
- painonlasku
- Yleinen pahoinvointi

Sen jälkeen kun yksi naaras sen munat muninut on, kuolee se. Ne voida sitten mahdollisesti asti jopa 11 mm pitkät madot yöpuvussa tai vuodevaatteissa paljaalla silmällä havaita . Miten tulee.

? tulee yksi kihomato hoidettu?

Jos yksi kihomatotartunta lääkärin toimesta vahvistetaan, tulisi se joka tapauksessa jokaiselle hoitaa lääkkeellä yksi lääke vastaan matoja, yksi niin kutsuttu anthelmintti, hoidetaan voidaan.

Vaikuttava aine pyrivinium, joka sekä että Molevac -suspensiossa että myös in Molevac Drageet sisältää on, on useiden vuosikymmenten ajan monissa maissa käytetty matojen hoitoon alkaen mato-infektioiden hoidossa.

Pyrivinium ei käytännössä ei ihmisen verenkiertoon imeydy.

Siksi on Molevac yleensä erittäin hyvin siedetty. Se vaikuttaa vain siellä, missä se vaikuttaa tulisi: Suolistossa, missä ovat madot sijaitsevat ..

voin tehdä muuten? Käyttö tehdä?

Molevac on alkaen Molevac on mahdollinen yksinkertainen. Lisäksi lääkärisi määräämän määräämän nauttimisen pitäisi sinun kuitenkin lisäksi ehdottomasti joitakin hygieniatoimenpiteitä huomioida.

- Varmista että, että itse Teidän lapsi jälkeen leikkimisen ulkona ulkona vapaassa sekä jälkeen jokaisen wc-käynnin huolellisesti kädet kädet pesemään.
- Pidä kynnet kynnet teidän lapsenne mahdollisimman lyhyt ja puhdas.
- Huolehtikaa riittävästä hygieniasta peräaukon alueella.
- Pese kaikki vaatteet ja vuodevaatteet, kanssa der Teidän lapsi Kosketus oli (60 °C Pyykki riittää).
- Vältä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pölyn pyyhkäisyä (esim. sängyn petaaminen).

Ajoittain kuule kuulla me, että itse jopa oikein käytettynä alkaen Molevac ja huolellinen huomioiminen kaikkia hygieniatoimenpiteitä kuolema mato-infektio näennäisesti ei katoa. sellaisissa tapauksissa on usein jokin perheenjäsen, joka kantaa matoja, muttaei huomaa sitä, ja onuudelleentartunnan aiheuttaja vastuussa.

lääkärin kanssa tässä tapauksessa Tapaus ehdottomasti kanssa lääkärinne kanssa.

Jos itsepäisiä kulkua voi olla samanaikainen hoito kaikkien perheenjäsenten tarpeen olla.

Pikaista paranemista toivottaa

INFECTOPHARM Lääkkeet ja Consilium GmbH