

Notice d'utilisation: Information pour l'utilisateur

Molevac® Dragées

50 mg enrobées Comprimés Substance active: Pyrvinium

Pour les enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes

Lisez attentivement l'intégralité de la notice avec soin jusqu'au bout, avant de avec le prise de ce médicament commencer, car elle contient des informations importantes.

Prenez ce médicament toujours exactement comme dans cette Notice d'emballage décrit ou précisément selon les instructions de votre médecin ou pharmacien un.

Conservez la notice d'emballage . Peut-être souhaitez-vous vous ces plus tard encore lire.

Questions Vous votre pharmacien, si vous plus informations ou un conseil avez besoin.

Si vous effets secondaires remarquer, adressez -vous à votre médecin ou pharmacien.

Cela s'applique également aux effets secondaires , qui ne sont pas indiqués danscette notice Notice d'emballage indiqué Voir. Voir Section 4

Si vos symptômes s'aggravent ou aucune amélioration n'apparaît ,vous devez consulter un médecin dans tous les cas.

Ce qui est cette notice contient

1. Qu'est-ce que est Molevac et dans quel cas est-il utilisé ?Quelles
2. précautions devez-vous prendre avant de prendre de Molevac tenir compte?
3. Comment est Molevac à prendre?
4. Quels effets secondaires sont possibles?
5. Comment est Molevac à conserver?
6. Contenu du Emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que est Molevac et à quoi sert il utilisé?

Molevac est un médicament pour le traitement chez infestation par les oxyures (Oxyurose). Molevac peut être utilisé chez les enfants à partir de 3 ans, les adolescents et les adultes.

Le dans Molevac est le principe actif Pyrvinium est spécialement contre oxyures (oxyures) efficace. L' action vermifuge effet repose sur une perturbation du métabolisme des oxyures par Molevac.

2. Que devriez -vous avant de prendre de Molevac considérer?

Molevac ne doit pas être pris ,si

- vous Vous allergique contre le principe actif Pyrvinium, Méthyl- ou. Propyl-4-hydroxybenzoate ou un des dans section 6. mentionnés autres composants de ce médicament sont.
- chez Lésion hépatique
- en cas de inflammatoires maladies intestinales
- en cas de insuffisance rénale

Mises en garde et précautions

Veillez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre Molevac . prendre.

Molevac colore les selles rouge clair. Cela n'a aucune valeur pathologique, mais indique seulement que le principe actif a traversé le tractus gastro-intestinal correctement conformément se produit a.

Le principe actif de Molevac, le pyrvinium, peut par exemple par vomissements ou par coloration rouge des selles entraîner une décoloration de textiles provoquer. Ces décoloration est non lavable.

En cas de une infestation par des vers sont souvent également les membres de la famille ou d'autres proches contacts avec concerné. Questions Vous votre médecin ou pharmacien, si chez ces contacts également un traitement effectué devrait être. Faites attention en outre sur Hygiène corporelle et une minutieuse nettoyage des espaces de vie (appartement, lieu de travail) ainsi que des vêtements.

Enfants

Molevac Dragées sont pour le traitement des enfants de moins de 3 ans ne sont pas appropriés. Pour les enfants à partir de un âge de 1 an est disponible Molevac sous forme de suspension à disposition.

Prise de Molevac ensemble avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien, si vous prenez d'autres médicaments ou utilisez, récemment récemment autres médicaments pris/utilisés avez ou envisagez autres médicaments prendre/utiliser.

Jusqu'à présent aucune interactions avec d'autres autres Médicaments observé.

Grossesse, Allaitement et Fertilité-Capacité de procréation

Si vous êtes enceinte ou allaitez ,ou si vous soupçonnez soupçonner, enceinte de être ou envisagez, enceinte de devenir, consultez votre avant de prendre ce médicament votre médecin ou pharmacien pour conseil.

Grossesse

Pendant la grossesse vous ne devez prendre Molevac que si, cela est pris en compte des risques pour la mère et l'enfant absolument nécessaire nécessaire est, p. ex. parce que d'autres principes actifs ne pris être autorisés.

Lors de l' utilisation de Molevac pendant la grossesse doit la quantité de médicament à la Poids corporel avant la grossesse référé être (voir aussi section 3. « Comment prendre Molevac à prendre? »).

Allaitement

Mères allaitantes devraient être de raisons de sécurité pendant l' utilisation de Molevac le lait tirer et jeter.

Les femmes en âge de procréer Âge

Les femmes en âge de procréer Âge devraient pendant le traitement avec Molevac une méthode contraceptive appliquer, car le risque possible lors de l'utilisation de Molevac pendant la grossesse n'est pas connu est.

Aptitude à conduire et capacité à utiliser des machines

Il n'y a aucune précaution particulière requise.

Molevac contient du saccharose (sucre)

Veuillez prendre vous Molevac seulement après consultation avec votre médecin un, si vous savez que, vous souffrez d'une intolérance envers certains sucres souffrez.

3. Comment est Molevac à prendre?

Prenez ce médicament toujours exactement comme dans cette notice décrite ou exactement après le avec votre médecin ou pharmacien convenue accord un. Posez vos à votre médecin ou pharmacien après, si vous vous pas certain êtes.

Dosage

Molevac est en général administré comme dose unique administré.

Si par médecin non autrement prescrit, est la dose habituelle:

Enfants à partir de 3 ans, Adolescents et Adultes reçoivent 1 comprimé enrobé Molevac (correspondant 50 mg de pyrvinium) par 10 kg poids corporel. La dose maximale est chez les enfants, les adolescents et les adultes (même chez un poids corporel de plus de 80 kg) 8 enrobées comprimés Molevac (correspondant 400 mg de pyrvinium), voir tableau de dosage.

En cas de efficacité insuffisante il faut ne pas quantité de médicament augmentée, mais le Traitement répété être.

Tableau de dosage

Âge env. (années)	Poids corporel env. (kg)	Nombre Molevac Dragées
Enfants ou. Adolescents		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Adultes		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (ou plus)	8

Application chez les enfants et les adolescents

La posologie chez les enfants à partir de 3 ans et les adolescents peuvent être consultées dans le tableau de posologie .. Dragées sont pour les pour la Traitement de enfants de moins de 3 ans non approprié. Pour les enfants à partir de un âge de 1 an est disponible Molevac sous forme de suspension à prendre disponible Disponibilité.

emploi Application

Prenez Molevac dragées s'il vous plaît sans mâcher avec suffisamment de liquide ingérer. Molevac peut être pris pendant un repas ou à jeun vide Estomac pris être. Si vous un plus grande quantité dragées prendre devez, répartissez la prise de préférence sur trois portions :: avant, pendant et après le repas.

Femmes enceintes

Lors de l'utilisation de Molevac pendant la grossesse doit le dosage au poids corporel avant la grossesse obtenu être. Concernant les risques lors de l'utilisation de Molevac pendant la grossesse voir section 2 sous «Grossesse, allaitement et fertilité-/fécondité”.

Patients avec fonction rénale réduite

Molevac ne doit pas chez les patients avec fonction rénale réduite ne utilisé être (voir section 2 sous «Molevac ne doit pas être pris »).Patients

avec fonction hépatique altérée Molevac

Molevac doit chez les patients avec atteinte hépatique ne être utilisé doit (voir section 2 sous «Molevac ne doit pas être pris »).

Personnes âgées Patients (plus de 65 ans)

Sauf en cas de altération de la fonction hépatique ou de la fonction rénale présente, il n'y a aucune particularité à prendre en compte.

Durée de l'application

Répétez le traitement avec Molevac après 2 à 4 semaines de la même manière.

Si vous avez pris une quantité plus importante de Molevac que prévu, comme vous devriez,

peut un renforcement des effets indésirables (voir également section 4 : «Quelles effets secondaires sont possibles»?) de Molevac survenir. Si après la prise de Molevac des signes d'une intoxication apparaissent ,consultez immédiatement un immédiatement un médecin. Il peut un lavage gastrique ou l' administration de charbon médical ordonner.

Si vous avez oublié de prendre Molevac ,vous

pouvez Vous le manquant quantité sans autre encore le même jour prendre. Dans chaque cas devriez vous mais le dans cette notice mentionnée Quantité totale Molevac prendre.

Si vous d'autres questions sur la prise de ce médicament avez, consultez votre médecin ou votre docteur ou Pharmacien.

4. Quelles effets secondaires sont possibles?

Comme tous les médicaments peut aussi ce médicament avoir des effets secondaires , quicependant ne chez tout le monde apparaître ne doivent pas doivent.

Lors de l'évaluation des effets indésirables sont les fréquences prises en compte:

Très fréquent:	plus de 1 patient sur 10
Fréquent:	1 à 10 Traitée sur 100
Occasionnellement:	1 à 10 Traitée sur 1.000

Rarement: 1 à 10 Traitée sur 10.000
Très rarement: moins que 1 Traitée sur 10.000

Maladies du système nerveux
Occasionnellement: Maux de tête
Très rarement: Convulsions

Maladies de l'oreille et du labyrinthe
Très rarement: Vertiges

Maladies des voies respiratoires, de la cavité thoracique et du médiastin
Très rare: œdème laryngé interne temporaire (œdème du larynx)

Maladies du tractus gastro-intestinal Fréquent
Fréquent: Douleurs abdominales, nausées, Vomissements
Occasionnellement: Diarrhée
Rarement: Crampes d'estomac, Flatulences, Constipation
Très rarement: Inflammation de la muqueuse buccale (Stomatite)

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Très rare: manifestations cutanées allergiques avec et sans démangeaisons, comme p. ex. urticaire avec vésicules- et Formation de papules (Urticaire), Photosensibilité, Éruptions cutanées (Éruption), Hémorragies cutanées (Purpura) ainsi que Gonflement de la peau et muqueuse (Œdème de Quincke)

Autres possibles Effets secondaires
Méthyl- et propyl-4-hydroxybenzoate peuvent réactions d'hypersensibilité, y compris réactions tardives provoquer.

Déclaration des effets indésirables

Si vous effets indésirables remarquez, adressez -vous à votre médecin Médecin ou Pharmacien. Cela s'applique également pour les effets secondaires, qui ne sont pas dans cette notice indiqués sont. Vous pouvez les effets secondaires également directement à l'Institut fédéral pour les médicaments et produits médicaux, Abt. Pharmacovigilance, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, signaler. En vous effets indésirables signalez, vous pouvez contribuer à ce que plus de personnes Informations sur la sécurité de ce médicament à disposition fournies être.

5. Comment est Molevac conserver?

Conservez ce médicament hors de la portée des enfants inaccessible .

Vous peuvent le médicament après la sur plaquette et sur le emballage extérieur après «À utiliser avant :» indiqué date de péremption pas plus utiliser. La date de péremption se réfère à sur le dernier jour du indiqué mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Qu'est-ce que Molevac contient

La substance active est Pyrvinium.

1 enrobé comprimé contient 75,25 mg Pyrvinium embonate (équivalent à 50 mg de base de pyrvinium).

Les autres composants sont:

Mannitol (Ph. Eur.), amidon de maïs, talc, povidone K 25, Stéarate de magnésium (Ph. Eur.), Polysorbate 80, Amidon carboxyméthylé-sodium (Type A) (Ph. Eur.), Saccharose, Gélatine, Gomme-laque, Carbonate de calcium, Oxydes de fer et hydroxydes, Benzoate de sodium, Méthyl-4-hydroxybenzoate (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoate (Ph. Eur.), cire blanchie.

Comment Molevac ressemble et Contenu de l'emballage

8 enrobés rouge-brunâtres comprimés

Exploitant pharmaceutique et fabricant

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Ces Notice d'emballage a été dernièrement révisée en décembre 2013.

Autres informations conformément à l'article 11 alinéa 1 phrase 7 AMG :

Chers patients, chers parents.

Chez vous ou votre enfant a été infestation par des vers constaté et vous avez Molevac de votre médecin prescrit obtenu ou sans ordonnance à la pharmacie acheté. Bien sûr vous vous inquiétez souci, comment vous les parasites à nouveau éliminer. C'est pourquoi nous avons rassemblé quelques informations , qui vous expliquent lesorigines de cette maladie de manière détaillée et aider à comprendre être, le traitement correctement effectuer.

oxyurose – la plus fréquente helminthiase

oxyures sont parasites, c.-à-d. organismes, qui dans un étranger organisme, l' dits hôte, vivent et se sur ses frais nourrissent.

Oxyures sont les de loin les plus fréquents type de ver Type de vertempérés zones climatiques . En. En de nombreux pays hébergent environ un tiers de tous les enfants ces parasites. La transmission d'homme à homme se fait très facilement par contact direct et Infection par la saleté et est déjà par simple poignée de main possible.

Comment se produit une infection par les oxyures?

Si vous ou votre enfant est oxyures infesté sont, donc est ce n'est pas forcément la conséquence de manque de hygiène personnelle. Il est facile de une transmission au sein de établissements communautaires, comment p. ex. jardins d'enfants, par utilisation commune de toilettes, jouets ou vêtements se produire.

Même en jouant sur publics aires de jeux est par sable contaminé une une infection possible. Les œufs d'oxyures sont très stables. Ils peuvent dans un environnement sec jusqu'à à 3 semaines contagieux être et avec la poussière de chambre soulevée être. Par conséquent peut le oxyure non seulement par contact direct, mais aussi par Inhalation transmis sont. Une fois dans le corps atteint, mûrissent les œufs en 14 jours en vers adultes vers matures, qui peuvent atteindre 11 mm de long sont. Un dans côlon présente femelle rampe la nuit, quand le patient concerné dort, hors de l'anus et dépose là dans la zone de l'anus à une fois jusqu'à à 10000 œufs déposés. Cela entraîne un fort prurit et le patient commence à se gratter Sommeil partiellement inaperçu à gratter. Sur ce chemin parviennent des milliers d'œufs de vers sous les ongles. En particulier les enfants mettent alors les doigts dans la bouche et déjà commence le cycle de nouveau.

Comment reconnaître je une infection par les oxyures?

Il y a beaucoup de personnes qui sont infectées par les oxyures affecté sont, cela cependant pas remarquer. Souvent provoque l' infestation par les vers en effet seulement légers ou aucun symptômes . Si vous cependant remarquez ,, que se Votre enfant souvent à l'anus se gratte, devraient une infection par des vers penser .. signes peuvent être : fatigue

- et et donc faiblesse de concentration
- troubles du sommeil, pendant la journée irritabilité
- perte d'appétit
- pâleur
- perte de poids
- Généralités malaise général

Après que une femelle ses œufs pondu a, meurt elle pouvoir alors éventuellement la jusqu'à à 11 mm longs vers dans pyjama ou dans le linge de lit avec l'œil nu reconnaître.

Comment est un oxyurose traité?

Si une infection par les oxyures par le médecin confirmée est, elle doit dans tous les cas avec un médicament contre les vers, un si appelé anthelminthique, traité être.

La substance active Pyrvinium, qui à la fois dans Molevac suspension ainsi que dans Molevac Dragées contenu est, est utilisé depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays pour le traitement des infections parasitaires utilisé.

Pyrvinium est pratiquement pas dans le humain système sanguin absorbé.

C'est pourquoi est Molevac en général particulièrement bien toléré. Il agit seulement là, où il agir doit: Dans l'intestin, où se les vers trouvent.

Que puis-je faire d'autre encore ?

L' utilisation de Molevac est envisageable simple. En plus de celle prescrite par votre médecin prescrite prise devriez vous cependant également absolument quelques mesures d'hygiène respecter.

- Assurez-vous que, que se Votre enfant après le jeu à l'extérieur ainsi après chaque passage aux toilettes soigneusement les mains lave.
- Gardez les ongles de votre enfant le plus court possible et propre.
- Assurez-vous d'une hygiène suffisante dans la région anale.
- Lavez tous les vêtements et le linge de lit, avec le Votre enfant dans Contact était (60 °C Linge suffit).
- Évitez de préféablement le soulèvement de poussière (par ex. lors de faire le lit).

De temps en temps écouter nous, que même avec une utilisation correcte de Molevac et une attention minutieuse soigneux toutes les mesures d'hygiène l'infection par les vers semble ne pas disparaître . Dans disparaît. Dans de tels cas est souvent un membre de la famille, qui héberge des vers, mais ne s'en rend pas compte, responsable de la réinfection responsable. à votre médecin dans ce Cas absolument avec votre médecin.

En cas de persistants évolutions peut un simultanée traitement de tous les membres de la famille nécessaire être.

Bon rétablissement souhaite

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH